

Ё.У. СОАТОВ

**ОЛИЙ
МАТЕМАТИКА**

3



Е. У. СОАТОВ

ОЛИЙ МАТЕМАТИКА

Беш жилдлик

3- жилд

*Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлиги олий техника ўқув юрталари
учун дарслик сифатида тавсия этган*

511075

с-73

Таъризчилар: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти «Олий математика» кафедраси, Тошкент электротехника алоқа институти «Олий математика» кафедраси

Таърир ҳайъати: Физика-математика фанлари номзодлари, доцентлар: Е. М. ХУСАНБОВЕВ (масъул), А. Қ. ОМОНОВ, техника фанлари номзодлари, доцентлар: Р. Ж. ИСОМОВ, Ш. Р. ХУРРАМОВ

Дарслик Олий техника институтлари талабалари учун мўлжалланган. Унда келтирилган қисқа назарий маълумотлар, талабаларнинг ўқув жараёнини ташкил этишга ва назорат қилишга алоқадор амалий машғулоти турлари олий ўқув юртларининг муҳандис-техник ва кишлок хўжалик мутахассисликлари учун математик фанларнинг амалдаги «Дастури»га тўла мос келади.

Китобнинг барча бобларида дарсхона топшириқлари, мустақил ишлаш учун мўлжалланган масала-миқоллар, назорат ва намунавий ҳисоб топшириқлари ҳамда лаборатория ишларидан олдин тегишли қисқа назарий маълумотлар келтирилиб, мос масала-миқолларни ечиш услублари кўрсатилган.


ISBN 5—640—01965—4

© «ЎЗБЕКИСТОН» нашриёти, 1996

1602010000—137

С катъий буюртма — 95

М 351(04) 96



СЎЗ БОШИ

Китобхон эътиборига ҳавола қилинаётган мазкур «Олий математика» дарслигининг учинчи жилдига чизиқли алгебра ва аналитик геометрия элементлари, математик анализга кириш, бир ўзгарувчи функцияларнинг дифференциал ҳисоби, функцияларни ҳосилалар ёрдамида текшириш, ҳақиқий ўзгарувчининг вектор ва комплекс функциялари, бир ўзгарувчи функцияларнинг интеграл ҳисоби, бир неча ўзгарувчи функциялар, оддий дифференциал тенгламалар, қаторлар, Фурье алмаштиришлари, каррали интеграллар, эгри чизиқли ва сирт интеграллари, векторлар анализи, математик физика тенгламалари, эҳтимоллик назарияси ва математик статистика ҳамда сонли усуллар қисмларининг уч хил ўқув шакли (кундузги, кечки, сиртки) учун амалий машғулот жараёнлари ва назорат турларини (дарсхона топшириқлари, мустақил ва назорат ишлари, намунавий ҳисоб топшириқлари, лаборатория ишлари ва ҳ. к.) ташкил қилишга керакли бўлган тушунчалар, формулалар, қондалар ва усуллар исботсиз келтирилган ва уларнинг моҳияти кўп миқдордаги мисоллар ечимларида тушунтирилган.

Дарсликнинг учинчи жилдини ёзишда ҳам олий ўқув юрталарининг муҳандис-техник ва кишлок хўжалик мутахассисликлари учун математик фанларнинг амалдаги «Дастур»да тавсия қилинган асосий ва кўшимча адабиётлардан ҳамда ўзбек тилида чоп этилган дарслик ва ўқув қўлланмаларидан кенг фойдаланилди.

Муаллиф дарсликнинг ушбу жилдини тузишда ва унга киририлган қисмларнинг қисқа мазмунларини ёзишда, масала ва мисолларнинг ечимларини текширишда берган маслаҳатлари ва ёрдамлари учун Тошкент архитектура-қурилиш институти «Олий ва амалий математика» кафедраси аъзоларига, ҳолисона такриз, танқид, уни ёзишда йўл қўйилган камчиликларни кўрсатганлари учун Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти «Олий

математика» кафедраси, Тошкент электротехника алоқа институти «Олий математика» кафедраси жамовларига, таҳрир хайъатининг аъзолари, доцентлар Е. М. Хусанбоёв, Р. Ж. Исомов, А. Қ. Омонов, Ш. Р. Хуррамовларга ўз миннатдорчилигини билдиради ва уларнинг беминнат меҳнатларини эътироф этишни ўзининг бурчи деб билади.

Дарслик камчиликлардан холи эмас, албатта. Уни янада тақомиллаштиришга қаратилган танқидий фикр ва мулоҳазаларни шидқидилдан билдирган ҳамкасб ўртоқларга муаллиф олдиндан ўзининг илиқ ҳурматини ва ташаккурини билдиради.

Муаллиф

ЧИЗИҚЛИ АЛГЕБРА ВА АНАЛИТИК ГЕОМЕТРИЯ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

1-§. Иккинчи ва учинчи тартибли детерминантлар.
Детерминантларни ҳисоблаш. Детерминантларнинг асосий
хоссалари. Юқори тартибли детерминантлар.

1.1.1. Тўртта сондан иборат

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

квадрат жадвал *иккинчи тартибли квадрат матрица* дейилади.

Иккинчи тартибли квадрат матрицага мос келувчи *иккинчи тартибли детерминант* деб куйидаги белги ва тенглик билан аниқланувчи сонга айтилади:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

Шунга ўхшаш ушбу

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - \\ - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{32}a_{23}a_{11}$$

ифода *учинчи тартибли детерминант* дейилади. Бу ифодага мусбат ишора билан кирадиган ҳар бир кўпайтма, ҳамда манфий ишорали кўпайтмалар кўпайтувчиларини алоҳида-алоҳида пунктир чизиклар ёрдамида туташтириб, учинчи тартибли детерминантларни ҳисоблаш учун хотирада осон сақланадиган «учбурчаклар қоидаси»га эга бўламиз (1-шакл).

$$\begin{vmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{vmatrix}$$

1-шакл

Детерминант a_{ik} элементининг M_{ik} минори деб, шу детерминантдан бу элемент турган қатор ва устунни ўчириш натижасида ҳосил бўлган детерминантга айтилади.

Детерминант a_{ik} элементининг алгебраик тўлдирувчиси

$$A_{ik} = (-1)^{i+k} M_{ik}$$

муносабат билан аниқланади.

1.1.2. Детерминантларнинг асосий хоссалари:

а) агар детерминантнинг барча сатрлари мос устунлари билан алмаштирилса, унинг қиймати ўзгармайди;

Кейинги хоссаларни таърифлашда сатрлар ва устунларни бир сўз билан қатор деб атаймиз.

б) агар детерминант ноллардан иборат қаторга эга бўлса, унинг қиймати нолга тенг бўлади;

в) агар детерминант иккита бир хил параллел қаторга эга бўлса, унинг қиймати нолга тенг бўлади;

г) агар детерминант иккита параллел қаторининг мос элементлари мутаносиб (пропорционал) бўлса, унинг қиймати нолга тенг бўлади;

д) бирор қатор элементларининг умумий кўпайтувчисини детерминант белгисидан ташқарига чиқариш мумкин;

е) агар детерминант иккита параллел қаторининг ўринлари алмаштирилса, детерминант ишорасини карама-қаршисига ўзгартиради;

ж) детерминантнинг қиймати бирор қатор элементлари билан шу элементларга тегишли алгебраик тўлдирувчилари кўпайтмалари йиғиндисига тенг.

Бу хосса *детерминантни* қатор элементлари бўйича *ёйиш* дейилади. Ундан детерминантларни ҳисоблашда фойдаланилади.

з) бирор қатор элементлари билан параллел қатор мос элементлари алгебраик тўлдирувчилари кўпайтмаларининг йиғиндисига тенг.

и) агар детерминант бирор қаторининг ҳар бир элементи икки кўшилувчининг йиғиндисидан иборат бўлса, у ҳолда детерминант икки детерминант йиғиндисига тенг бўлиб, уларнинг бири тегишли қатор биринчи кўшилувчилардан, иккинчиси эса иккинчи кўшилувчилардан иборат бўлади. Масалан

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + b_1 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + b_2 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} + b_3 & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}$$

к) агар детерминантнинг бирор қатори элементларига параллел қаторнинг мос элементларини бирор ўзгармас сонга қўпайтириб қўшилса, детерминантнинг қиймати ўзгармайди. Масалан:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + \lambda a_{11} & a_{32} + \lambda a_{12} & a_{33} + \lambda a_{13} \end{vmatrix}.$$

1.1.3. ($n \times n$) та сондан иборат ушбу

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

жадвал n -тартибли квадрат матрица дейилади. Унинг n -тартибли детерминанти деб қуйидаги белги ва тенглик билан аниқланувчи сонга айтилади:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n}.$$

1.1.2 бандда келтирилган хоссаларнинг ҳаммаси исталган тартибли детерминантга тегишлидир. Ихтиёрий тартибли детерминантни ҳисоблашнинг иккита усулини келтираемиз:

1. *Детерминант тартибини пасайтириш усули* — детерминант бирор қатори элементларининг биттасидан бошқаларини олдиндан нолга айлантириб олиб, шу қатор бўйича ёйиш усули.

1-мисол.

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 3 & -1 & 12 & 8 \\ -5 & 3 & -34 & -23 \\ 1 & 1 & 3 & -7 \\ -9 & 2 & 8 & -15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 12 & 8 \\ 4 & 0 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 15 & 1 \\ -3 & 0 & 32 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= -(-1)^3 \begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 4 & 15 & 1 \\ -3 & 32 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 0 & 13 & 0 \\ -7 & 30 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 13 \\ -7 & 30 \end{vmatrix} = 91. \end{aligned}$$

2. Детерминантни учбурчак кўринишга келтириш усули детерминантни шундай алмаштиришдан иборатки, унинг бош диагоналидан бир томонида етувчи ҳамма элементлари нолга айлантирилади ва учбурчаксимон шаклга келтирилади, масалан

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Равшанки, учбурчак шаклидаги детерминантнинг киймати бош диагоналлари элементлари кўпайтмасига тенг:

$$\Delta = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$$

2-мисол.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ -2 & -4 & -6 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 8 = 48.$$

1-дирсхона топшириғи

1. Учинчи тартибли детерминантларни учбурчак кондасидан фойдаланиб ҳисобланг:

$$а) \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix}; \quad б) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{vmatrix}; \quad в) \begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 16 \\ 0 & -1 & 10 \end{vmatrix}.$$

Ж: а) -12; б) 0; в) 87.

2. Детерминантларни тартибини пасайтириш усулидан фойдаланиб ҳисобланг:

$$а) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -5 \\ 3 & 2 & 7 \end{vmatrix}; \quad б) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 6 & 1 \end{vmatrix}; \quad в) \begin{vmatrix} 2 & 4 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{vmatrix}.$$

Ж: а) -2; б) 0; в) 16.

3. Детерминантларни учбурчак шаклига келтириб ҳисобланг:

$$a) \begin{vmatrix} 2 & 3 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & -5 \end{vmatrix}, \quad б) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 9 \\ 1 & -1 & 7 & 4 \\ 1 & 3 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

Ж: а) 48; б) 20.

4. Детерминантларни ёқдин соддалаштириб, кейин ҳисобланг:

$$a) \begin{vmatrix} x^2+a^2 & ax & 1 \\ y^2+a^2 & ay & 1 \\ z^2+a^2 & az & 1 \end{vmatrix}, \quad б) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 5 \end{vmatrix}, \quad в) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$$

Ж: а) $a(x-y)(y-z)(z-x)$; б) 640;
в) $(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$.

1-мустақил иш

Детерминантларни ҳисобланг:

$$1. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{Ж: } 32, \quad 2. \begin{vmatrix} 0 & -5 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{Ж: } 24$$

$$3. \begin{vmatrix} -4 & -3 & 5 & -2 \\ 5 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 8 & 1 & -6 \\ 5 & -2 & 3 & 8 \end{vmatrix} \quad \text{Ж: } 120, \quad 4. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{Ж: } 192$$

2-§. Икки ва уч номаълумли чизиқли тенгламалар системаси.
Кramer қоидаси. Гаусс усули

1.2.1. Икки номаълумли иккита чизиқли тенгламалар системаси

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

нинг бош детерминанти $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ бўлганда, ягона ечимга

эга ва у Крамер қондаси бўйича қуйидаги формулалар билан ҳисобланади:

$$x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{\Delta}.$$

бу ерда

$$\Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}.$$

Агар $\Delta=0$ ва шу билан бирга $\Delta_{x_1}, \Delta_{x_2}$ лардан ақалли биттаси нолга тенг бўлмаса, система ечимга эга эмас.

Агар $\Delta = \Delta_{x_1} = \Delta_{x_2} = 0$ бўлса, у ҳолда берилган система чексиз кўп ечимга эга бўлади.

1.2.2. Уч номаълумли учта чизиқли тенгламалар системаси

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3, \end{cases}$$

нинг бош детерминанти

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0$$

бўлганда ягона ечимга эга бўлиб, бу ечим Крамер формулалари билан ҳисобланади:

$$x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{\Delta}, \quad x_3 = \frac{\Delta_{x_3}}{\Delta}.$$

бунда

$$\Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\Delta_{x_3} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

Агар $\Delta=0$ ва $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$ детерминантлардан акалли биттаси нолдан фаркли бўлса, у ҳолда берилган система ечимга эга бўлмайди ва бу система биргаликда бўлмаган система деб аталади. Камида битта ечимга эга бўлган система биргаликдаги система деб аталади.

1-мисол. Чизикли тенгламалар системасини ечинг:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -4; \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 8; \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -6. \end{cases}$$

Ечиш. Детерминантларни топамиз:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & -4 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 4.$$

Детерминант $\Delta=4 \neq 0$ бўлгани учун система ягона ечимга эга ва Крамер формуласини қўллаб, уни топамиз:

$$\Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} -4 & -2 & 1 \\ 8 & 2 & -1 \\ -6 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 4;$$

$$\Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 3 & 8 & -1 \\ 2 & -6 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 0 & 20 & -4 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 20 & -4 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 8;$$

$$\Delta_{x_3} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 3 & 2 & 8 \\ 2 & -3 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 0 & 8 & 20 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 20 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -4.$$

$$x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{\Delta} = 1, \quad x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{\Delta} = 2, \quad x_3 = \frac{\Delta_{x_3}}{\Delta} = -1.$$

1.2.3. n та номаълумли n та чизикли тенгламалар системасини n нинг катта ($n \geq 4$) қийматларида Крамер кондаси билан ечиш бир нечта юқори тартибли детерминантларни ҳисоблашни талаб этади. Шу сабабли, бундай системаларни ечишда Гаусс усулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Бу усулнинг моҳияти шундан иборатки, унда номаълумлар кетма-кет йўқотилиб, система учбурчаксимон шаклга келтирилади. Агар система учбурчаксимон шаклга келса, у ягона ечимга эга бўлади ва унинг номаълумлари охириги тенгламадан бошлаб топиб борилади. (Система чексиз қўп ечимга эга бўлса, номаълумлар кетма-кет йўқотилгач, у трапециясимон шаклга келади.)

2-мисол. Ушбу

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1, \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3, \\ 2x_1 + 3x_2 + 11x_3 + 5x_4 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -3 \end{cases}$$

чизикли тенгламалар системасини Гаусс усули билан ечинг.

Ечиш. Иккинчи, учинчи, тўртинчи тенгламалардан x_1 ларни йўқотамиз. Бунинг учун биринчи тенгламани кетма-кет -1 , -2 , -2 га кўпайтирамиз ва моҳ равишда иккинчи, учинчи, тўртинчи тенгламалар билан қўшамиз. Натижада ушбу системага эга бўламиз:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1, \\ 2x_3 - 2x_4 = 4, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ -x_2 - 7x_3 - 2x_4 = -5. \end{cases}$$

ёки

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 7x_3 + 2x_4 = 5, \\ x_3 - x_4 = 2 \end{cases}$$

Учинчи тенгламадан иккинчи тенгламани айирамиз:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ 6x_3 + x_4 = 5, \\ x_3 - x_4 = 2. \end{cases}$$

сўнгра тўртинчи тенгламани -6 га кўпайтириб, учинчи тенгламага қўшсак, учбурчакли система ҳосил бўлади:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_3 - x_4 = 2, \\ 7x_4 = -7. \end{cases}$$

Бундан,

$$\begin{aligned}x_4 &= -1, \\x_1 &= 2 + x_4 = 1, \\x_2 &= -x_3 - x_4 = 0, \\x_1 &= 1 - x_2 - 5x_3 - 2x_4 = -2.\end{aligned}$$

Шундай қилиб,

$$x_1 = -2, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = -1.$$

2- дарсхона топшириги

1. Чизикли тенгламалар системаларини ечинг:

$$\begin{aligned}\text{а) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3, \\ 3x_1 + 2x_2 = 4; \end{cases} & \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 - x_2 = 2, \\ 6x_1 - 2x_2 = 1; \end{cases} & \quad \text{в) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 1, \\ 4x_1 + 2x_2 = 2; \end{cases} \\ & \quad \text{г) } \begin{cases} x_1 - 2x_2 = 0, \\ 3x_1 + x_2 = 0, \end{cases} & \quad \text{д) } \begin{cases} 3x_1 - x_2 = 2, \\ 4x_1 + 5x_2 = 9. \end{cases}\end{aligned}$$

Ж: а) $x_1 = 2, x_2 = -1$; б) системанинг ечимлари йўқ; в) $x_1 = 1, x_2 = 1$; г) $x_1 = 0, x_2 = 0$; д) $x_1 = 1, x_2 = 1$.

2. Чизикли тенгламалар системаларини ечинг:

$$\begin{aligned}\text{а) } \begin{cases} 5x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 14, \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 16; \end{cases} & \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + x_2 - 7x_3 = 0, \\ x_1 - 6x_2 + x_3 = 0, \\ 5x_1 - x_2 - x_3 = 0; \end{cases} \\ & \quad \text{в) } \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 8, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases}\end{aligned}$$

Ж: а) $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$; б) $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$; в) $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = -1$.

3. Тенгламалар системасини Гаусс усули билан ечинг:

$$\begin{aligned}\text{а) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8, \\ x_2 + 3x_3 + x_4 = 15, \\ 4x_1 + x_3 + x_4 = 11, \\ x_1 + x_2 + 5x_4 = 23; \end{cases} & \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 6, \\ x_1 - 2x_2 + x_4 = -6, \\ x_2 + x_3 + 3x_4 = 16, \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 6. \end{cases}\end{aligned}$$

Ж: а) $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 4$; б) $x_1 = 8, x_2 = 6, x_3 = 4, x_4 = 2$.

1. Чизикли тенгламалар системаларини Крамер қоидаси бўйича ечинг ва текширинг:

$$\text{а) } \begin{cases} 7x_1 + 4x_2 - x_3 = 13, \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -10; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_3 = -5, \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 17, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -7. \end{cases}$$

2. Тенгламалар системасини ечинг:

$$\text{а) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, \\ 5x_1 + x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = -6, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 6. \end{cases}$$

Ж: а) $x_1=0, x_2=0, x_3=0$; б) $x_1=-1, x_2=-1, x_3=1$.

3. Чизикли тенгламалар системасини Гаусс усули билан ечинг ва текширинг:

$$\text{а) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 5, \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = 9, \\ 5x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 4; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 = -1, \\ x_1 + x_2 + 3x_3 = 3; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 4, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 - x_4 = 8, \\ -5x_1 + x_2 - 3x_3 = -7, \\ x_2 + x_3 - 7x_4 = -5; \end{cases} \quad \text{г) } \begin{cases} 2x_1 + x_3 + x_4 = 9, \\ 3x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 12, \\ -2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 5x_1 + 2x_2 - 3x_4 = -3. \end{cases}$$

Ж: а) $x_1=2, x_2=1, x_3=-1$;
 б) $x_1=0, x_2=0, x_3=1$;
 в) $x_1=1, x_2=1, x_3=1, x_4=1$;
 г) $x_1=1, x_2=2, x_3=3, x_4=4$.

3-§. Матрицалар. Матрицалар устида амаллар. Матрицанинг ранги.

Чизиқли тенгламалар системасини текшириш

1.3.1. Сонларнинг m та сатр ва n та катордан иборат тўғри тўртбурчакли жадвали $m \times n$ ўлчамли матрица дейилади. Бу матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

кўринишда ёзилади.

Агар $m=1$ бўлса, *сатр матрица*, $n=1$ бўлса *устун матрица*, $m=n$ бўлса, *квадрат матрица* ҳосил бўлади. Квадрат A матрица учун шу матрицанинг элементларидан тузилган n -тартибли детерминантни ҳисоблаш мумкин. Бу детерминант $\det A$ ёки $|A|$ оркали белгиланади:

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Агар $\det A = 0$ бўлса, у ҳолда A матрица *махсус*, $\det A \neq 0$ бўлса, *махсусмас* дейилади.

Бош диагоналида турган элементлари бирга, қолган элементлари нолга тенг бўлган квадрат матрица *бирлик матрица* деб аталади ва E билан белгиланади:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Равшанки, $\det E = 1$.

Агар ўлчамлари бир хил $m \times n$ бўлган икки матрицанинг барча мос элементлари ўзаро тенг бўлса, бу матрицалар *тенг* дейилади.

1.3.2. Бир хил $m \times n$ ўлчамли A ва B матрицанинг *йиғиндис*и деб ўша ўлчамли шундай $C = A + B$ матрицага айтиладики, унинг ҳар бир элементи A ва B матрицаларнинг мос элементлари йиғиндисидан иборат бўлади.

$m \times n$ ўлчамли A матрицанинг λ *сонга кўпайтмаси* деб, ўша ўлчамдаги $B = \lambda \cdot A$ матрицага айтиладики, бу матрица элементлари A матрица элементларини λ га кўпайтиришдан ҳосил бўлади.

$m \times k$ ўлчамли A матрицанинг $k \times n$ ўлчамли B матрицага кўпайтмаси деб, $m \times n$ ўлчамли шундай $C = A \cdot B$ матрицага айтиладики, унинг c_{ij} элементи A матрицанинг i -сатри элементларини B матрицанинг j -устунидаги мос элементларига кўпайтмалари йиғиндисига тенг, яъни

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ik}b_{kj}.$$

Агар $AB = BA$ бўлса, у ҳолда A ва B матрицалар ўрни алмашинадиган ёки коммутатив матрицалар дейилади.

1-мисол. Ушбу

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$$

матрицаларнинг AB ва BA кўпайтмаларини топиш.

Ечиш. AB матрица 2×2 ўлчамга эга бўлади:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \\ 4 & -5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot 4 & 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 3 + (-2) \cdot (-5) \\ 2 \cdot 2 + (-4) \cdot (-1) + 5 \cdot 4 & 2 \cdot (-1) + (-4) \cdot 3 + 5 \cdot (-5) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -3 & 10 \\ 28 & -39 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

BA матрица 3×3 ўлчамга эга бўлади:

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \\ 4 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 & 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-4) & 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 5 \\ (-1) \cdot 3 + 3 \cdot 2 & (-1) \cdot 1 + 3 \cdot (-4) & (-1) \cdot (-2) + 3 \cdot 5 \\ 4 \cdot 3 + (-5) \cdot 2 & 4 \cdot 1 + (-5) \cdot (-4) & 4 \cdot (-2) + (-5) \cdot 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 6 & -9 \\ 3 & -13 & 17 \\ 2 & 24 & -33 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$AB \neq BA$ бўлганлиги сабабли A ва B матрицалар коммутатив эмас.

1.3.3. Агар квадрат матрица махсусмас бўлса, у ҳолда $AA^{-1} = A^{-1}A = E$ тенгликни қаноатлантирувчи ягона A^{-1} матрица мавжуд бўлади ва у A матрицага тескари матрица дейилади. A матрицанинг A^{-1} тескари матрицаси қуйидагича аниқланади:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

Бу ерда A_{jk} A матрица детерминанти a_{jk} элементининг алгебранк тўлдирувчиси.

2-мисол. Берилган

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

матрицага тескари матрицани топинг.

Ечиш. Матрицанинг детерминантини ҳисоблаймиз:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 7 - 1 \cdot (-6) = -4 \neq 0.$$

Демак, A матрица махсусмас матрица экан. Энди A_{jk} алгебранк тўлдирувчиларни ҳисоблаймиз:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 4; \quad A_{21} = - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = -8; \quad A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4;$$

$$A_{12} = - \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -7; \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 9; \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -5;$$


$$A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -6; \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 10; \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -6.$$

Тескари матрицани тузамиз:

$$A^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & -8 & 4 \\ -7 & 9 & -5 \\ -6 & 10 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 7/4 & -9/4 & 5/4 \\ 3/2 & -5/2 & 3/2 \end{pmatrix}$$

$AA^{-1} = A^{-1}A = E$ эканини текшириш мумкин.

1.3.4. n та номаълумли n та чизикли тенгламалар системаси



системанинг асосий матричаси,

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

системанинг кенгайтирилган матричаси. Агар $\text{rang } A = n$ бўлса, у ҳолда системанинг детерминанти нолдан фарқли бўлиб, у ягона ечимга эга бўлади; агар $\text{rang } A < n$ бўлса, у ҳолда система $(n - \text{rang } A)$ та ихтиёрый параметрга боғлиқ бўлган чексиз кўп ечимга эга бўлади.

Агар барча b_i овоз хадлар нолга тенг бўлса, у ҳолда тенгламалар системаси *бир жинсли* дейилади. Бундай тенгламалар системасида ҳар доим $\text{rang } A = \text{rang } B$, шу сабабли бир жинсли система биргаликда бўлади. Бир жинсли тенгламалар системасини $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ қийматлар қаноатлантиради, лекин A матрицанинг ранги нолга нисбатан n дан кичик бўлганда унинг детерминанти нолга тенг бўлиб, система нолмас ечимга эга бўлади.

4- м и с о л: Ушбу

$$\begin{aligned} 4x_1 + 3x_2 - 3x_3 - x_4 &= 4, \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 &= 1, \\ 3x_1 + x_2 - x_4 &= 0, \\ 5x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 &= 3 \end{aligned}$$

чиқиқли тенгламалар системаси биргаликдалигини аниқланг.

Ечиш. Берилган системанинг A асосий ва B кенгайтирилган матрицаларини тузамиз:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 & -1 \\ 3 & -1 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & 0 & -1 \\ 5 & 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 & -1 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 5 & 4 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Сатрлар устида тегишли элементар алмаштиришларни бажариб, бу матрицаларнинг рангини топамиз:

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 & -1 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 5 & 4 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 9 & -1 & -12 \\ 0 & -1 & 4 & 2 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & -1 & 4 & 2 & -5 \\ 0 & -5 & 9 & -1 & -12 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \end{aligned}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -4 & -2 & 5 \\ 0 & 5 & -9 & 1 & 12 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -4 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 11 & 11 & -13 \\ 0 & 0 & 5 & 5 & -11 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3/11 \\ 0 & 0 & 11 & 11 & -13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -56/11 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 42/11 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 29/11 \\ 0 & 0 & 11 & 11 & -13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -56/11 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 11 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -56/11 \end{pmatrix}$$

Шундай қилиб, $\text{rang}B=4$, $\text{rang}A=3$, яъни $\text{rang}B \neq \text{rang}A$.
Демак, система биргаликда эмас.
5-мисол. Ушбу

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

бир жинсли системани ечинг.

Ечиш. A матрицанинг рангини ҳисоблаймиз:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & -3 & 5 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 3 & 4 & -1 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 13 & -16 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 13 & -16 \\ 0 & 13 & -16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 13 & -16 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 13 & -16 \\ 0 & 13 & -16 \end{pmatrix}$$

$\text{rang}A=2 < 3$ (3 — номаълумлар сони), чунки

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 13 \end{vmatrix} = 13 \neq 0.$$

Демак, система нотмас ечимларга эга ва системанинг детерминанти

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & -3 & 5 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -36 + 80 - 1 - 12 - 15 - 16 = 80 - 80 = 0$$

бўлгани сабабли улар чексиз кўпдир. Системанинг дастлабки икки тенгламасини ечамиз:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0. \end{cases}$$

Бу системада x_3 ли ҳадларни ўнг томонга ўтказамиз:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 = x_3 \\ x_1 - 3x_2 = -5x_3 \end{cases}$$

Бу системани Крамер қондасидан фойдаланиб ечамиз:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -9 - 4 = -13.$$

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} x_3 & 4 \\ -5x_3 & -3 \end{vmatrix} = -3x_3 + 20x_3 = 17x_3.$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} 3 & x_3 \\ 1 & -5x_3 \end{vmatrix} = -15x_3 - x_3 = -16x_3.$$

Шундай қилиб, $x_1 = -\frac{17x_3}{13}$; $x_2 = \frac{16x_3}{13}$; $x_3 = 13t$ бўлсин (t — ихтиёрий мутаносиблик коэффициент). У ҳолда $x_1 = -17t$; $x_2 = 16t$; $x_3 = 13t$. t га ихтиёрий қийматларни бериб, чексиз кўп ечимларни ҳосил қиламиз.

3-дарсхона топшириғи

1. Агар

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

бўлса, $3A + 2B$ ни ҳисобланг.

$$\text{Ж: } 3A + 2B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -3 \\ -6 & 7 & -8 \end{pmatrix}.$$

2. Ушбу

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

матрицалар берилган. AB ва BA ларни топинг.

$$\text{Ж: } AB = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 11 \\ 0 & -11 & 19 \\ 13 & 13 & 29 \end{pmatrix}; BA = \begin{pmatrix} 6 & -7 & 30 \\ -13 & -2 & -8 \\ 21 & 3 & 18 \end{pmatrix}$$

3. Ушбу

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

матрицага тескари A^{-1} матрицани топинг.

$$\text{Ж: } A^{-1} = -\frac{1}{13} \begin{pmatrix} -4 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -8 \\ -2 & -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Агар

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

бўлса, A нинг рангини элементар алмаштиришлар ёрдамида топинг.

$$\text{Ж: } \text{rang}A = 3.$$

5. Тенгламалар системасининг биргаликда бўлиш-бўлмаслигини текширинг. Агар система биргаликда бўлса, уни матрица усули билан ечинг:

$$\begin{aligned} \text{а) } & \begin{cases} 4x + 2y - z = -9, \\ x + 2z = 5, \\ x - 3y + z = 5; \end{cases} \\ \text{б) } & \begin{cases} 2x - 3y + z = 2, \\ 3x + y - 3z = 1, \\ 5x - 2y - 2z = 4. \end{cases} \end{aligned}$$

Ж: а) $x = -1$, б) система биргаликда эмас.
 $y = -1$,
 $z = 3$;

6. Бир жинсли системани ечинг:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0, \\ 3x_1 - x_2 + 7x_3 = 0. \end{cases}$$

Ж: $x_1 = 17t$; $x_2 = 2t$; $x_3 = -7t$ ($-\infty < t < +\infty$).

3-мустақил иш

1. Агар

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & -8 \\ -3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

бўлса, $(A+3B)^2$ ни тошинг.

$$\text{Ж: } \begin{pmatrix} 96 & 12 & 8 \\ -18 & 54 & -8 \\ 51 & 85 & 111 \end{pmatrix}.$$

2. Агар

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

бўлса, A га тескари A^{-1} матрицани тошинг ва $AA^{-1}=A^{-1}A=E$ эканига ишонч ҳосил қилинг.

$$\text{Ж: } A^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

3. Тенгламалар системасининг биргаликда бўлиш-бўлмаслигини текширинг. Агар у биргаликда бўлса, уни матрица усули билан ечинг:

$$\begin{cases} 3x - y + z = 12, \\ x + 2y + 4z = 6, \\ 5x + y + 2z = 3. \end{cases} \quad \text{Ж: } x=0, y=-7, z=5.$$

4. Бир жинсли системанинг нолмас ечимлари бор-йўқлигини аниқланг, агар бор бўлса, уларни тошинг:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0, \\ 4x_1 - 11x_2 + 10x_3 = 0. \end{cases} \quad \text{Ж: } x_1 = -7t, x_2 = 2t, x_3 = 5t.$$

1-назорат иши

1. Олдин бирор қатор элементларининг биттасидан бошқасини нолларга айлантириб, детерминантни тартибини пасайтириш усули билан ҳисобланг:

$$1.1. \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & 0 \\ -4 & -1 & -3 & 3 \\ 3 & 4 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & 4 \end{vmatrix}$$

$$1.2. \begin{vmatrix} 0 & 3 & 2 & -4 \\ -2 & 4 & -3 & -1 \\ 1 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$1.3. \begin{vmatrix} 0 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 3 & -3 & -1 & 4 \\ -2 & 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$1.4. \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & -4 & -2 \\ 0 & 6 & 4 & -8 \\ -2 & 4 & -3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$1.5. \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 & 3 \\ -4 & 3 & 2 & -3 \\ -2 & 3 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$1.6. \begin{vmatrix} -4 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 & -4 \\ 3 & 4 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & -2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$1.7. \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 & 3 \\ -4 & 3 & 2 & -3 \\ -2 & 3 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$1.8. \begin{vmatrix} -4 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & -3 & 4 & -2 \\ 2 & 4 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$1.9. \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & -3 & 2 & -4 \\ 4 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & -4 & -2 \end{vmatrix}$$

$$1.10. \begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 2 & 4 \\ -2 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$1.11. \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 0 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$1.12. \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ -2 & 1 & 3 & -5 \\ 3 & 7 & 5 & 1 \\ 5 & 3 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$1.13. \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 & -3 \\ 1 & 7 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 3 & 7 & 1 \end{vmatrix}$$

$$1.14. \begin{vmatrix} 5 & -8 & -4 & 7 \\ 0 & -5 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -3 & -2 \\ 1 & 5 & -5 & -1 \end{vmatrix}$$

$$1.15. \begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 & 5 \\ 4 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & 3 & -5 \end{vmatrix}$$

$$1.16. \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 & -3 \\ -4 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & -3 & -4 \\ -3 & 2 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$1.17. \begin{vmatrix} 1 & 7 & -1 & 0 \\ 2 & 6 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 4 & 0 \\ 4 & 5 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$1.18. \begin{vmatrix} 8 & 5 & -1 & 1 \\ 5 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -7 & -6 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$1.19. \begin{vmatrix} 1 & 4 & -4 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \\ -4 & -3 & 4 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$1.20. \begin{vmatrix} 2 & -1 & -4 & 4 \\ -9 & 3 & 2 & -7 \\ -1 & 0 & 4 & 5 \\ 6 & 4 & 7 & -4 \end{vmatrix}$$

$$1.21. \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 & -7 \\ 5 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & -8 & 5 & 3 \end{vmatrix}$$

$$1.22. \begin{vmatrix} -1 & 3 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 6 & 5 & 4 \\ 4 & 3 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

$$1.23. \begin{vmatrix} 3 & -7 & 2 & 1 \\ -8 & 3 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 2 & 4 & 1 & -5 \end{vmatrix}$$

$$1.24. \begin{vmatrix} 8 & 4 & -1 & -1 \\ 3 & 1 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 7 & 1 \\ 5 & -1 & 6 & 0 \end{vmatrix}$$

$$1.25. \begin{vmatrix} 8 & -1 & -1 & 5 \\ -5 & 1 & 10 & 3 \\ 2 & 3 & -2 & -5 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$1.26. \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 7 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & -4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$1.27. \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 4 \\ 3 & 2 & 2 & -2 \\ -7 & 2 & 7 & 0 \\ -5 & 3 & 1 & -6 \end{vmatrix}$$

$$1.28. \begin{vmatrix} 6 & 9 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & -3 & -1 \\ -1 & -1 & 10 & 7 \\ 5 & 2 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$1.29. \begin{vmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & -4 & 3 \\ 0 & -2 & 5 & 3 \\ -5 & 3 & -7 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$1.30. \begin{vmatrix} 4 & -3 & 2 & -4 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ -3 & 2 & 6 & 1 \\ 13 & 3 & -2 & 0 \end{vmatrix}.$$

2. Чизикли тенгламалар системасини Крамер формулаларидан фойдаланиб ечинг:

$$2.1. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 9, \\ 4x_2 + 11x_3 = 1, \\ 7x_1 - 5x_2 = -1. \end{cases}$$

$$2.2. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 5x_3 = 27, \\ 5x_1 + 2x_2 + 13x_3 = 70, \\ 3x_1 - x_3 = -2. \end{cases}$$

$$2.3. \begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 46, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 8, \\ x_1 - 7x_2 - 2x_3 = 5. \end{cases}$$

$$2.4. \begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 = -1, \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = -1, \\ x_1 + x_2 - x_3 = -1. \end{cases}$$

$$2.5. \begin{cases} x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - 5x_2 - 6x_3 = 21, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = -4. \end{cases}$$

$$2.6. \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + x_3 = 43, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 = 13. \end{cases}$$

$$2.7. \begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 6, \\ 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -4, \\ 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -2. \end{cases}$$

$$2.8. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 11, \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 9, \\ x_1 - 5x_2 - 8x_3 = 23. \end{cases}$$

$$2.9. \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 12, \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 9, \\ 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -15. \end{cases}$$

$$2.10. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 15, \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = 16, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

$$2.11. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 11, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = -6, \\ x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 3. \end{cases}$$

$$2.12. \begin{cases} 2x_1 - 5x_2 = 19, \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 = -10, \\ x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 16. \end{cases}$$

$$2.13. \begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 6, \\ 2x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 19. \end{cases}$$

$$2.14. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 16, \\ 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 = -10, \\ 2x_1 - 3x_3 = 4. \end{cases}$$

$$2.15. \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 1, \\ 3x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 3, \\ x_1 - 2x_2 = -7. \end{cases}$$

$$2.16. \begin{cases} x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 11, \\ x_1 + x_2 - x_3 = -3, \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = -10 \end{cases}$$

$$2.17. \begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = -2, \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 7, \\ x_1 - 3x_3 = 11. \end{cases}$$

$$2.18. \begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -7, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -5, \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 = 38. \end{cases}$$

$$2.19. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 5x_3 = -4, \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 9, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 14. \end{cases}$$

$$2.20. \begin{cases} x_1 - 3x_2 = -10, \\ 4x_1 + 3x_3 = -7, \\ 5x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 38. \end{cases}$$

$$2.21. \begin{cases} x_1 + 4x_2 - 3x_3 = -13, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 3. \end{cases}$$

$$2.22. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 7, \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = -13, \\ x_1 + 4x_2 - x_3 = 14. \end{cases}$$

$$2.23. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = -6, \\ 6x_1 - x_2 + 3x_3 = -2, \\ 5x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 3. \end{cases}$$

$$2.24. \begin{cases} 5x_1 - 4x_2 + x_3 = 23, \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 15. \end{cases}$$

$$2.25. \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 3, \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 = -5, \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 6. \end{cases}$$

$$2.26. \begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = -5, \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 24, \\ 4x_1 - x_2 = 18. \end{cases}$$

$$2.27. \begin{cases} 3x_1 - 3x_2 + x_3 = -10, \\ 2x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 5, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 3. \end{cases}$$

$$2.28. \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = -3, \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 2. \end{cases}$$

$$2.29. \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - x_3 = -20, \\ x_1 - x_2 = 2, \\ 4x_1 + x_3 = -2. \end{cases}$$

$$2.30. \begin{cases} 6x_1 + x_2 + x_3 = 16, \\ x_2 - 3x_3 = 14, \\ 3x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 31. \end{cases}$$

3. 1 матрица берилган. A^{-1} тескари матрицани топинг ва $AA^{-1} = A^{-1}A = E$ эканини текширинг:

$$3.1. \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

$$3.3. \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$3.5. \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 1 & -5 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3.7. \begin{pmatrix} -5 & 7 & -4 \\ 8 & 0 & -1 \\ 4 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3.9. \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -3 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$3.11. \begin{pmatrix} 3 & -3 & 4 \\ -1 & -5 & -7 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$3.13. \begin{pmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 1 & -5 & 5 \\ -2 & 3 & 10 \end{pmatrix}$$

$$3.15. \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$3.17. \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 2 & 0 & -3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$3.19. \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$3.21. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$3.2. \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 7 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3.4. \begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 \\ 4 & 5 & 1 \\ -3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3.6. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & -5 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$3.8. \begin{pmatrix} -1 & 8 & 1 \\ -1 & 5 & 5 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$3.10. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 9 & 7 \\ 4 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$3.12. \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 7 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$3.14. \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ -7 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3.16. \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \\ -2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$3.18. \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 6 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$3.20. \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$3.22. \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3.23. \begin{pmatrix} 8 & 7 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3.24. \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 11 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

$$3.25. \begin{pmatrix} 4 & 1 & 7 \\ 9 & -1 & 1 \\ 6 & -1 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$3.26. \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$3.27. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 6 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$3.28. \begin{pmatrix} 1 & 3 & -6 \\ 1 & 4 & 5 \\ -3 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$3.29. \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -4 & 9 & 4 \\ 1 & 7 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$3.30. \begin{pmatrix} 2 & 6 & 3 \\ 4 & 7 & 1 \\ -3 & -8 & -2 \end{pmatrix}.$$

4. Берилган A матрица рангини топинг:

$$4.1. \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 & 61 \\ 2 & 5 & 1 & -23 \\ 17 & -10 & 20 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$4.2. \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 3 \\ -3 & 0 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$4.3. \begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 & 1 & 1 \\ 5 & -8 & -2 & 8 & 3 \\ -2 & -1 & -10 & -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$4.4. \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 3 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$4.5. \begin{pmatrix} 5 & -5 & 10 & 12 \\ 3 & 1 & 7 & 11 \\ 1 & 7 & 4 & 30 \end{pmatrix}.$$

$$4.6. \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & -4 & 5 & 0 \\ -1 & 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$4.7. \begin{pmatrix} 7 & 5 & 3 & 6 & 3 \\ 2 & -1 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 8 & 6 & -6 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$4.8. \begin{pmatrix} 5 & 0 & -4 & 2 \\ 3 & 2 & 2 & -6 \\ 4 & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$4.9. \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & -8 & -5 & 6 \\ 1 & 4 & 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$4.10. \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 7 & 7 \end{pmatrix}.$$

$$4.11. \begin{pmatrix} 3 & 5 & -1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$4.12. \begin{pmatrix} 3 & 4 & -4 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 5 & 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$4.13. \begin{pmatrix} 5 & -3 & 4 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & 7 & -6 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$4.14. \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \\ 5 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$4.15. \begin{pmatrix} 7 & 5 & -3 & 1 & 8 \\ 3 & 2 & -3 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4.16. \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 & -1 \\ 5 & 2 & 4 & -1 \\ 4 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$4.17. \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 4 & -1 & -5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4.18. \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$4.19. \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 & -4 & 1 \\ 2 & -3 & -2 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 4 & -9 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4.20. \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & 0 \\ 4 & 3 & -5 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$4.21. \begin{pmatrix} -6 & 1 & 11 & 9 \\ 2 & 5 & 0 & 7 \\ 1 & -3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$4.22. \begin{pmatrix} 4 & 3 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 & -3 \\ 3 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$4.23. \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$4.24. \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & -5 \\ 2 & -1 & -6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4.25. \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$4.26. \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 4 & 5 \\ 2 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4.27. \begin{pmatrix} 4 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$4.28. \begin{pmatrix} 5 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -2 & 2 & -6 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4.29. \begin{pmatrix} 6 & 2 & -10 & 4 \\ -5 & -7 & 4 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & -6 \end{pmatrix}$$

$$4.30. \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 & 1 \\ 4 & 3 & -2 & -5 \\ 3 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

5. Бир жинсли тенгнамалар системасини ечинг:

$$5.1. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ 5x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.2. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.3. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.5. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, \\ 5x_1 - 14x_2 + 15x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.7. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.9. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.11. \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 - 9x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.13. \begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0, \\ 3x_1 - 5x_2 + 7x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.15. \begin{cases} x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 - 7x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.17. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ 4x_1 + 2x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.19. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.21. \begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 = 0, \\ 5x_1 - x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.4. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.6. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ 5x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.8. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.10. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 + 5x_2 - 6x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.12. \begin{cases} 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 + 5x_2 - 6x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.14. \begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 5x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 + 2x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.16. \begin{cases} 2x_1 - x_2 - 5x_3 = 0, \\ 5x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 + 2x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.18. \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.20. \begin{cases} 7x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.22. \begin{cases} x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.23. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases}$$

$$5.25. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 - x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.27. \begin{cases} x_1 - 3x_2 + 7x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 + 7x_2 - 8x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.29. \begin{cases} 4x_1 - x_2 + 5x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.24. \begin{cases} x_1 - x_2 + 6x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.26. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0, \\ x_1 - 4x_2 + 8x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 6x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.28. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 7x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.30. \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - 4x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

1-намунавий ҳисоб топшириқлари

1. Берилган детерминантни уч усул билан ҳисобланг.

а) уни i -сатр элементиари бўйича ёйиб;

б) уни j -устун элементиари бўйича ёйиб;

в) оддий j -устундаги биттадан бошқа элементларни нолга айлантириб, сўнгра шу устун элементиари бўйича ёйиб.

$$1.1. \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ -5 & 3 & 1 & -2 \\ -3 & -2 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$i=2, j=4.$$

$$1.2. \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & -3 & 2 \\ -4 & 0 & 3 & -1 \\ 6 & 3 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$i=4, j=3.$$

$$1.3. \begin{vmatrix} 6 & -3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 4 & 5 \\ 2 & 7 & 3 & 4 \\ 0 & -5 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$i=3, j=3.$$

$$1.4. \begin{vmatrix} -3 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \\ 4 & -3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

$$i=1, j=2.$$

$$1.5. \begin{vmatrix} -3 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 7 & 0 \\ -5 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$i=3, j=2.$$

$$1.6. \begin{vmatrix} 4 & -1 & 3 & 2 \\ -5 & 5 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 7 \\ 0 & -2 & 6 & 3 \end{vmatrix}$$

$$i=2, j=3.$$

$$1.7. \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & -2 & 5 \\ -3 & 2 & 7 & 0 \end{vmatrix}$$

$$i=4, j=1.$$

$$1.8. \begin{vmatrix} 6 & -2 & 1 & 8 \\ -6 & 1 & 4 & 5 \\ 2 & 0 & 3 & -3 \\ 4 & 5 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$i=2, j=2.$$

$$1.9. \begin{vmatrix} 3 & -3 & 1 & 2 \\ -4 & 0 & 5 & 7 \\ -2 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 6 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$i=1, j=3.$$

$$1.10. \begin{vmatrix} -3 & 2 & 5 & 7 \\ 1 & -3 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & -2 & 1 \\ -4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$i=4, j=4.$$

$$1.11. \begin{vmatrix} 1 & -4 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 3 & -6 \end{vmatrix}$$

$$i=4, j=2.$$

$$1.12. \begin{vmatrix} 3 & -2 & 9 & 0 \\ 4 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & -2 & 6 \\ 5 & 7 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$i=1, j=4.$$

$$1.13. \begin{vmatrix} 4 & 3 & -1 & -2 \\ 6 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 2 & 3 \\ 5 & -2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$i=1, j=1.$$

$$1.14. \begin{vmatrix} 3 & -5 & 5 & 1 \\ 7 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 8 & 0 \\ 1 & -7 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$i=3, j=1.$$

$$1.15. \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & 2 \\ 9 & 2 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -6 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$i=3, j=4.$$

$$1.16. \begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 4 & 5 & -1 & 0 \\ 3 & -4 & 2 & 5 \\ -3 & 1 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$i=2, j=1.$$

$$1.17. \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 3 & 1 & 5 \\ 4 & -1 & 2 & 4 \\ 6 & 0 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$i=3, j=1.$$

$$1.18. \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 & 1 \\ -5 & 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -3 & 4 \\ 5 & 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$i=2, j=2.$$

$$1.19. \begin{vmatrix} 4 & -5 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & 4 \\ -5 & 3 & -4 & 8 \\ 0 & -2 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$i=2, j=3$$

$$1.20. \begin{vmatrix} 6 & -1 & 3 & 0 \\ -2 & 3 & 4 & -5 \\ 2 & 0 & -3 & 1 \\ -5 & 5 & 8 & 2 \end{vmatrix}$$

$$i=4, j=4$$

$$1.21. \begin{vmatrix} 2 & 6 & -10 & 3 \\ -1 & 3 & 2 & 7 \\ 5 & 1 & 0 & 3 \\ -2 & 0 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$i=1, j=2$$

$$1.22. \begin{vmatrix} -4 & 1 & 3 & -2 \\ 3 & 0 & -1 & -1 \\ 5 & 3 & 4 & -3 \\ -1 & 2 & -3 & 7 \end{vmatrix}$$

$$i=3, j=3$$

$$1.23. \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & -4 & 3 \\ 2 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$i=4, j=2$$

$$1.24. \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & -1 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$i=3, j=4$$

$$1.25. \begin{vmatrix} 5 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -3 & 2 \\ 3 & -3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$i=3, j=2$$

$$1.26. \begin{vmatrix} 3 & -4 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$i=1, j=4$$

$$1.27. \begin{vmatrix} -6 & 1 & 5 & 3 \\ 2 & 1 & -3 & 5 \\ 0 & 4 & 1 & -2 \\ 3 & -4 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

$$i=4, j=3$$

$$1.28. \begin{vmatrix} 4 & 3 & -2 & 1 \\ -3 & 1 & 1 & -5 \\ 8 & 4 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

$$i=2, j=4$$

$$1.29. \begin{vmatrix} 8 & -7 & 6 & 1 \\ 3 & 5 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$i=1, j=3$$

$$1.30. \begin{vmatrix} 3 & 5 & -5 & 0 \\ 4 & 3 & -4 & 2 \\ -1 & 2 & 3 & 5 \\ 5 & -1 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

$$i=4, j=1$$

2. A ва B матрицалар берилган.

а) AB ва BA кўпайтмаларни тошинг; б) A^{-1} ни тошинг ва $AA^{-1}=A^{-1}A=E$ эканлини текширинг:

$$2.1. A = \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \\ 9 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

$$2.2. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 \\ -4 & 1 & 2 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$2.3. A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 7 \\ 8 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$2.4. A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 7 \\ 1 & -4 & 9 \\ -4 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$2.5. A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$2.6. A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$2.7. A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & -9 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2.8. A = \begin{pmatrix} 7 & -12 & 6 \\ 10 & -19 & 10 \\ 12 & -24 & 13 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -6 \\ 3 & 0 & 7 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$2.9. A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$2.10. A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2.11. A = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 13 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2.12. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2.13. A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 8 \\ 6 & 9 & 1 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

$$2.14. A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 8 & -2 \\ -4 & 3 & 2 \\ 3 & -8 & 5 \end{pmatrix}$$

$$2.15. A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & -5 \\ -3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2.16. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 7 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$2.17. A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -6 \end{pmatrix}$$

$$2.18. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -5 \\ 7 & 1 & 4 \\ 6 & 4 & -7 \end{pmatrix}$$

$$2.19. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$2.20. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2.21. A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \end{pmatrix}$$

$$2.22. A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 4 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -5 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2.23. A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$2.24. A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -15 \\ 5 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2.25. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & -5 \\ -3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2.26. A = \begin{pmatrix} 11 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 7 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$2.27. A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \\ 9 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

$$2.28. A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 7 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2.29. A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -13 \\ 0 & 3 & 8 \\ 1 & -1 & -7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 7 \\ 8 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$2.30. A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 7 & -2 & 3 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Берилган тенгламалар системасининг биргаликда эканлигини текширинг, агар биргаликда бўлса, уларни: а) Крамер қондасидан фойдаланиб, б) матрица усули, в) Гаусс усули билан ечинг:

$$3.1. \text{ а) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 6, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 11, \\ 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 8. \end{cases}$$

$$3.2. \text{ а) } \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 9, \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 4, \\ 5x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 18; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 7, \\ 2x_1 + 8x_2 + 5x_3 = 15, \\ 3x_1 + 9x_2 + 4x_3 = 10. \end{cases}$$

$$3.3. \text{ а) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 4, \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 11, \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 11; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 4x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 17, \\ 2x_1 + 6x_2 + 5x_3 = 12, \\ 3x_1 + 6x_2 + 4x_3 = 9. \end{cases}$$

$$3.4. \text{ а) } \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1, \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = 2, \\ -4x_1 - x_2 + 3x_3 = -3; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 2, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 8. \end{cases}$$

$$3.5. \text{ а) } \begin{cases} 7x_1 - 5x_2 = 31, \\ 4x_1 + 11x_3 = -43, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = -20; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 5x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1, \\ 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 7. \end{cases}$$

$$3.6. \text{ а) } \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6, \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 20, \\ 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 6; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} x_1 - 9x_2 + 2x_3 = 5, \\ x_1 + 3x_2 - 8x_3 = 3, \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 8. \end{cases}$$

$$3.7. \text{ а) } \begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = -1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = -4, \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = -2; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 3x_1 - 3x_2 - x_3 = -5, \\ 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 17, \\ 4x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 8. \end{cases}$$

$$3.8. \text{ а) } \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8, \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = -1, \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = -7; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 4, \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 1, \\ 4x_1 - x_2 + x_3 = 3. \end{cases}$$

$$3.9. \text{ а) } \begin{cases} x_1 - 4x_2 - 2x_3 = -7, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 5, \\ -3x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 7; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 4, \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 1, \\ 7x_1 + x_3 = 6. \end{cases}$$

$$\begin{array}{l}
3.10. \text{ a)} \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 31, \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 20, \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 0; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 - 3x_2 - x_3 = 1, \\ 4x_1 - x_2 = 6. \end{cases} \\
3.11. \text{ a)} \begin{cases} x_1 + 5x_2 + x_3 = -2, \\ 2x_1 - 4x_2 - 3x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 3; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 = 3, \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 8. \end{cases} \\
3.12. \text{ a)} \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -6, \\ 5x_1 + 8x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} 4x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 5, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 3, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 7. \end{cases} \\
3.13. \text{ a)} \begin{cases} x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - 5x_2 - 6x_3 = 7, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 6; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 2, \\ 5x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 4, \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 8. \end{cases} \\
3.14. \text{ a)} \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 5x_3 = 10, \\ 5x_1 + 2x_2 - 13x_3 = 21, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 = 12; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 4, \\ x_1 + 3x_2 - 7x_3 = 3, \\ x_1 - 5x_2 + 5x_3 = 7. \end{cases} \\
3.15. \text{ a)} \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 = -1, \\ x_1 + x_2 - x_3 = -2, \\ 4x_1 - 3x_2 + x_3 = 13; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 5, \\ 2x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 6, \\ 4x_1 - x_2 + 4x_3 = 4; \end{cases} \\
3.16. \text{ a)} \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = -10, \\ 4x_1 + 11x_3 = -29, \\ 7x_1 - 5x_2 = 7; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 2, \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 5. \end{cases} \\
3.17. \text{ a)} \begin{cases} 2x_1 + 7x_2 - x_3 = 10, \\ 3x_1 - 5x_2 + 3x_3 = -14, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = -1; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} 6x_1 + 4x_2 - 7x_3 = 3, \\ 7x_1 + x_2 - 3x_3 = 2, \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 7. \end{cases} \\
3.18. \text{ a)} \begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 = -6, \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = -15, \\ x_1 + x_2 - x_3 = -4; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} 3x_1 - x_2 - x_3 = -3, \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 4, \\ x_1 - 4x_2 + x_3 = 8. \end{cases}
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
3.19. \text{ a)} \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 = -14, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = -10; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 = -3, \\ 3x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -2, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 4. \end{cases} \\
3.20. \text{ a)} \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 - 2x_3 = -9, \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = -1, \\ 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -15; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} 4x_1 - x_2 - 5x_3 = 4, \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 8. \end{cases} \\
3.21. \text{ a)} \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 9, \\ 2x_1 - 3x_2 = 0, \\ 5x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 9; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 2, \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 3, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 5. \end{cases} \\
3.22. \text{ a)} \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 + x_2 - 5x_3 = 1; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 2, \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 5, \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 9. \end{cases} \\
3.23. \text{ a)} \begin{cases} x_1 + 4x_2 - 3x_3 = -2, \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -1, \\ x_1 + 7x_2 - 10x_3 = -5; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} 4x_1 + x_2 - 2x_3 = 3, \\ 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 = 2, \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 = 6. \end{cases} \\
3.24. \text{ a)} \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 5, \\ 2x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 6, \\ 4x_1 - x_2 + 4x_3 = 4; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 3, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases} \\
3.25. \text{ a)} \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + 7x_3 = -1, \\ x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 7; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 3, \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 8. \end{cases} \\
3.26. \text{ a)} \begin{cases} 7x_1 + 5x_2 + 3x_3 = -1, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 4, \\ x_1 + 8x_2 - 6x_3 = -13; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 - 3x_3 = 4, \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 10. \end{cases} \\
3.27. \text{ a)} \begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 6, \\ 2x_1 + 5x_2 - 8x_3 = 3, \\ x_1 + 4x_2 + x_3 = 11; \end{cases} \\
\text{б)} \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -4, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 - x_2 + 4x_3 = 7. \end{cases}
\end{array}$$

$$3.28. \text{ а) } \begin{cases} 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 23, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 4, \\ x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 19, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 3, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$3.29. \text{ а) } \begin{cases} 5x_1 + 7x_2 - 3x_3 = -12, \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5, \\ x_1 - x_2 = -3, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 2, \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 3, \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 4. \end{cases}$$

$$3.30. \text{ а) } \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 5, \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 = 5, \\ 4x_1 - x_2 - 5x_3 = -9, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 5x_1 + 7x_2 + 10x_3 = 4, \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 5, \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 8. \end{cases}$$

4. Бир жинсли чыккы теңгеламалар системаларыны эчинг:

$$4.1. \text{ а) } \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.2: \text{ а) } \begin{cases} x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.3. \text{ а) } \begin{cases} 5x_1 - x_2 + 5x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - 5x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.4. \text{ а) } \begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ 4x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.5. \text{ а) } \begin{cases} x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 - x_4 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 + 8x_2 - 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.6. \text{ а) } \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0, \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0, \\ 5x_1 - 4x_2 + 7x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.7. \text{ а) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 0, \\ 4x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4x_1 - x_2 + 5x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.8. \text{ а) } \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 0, \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - 4x_2 + 6x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.9. \text{ а) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.10. \text{ а) } \begin{cases} 3x_1 - 4x_2 + 7x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.11. \text{ а) } \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.12. \text{ а) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ 4x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 5x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.13. \text{ а) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0, \\ 5x_1 + x_2 - 3x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 - 7x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.14. \text{ а) } \begin{cases} 5x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 0, \\ 3x_2 - 2x_3 = 0, \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 5x_1 + 8x_2 - 3x_3 = 0, \\ 3x_1 - 4x_2 + x_3 = 0, \\ 4x_1 + 2x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.15. \text{ а) } \begin{cases} 6x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.16. \text{ a) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4x_1 + 5x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.17. \text{ a) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 6x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.18. \text{ a) } \begin{cases} 6x_1 + 5x_2 - x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.19. \text{ a) } \begin{cases} 7x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ 3x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 7x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.20. \text{ a) } \begin{cases} 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 + 8x_2 + 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 6x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.21. \text{ a) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 - 4x_2 + 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.22. \text{ a) } \begin{cases} 5x_1 - 7x_2 + 6x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 7x_2 - 8x_3 = 0, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - 4x_2 + 5x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.23. \text{ a) } \begin{cases} 6x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 7x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.24. \text{ a) } \begin{cases} x_1 + 5x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 0, \\ 3x_1 - 8x_2 + 5x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 0, \\ 2x_1 + 9x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.25. \text{ а) } \begin{cases} 6x_1 - 7x_2 + 2x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 4x_3 = 0, \\ x_1 + 8x_2 - 2x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.26. \text{ а) } \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 7x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - 5x_2 - 4x_3 = 0, \\ x_1 - 6x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.27. \text{ а) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 - 8x_2 + 7x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 0, \\ 3x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.28. \text{ а) } \begin{cases} x_1 - 8x_2 + 7x_3 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 - 8x_2 + 7x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 0, \\ 3x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.29. \text{ а) } \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 - 3x_2 - 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 - 5x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 5x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 = 0, \\ x_1 - 8x_2 - 5x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.30. \text{ а) } \begin{cases} x_1 - 3x_2 - 4x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 - 4x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

4-§. Векторлар устида чизикли амаллар.


Базис. Базис бўйича ёйиш. Координаталар орқали берилган векторлар устида чизикли амаллар

1.4.1. Боши A нуктада, охири B нуктада бўлган йўналтирилган кесма **вектор** деб аталади ва у AB ёки \vec{a} каби белгиланади. \vec{a} векторнинг узунлиги унинг **модули** деб аталади ва $|\vec{a}|$ каби белгиланади. Охири боши билан устма-уст тушадиган вектор **қоъ-вектор** дейилади ва $\vec{0}$ билан белгиланади. Бундай вектор тайин йўналишга эга эмас, унинг модули нолга тенг.


Узунлиги бирга тенг вектор **бирлик вектор** дейилади \vec{a} векторнинг бирлик вектори \vec{a}^0 каби белгиланади.

Бир тўғри чизикда эки параллел тўғри чизикларда етувчи векторлар **коллинеар векторлар** дейилади.

Агар икки вектор ўзаро коллинеар, бир хил йўналган ва модуллари тенг бўлса, бу векторлар **тенг векторлар** дейилади.



2- шакл



3- шакл

Бир текисликда ёки параллел текисликларда ётувчи векторларни *компланар векторлар* дейилади.

1.4.2. Векторларни қўшиш, айириш ва векторни сонга кўпайтириш амалларининг векторлар устида *чизикли амаллар* дейилади.

\vec{a} векторнинг λ сонга *кўпайтмаси* деб, \vec{a} векторга коллинеар, $\lambda > 0$ да у билан йўналиши бир хил, $\lambda < 0$ да эса йўналиши қарама-қарши ҳамда модули $|\lambda| \cdot |\vec{a}|$ га тенг бўлган $\lambda \vec{a}$ (ёки $\vec{a}\lambda$) векторга айтилади.

$\vec{a}^0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ бирлик вектор бўлиб, у \vec{a} билан бир хил йўналган.


\vec{a} ва \vec{b} векторларнинг *йиғиндиси* деб $\vec{a} + \vec{b}$ векторлар билан компланар бўлган $\vec{a} + \vec{b}$ векторга айтилади. Икки векторнинг йиғиндиси параллелограмм (2- шакл) ёки учбурчак (3- шакл) коидалари бўйича топилади.

Бир нечта векторни қўшиш учбурчак коидасини кетма-кет қўллаш билан амалга оширилади. Натижада шу векторларга қурилган слиқ чизикни ёпувчи вектор бир нечта векторларнинг йиғиндиси бўлади (4- шакл).


Икки \vec{a} ва \vec{b} векторнинг *айирмаси* деб, \vec{b} векторга қўшилганда \vec{a} векторни ҳосил қилувчи $\vec{a} - \vec{b}$ векторга айтилади (5- шакл).

$\vec{a} = \overline{OA}$ ва $\vec{b} = \overline{OB}$ векторларга қурилган параллелограммнинг OC диагонали $\overline{OC} = \vec{a} + \vec{b}$ га, BA диагонали эса $\overline{BA} = \vec{a} - \vec{b}$ га тенг (6- шакл).


1.4.3. $\vec{a} = \overline{AB}$ векторнинг l ўқ бўйича *ташкил этувчиси* (компоненти) деб, шу вектор боши ва охирининг проекцияларини бирлаштирувчи $\overline{A_1B_1}$ векторга айтилади (7- шакл).




4- шакл



6- шакл



5- шакл



7- шакл

$\vec{a} = \overline{AB}$ векторнинг l ўқдаги проекцияси деб, $\overline{A_1B_1}$ векторнинг йўналиши l ўқ йўналиши билан бир хил ёки бир хил эмаслигига қараб, «+» ёки «-» ишора билан олинadigan ташкил этувчисининг узунлигига айтилади.

$$\text{пр}_l \overline{AB} = \pm |\overline{A_1B_1}|.$$

\vec{a} векторнинг l ўққа проекцияси a_l деб белгиланади, яъни:

$$\text{пр}_l \vec{a} = a_l.$$

Проекцияларнинг асосий хоссалари:

а) $\text{пр}_l \vec{a} = |\vec{a}| \cos \varphi$ ёки $a_l = |\vec{a}| \cos \varphi$

Бунда φ — \vec{a} вектор билан ўқ орасидаги бурчак;

б) $\text{пр}_l (\vec{a} + \vec{b}) = \text{пр}_l \vec{a} + \text{пр}_l \vec{b}$ ёки $\text{пр}_l (\vec{a} + \vec{b}) = a_l + b_l$;

в) $\text{пр}_l \lambda \vec{a} = \lambda \text{пр}_l \vec{a}$ ёки $\text{пр}_l \lambda \vec{a} = \lambda a_l$.

1.4.4. $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ векторларнинг чизикли комбинацияси деб

$$\vec{a} = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n$$

формула билан аниқланувчи \vec{a} векторга айтилади. Бунда $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ — таъин сонлар.

Агар $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ векторлар системаси учун камида биттаси нолдан фарқли шундай $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ сонлар мавжуд бўлиб, $\lambda_1 \vec{a}_1 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n = 0$ шарт бажарилса, у система *чизикли боғлиқ система* дейилади. Агар юқоридаги тенглик фақат $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ бўлганда ўрилли бўлса, $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ векторлар системаси *чизикли эркин* дейилади.

Иккита коллинеар вектор ҳар доим чизикли боғлиқдир. Шунингдек, учта компланар вектор ҳар доим чизикли боғлиқ. Фазодаги ихтиёрий тўрт ёки undan ортиқ векторлар ҳар доим чизикли боғлиқ.

n та чизикли боғлиқмасе векторлар системаси $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$ берилган бўлиб, агар ихтиёрий \vec{a} векторни уларнинг чизикли комбинацияси, яъни

$$\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n$$

шаклида ифодалаш мумкин бўлса, у ҳолда берилган система *базис* дейилади.

Бу тенглик \vec{a} векторнинг $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$ базис бўйича *ёйилмаси* дейилади.

Фазода чизикли боғлиқ бўлмаган ҳар қандай учта $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ вектор базис ташкил қилади, шу сабабли фазодаги ҳар қандай \vec{a} вектор шу базис бўйича ёйилиши мумкин:

$$\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \lambda_3 \vec{e}_3.$$

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ сонлар \vec{a} векторнинг берилган базисдаги *координатлари* бўлиб, бундай ёзилади:

$$\vec{a} = \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}.$$

Агар базиснинг векторлари ўзаро перпендикуляр ва бирлик узунликка эга бўлса, бу базис *ортонормалланган базис* дейилиб, у *ортлар* деб аталувчи $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ векторлар орқали белгиланади.

Агар $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ мос равишда OX, OY, OZ ўқлари бўйича йўналган ортлар бўлса, у ҳолда ихтиёрий \vec{a} векторнинг $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ базисдаги ёйилмаси қуйидагича ифодаланади:

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \text{ ёки } \vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\},$$

бунда a_x, a_y, a_z — \vec{a} векторнинг координатлари. \vec{a} вектор узунлиги

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

формула бўйича аниқланади.

\vec{a} йўналиши унинг координата ўқлари билан ҳосил қилган α, β, γ бурчаклари билан аниқланади.

α векторнинг йўналтирувчи косинуслари

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|} = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}},$$

$$\cos \beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|} = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|} = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}$$

формулалар билан аниқланади ва улар

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

муносабат билан боғланган.

1.4.5. $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$ ва $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$ векторлар берилган бўлсин. У ҳолда

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x) \vec{i} + (a_y \pm b_y) \vec{j} + (a_z \pm b_z) \vec{k},$$

$$\lambda \vec{a} = \lambda a_x \vec{i} + \lambda a_y \vec{j} + \lambda a_z \vec{k}$$

$M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$ нукталар берилган бўлсин. У ҳолда $M_1 M_2$ векторнинг ортлар бўйича ёйилмаси

$$\vec{M_1 M_2} = (x_2 - x_1) \vec{i} + (y_2 - y_1) \vec{j} + (z_2 - z_1) \vec{k}$$

кўринишда бўлади. M_1 ва M_2 нукталар орасидаги масофа ёки M_1M_2 векторнинг узунлиги

$$|M_1M_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

формула билан ҳисобланади.

M_1M_2 кесмани берилган λ нисбатда бўлувчи M нуктанинг координаталари қуйидагича аниқланади:

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \quad z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}.$$

Хусусан, агар $\lambda = 1$ бўлса, M нукта M_1M_2 кесманинг ўртасида ётади ва унинг координаталари

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad z = \frac{z_1 + z_2}{2}$$

муносабатлардан топилди.

Мисол. $\vec{a} = \{3; 2; -5\}$ ва $\vec{b} = \{2; -3; 1\}$ векторлар берилган

Қуйидагиларни топинг:

а) $2\vec{a} - \vec{b}$ векторнинг координата ўқларидаги проекцияларини;

б) $2\vec{a} - \vec{b}$ векторнинг узунлигини;

в) $2\vec{a} - \vec{b}$ векторнинг йўналтирувчи косинусларини.

Ечиш. а) $2\vec{a} - \vec{b} = \{2 \cdot 3 - 2; 2 \cdot 2 - (-3); 2 \cdot (-5) - 1\} = \{4; 7; -11\}$.

б) $|2\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{4^2 + 7^2 + (-11)^2} = \sqrt{16 + 49 + 121} = \sqrt{186}$.

в) $\cos \alpha = \frac{4}{\sqrt{186}}, \cos \beta = \frac{7}{\sqrt{186}}, \cos \gamma = -\frac{11}{\sqrt{186}}$.

4- дарсхона топириги

1. Берилган \vec{a} ва \vec{b} векторлар бўйича уларнинг қуйидаги чизикли комбинацияларини ясанг:

а) $3\vec{a}$; б) $-\frac{1}{2}\vec{b}$; в) $2\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$; г) $\frac{1}{2}\vec{a} - 3\vec{b}$.

2. ABC учбурчакда $\vec{AB} = \vec{m}$ ва $\vec{AC} = \vec{n}$ векторлар берилган. Ушбу векторларни ясанг: а) $\frac{\vec{m} + \vec{n}}{2}$; б) $\frac{\vec{m} - \vec{n}}{2}$; в) $\frac{\vec{n} - \vec{m}}{2}$; г) $-\frac{\vec{m} + \vec{n}}{2}$.

3. ABC учбурчакда AB томони P ва N нукталар билан учта тенг қисмга бўлинган: $|AP| = |PN| = |NB|$. Агар $\vec{CA} = \vec{a}$, $\vec{CB} = \vec{b}$ бўлса, \vec{CP} векторни топинг.

Ж: $\vec{CP} = (2\vec{a} + \vec{b})/3$

4. Иккита $\vec{a} = \{-1, 2, 3\}$ ва $\vec{b} = \{2, -4, 5\}$ вектор берилган. Куйидаги векторларнинг координата ўқларидаги проекцияларини топинг:

а) $2\vec{a} + \vec{b}$; б) $\vec{a} - 3\vec{b}$; в) $3\vec{a} + 5\vec{b}$.

Ж: а) $\{0, 0, 11\}$; б) $\{-7, 14, -12\}$; в) $\{7, -14, 34\}$.

5. $\vec{a} = \{2, 3, 6\}$ векторнинг йўналтирувчи косинусларини топинг.

Ж: $\cos\alpha = \frac{2}{7}$, $\cos\beta = \frac{3}{7}$, $\cos\gamma = \frac{6}{7}$.

6. $\vec{a} = \{2, -3, 6\}$ ва $\vec{b} = \{-1, 2, -2\}$ векторлар ҳосил қилган бурчак биссектрисаси бўйича йўналган \vec{e} бирлик векторнинг координаталарини топинг.

Ж: $\vec{e} = \left\{ -\frac{1}{\sqrt{42}}, \frac{5}{\sqrt{42}}, \frac{4}{\sqrt{42}} \right\}$.

4- мустақил иш

1. $\vec{a} = \{8, -5, 3\}$ ва $\vec{b} = \{-4, 1, -1\}$ векторларга қурилган параллелограмм диагоналлари узунликларини топинг.

Ж: $|\vec{a} + \vec{b}| = 6$; $|\vec{a} - \vec{b}| = 14$.

2. $A(1, 2, 3)$ ва $B(3, -4, 6)$ нукталар берилган. \overline{AB} вектор узунлигини ва йўналишини топинг.

Ж: $|\overline{AB}| = 7$, $\cos\alpha = \frac{2}{7}$, $\cos\beta = -\frac{6}{7}$, $\cos\gamma = \frac{3}{7}$.

3. $\vec{a} = \{3, 4, -12\}$ векторнинг ортини топинг.

Ж: $\vec{a} = \left\{ \frac{3}{13}, \frac{4}{13}, -\frac{12}{13} \right\}$.

4. ABC учбурчакда $\overline{AB} = \{2, 6, -4\}$ ва $\overline{AC} = \{4, 2, -2\}$ векторлар берилган. C учидан ўтказилган медиана билан устма-уст тушувчи \overline{CD} вектор узунлигини топинг.

Ж: $|\overline{CD}| = \sqrt{10}$.

5- §. Скаляр кўпайтма. Векторнинг узунлиги. Векторлар орасидаги бурчак

1.5.1. Иккита \vec{a} ва \vec{b} векторнинг скаляр кўпайтмаси деб, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ кўринишида белгиланувчи ва шу векторлар узунликлари кўпайтмасининг улар орасидаги бурчак косинуси билан кўпайтмасига тенг бўлган сонга айтилади:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\varphi$$

Скаляр кўпайтманинг асосий хоссалари:

а) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (урин алмаштириш қонуни);

б) $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ (тақсимот қонуни);

в) $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$ (гуруҳлаш қонуни);

г) агар $\vec{a}=\vec{0}$, ёки $\vec{b}=\vec{0}$, ёки $\vec{a}\perp\vec{b}$ бўлса, $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ (нолга тенг бўлмаган векторларнинг ортогоналлик шарт);

д) $\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$ ёки $a^2=|\vec{a}|^2$;

е) $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot\text{пр}_a\vec{b}=|\vec{b}|\cdot\text{пр}_b\vec{a}$.

1.5.2. Координата ўқлари ортларининг скаляр кўпайтмаси: $\vec{i}^2=\vec{j}^2=\vec{k}^2=1$, $\vec{i}\cdot\vec{j}=\vec{i}\cdot\vec{k}=\vec{j}\cdot\vec{k}=0$. $\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$ ва $\vec{b}=b_x\vec{i}+b_y\vec{j}+b_z\vec{k}$ векторлар берилган бўлсин. N ҳолда:

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_x\cdot b_x+a_y\cdot b_y+a_z\cdot b_z;$$

$$a^2=|\vec{a}|^2=a_x^2+a_y^2+a_z^2.$$

\vec{a} ва \vec{b} векторлар орасидаги φ бурчак ушбу формула буйича ҳисобланади:

$$\cos\varphi = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \cdot \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}.$$

\vec{a} ва \vec{b} векторларнинг перпендикулярлик шарт:

$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ ёки $a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$.

1.5.3. \vec{F} куч жисми l вектор йўналишида \vec{BC} масофага кўчириш натижасида бажарган иш ушбу формула билан ҳисобланади:

$$A = \vec{F} \cdot \vec{BC} = |\vec{F}| \cdot |\vec{BC}| \cdot \cos\varphi,$$

бунда φ — кўчириш йўналиши l ва \vec{F} кучнинг таъсир чизиги орасидаги бурчак.

Мисол. Агар $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=3$ бўлиб, улар ўзаро 60° ли бурчак ташкил этса, $2\vec{a}-\vec{b}$ ва $2\vec{a}+3\vec{b}$ векторларнинг скаляр кўпайтмасини топинг.

Ечиши. $(2\vec{a}-\vec{b})\cdot(2\vec{a}+3\vec{b}) = 2\vec{a}\cdot 2\vec{a} + 2\vec{a}\cdot 3\vec{b} - \vec{b}\cdot 2\vec{a} - \vec{b}\cdot 3\vec{b} = 4\vec{a}\cdot\vec{a} + 6\vec{a}\cdot\vec{b} - 2\vec{a}\cdot\vec{b} - 3\vec{b}\cdot\vec{b} = 4\vec{a}\cdot\vec{a} + 4\vec{a}\cdot\vec{b} - 3\vec{b}\cdot\vec{b} = 4|\vec{a}|\cdot|\vec{a}| + 4|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cos 60^\circ - 3|\vec{b}|\cdot|\vec{b}| = 4\cdot 2\cdot 2 + 4\cdot 2\cdot 3\cdot \frac{1}{2} - 3\cdot 3\cdot 3 = 16 + 12 - 27 = 1$

5-дархона топшириги

1. Агар $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$ бўлиб, \vec{a} ва \vec{b} векторлар орасидаги бурчак $\varphi = \frac{2}{3}\pi$ бўлса, қуйидагиларни ҳисобланг:

а) $\vec{a}\cdot\vec{b}$; б) a^2 ; в) b^2 ; г) $(\vec{a}+\vec{b})^2$; д) $(\vec{a}-\vec{b})^2$;

е) $(3\vec{a}-2\vec{b})\cdot(\vec{a}+2\vec{b})$.

Ж: а) -6 ; б) 9; в) 16; г) 13; д) 37; е) -61

2. Агар $\overline{OA} = \vec{a}$ ва $\overline{OB} = \vec{b}$ векторлар ўзаро $\varphi = 60^\circ$ ли бурчак ҳосил қилиб, $|\vec{a}| = 2$ ва $|\vec{b}| = 4$ бўлса, AOB учбурчакнинг OM медианаси билан OA томони орасидаги θ бурчакни топинг.

Ж: $\cos\theta = \frac{2}{\sqrt{7}}$, $\theta \approx 41^\circ$.

3. $\vec{a} = \{m, 3, 4\}$ ва $\vec{b} = \{4, m, -7\}$ векторлар берилган. m нинг қандай қийматида бу векторлар перпендикуляр бўлади?

Ж: $m = 4$

4. Учбурчакнинг учлари берилган:

$A(-1, -2, 4)$, $B(-4, -2, 0)$, $C(3, -2, 1)$.

Учбурчакнинг B ўчидаги ташқи бурчакни ҳисобланг.

Ж: $\frac{3\pi}{4}$.

5. $\vec{F} = \{3, -2, -5\}$ кучнинг қўйилиш нуқтаси тўғри чизик бўйлаб ҳаракат қилиб, $M_1(2, -3, 5)$ ҳолатдан $M_2(3, -2, -1)$ ҳолатга ўтади. Бу кўчишда \vec{F} куч бажарган ишни ҳисобланг.

Ж: $A = 31$ иш бирл.

5- мустақил иш

1. Тўртбурчакнинг учлари берилган:

$A(1, -2, 2)$, $B(1, 4, 0)$, $C(-4, 1, 1)$, $D(-5, -5, 3)$. Шу тўртбурчакнинг AC ва BD диагоналлари ўзаро перпендикуляр бўлишини исботланг.

2. $A(-2, 3, -4)$, $B(3, 2, 5)$, $C(1, -1, 2)$, $D(3, 2, -4)$ нуқталар берилган. \overline{AB} векторнинг \overline{CD} вектордаги проекциясини ҳисобланг.

Ж: $-6\frac{5}{7}$.

3. Учбурчакнинг учлари берилган:

$A(1, 2, 1)$, $B(3, -1, 7)$, $C(7, 4, -2)$.


Унинг ички бурчакларини ҳисобланг.

6- §. Векторларнинг вектор ва аралаш кўпайтмалари


1.6.1. \vec{a} векторнинг \vec{b} векторга вектор кўпайтмаси деб $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ кўринишда белгиланувчи ва қуйидаги шартларни қаноатлантирувчи \vec{c} векторга айтилади:

а) \vec{c} вектор \vec{a} ва \vec{b} векторларга перпендикуляр;

б) \vec{c} вектор ўчидан қаралганда \vec{a} вектордан \vec{b} векторга энг қисқа бурилиш соат мили йўналишига тесқари йўналишда



8- шакл



9- шакл

кузатилади (\vec{a} , \vec{b} , \vec{c} векторларнинг бундай жойлашувини ўнг учлик дейилади);

в) \vec{c} векторнинг модули \vec{a} ва \vec{b} векторларга қурилган параллелограмнинг S юзига тенг, яъни $|\vec{c}| = S = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\varphi$ (φ — \vec{a} ва \vec{b} векторлар орасидаги бурчак) (8 шакл).

Вектор қўпайтманинг асосий хоссалари:

а) $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$.

б) $(\lambda\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda\vec{b}) = \lambda(\vec{a} \times \vec{b})$;

в) $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$;

г) Агар $\vec{a} = \vec{0}$, ёки $\vec{b} = \vec{0}$, ёки $\vec{a} \parallel \vec{b}$ бўлса, у ҳолда $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$. Хусусан $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$.

1.6.2. Координата ўқлари орталарининг вектор қўпайтмаси:

$$\vec{i} \times \vec{i} = \vec{0}, \quad \vec{j} \times \vec{j} = \vec{0}, \quad \vec{k} \times \vec{k} = \vec{0}.$$

Агар

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \quad \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \quad \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}.$$

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k},$$

$$\vec{b} = b_x\vec{i} + b_y\vec{j} + b_z\vec{k}$$

бўлса, у ҳолда

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

Агар \vec{a} ва \vec{b} векторлар коллинеар бўлса, у ҳолда

$$\frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}.$$

1.6.3. Жисм A нуктасига қўйилган \vec{F} кучнинг O нуктага нисбатан \vec{M} моменти (9- шакл)

$$\vec{M} = \vec{OA} \times \vec{F}$$

Формула билан ҳисобланади.

10- мисол. $\vec{a}=2\vec{i}-3\vec{j}$ ва $\vec{b}=3\vec{i}+4\vec{k}$ векторларга қурилган параллелограммнинг юзини топинг.

Ечиш \vec{a} ва \vec{b} векторларга қурилган параллелограммнинг S юзи шу векторлар вектор кўпайтмасининг модулига тенг: $S=|\vec{a} \times \vec{b}|$. Вектор кўпайтмани топамиз:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -12\vec{i} - 8\vec{j} + 9\vec{k}$$

Демак, $S = \sqrt{(-12)^2 + (-8)^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 64 + 81} = 17$ кв бирлик.

1.6.4. \vec{a} , \vec{b} , \vec{c} векторларнинг аралаш кўпайтмаси деб $(\vec{a} \times \vec{b})$ векторнинг \vec{c} векторга скаляр кўпайтмасига айтилади.

Аралаш кўпайтманинг хоссалари:

а) $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$.

Бу хоссадан аралаш кўпайтмани $\vec{a}\vec{b}\vec{c}$ кўринишда белгилаш мумкин эканлиги келиб чиқади.

б) $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \vec{b}\vec{c}\vec{a} = \vec{c}\vec{a}\vec{b}$, яъни кўпайтирилувчи векторлар ўринлари доиравий алмаштирилганда аралаш кўпайтма қиймати ўзгармайди;

в) $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = -\vec{b}\vec{a}\vec{c}$, $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = -\vec{c}\vec{b}\vec{a}$, $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = -\vec{a}\vec{c}\vec{b}$,

яъни кўшни иккита векторларнинг ўринлари алмаштирилганда аралаш кўпайтма ишорасини ўзгартиради;

г) агар векторлардан акалли биттаси ноль вектор ёки \vec{a} , \vec{b} , \vec{c} векторлар компланар бўлса, у ҳолда $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = 0$ бўлади.

1.6.5. Агар

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k},$$

$$\vec{b} = b_x\vec{i} + b_y\vec{j} + b_z\vec{k},$$

$$\vec{c} = c_x\vec{i} + c_y\vec{j} + c_z\vec{k}$$

бўлса, у ҳолда

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

Агар $\vec{a}\vec{b}\vec{c}$ векторлар компланар бўлса, у ҳолда

$$\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0.$$

1.6.6. Аралаш кўпайтма кўпайтирилувчи векторларга қўрилган параллелолипед ҳажмига ишора аниқлигида тенг, яъни $V = \pm abc$.

Мисол. Учлари $A(1, 2, 0)$, $B(-1, 2, 1)$; $C(0, -3, 2)$ ва $D(1, 0, 1)$ нукталарда бўлган пирамиданинг ҳажмини ҳисобланг.

Ечиш. Пирамиданинг A учидан чиққан кирраларига мос келувчи векторларни топамиз:

$$\overline{AB} = \{-2; 0; 1\}, \quad \overline{AC} = \{-1; -5; 2\}, \quad \overline{AD} = \{0; -2; 1\}.$$

Пирамиданинг ҳажми шу векторларга қўрилган параллелолипед ҳажмининг $\frac{1}{6}$ қисмига тенг бўлганлиги сабабли

$$V = \pm \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -1 & -5 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 4 = \frac{2}{3} \text{ куб бирлик.}$$

6-дарсхона топшириғи

1. \vec{a} ва \vec{b} векторлар ўзаро перпендикуляр бўлиб, $|\vec{a}| = 3$ ва $|\vec{b}| = 4$ бўлса, қуйидагиларни ҳисобланг:

а) $|(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b})|$; б) $|(3\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{a} - 2\vec{b})|$.

Ж: а) 24; б) 60.

2. \vec{a} ва \vec{b} векторлар ўзаро $\varphi = 45^\circ$ ли бурчак ташкил қилиб, $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 5$ бўлса, $\vec{p} = \vec{a} - 2\vec{b}$ ва $\vec{q} = 3\vec{a} + 2\vec{b}$ векторларга қўрилган учбурчак юзини ҳисобланг.

Ж: $50\sqrt{2}$ кв. бирлик.

3. $A(2, -1, 2)$, $B(1, 2, -1)$, $C(3, 2, 1)$ нукталар берилган. $\overline{AB} \times \overline{BC}$ ни ҳисобланг.

Ж: $\{6, -4, -6\}$

4. Учлари $A(7, 3, 4)$, $B(1, 0, 6)$, $C(4, 5, -2)$ нукталардан иборат учбурчак юзини ҳисобланг.

Ж: 24,5 кв. бирлик.

5. $A(1, 2, -1)$, $B(0, 1, 5)$, $C(-1, 2, 1)$, $D(2, 1, 3)$ нукталар бир текисликда ётадими?

6. Қуйидаги векторлар компланарми:

а) $\vec{a} = \{-1, 3, 2\}$, $\vec{b} = \{2, -3, -4\}$, $\vec{c} = \{-3, 12, 6\}$;

б) $\vec{a} = \{3, -2, 1\}$, $\vec{b} = \{2, 1, 2\}$, $\vec{c} = \{3, -1, -2\}$?

Ж: а) компланар; б) нокомпланар.

7. $\vec{a} = \{3, 4, 0\}$, $\vec{b} = \{0, -4, 1\}$, $\vec{c} = \{0, 2, 5\}$ векторлар қандай учлик ташкил этади?

Ж: чап учлик.

8. Пирамиданинг учлари берилган:

$A(2, 3, 1)$, $B(4, 1, -2)$, $C(6, 3, 7)$, $D(-5, -4, 8)$.

Учбурчакнинг D учидан туширилган баландлиги узунлигини топинг.

Ж: 11 узун. бирл.

6- мустақил иш

1. $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 26$, $|\vec{a} \times \vec{b}| = 72$ бўлса, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ни ҳисобланг.

Ж: ± 30 .

2. Учбурчакнинг учлари берилган.

$A(1, -1, 2)$, $B(5, -6, 2)$, $C(1, 3, -1)$

Унинг B учидан AC томонига туширилган баландлигининг узунлигини ҳисобланг.

Ж: 5 узун. бирл.

3. $A(4, 2, -3)$ нуктага қўйилган $F = \{2, -4, 5\}$ кучнинг $B(3, 2, -1)$ нуктага нисбатан куч моментини топинг.

Ж: $\vec{M} = \{-4, 3, 4\}$.

4. Учлари $A(2, -1, 1)$, $B(5, 5, 4)$, $C(3, 2, -1)$, $D(4, 1, 3)$ нукталарда бўлган пирамида ҳажмини ҳисобланг.

Ж: 3 куб бирл.

2- назорат иши

1. $ABCD$ параллелограммда P ва N нукталар BC ва CD томонларнинг ўрталаридир. $\vec{AP} = \vec{a}$ ва $\vec{AN} = \vec{b}$ эканлиги маълум бўлса, векторларни \vec{a} ва \vec{b} векторлар орқали ифодаланг:

1.1. \vec{AB}, \vec{AD}

1.2. \vec{BP}, \vec{DN}

1.3. \vec{PD}, \vec{AC}

1.4. \vec{AB}, \vec{AC}

1.5. \vec{BP}, \vec{AC}

1.6. \vec{BN}, \vec{AC}

1.7. \vec{AD}, \vec{AC}

1.8. \vec{DN}, \vec{AC}

1.9. \vec{BN}, \vec{NC}

1.10. \vec{AB}, \vec{BD}

1.11. \vec{BP}, \vec{BD}

1.12. \vec{DP}, \vec{PC}

1.13. \vec{AD}, \vec{BD}

1.14. \vec{DN}, \vec{BD}

1.15. \vec{BN}, \vec{BD}

1.16. \vec{BC}, \vec{CD}

1.17. \vec{PD}, \vec{BN}

1.18. \vec{DP}, \vec{BD}

1.19. \vec{BC}, \vec{AC}

1.20. \vec{BP}, \vec{AB}

1.21. \vec{PD}, \vec{AC}

1.22. \vec{CD}, \vec{CA}

1.23. \vec{AD}, \vec{DN}

1.24. \vec{PD}, \vec{BC}

1.25. \vec{BC}, \vec{BD}

1.26. \vec{CB}, \vec{DN}

1.27. \vec{AC}, \vec{NB}

1.28. \vec{DC}, \vec{DB}

1.29. \vec{CD}, \vec{BP}

1.30. \vec{AD}, \vec{BN}

2. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ векторлар берилган а) \vec{d} векторнинг $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ векторлар оркали ёйилмасини, б) $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$ векторнинг $\gamma\vec{c} + \delta\vec{d}$ вектор йўналишидаги проекциясини топинг:

$$2.1. \vec{a} = \{3, 2, -4\}, \vec{b} = \{-2, -7, 1\}, \\ \vec{c} = \{6, 20, -3\}, \vec{d} = \{-1, 4, 3\}; \\ \alpha = 4, \beta = -3, \gamma = -2, \delta = 6.$$

$$2.2. \vec{a} = \{14, 9, -1\}, \vec{b} = \{5, 7, -2\}, \\ \vec{c} = \{-3, 1, 3\}, \vec{d} = \{1, -4, 6\}; \\ \alpha = 5, \beta = 3, \gamma = -4, \delta = -2.$$

$$2.3. \vec{a} = \{1, -3, 1\}, \vec{b} = \{-2, -4, 3\}, \\ \vec{c} = \{0, -2, 3\}, \vec{d} = \{-8, -10, 13\}; \\ \alpha = 6, \beta = -7, \gamma = -1, \delta = -3.$$

$$2.4. \vec{a} = \{-3, -6, 7\}, \vec{b} = \{1, 3, 1\}, \\ \vec{c} = \{4, 5, 1\}, \vec{d} = \{7, 3, 8\}, \\ \alpha = -3, \beta = 4, \gamma = 5, \delta = -6.$$

$$2.5. \vec{a} = \{4, -5, -1\}, \vec{b} = \{-2, 4, 1\}, \\ \vec{c} = \{3, -1, 2\}, \vec{d} = \{1, -11, -9\}; \\ \alpha = -3, \beta = 5, \gamma = 1, \delta = 7.$$

$$2.6. \vec{a} = \{2, 3, 4\}, \vec{b} = \{-4, 3, -1\}, \\ \vec{c} = \{3, 1, 2\}, \vec{d} = \{4, 4, 9\}; \\ \alpha = 5, \beta = -8, \gamma = -2, \delta = 3.$$

$$2.7. \vec{a} = \{4, -3, 2\}, \vec{b} = \{3, 2, -7\}, \\ \vec{c} = \{-2, 5, 1\}, \vec{d} = \{-4, 22, -13\}; \\ \alpha = -5, \beta = -7, \gamma = -3, \delta = 2.$$

$$2.8. \vec{a} = \{-6, 4, 5\}, \vec{b} = \{-5, 3, -1\}, \\ \vec{c} = \{1, 2, 3\}, \vec{d} = \{3, -9, 2\}; \\ \alpha = 2, \beta = -6, \gamma = 4, \delta = 5.$$

$$2.9. \vec{a} = \{-4, 3, -4\}, \vec{b} = \{3, -5, 6\}, \\ \vec{c} = \{7, 2, 1\}, \vec{d} = \{-9, -16, 12\}; \\ \alpha = 6, \beta = 4, \gamma = 2, \delta = -7.$$

$$2.10. \vec{a} = \{4, -7, 4\}, \vec{b} = \{-3, 2, 1\}, \\ \vec{c} = \{9, 5, 3\}, \vec{d} = \{10, 13, -8\}; \\ \alpha = 7, \beta = 2, \gamma = -6, \delta = -5.$$

$$2.11. \vec{a} = \{-4, -2, 7\}, \vec{b} = \{-3, 3, 4\}, \\ \vec{c} = \{-1, 1, 2\}, \vec{d} = \{2, -14, 0\}; \\ \alpha = 3, \beta = -2, \gamma = -5, \delta = 3.$$

$$2.12. \vec{a} = \{-7, 4, -3\}, \vec{b} = \{2, -5, 1\}, \\ \vec{c} = \{5, 3, 2\}, \vec{d} = \{3, 12, 1\}; \\ \alpha = 3, \beta = -1, \gamma = -5, \delta = 4.$$

$$2.13. \vec{a} = \{6, -2, 1\}, \vec{b} = \{-2, 7, -5\}, \\ \vec{c} = \{3, 5, 4\}, \vec{d} = \{-5, 26, 5\}; \\ \alpha = 6, \beta = 2, \gamma = -3, \delta = 7.$$

- 2.14. $\bar{a} = \{-3, 4, 5\}$, $\bar{b} = \{5, 1, -2\}$,
 $\bar{c} = \{7, 2, 1\}$, $\bar{d} = \{10, 17, 15\}$;
 $\alpha = 5$, $\beta = -2$, $\gamma = 3$, $\delta = 4$.
- 2.15. $\bar{a} = \{1, 7, 2\}$, $\bar{b} = \{-3, 4, -5\}$,
 $\bar{c} = \{1, 3, 6\}$, $\bar{d} = \{-8, -10, -10\}$;
 $\alpha = 4$, $\beta = 2$, $\gamma = 3$, $\delta = -5$.
- 2.16. $\bar{a} = \{-5, -3, -1\}$, $\bar{b} = \{3, -6, 2\}$,
 $\bar{c} = \{-2, 1, 3\}$, $\bar{d} = \{7, 22, 2\}$;
 $\alpha = 2$, $\beta = 5$, $\gamma = -3$, $\delta = 4$.
- 2.17. $\bar{a} = \{2, -4, 5\}$, $\bar{b} = \{-3, 1, -8\}$,
 $\bar{c} = \{4, 2, 3\}$, $\bar{d} = \{5, 15, -1\}$.
 $\alpha = 1$, $\beta = 5$, $\gamma = -3$, $\delta = 2$.
- 2.18. $\bar{a} = \{-1, -3, 4\}$, $\bar{b} = \{-3, 2, 1\}$,
 $\bar{c} = \{6, 1, -3\}$, $\bar{d} = \{-3, -19, 14\}$.
 $\alpha = 2$, $\beta = -1$, $\gamma = 3$, $\delta = 4$.
- 2.19. $\bar{a} = \{1, -2, 5\}$, $\bar{b} = \{-2, 4, 1\}$,
 $\bar{c} = \{3, 1, -3\}$, $\bar{d} = \{11, 6, 5\}$.
 $\alpha = 1$, $\beta = 3$, $\gamma = -4$, $\delta = -2$.
- 2.20. $\bar{a} = \{3, -4, 2\}$, $\bar{b} = \{-1, 2, -3\}$,
 $\bar{c} = \{5, 3, 1\}$, $\bar{d} = \{11, 26, -9\}$;
 $\alpha = -2$, $\beta = 3$, $\gamma = -3$, $\delta = 6$.
- 2.21. $\bar{a} = \{4, -5, -3\}$, $\bar{b} = \{-2, 3, 1\}$,
 $\bar{c} = \{3, -1, 2\}$, $\bar{d} = \{26, -23, -1\}$;
 $\alpha = 2$, $\beta = 4$, $\gamma = -3$, $\delta = 5$.
- 2.22. $\bar{a} = \{-5, -4, 0\}$, $\bar{b} = \{4, -3, -2\}$,
 $\bar{c} = \{0, 2, -3\}$, $\bar{d} = \{6, -14, -17\}$;
 $\alpha = 5$, $\beta = 1$, $\gamma = -2$, $\delta = -3$.
- 2.23. $\bar{a} = \{4, -3, 5\}$, $\bar{b} = \{-2, 1, -3\}$,
 $\bar{c} = \{6, 1, 2\}$, $\bar{d} = \{-6, 11, -12\}$;
 $\alpha = 5$, $\beta = 2$, $\gamma = 1$, $\delta = -4$.
- 2.24. $\bar{a} = \{-4, 3, 5\}$, $\bar{b} = \{2, 7, -3\}$,
 $\bar{c} = \{-3, 0, 1\}$, $\bar{d} = \{-7, 37, 4\}$;
 $\alpha = -2$, $\beta = -4$, $\gamma = 2$, $\delta = 3$.
- 2.25. $\bar{a} = \{-4, 0, 3\}$, $\bar{b} = \{-7, -2, -4\}$,
 $\bar{c} = \{3, 1, 2\}$, $\bar{d} = \{0, 5, 22\}$;
 $\alpha = 2$, $\beta = -5$, $\gamma = -3$, $\delta = 4$.
- 2.26. $\bar{a} = \{2, -1, 0\}$, $\bar{b} = \{-5, -3, 4\}$,
 $\bar{c} = \{1, -1, 1\}$, $\bar{d} = \{-3, -2, -3\}$;
 $\alpha = 3$, $\beta = -2$, $\gamma = -4$, $\delta = 5$.
- 2.27. $\bar{a} = \{3, -2, -4\}$, $\bar{b} = \{-2, 5, 0\}$,
 $\bar{c} = \{1, 3, 4\}$, $\bar{d} = \{7, 10, -12\}$;
 $\alpha = -4$, $\beta = -6$, $\gamma = 2$, $\delta = 5$.

$$2.28. \vec{a} = \{-6, 3, -1\}, \vec{b} = \{2, -3, -5\}, \\ \vec{c} = \{-1, 1, 2\}, \vec{d} = \{-1, -5, -15\}, \\ \alpha = -1, \beta = -3, \gamma = -2, \delta = 5.$$

$$2.29. \vec{a} = \{4, 5, -3\}, \vec{b} = \{-3, 0, -2\}, \\ \vec{c} = \{2, -1, 4\}, \vec{d} = \{3, 1, 7\}; \\ \alpha = -1, \beta = 4, \gamma = 3, \delta = -2.$$

$$2.30. \vec{a} = \{2, -1, 3\}, \vec{b} = \{-3, 5, 2\}, \\ \vec{c} = \{5, 4, 1\}, \vec{d} = \{-10, -11, 11\}; \\ \alpha = 6, \beta = 3, \gamma = -4, \delta = -5.$$

3. $ABCD$ пирамиданинг учлари берилган.

а) Пирамиданинг берилган кирралари орасидаги бурчак косинусини топинг;

б) пирамиданинг берилган ёғи юзини топинг:

$$3.1. A (6, -4, 1), B (6, 3, -1), C (2, 5, 7), D (-4, -2, 3), \\ \text{а) } AB \text{ ва } AC; \text{ б) } DBC.$$

$$3.2. A (6, 4, -7), B (5, 7, -4), C (-5, -4, 2), D (4, 2, 3), \\ \text{а) } BC \text{ ва } BD; \text{ б) } ACD.$$

$$3.3. A (-2, 8, 7), B (6, -2, -3), C (8, 2, -3), D (3, 5, 3); \\ \text{а) } CA \text{ ва } CD; \text{ в) } BAD.$$

$$3.4. A (4, 4, 3), B (2, -4, 5), C (-1, 3, -4), D (4, -7, -9), \\ \text{а) } DA \text{ ва } DB; \text{ б) } ABC.$$

$$3.5. A (-5, -3, 2), B (4, -2, -4), C (5, 7, 2), D (1, 3, 4); \\ \text{а) } AB \text{ ва } AD; \text{ б) } CBD.$$

$$3.6. A (-5, 6, 4), B (-6, 2, 4), C (9, -5, 3), D (7, 2, -8); \\ \text{а) } BC \text{ ва } BA; \text{ б) } DAC.$$

$$3.7. A (1, -9, 7), B (3, -5, 1), C (-9, 3, -5), D (2, 4, 7); \\ \text{а) } CB \text{ ва } CD; \text{ б) } ABD.$$

$$3.8. A (4, -2, 9), B (3, 5, -1), C (5, 1, 7), D (-6, -3, 5); \\ \text{а) } DA \text{ ва } DC; \text{ б) } ABC.$$

$$3.9. A (4, 1, 2), B (1, -5, 4), C (9, -7, -6), D (-1, -5, -2); \\ \text{а) } AC \text{ ва } AD; \text{ б) } BCD.$$

$$3.10. A (2, -5, 1), B (3, -6, -7), C (-9, -6, 7), D (7, 2, 5); \\ \text{а) } BD \text{ ва } BA; \text{ б) } CAD.$$

$$3.11. A (1, -5, -3), B (9, 7, 3), C (8, 7, 1), D (-2, -1, 7); \\ \text{а) } AD \text{ ва } CB; \text{ в) } ABD.$$

$$3.12. A (1, -1, 0), B (0, -4, 8), C (-3, 1, 5), D (-5, -6, -7); \\ \text{а) } AB \text{ ва } DC; \text{ б) } ABC.$$

$$3.13. A (-9, 2, 6), B (-7, 2, 3), C (5, -6, -4), D (4, -4, 5), \\ \text{а) } AB \text{ ва } AC; \text{ б) } DBC.$$

- 3.14. $A (-3, 0, 4), B (8, -6, 5), C (4, -4, -3), D (6, 3, 5)$;
а) BC ва BD ; б) ACD .
- 3.15. $A (-3, 8, 2), B (-8, 2, 4), C (3, -7, 5), D (5, 4, -6)$;
а) CA ва CD ; б) BCD .
- 3.16. $A (5, -3, 9), B (8, -5, 1), C (-7, 5, -3), D (4, 2, 5)$;
а) DA ва DC ; б) BAC .
- 3.17. $A (5, -1, 6), B (-6, 7, 5), C (2, 1, 3), D (-3, -5, -4)$;
а) AC ва AD ; б) BCD .
- 3.18. $A (1, 2, 3), B (3, -3, 2), C (7, -5, 4), D (-3, -7, -4)$;
а) BD ва BA ; б) CAD .
- 3.19. $A (4, -3, 1), B (0, -3, -5), C (-3, -2, 1), D (9, 4, 7)$;
а) CA ва CB ; б) ABD .
- 3.20. $A (5, -4, -2), B (7, 5, 1), C (3, 2, -4), D (-2, -5, 3)$;
а) DB ва DC ; б) ABC .
- 3.21. $A (-7, 2, 3), B (0, -2, 6), C (-1, 3, 7), D (-3, -4, -5)$;
а) AB ва AD ; б) CBD .
- 3.22. $A (-7, 6, 4), B (-4, 1, 1), C (3, -2, -6), D (6, -2, 3)$;
а) BC ва BA ; б) ACD .
- 3.23. $A (-4, 1, 5), B (5, -3, 2), C (3, -5, -4), D (8, 5, 7)$;
а) DA ва DC ; б) ABD .
- 3.24. $A (-5, 4, 2), B (-4, 6, 2), C (1, -5, 3), D (3, 6, -4)$;
а) DA ва AD ; б) BAC .
- 3.25. $A (3, -5, 6), B (6, -3, 4), C (-5, 3, -2), D (2, 4, 3)$;
а) AB ва AC ; б) DBC .
- 3.26. $A (4, -2, 8), B (-2, 2, 3), C (6, 4, 1), D (-4, -3, -5)$;
а) BC ва BD ; б) ACD .
- 3.27. $A (-3, 2, 4), B (-2, 5, 3), C (4, -2, -3), D (1, 4, 2)$;
а) CA ва CD ; б) BAD .
- 3.28. $A (-4, 4, 3), B (4, -3, -2), C (6, 4, -1), D (1, 3, 1)$;
а) DA ва DB ; б) CAB .
- 3.29. $A (2, 2, 1), B (4, -2, 3), C (-3, 5, -2), D (6, 5, -7)$;
а) AC ва AD ; б) BCD .
- 3.30. $A (-3, -6, 3), B (6, -3, -2), C (1, 2, 1), D (5, 4, 3)$;
а) BD ва BA ; б) CAD .

2- намунавий ҳисоб топшириқлари

1. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ векторлар базис ҳосил қилишини текширинг. \vec{d} векторнинг шу базисдаги ёйилмасини топинг:

1.1. $\vec{a} = \{0, 3, 1\}, \vec{b} = \{1, -2, 0\}, \vec{c} = \{1, 0, 1\}, \vec{d} = \{2, 7, 5\}$

1.2. $\vec{a} = \{-1, 0, 1\}, \vec{b} = \{3, -1, 2\}, \vec{c} = \{0, 1, 5\}, \vec{d} = \{8, -7, -13\}$

1.3. $\vec{a} = \{4, 0, 1\}, \vec{b} = \{3, 1, -1\}, \vec{c} = \{0, -2, 1\}, \vec{d} = \{0, -8, 9\}$

- 1.4. $\vec{a} = \{1, 2, -1\}$, $\vec{b} = \{-3, 0, 2\}$, $\vec{c} = \{1, 1, 4\}$, $\vec{d} = \{-13, 2, 18\}$.
 1.5. $\vec{a} = \{-1, 1, 1\}$, $\vec{b} = \{3, 2, 0\}$, $\vec{c} = \{1, -1, 2\}$, $\vec{d} = \{11, -1, -4\}$.
 1.6. $\vec{a} = \{2, -1, 0\}$, $\vec{b} = \{1, -1, 2\}$, $\vec{c} = \{0, 3, 1\}$, $\vec{d} = \{-1, 7, 0\}$.
 1.7. $\vec{a} = \{4, 2, 1\}$, $\vec{b} = \{1, 0, 1\}$, $\vec{c} = \{2, 1, 0\}$, $\vec{d} = \{3, 1, 3\}$.
 1.8. $\vec{a} = \{-3, 2, 5\}$, $\vec{b} = \{1, -1, 0\}$, $\vec{c} = \{2, 1, 0\}$, $\vec{d} = \{-9, 3, 15\}$.
 1.9. $\vec{a} = \{1, 3, 0\}$, $\vec{b} = \{0, -2, 1\}$, $\vec{c} = \{1, 0, 1\}$, $\vec{d} = \{8, 9, 4\}$.
 1.10. $\vec{a} = \{-1, 1, 0\}$, $\vec{b} = \{3, 2, -1\}$, $\vec{c} = \{0, 5, 1\}$, $\vec{d} = \{5, 0, -3\}$.
 1.11. $\vec{a} = \{4, 1, 0\}$, $\vec{b} = \{3, -1, 1\}$, $\vec{c} = \{0, 1, -2\}$, $\vec{d} = \{1, -4, 1\}$.
 1.12. $\vec{a} = \{1, -1, 2\}$, $\vec{b} = \{-3, 2, 0\}$, $\vec{c} = \{1, 2, -1\}$, $\vec{d} = \{8, 8, 7\}$.
 1.13. $\vec{a} = \{-1, 1, 1\}$, $\vec{b} = \{3, 0, 2\}$, $\vec{c} = \{1, 2, -1\}$, $\vec{d} = \{8, -5, 7\}$.
 1.14. $\vec{a} = \{2, 0, -1\}$, $\vec{b} = \{1, 2, -1\}$, $\vec{c} = \{0, 1, 3\}$, $\vec{d} = \{5, -4, 5\}$.
 1.15. $\vec{a} = \{4, 1, 2\}$, $\vec{b} = \{1, 1, 0\}$, $\vec{c} = \{2, 0, 1\}$, $\vec{d} = \{3, 5, 0\}$.
 1.16. $\vec{a} = \{2, 5, -3\}$, $\vec{b} = \{-1, 0, 1\}$, $\vec{c} = \{1, 0, 2\}$, $\vec{d} = \{-3, -5, 7\}$.
 1.17. $\vec{a} = \{1, 0, 3\}$, $\vec{b} = \{0, 1, -2\}$, $\vec{c} = \{1, 1, 0\}$, $\vec{d} = \{7, -1, 19\}$.
 1.18. $\vec{a} = \{0, -1, 1\}$, $\vec{b} = \{-1, 3, 2\}$, $\vec{c} = \{1, 0, 5\}$, $\vec{d} = \{5, -15, 0\}$.
 1.19. $\vec{a} = \{1, 0, 4\}$, $\vec{b} = \{-1, 1, 3\}$, $\vec{c} = \{1, -2, 0\}$, $\vec{d} = \{-6, 2, 0\}$.
 1.20. $\vec{a} = \{2, 1, -1\}$, $\vec{b} = \{0, -3, 2\}$, $\vec{c} = \{1, 1, 4\}$, $\vec{d} = \{-6, -14, -9\}$.
 1.21. $\vec{a} = \{1, 0, 4\}$, $\vec{b} = \{-1, 1, 3\}$, $\vec{c} = \{1, -2, 0\}$, $\vec{d} = \{0, 7, 29\}$.
 1.22. $\vec{a} = \{2, 1, -1\}$, $\vec{b} = \{0, -3, 2\}$, $\vec{c} = \{1, 1, 4\}$, $\vec{d} = \{4, -9, -14\}$.
 1.23. $\vec{a} = \{2, 0, 3\}$, $\vec{b} = \{1, 1, -1\}$, $\vec{c} = \{-1, 2, 1\}$, $\vec{d} = \{-11, 11, -14\}$.
 1.24. $\vec{a} = \{1, -2, 1\}$, $\vec{b} = \{-1, 0, 2\}$, $\vec{c} = \{-3, 1, 0\}$, $\vec{d} = \{16, -19, 10\}$.
 1.25. $\vec{a} = \{1, 0, 2\}$, $\vec{b} = \{3, -3, 4\}$, $\vec{c} = \{0, 1, 1\}$, $\vec{d} = \{-16, 13, -25\}$.
 1.26. $\vec{a} = \{3, 1, 0\}$, $\vec{b} = \{1, 2, 2\}$, $\vec{c} = \{1, 0, -1\}$, $\vec{d} = \{6, 7, 9\}$.
 1.27. $\vec{a} = \{1, 0, -1\}$, $\vec{b} = \{3, -1, 2\}$, $\vec{c} = \{0, 1, 5\}$, $\vec{d} = \{-11, 10, 1\}$.
 1.28. $\vec{a} = \{1, 0, 4\}$, $\vec{b} = \{-1, 3, 1\}$, $\vec{c} = \{1, 0, -2\}$, $\vec{d} = \{-1, 15, 33\}$.
 1.29. $\vec{a} = \{1, 2, -1\}$, $\vec{b} = \{-3, 0, 2\}$, $\vec{c} = \{1, -1, 4\}$, $\vec{d} = \{-7, 16, -25\}$.
 1.30. $\vec{a} = \{1, -1, 1\}$, $\vec{b} = \{2, 3, 0\}$, $\vec{c} = \{-1, 1, 2\}$, $\vec{d} = \{-1, -4, 10\}$.

2. A , B ва C нукталарнинг координаталари берилган.

а) \vec{a} ва \vec{b} векторлар орасидаги бурчак косинусини;

б) $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$ векторнинг \vec{a} вектор йўналишидаги проекциясини

ТОНИНГ:

2.1. $A (9, 10, 1)$, $B (7, 6, -1)$, $C (4, 0, -4)$;

$$\vec{a} = 2\vec{AB} - 3\vec{AC}, \vec{b} = 4\vec{BC} + \vec{AC}; \alpha = 1, \beta = 2$$

2.2. $A (0, 2, 1)$, $B (1, 2, 0)$, $C (0, 3, -1)$;

$$\vec{a} = 3\vec{AC} + 3\vec{BC}, \vec{b} = 2\vec{AB} + 5\vec{BC}; \alpha = -1, \beta = 2$$

- 2.3. $A(0, 4, 8), B(-5, 4, -2), C(-1, 4, 1);$
 $\bar{a} = \overline{AB} - 4\overline{AC}, \bar{b} = 3\overline{AC} + 2\overline{AB}, \alpha = -2, \beta = 3.$
- 2.4. $A(3, 0, 1), B(-2, 3, 2), C(1, 1, -2);$
 $\bar{a} = 3\overline{BC} - \overline{AB}, \bar{b} = 6\overline{BC} + 5\overline{AC}, \alpha = 2, \beta = -3.$
- 2.5. $A(4, 1, -3), B(5, 1, -2), C(-1, 3, 3);$
 $\bar{a} = 4\overline{AC} - 2\overline{CB}, \bar{b} = 7\overline{AB} + 5\overline{BC}, \alpha = \beta = 3.$
- 2.6. $A(4, 1, 1), B(3, 1, 2), C(0, 1, -2);$
 $\bar{a} = 3\overline{BC} - 4\overline{CA}, \bar{b} = 6\overline{BA} - \overline{AC}, \alpha = 3, \beta = 2.$
- 2.7. $A(-3, 4, -5), B(0, 1, -2), C(-1, 2, 3);$
 $\bar{a} = 4\overline{AB} - 3\overline{BC}, \bar{b} = 5\overline{CA} - 2\overline{BA}, \alpha = -2, \beta = 5.$
- 2.8. $A(7, 5, -2), B(6, 0, 0), C(7, 2, 2);$
 $\bar{a} = 4\overline{AB} - 3\overline{BC}, \bar{b} = 2\overline{CB} + 5\overline{AC}, \alpha = -4, \beta = 2.$
- 2.9. $A(-3, -7, -3), B(-1, -3, -1), C(2, 3, 2);$
 $\bar{a} = 2\overline{BC} - 5\overline{AB}, \bar{b} = 5\overline{AC} - \overline{CB}, \alpha = -3, \beta = 1.$
- 2.10. $A(2, -1, 8), B(3, 1, 7), C(2, 0, 7);$
 $\bar{a} = \overline{AB} - 3\overline{BC}, \bar{b} = 6\overline{CB} - 2\overline{AC}, \alpha = 5, \beta = 6.$
- 2.11. $A(-1, -1, 8), B(4, -1, -2), C(0, -1, 1);$
 $\bar{a} = 6\overline{BC} + 2\overline{AB}, \bar{b} = 2\overline{AC} - 5\overline{AB}, \alpha = -4, \beta = 3.$
- 2.12. $A(-2, 4, -2), B(3, 1, 0), C(0, 3, -4);$
 $\bar{a} = 3\overline{AB} - 4\overline{AC}, \bar{b} = 2\overline{BC} + 5\overline{CA}, \alpha = 3, \beta = -6.$
- 2.13. $A(1, 1, 4), B(-2, 1, 5), C(-1, 3, 3);$
 $\bar{a} = 4\overline{AC} - 2\overline{BC}, \bar{b} = 2\overline{AC} + 3\overline{AB}, \alpha = -5, \beta = 3.$
- 2.14. $A(4, 2, 6), B(2, 2, 8), C(-4, 2, 0);$
 $\bar{a} = 5\overline{AB} - 7\overline{AC}, \bar{b} = 2\overline{BC} + 3\overline{BA}, \alpha = 9, \beta = 12.$
- 2.15. $A(15, -12, 0), B(6, -3, 0), C(9, -6, 3);$
 $\bar{a} = \overline{AC} - 6\overline{BC}, \bar{b} = \overline{AB} + 3\overline{BC}, \alpha = -7, \beta = 6.$
- 2.16. $A(-1, -5, -2), B(0, -6, 4), C(-1, -8, 2);$
 $\bar{a} = 3\overline{BC} + 5\overline{AB}, \bar{b} = 5\overline{AC} - 3\overline{AB}, \alpha = -3, \beta = 4.$
- 2.17. $A(-1, -10, -5), B(1, -6, -3), C(0, 0, 4);$
 $\bar{a} = 2\overline{BC} - 3\overline{AC}, \bar{b} = 4\overline{AB} + 3\overline{AC}, \alpha = 4, \beta = -6.$
- 2.18. $A(-3, 3, 7), B(-2, 3, 6), C(-3, 2, 6);$
 $\bar{a} = 4\overline{AB} + \overline{AC}, \bar{b} = 2\overline{BC} - 3\overline{BA}, \alpha = -3, \beta = 8.$
- 2.19. $A(2, -2, -8), B(5, -2, -4), C(1, -2, -1);$
 $\bar{a} = 5\overline{AB} - 3\overline{BC}, \bar{b} = 4\overline{CA} + \overline{AB}, \alpha = -4, \beta = 1.$
- 2.20. $A(1, 2, 4), B(-4, -1, 6), C(-1, 1, 2);$
 $\bar{a} = 3\overline{CA} - 2\overline{AB}, \bar{b} = 2\overline{BA} + 4\overline{CB}, \alpha = 3, \beta = -5.$
- 2.21. $A(1, 1, 4), B(-2, 5, 1), C(-1, 3, 3);$
 $\bar{a} = \overline{AB} + \overline{AC}, \bar{b} = 2\overline{BC} - 3\overline{AB}, \alpha = 3, \beta = -4.$
- 2.22. $A(0, 1, -2), B(3, 1, 2), C(4, 1, 1);$
 $\bar{a} = 2\overline{AC} + 3\overline{BA}, \bar{b} = 3\overline{BC} - 4\overline{AB}, \alpha = -2, \beta = 6.$

- 2.23. $A(6, -8, 10)$, $B(0, -2, 4)$, $C(2, -4, 6)$;
 $\vec{a} = 3\vec{AB} + 6\vec{CB}$, $\vec{b} = 2\vec{AC} - 5\vec{AB}$, $\alpha = 2$, $\beta = 8$.
- 2.24. $A(0, 3, 2)$, $B(-2, -1, 0)$, $C(-5, -7, -3)$;
 $\vec{a} = 5\vec{BC} - 2\vec{CA}$, $\vec{b} = 6\vec{AB} + 4\vec{AC}$; $\alpha = -2$, $\beta = 5$.
- 2.25. $A(-1, 4, 6)$, $B(0, 2, 5)$, $C(-1, 3, 5)$;
 $\vec{a} = 8\vec{AC} - 4\vec{AB}$, $\vec{b} = 2\vec{BC} - 6\vec{AB}$; $\alpha = -3$, $\beta = -4$.
- 2.26. $A(1, -2, 3)$, $B(4, -2, -1)$, $C(0, -2, 4)$;
 $\vec{a} = 2\vec{AC} + 3\vec{AB}$, $\vec{b} = 3\vec{AB} - 4\vec{BC}$; $\alpha = 2$, $\beta = 1$.
- 2.27. $A(-1, 1, 1)$, $B(-6, 4, 3)$, $C(-3, 2, -1)$;
 $\vec{a} = 4\vec{AB} - 3\vec{BC}$, $\vec{b} = \vec{AC} + \vec{AB}$; $\alpha = 4$, $\beta = -6$.
- 2.28. $A(1, 1, 4)$, $B(-2, 5, 5)$, $C(-1, 3, 3)$;
 $\vec{a} = 2\vec{AC} - 3\vec{BC}$, $\vec{b} = 2\vec{AB} + 5\vec{CA}$; $\alpha = -2$, $\beta = 6$.
- 2.29. $A(-3, -1, -2)$, $B(-4, -1, -1)$, $C(0, -1, 2)$;
 $\vec{a} = 3\vec{BC} - 4\vec{AB}$, $\vec{b} = 2\vec{AC} + 3\vec{BC}$; $\alpha = -6$, $\beta = 4$.
- 2.30. $A(5, -4, 3)$, $B(2, -1, 0)$, $C(3, -2, 1)$;
 $\vec{a} = \vec{BC} + \vec{AC}$, $\vec{b} = 2\vec{AB} - 3\vec{CA}$; $\alpha = -5$, $\beta = 3$.

3. Агар a, b, α, β лар маълум бўлса, $\vec{c}_1 = \alpha_1 \vec{a} + \beta_1 \vec{b}$ ва $\vec{c}_2 = \alpha_2 \vec{a} + \beta_2 \vec{b}$ векторларнинг коллинеар бўлиши бўлмаслигини текширинг:

- 3.1. $\vec{a} = \{4, -3, 1\}$, $\vec{b} = \{-5, 0, 2\}$; $\alpha_1 = -2$, $\beta_1 = 5$; $\alpha_2 = -5$, $\beta_2 = 2$.
- 3.2. $\vec{a} = \{-3, 0, 5\}$; $\vec{b} = \{-7, 2, 4\}$; $\alpha_1 = -2$, $\beta_1 = 6$; $\alpha_2 = -3$, $\beta_2 = 6$.
- 3.3. $\vec{a} = \{0, -1, 2\}$; $\vec{b} = \{4, 3, -1\}$; $\alpha_1 = -3$, $\beta_1 = 1$; $\alpha_2 = -2$, $\beta_2 = 6$.
- 3.4. $\vec{a} = \{7, 1, -3\}$; $\vec{b} = \{8, 0, 5\}$; $\alpha_1 = -9$, $\beta_1 = 12$; $\alpha_2 = -4$, $\beta_2 = 3$.
- 3.5. $\vec{a} = \{8, 3, -1\}$; $\vec{b} = \{6, -1, 2\}$; $\alpha_1 = -5$, $\beta_1 = 2$; $\alpha_2 = -2$, $\beta_2 = 5$.
- 3.6. $\vec{a} = \{3, -1, 0\}$; $\vec{b} = \{9, 2, 4\}$; $\alpha_1 = -3$, $\beta_1 = 4$; $\alpha_2 = 4$, $\beta_2 = -3$.
- 3.7. $\vec{a} = \{-2, 1, 7\}$; $\vec{b} = \{3, 5, -9\}$; $\alpha_1 = 5$, $\beta_1 = 3$; $\alpha_2 = -1$, $\beta_2 = 2$.
- 3.8. $\vec{a} = \{7, 0, 6\}$; $\vec{b} = \{-2, -1, 5\}$; $\alpha_1 = 4$, $\beta_1 = -6$; $\alpha_2 = -2$, $\beta_2 = 3$.
- 3.9. $\vec{a} = \{-6, -7, 3\}$; $\vec{b} = \{4, -1, 2\}$; $\alpha_1 = -2$, $\beta_1 = 3$; $\alpha_2 = -3$, $\beta_2 = 2$.
- 3.10. $\vec{a} = \{-1, 6, 4\}$; $\vec{b} = \{0, 7, 3\}$; $\alpha_1 = -7$, $\beta_1 = 5$; $\alpha_2 = 2$, $\beta_2 = 3$.
- 3.11. $\vec{a} = \{5, 3, 7\}$; $\vec{b} = \{4, -2, 1\}$; $\alpha_1 = 1$, $\beta_1 = -2$; $\alpha_2 = -3$, $\beta_2 = 6$.
- 3.12. $\vec{a} = \{10, 7, 5\}$; $\vec{b} = \{6, -1, 3\}$; $\alpha_1 = 1$, $\beta_1 = -2$; $\alpha_2 = -2$, $\beta_2 = 4$.
- 3.13. $\vec{a} = \{3, 1, 4\}$; $\vec{b} = \{-1, 3, 8\}$; $\alpha_1 = 6$, $\beta_1 = -10$; $\alpha_2 = -3$, $\beta_2 = 5$.
- 3.14. $\vec{a} = \{3, 4, 6\}$; $\vec{b} = \{-2, 0, 5\}$; $\alpha_1 = 4$, $\beta_1 = 3$; $\alpha_2 = 3$, $\beta_2 = -2$.
- 3.15. $\vec{a} = \{3, 4, 5\}$; $\vec{b} = \{-2, 9, 7\}$; $\alpha_1 = 4$, $\beta_1 = -1$; $\alpha_2 = -1$, $\beta_2 = 4$.
- 3.16. $\vec{a} = \{1, -7, 2\}$; $\vec{b} = \{-1, 2, -1\}$; $\alpha_1 = 1$, $\beta_1 = -3$; $\alpha_2 = -2$, $\beta_2 = 6$.
- 3.17. $\vec{a} = \{4, -3, 1\}$; $\vec{b} = \{0, 7, 3\}$; $\alpha_1 = 1$, $\beta_1 = 2$; $\alpha_2 = -2$, $\beta_2 = 4$.
- 3.18. $\vec{a} = \{2, 5, -3\}$; $\vec{b} = \{-1, 7, -2\}$; $\alpha_1 = 2$, $\beta_1 = 3$; $\alpha_2 = 3$, $\beta_2 = 2$.
- 3.19. $\vec{a} = \{1, -2, 1\}$; $\vec{b} = \{-2, 3, 0\}$; $\alpha_1 = 5$, $\beta_1 = 3$; $\alpha_2 = -2$, $\beta_2 = 5$.
- 3.20. $\vec{a} = \{3, 2, 7\}$; $\vec{b} = \{-1, 0, 5\}$; $\alpha_1 = 3$, $\beta_1 = -6$; $\alpha_2 = -1$, $\beta_2 = 2$.

- 3.21. $\vec{a} = \{0, -2, 6\}$, $\vec{b} = \{2, 4, -1\}$, $\alpha_1 = 3$, $\beta_1 = -6$; $\alpha_2 = 1$, $\beta_2 = -2$.
 3.22. $\vec{a} = \{5, 0, 1\}$, $\vec{b} = \{-2, -3, -2\}$; $\alpha_1 = -3$, $\beta_1 = -1$; $\alpha_2 = 9$, $\beta_2 = 3$.
 3.23. $\vec{a} = \{1, -1, 2\}$, $\vec{b} = \{-1, 4, 3\}$, $\alpha_1 = 1$, $\beta_1 = -2$; $\alpha_2 = -3$, $\beta_2 = 6$.
 3.24. $\vec{a} = \{0, -1, 3\}$, $\vec{b} = \{5, -2, 1\}$; $\alpha_1 = 1$, $\beta_1 = -2$; $\alpha_2 = -2$, $\beta_2 = 4$.
 3.25. $\vec{a} = \{-1, 1, 1\}$, $\vec{b} = \{-2, 4, 1\}$; $\alpha_1 = 2$, $\beta_1 = 4$, $\alpha_2 = 1$, $\beta_2 = 1$.
 3.26. $\vec{a} = \{7, 9, 5\}$, $\vec{b} = \{4, 5, 3\}$; $\alpha_1 = -2$, $\beta_1 = 3$; $\alpha_2 = 1$, $\beta_2 = -2$.
 3.27. $\vec{a} = \{-1, -1, 2\}$, $\vec{b} = \{-3, 2, 1\}$; $\alpha_1 = -1$, $\beta_1 = 8$; $\alpha_2 = 3$, $\beta_2 = 4$.
 3.28. $\vec{a} = \{7, -2, 1\}$, $\vec{b} = \{1, 4, -2\}$, $\alpha_1 = -1$, $\beta_1 = 2$, $\alpha_2 = 3$, $\beta_2 = 5$.
 3.29. $\vec{a} = \{5, 3, -2\}$, $\vec{b} = \{1, 0, 1\}$; $\alpha_1 = -1$, $\beta_1 = 3$; $\alpha_2 = 2$, $\beta_2 = 1$.
 3.30. $\vec{a} = \{-1, 0, 3\}$, $\vec{b} = \{3, -2, 1\}$, $\alpha_1 = 3$, $\beta_1 = -1$; $\alpha_2 = 4$, $\beta_2 = 2$.

1. \vec{a} , \vec{b} ва \vec{c} векторлар компланар бўлиш-бўлмаслигини аниқлаш:

- 4.1. $\vec{a} = \{9, 5, 8\}$, $\vec{b} = \{4, 3, 3\}$, $\vec{c} = \{5, 3, 4\}$.
 4.2. $\vec{a} = \{6, 11, 8\}$, $\vec{b} = \{0, 1, 1\}$, $\vec{c} = \{2, 4, 3\}$.
 4.3. $\vec{a} = \{-4, -1, 2\}$, $\vec{b} = \{-7, -3, 1\}$, $\vec{c} = \{-6, -1, 4\}$.
 4.4. $\vec{a} = \{4, 2, 4\}$, $\vec{b} = \{-5, -4, -5\}$, $\vec{c} = \{0, 1, 3\}$.
 4.5. $\vec{a} = \{-1, 1, 1\}$, $\vec{b} = \{6, 1, 8\}$, $\vec{c} = \{3, 0, 3\}$.
 4.6. $\vec{a} = \{8, -3, 1\}$, $\vec{b} = \{3, 0, 1\}$, $\vec{c} = \{4, -1, 1\}$.
 4.7. $\vec{a} = \{2, 1, 2\}$, $\vec{b} = \{-1, -2, -1\}$, $\vec{c} = \{4, 3, 6\}$.
 4.8. $\vec{a} = \{6, 2, 6\}$, $\vec{b} = \{-9, -4, -9\}$, $\vec{c} = \{1, 1, 4\}$.
 4.9. $\vec{a} = \{-1, 0, 3\}$, $\vec{b} = \{6, 7, -4\}$, $\vec{c} = \{3, 3, -3\}$.
 4.10. $\vec{a} = \{-1, 4, -2\}$, $\vec{b} = \{-1, 2, 0\}$, $\vec{c} = \{-5, 10, -7\}$.
 4.11. $\vec{a} = \{2, 2, 2\}$, $\vec{b} = \{-1, 0, -1\}$, $\vec{c} = \{1, 3, 2\}$.
 4.12. $\vec{a} = \{-1, 1, 3\}$, $\vec{b} = \{4, 3, 2\}$, $\vec{c} = \{1, 2, 3\}$.
 4.13. $\vec{a} = \{1, 1, 1\}$, $\vec{b} = \{-1, 1, -1\}$, $\vec{c} = \{2, 5, 1\}$.
 4.14. $\vec{a} = \{4, 3, 2\}$, $\vec{b} = \{1, 2, 3\}$, $\vec{c} = \{-3, -1, -1\}$.
 4.15. $\vec{a} = \{1, 1, 1\}$, $\vec{b} = \{1, -2, 1\}$, $\vec{c} = \{1, 3, 3\}$.
 4.16. $\vec{a} = \{-1, 2, 5\}$, $\vec{b} = \{0, -1, -2\}$, $\vec{c} = \{-1, 1, 3\}$.
 4.17. $\vec{a} = \{2, 2, 2\}$, $\vec{b} = \{1, -2, 1\}$, $\vec{c} = \{1, 3, 4\}$.
 4.18. $\vec{a} = \{-1, 0, 2\}$, $\vec{b} = \{4, 7, 6\}$, $\vec{c} = \{1, 3, 4\}$.
 4.19. $\vec{a} = \{3, 2, 1\}$, $\vec{b} = \{-7, -3, 1\}$, $\vec{c} = \{1, 2, 3\}$.
 4.20. $\vec{a} = \{1, 2, 2\}$, $\vec{b} = \{-1, 0, -2\}$, $\vec{c} = \{2, 7, 3\}$.
 4.21. $\vec{a} = \{17, -6, 2\}$, $\vec{b} = \{1, 0, 1\}$, $\vec{c} = \{6, -2, 1\}$.
 4.22. $\vec{a} = \{2, 1, 2\}$, $\vec{b} = \{-1, -2, -1\}$, $\vec{c} = \{4, 3, 6\}$.
 4.23. $\vec{a} = \{4, 2, 4\}$, $\vec{b} = \{-1, -2, -1\}$, $\vec{c} = \{4, 3, 7\}$.
 4.24. $\vec{a} = \{-1, 0, 2\}$, $\vec{b} = \{5, 7, 4\}$, $\vec{c} = \{2, 3, 2\}$.
 4.25. $\vec{a} = \{4, 2, 4\}$, $\vec{b} = \{-1, 0, -1\}$, $\vec{c} = \{4, 3, 5\}$.
 4.26. $\vec{a} = \{3, 4, 2\}$, $\vec{b} = \{-3, -2, -2\}$, $\vec{c} = \{5, 10, 3\}$.
 4.27. $\vec{a} = \{4, 7, 6\}$, $\vec{b} = \{1, 3, 4\}$, $\vec{c} = \{-3, -4, -2\}$.
 4.28. $\vec{a} = \{-2, 3, 8\}$, $\vec{b} = \{-1, 0, 1\}$, $\vec{c} = \{-1, 1, 3\}$.
 4.29. $\vec{a} = \{2, 1, 2\}$, $\vec{b} = \{-3, -3, 3\}$, $\vec{c} = \{2, 2, 4\}$.
 4.30. $\vec{a} = \{-1, 1, 1\}$, $\vec{b} = \{5, 2, 9\}$, $\vec{c} = \{2, 1, 4\}$.

5. Пирамиданинг учлари A, B, C, D берилган.

а) Курсатилган еك юзини; б) пирамиданинг l кйрраси ва берилган иккита учидан утувчи кесим юзини, в) пирамиданинг хажмини хисобланг.

- 5.1. $A(1, 0, -3), B(-1, 1, 0), C(2, -1, 1), D(0, 2, 1)$;
а) ABC ; б) $l=AD, B$ ва C .
- 5.2. $A(0, 1, 2), B(1, -2, 2), C(-1, 2, 1), D(2, 0, 1)$;
а) BCD ; б) $l=BA, C$ ва D .
- 5.3. $A(-4, -5, 0), B(6, -1, 2), C(1, 0, 1), D(-3, 2, 1)$;
а) ACD ; б) $l=CB, A$ ва D .
- 5.4. $A(2, -1, 1), B(-3, 0, -6), C(-5, 3, -2), D(-1, 10, 3)$;
а) ABD ; б) $l=CD, A$ ва B .
- 5.5. $A(1, -3, 7), B(-1, 0, 3), C(-4, -2, 1), D(4, 2, -1)$;
а) ABC ; б) $l=BD, A$ ва C .
- 5.6. $A(-4, 1, 3), B(5, -1, 2), C(2, 1, -4), D(1, -3, 0)$;
а) BCD ; б) $l=AC, B$ ва D .
- 5.7. $A(5, 3, -4), B(1, 0, 3), C(2, -1, 4), D(0, 3, 1)$;
а) ACD ; б) $l=AB, C$ ва D .
- 5.8. $A(3, 7, -4), B(-4, 1, 3), C(2, 3, 0), D(-1, -1, -2)$;
а) ABD ; б) $l=BC, A$ ва D .
- 5.9. $A(-8, 2, -5), B(-1, -3, 0), C(-4, 1, 2), D(6, -5, -3)$;
а) ABC ; б) $l=CD, A$ ва B .
- 5.10. $A(7, -8, -10), B(-3, 3, -1), C(0, -6, 5), D(-3, -4, 2)$;
а) BCD ; б) $l=AD, B$ ва C .
- 5.11. $A(-3, 6, -4), B(1, 0, -1), C(1, 2, 2), D(6, 3, 1)$;
а) ACD ; б) $l=BD, A$ ва C .
- 5.12. $A(-4, 2, -5), B(8, 5, -10), C(0, -3, 2), D(6, 2, -4)$;
а) ABD ; б) $l=AC, B$ ва D .
- 5.13. $A(1, 2, -4), B(1, 3, 3), C(-2, -1, 7), D(4, 2, 7)$;
а) ABC ; б) $l=AD, B$ ва C .
- 5.14. $A(6, -3, -6), B(2, -3, -7), C(2, 5, -1), D(4, 1, 2)$;
а) BCD ; б) $l=AB, C$ ва D .
- 5.15. $A(7, 6, -10), B(-3, 6, 3), C(-3, 0, -6), D(2, -5, -1)$;
а) ACD ; б) $l=CB, A$ ва D .
- 5.16. $A(3, -6, -1), B(-9, -5, 1), C(5, 3, -2), D(-1, -1, 0)$;
а) ABD ; б) $l=CD, A$ ва B .
- 5.17. $A(1, 1, -1), B(4, 2, 1), C(0, 5, 2), D(0, 2, 5)$;
а) ABC ; б) $l=BD, A$ ва C .
- 5.18. $A(-7, 9, -10), B(-6, 0, 5), C(1, 2, 1), D(-2, -1, 2)$;
а) BCD ; б) $l=AC, B$ ва D .
- 5.19. $A(6, -4, 1), B(-4, -8, 4), C(1, 7, -1), D(-4, 0, -2)$;
а) ACD ; б) $l=AB, C$ ва D .
- 5.20. $A(-1, 2, -2), B(-3, -6, -2), C(2, -3, -5), D(5, 4, 14)$;
а) ABD ; б) $l=BC, A$ ва D .

- 5.21. $A(-9, 1, 8)$, $B(6, 2, 5)$, $C(-3, 0, 3)$, $D(0, 2, 1)$;
 а) ABC ; б) $l=CD$, A ва B
- 5.22. $A(5, 2, -4)$, $B(1, 2, 3)$, $C(-1, 2, 1)$, $D(2, -1, 2)$;
 а) BCD , б) $l=AD$, B ва C .
- 5.23. $A(-2, 0, -1)$, $B(1, -2, 2)$, $C(3, 1, -1)$, $D(2, 1, 1)$.
 а) ACD , б) $l=BD$, A ва C .
- 5.24. $A(-3, 5, 7)$, $B(7, 3, 6)$, $C(-2, 1, 4)$, $D(1, 3, 2)$;
 а) ABD ; б) $l=AC$, B ва D
- 5.25. $A(-8, 9, 5)$, $B(1, 2, 3)$, $C(2, 3, 1)$, $D(-1, 1, 1)$.
 а) ABC , б) $l=AD$, B ва C .
- 5.26. $A(-12, 8, -4)$, $B(3, 7, -2)$, $C(3, 6, -3)$, $D(-7, 5, 1)$;
 а) BCD , б) $l=AB$, C ва D
- 5.27. $A(4, 5, 2)$, $B(0, -2, -3)$, $C(-4, 5, 1)$, $D(-7, 4, -3)$.
 а) ACD , б) $l=CB$, A ва D .
- 5.28. $A(5, 4, 3)$, $B(-2, 1, 2)$, $C(0, -1, 4)$, $D(-3, 2, -1)$.
 а) ABD , б) $l=CD$, A ва B
- 5.29. $A(-6, 2, 8)$, $B(1, -5, 0)$, $C(0, 1, -2)$, $D(3, -1, 4)$;
 а) ABC ; б) $l=BD$, A ва C .
- 5.30. $A(-4, -2, 2)$, $B(-1, 1, 2)$, $C(3, 0, -2)$, $D(1, -1, 1)$.
 а) BCD , б) $l=AC$, B ва D

7- §. Текисликнинг тенгламаси.
Текисликнинг умумий тенгламасини текшириш.
Тўғри чизикнинг тенгламаси

1.7.1. $Oxyz$ тўғри бурчакли координаталар системасида ҳар қандай текислик тенгламасини x , y , z ўзгарувчиларга нисбатан қуйидаги чизикли тенглама шаклида ёзиш мумкин:

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

Бу тенглама текисликнинг *умумий тенгламаси* дейилади. Бу ерда A , B , C коэффицентлар берилган текисликка перпендикуляр бўлган ва унинг *нормал вектори* деб аталувчи $\vec{n} = \{A, B, C\}$ векторнинг координаталаридир. Текисликнинг фазодаги ҳолати A , B , C коэффицентлари ва овоз ҳадини кийматларига боғлиқ. Хусусан, агар:

I. $D=0$ бўлса, u ҳолда $Ax + By + Cz = 0$ ва текислик координаталар бошида ўтади.

II. а) $C=0$ бўлса, u ҳолда $Ax + By + D = 0$ ва текислик Oz ўқига параллел бўлади;

б) $B=0$ бўлса, u ҳолда $Ax + Cz + D = 0$ ва текислик Oy ўқига параллел бўлади;

в) $A=0$ бўлса, u ҳолда $By + Cz + D = 0$ ва текислик Ox ўқига параллел бўлади.

III. а) $D=0, C=0$ бўлса, у ҳолда $Ax+By=0$ ва текислик Oz ўқи орқали ўтади.

б) $D=0, B=0$ бўлса, у ҳолда $Ax+Cz=0$ ва текислик Oy ўқи орқали ўтади.

в) $D=0, A=0$ бўлса, у ҳолда $By+Cz=0$ ва текислик Ox ўқи орқали ўтади.

IV. а) $C=0, B=0$ бўлса, у ҳолда $Ax+D=0$ ва текислик Oyz координаталар текислигига параллел (ёки Ox ўқка перпендикуляр) бўлади;

б) $C=0, A=0$ бўлса, у ҳолда $By+D=0$ ва текислик Oxz координаталар текислигига параллел (ёки Oy ўқка перпендикуляр) бўлади;

в) $A=0, B=0$ бўлса, у ҳолда $Cz+D=0$ ва текислик Oxy координаталар текислигига параллел (ёки Oz ўқка перпендикуляр) бўлади.

V. а) $D=0, A=0$ ва $B=0$ бўлса, у ҳолда $Cz=0$ ёки $z=0$ ва текислик Oxy координаталар текислиги билан устма-уст тушади;

б) $D=0, A=0$ ва $C=0$ бўлса, у ҳолда $By=0$ ёки $y=0$ ва текислик Oxz координаталар текислиги билан устма-уст тушади;

в) $D=0, B=0$ ва $C=0$ бўлса, у ҳолда $Ax=0$ ёки $x=0$ ва текислик Oyz текислик билан устма-уст тушади.

1.7.2. Қуйида маълум шартларни қаноатлантирувчи текисликлар тенгламаларни келтирилган:

а) берилган $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктадан ўтувчи ва берилган $\vec{n}=\{1, B, C\}$ нормал векторга эга текислик тенгламаси:

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0;$$

б) текисликнинг кесмаларга нисбатан тенгламаси

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

бунда a, b, c — текисликнинг мос координата ўқларидан кесадиган кесмалари;

в) берилган учта $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$ ва $M_3(x_3, y_3, z_3)$ нуктадан ўтувчи текислик тенгламаси:

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

1.7.3. Тўғри чизиқнинг фазода берилиш усулига қараб унинг тенгламаси турлича бўлиши мумкин:

а) берилган $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктадан ўтувчи ва $\vec{s}=\{l, m, p\}$ йўналтирувчи векторга эга бўлган тўғри чизиқнинг каноник шаклдаги тенгламалари

$$\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{p},$$

б) тўғри чизиқнинг параметрик тенгламалари

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + pt. \end{cases}$$

бунда t — параметр;

в) берилган икки $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ва $M_2(x_2, y_2, z_2)$ нуктадан ўтувчи тўғри чизик тенгламаси:

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1};$$

г) фазодаги тўғри чизиқнинг умумий тенгламалари:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases}$$

бунда $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$.

Бу тўғри чизиқнинг йўналтирувчи вектори \vec{s} ушбу

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}$$

формула бўйича аниқланади.

1.7.4. $Ax + By + Cz + D = 0$ ва $z = 0$ текисликларнинг кесилиши чизиги Oxy текисликда ётувчи

$$Ax + By + C = 0$$

тўғри чизикдан иборат бўлади. Бу тенглама текисликдаги тўғри чизиқнинг умумий тенгламаси дейилади. Берилган тўғри чизикка перпендикуляр бўлган $\vec{n} = \{A, B\}$ вектор тўғри чизиқнинг нормал вектори дейилади. Текисликдаги тўғри чизиқнинг тенгламалари:

а) берилган $M_0(x_0, y_0)$ нуктадан ўтувчи ва берилган $\vec{n} = \{A, B\}$ нормал векторга эга тўғри чизик тенгламаси

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0;$$

б) тўғри чизикнинг каноник тенгламаси

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m},$$

бунда $\vec{s} = \{l, m\}$ — тўғри чизикнинг йўналтирувчи вектори, $M_0(x_0, y_0)$ — тўғри чизикда ўтувчи берилган нукта;

в) тўғри чизикнинг бурчак коэффициентли тенгламаси

$$y = kx + b,$$

бунда b — тўғри чизикнинг Oy ўқдан кесадиган кесмаси; k — тўғри чизикнинг бурчак коэффициенти; $k = \operatorname{tg} \alpha$ (α — тўғри чизик билан Ox ўқнинг мусбат йўналиши орасидаги бурчак);

г) $M_0(x_0, y_0)$ нуктадан ўтувчи ва k бурчак коэффициентли тўғри чизикнинг тенгламаси

$$y - y_0 = k(x - x_0);$$

д) тўғри чизикнинг кесмаларга нисбатан тенгламаси

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1,$$

бунда a ва b — тўғри чизикнинг координаталар ўқларидан кесадиган кесмаси;

е) берилган икки $M_0(x_0, y_0)$ ва $M_1(x_1, y_1)$ нуктадан ўтувчи тўғри чизик тенгламаси

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}.$$

Мисол $M_0(-2, 1; -1)$ нуктадан ўтувчи $\vec{s} = \{1; -1; 2\}$ векторга параллел тўғри чизик тенгламасини топинг.

Ҳал. \vec{s} вектор тўғри чизикка параллел бўлгани учун u тўғри чизикнинг йўналтирувчи вектори бўлади. Шу сабабдан, тўғри чизикнинг каноник тенгламалари $\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{l}$ га нисбатан яъни асосан, ишлатилган тўғри чизик тенгламалари

$$\frac{x + 2}{1} = \frac{y - 1}{-1} = \frac{z + 1}{2}$$

куринишда бўлади.

7- дарсхона топириги

Қуйидаги текислик тенгламасини тузинг ва тегишли шаклни чизинг:

а) $M_0(7, -3, 5)$ нуктадан ўтувчи ва Oxz координаталар текислигига параллел текислик;

б) Oz ўқ ва $M_0(-3, 1, -2)$ нукта орқали ўтувчи текислик;

в) Ox ўқка параллел ҳамда икки $M_1(4, 0, -2)$ ва $M_2(5, 1, 7)$ нуктадан ўтувчи текислик;

г) $M_1(2, 1, -1)$ нуктадан ўтувчи ва нормал вектори $\vec{n} = \{1, -2, 3\}$ бўлган текислик;

д) $M_1(3, 4, -5)$ нуктадан ўтувчи ҳамда $\vec{a} = \{3, 1, -1\}$ ва $\vec{b} = \{1, -2, 1\}$ векторларга параллел бўлган.

Ж: а) $y + 3 = 0$; б) $x + 3y = 0$; в) $9y - z - 2 = 0$; г) $x - 2y + 3z + 3 = 0$; д) $x + 4y + 7z + 16 = 0$

2. $M(-1, 2, 1)$, $N(2, 3, -2)$ ва $P(3, 4, 2)$ нукталардан ўтувчи текислик тенгламасини топинг.

Ж: $7x - 15y + 2z + 7 = 0$

3. $M_0(7, -5, 1)$ нуктадан ўтувчи ва координаталар ўқларидан тенг кесмалар ажратувчи текислик тенгламасини тузинг.

Ж: $x + y + z - 3 = 0$

4. Фазода умумий тенгламалари

$$\begin{cases} x - y + 2z + 4 = 0, \\ 3x + y - 5z - 8 = 0 \end{cases}$$

билан берилган тўғри чизикнинг каноник тенгламасини ёзинг.

Ж: $\frac{x-1}{3} = \frac{y-5}{11} = \frac{z}{4}$

5. $M_0(2, 0, -3)$ нуктадан ўтувчи ва қуйидаги шартни қаноатлантирувчи тўғри чизик тенгламасини тузинг: а) $\vec{s} = \{2, 3, -4\}$ векторга параллел; б) $M_1(-3, 1, 4)$ нуктадан ўтувчи.

Ж: а) $\frac{x-2}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-4}$; б) $\frac{x-2}{-5} = \frac{y}{1} = \frac{z+3}{7}$

6. Берилган тенгламалари бўйича тўғри чизикнинг шаклини чизинг, унинг k бурчак коэффициентини ва координаталар ўқларидан кесадиган a ва b кесмаларини топинг:

а) $2x - y + 3 = 0$; б) $5x + 2y - 8 = 0$,

в) $3x + 8y + 16 = 0$; г) $3x - y = 0$.

Ж: а) $k = 2$, $a = -\frac{3}{2}$, $b = 3$; б) $k = -\frac{5}{2}$; $a = \frac{8}{5}$; $b = 4$,

в) $k = -\frac{3}{8}$; $a = -\frac{16}{3}$, $b = -2$; г) $k = 3$; $a = b = 0$

7. Қуйидаги тўғри чизиқлар тенгламаларини тузинг:

а) $M_0(3, -1)$ нуктадан ўтувчи ва ординаталар ўқига параллел;

б) $M_0(3, -1)$ нуктадан ўтувчи ва абсциссалар ўқига параллел;

в) $M_0(3, -1)$ нуктадан ўтувчи ва $a = \{3, -2\}$ векторга параллел;

г) $M_0(3, -1)$ нуктадан ўтувчи ва $b = \{1, -4\}$ векторга перпендикуляр.

Ж: а) $x = 3$; б) $y = -1$; в) $2x + 3y - 3 = 0$, г) $x - 4y - 7 = 0$.

7- мустақил иш

1. Иккита $M_1(3, -1, 2)$ ва $M_2(4, -2, -1)$ нукта берилган. M_1 нуктадан ўтувчи ва M_1M_2 векторга перпендикуляр текислик тенгламасини тузинг.

Ж: $x - y - 3z + 2 = 0$.

2. $M_1(3, -1, 2)$, $M_2(4, -1, -1)$ ва $M_3(2, 0, 2)$ нукталардан ўтувчи текислик тенгламасини тузинг.

Ж: $3x + 3y + z - 8 = 0$.

3. Учбурчакнинг учлари берилган: $M(3, 6, -7)$, $N(-5, 2, 3)$ ва $P(4, -7, -2)$. P учидан ушарилган медиананинг параметрик тенгламасини тузинг.

$$\text{Ж: } \begin{cases} x = 5t + 4, \\ y = -11t - 7, \\ z = -2 \end{cases}$$

4. Ушбу

$$\begin{cases} x - 2y + 3z - 4 = 0, \\ 3x + 2y - 5z - 4 = 0 \end{cases}$$

тенгламалар билан берилган тўғри чизиқнинг каноник тенгламаларини тузинг.

$$\text{Ж: } \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{7} = \frac{z}{4}$$

5. $2x + 2y - 5 = 0$ тўғри чизиқнинг абсциссалар ўқининг мусбат йўналиши билан ташкил қилган бурчагини тоинг.

Ж: 135° .

6. Учбурчак томонларининг ўрталари берилган: $M_1(2, 1)$, $M_2(5, 3)$, $M_3(3, -4)$. Учбурчак томонлари тенгламаларини тузинг.

Ж: $7x - 2y - 12 = 0$, $5x + y - 28 = 0$, $2x - 3y - 18 = 0$.

7. Учбурчакнинг учлари берилган: $M_1(2, 1)$, $M_2(-1, -1)$ ва $M_3(3, 2)$ Учбурчакнинг бадавликлари тенгламаларини тузинг.

$$\text{Ж: } 4x + 3y - 11 = 0, \quad x + y + 2 = 0, \quad 3x + 2y - 13 = 0$$

8-§. Текисликлар ва тўғри чизикларнинг ўзаро жойлашуви.
Текисликлар орасидаги бурчак. Тўғри чизиклар орасидаги бурчак.
Нуктадан тўғри чизиккача ва текисликкача бўлган масофа

1.8.1. Текисликлар $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ ва $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ тенгламалар билан берилган бўлсин. Улар орасидаги φ бурчак қуйидаги формула асосида ҳисобланади:

$$\cos\varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

бунда $\vec{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}$ ва $\vec{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}$ — берилган текисликларнинг нормал векторлари.

а) Агар текисликлар перпендикуляр бўлса, у ҳолда $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ ёки $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$.

б) Агар текисликлар параллел бўлса, у ҳолда

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$$

в) Агар текисликлар устма-уст тушса, у ҳолда

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$$

г) $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктадан $Ax + By + Cz + D = 0$ текисликкача бўлган d масофа:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

формула бўйича ҳисобланади.

1.8.2. Тўғри чизиклар

$$\frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{p_1}$$

ва

$$\frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{p_2}$$

каноник тенгламалар билан берилган бўлсин. Бу тўғри чизиклар орасидаги φ бурчак қуйидаги формуладан топилади

$$\cos\varphi = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|} = \frac{|l_1l_2 + m_1m_2 + p_1p_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + p_2^2}}$$

а) Агар тўғри чизиклар перпендикуляр бўлса, у ҳолда $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 0$ ёки $l_1 l_2 + m_1 m_2 + p_1 p_2 = 0$

б) Агар тўғри чизиклар параллел бўлса, у ҳолда $\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{p_1}{p_2}$

в) Агар тўғри чизиклар ўсма-ўст тушса, у ҳолда $\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{p_1}{p_2}$,
шу билан бирга

$$\frac{x_2 - x_1}{l_1} = \frac{y_2 - y_1}{m_1} = \frac{z_2 - z_1}{p_1}$$

г) Агар тўғри чизиклар кесинса, у ҳолда

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & p_1 \\ l_2 & m_2 & p_2 \end{vmatrix} = 0$$

д) Агар тўғри чизиклар айқаш бўлса, у ҳолда

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & p_1 \\ l_2 & m_2 & p_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

$M_1(x_1, y_1, z_1)$ нуктадан $\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{p}$ тўғри чизиккача
бўлган масофа қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$d = \frac{|\vec{s} \times \vec{M}_1 \vec{M}_0|}{|\vec{s}|},$$

бунда $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нукта шу тўғри чизикка тегишли ва $\vec{s} = \{l, m, p\}$ унинг йуналтирувчи вектори.

Икки айқаш

$$\frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{p_1} \text{ ва } \frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{p_2}$$

тўғри чизиклар орасидаги энг киска d масофа қуйидагича
аникланади:

$$d = \frac{|\vec{M}_1 \vec{M}_2 \cdot \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|}$$

бунда $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ва $M_2(x_2, y_2, z_2)$ нукталар мос равишда бу тўғри
чизикларга тегишли, $\vec{s}_1 = \{l_1, m_1, p_1\}$ ва $\vec{s}_2 = \{l_2, m_2, p_2\}$ лар эса
уларнинг йуналтирувчи векторлари.

Мисол. $x - 2y + 2z - 8 = 0$ ва $x + z - 6 = 0$ текисликлар ораси-
даги бурчакни тоғинг.

Е чи ш Икки текислик орасидаги бурчак формуласига кўра:

$$\cos \varphi = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 - C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} = \frac{1 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 + 2 \cdot 1}{\sqrt{1+4+4} \cdot \sqrt{1+1}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Бундан $\varphi = \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = 45^\circ$ келиб чиқади.

1.8.3. $Ax + By + Cz + D = 0$ текислик билан $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{p}$ тўғри чизик орасидаги φ бурчак ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{s}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|} = \frac{|Al + Bm + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l^2 + m^2 + p^2}}$$

бунда $\vec{n} = \{A, B, C\}$ — текисликнинг нормал вектори, $\vec{s} = \{l, m, p\}$ — тўғри чизикнинг йўналишувчи вектори.

а) Агар текислик билан тўғри чизик перпендикуляр бўлса, \vec{n} ва \vec{s} векторлар коллинеар ёки $\frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{p}$ бўлади.

б) Агар текислик билан тўғри чизик параллел бўлса, у ҳолда \vec{n} ва \vec{s} векторлар перпендикуляр ёки $Al + Bm + Cp = 0$ бўлади.

в) Агар текислик билан тўғри чизик устма-уст тушса, у ҳолда $Al + Bm + Cp = 0$, шу билан бирга $Ax_0 + Bx_0 + Cz_0 + D = 0$ бўлади.

г) Агар текислик билан тўғри чизик кесинса, у ҳолда

$$Al + Bm + Cp \neq 0$$

1.8.4. Текисликдаги тўғри чизиклар

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0 \text{ ва } A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

тенгламалар билан берилган бўлсин. Улар орасидаги φ бурчак ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$$

бунда $\vec{n}_1 = \{A_1, B_1\}$, $\vec{n}_2 = \{A_2, B_2\}$ — мос равишда берилган тўғри чизикларнинг нормал векторлари.

а) Агар бу тўғри чизиклар ўзаро перпендикуляр бўлса, у ҳолда

$$A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 = 0.$$

б) Агар бу тўғри чизиклар параллел бўлса, у ҳолда

$$A_1/A_2 = B_1/B_2.$$

в) Агар бу тўғри чизиклар устма уст тушса, у ҳолда

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$

Текисликдаги тўғри чизиклар

$$y = k_1x + b_1 \text{ ва } y = k_2x + b_2$$

тенгламалар билан берилган бўлсин. Улар орасидаги φ бурчак ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 \cdot k_2}$$

Бу тўғри чизикларнинг перпендикулярлик шarti $k_1 \cdot k_2 = -1$ дан иборат, параллеллик шarti эса $k_1 = k_2$ бўлади.

$M_0(x_0, y_0)$ нуктадан $Ax + By + C = 0$ тўғри чизиккача бўлган d масофа ушбу

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

формула бўйича ҳисобланади.

8-да: сона топшириғи

1. Координаталар бошидан ўтувчи $2x - y + 3z - 1 = 0$ ва $x + 2y + z = 0$ текисликларга перпендикуляр текислик тенгламасини тузинг.

Ж: $7x - y - 5z = 0$.

2. $P(-1, 1, -2)$ нуктадан $M_1(1, -1, 1)$, $M_2(-2, 1, 3)$ ва $M_3(1, -5, -2)$ нукталар орқали ўтувчи текисликкача бўлган d масофани ҳисобланг.

Ж: $d = 1$ узун. бирл.

3. Ушбу

$$\begin{cases} x - y - 4z - 5 = 0, \\ 2x + y - 2z - 4 = 0 \end{cases} \text{ ва } \begin{cases} x - 6y - 6z + 2 = 0, \\ 2x + 2y + 9z - 1 = 0 \end{cases}$$

тўғри чизиклар орасидаги φ бурчак косинусини ҳисобланг.

Ж: $\cos \varphi = \pm \frac{4}{21}$.

4. Тўғри чизик билан текисликнинг ўзаро ҳолатини аниқланг, улар кесинган ҳолда, кесиниши нуктаси координаталарини топинг:

а) $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z}{3}$, $3x - 3y + 2z - 5 = 0$,

б) $\frac{x-13}{8} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{3}$, $x + 2y - 4z + 1 = 0$,

в) $\frac{x-7}{5} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{4}$, $3x - y + 2z - 5 = 0$

Ж: а) параллел; б) тўғри чизик текисликда ётади; в) $M(2, 3, 1)$

нуктада кесинади

5. $M_1(5, 4, 6)$ ва $M_2(-2, -17, -8)$ нукталардан ўтувчи тўғри чизикка нисбатан $P(2, -5, 7)$ нуктага симметрик Q нуктани топинг

Ж: $Q(4, -1, -3)$

6. Учбurchакини $A(-10, -13)$ ва $B(-2, 3)$ учлари берилган Унинг C учидан AB томонга ўтказилган медианасига B учидан туширилган перпендикуляр узунлигини ҳисобланг

Ж: 4 узун, бирл

8-мустақил иш

1. $M_1(1, -1, 2)$ ва $M_2(3, 1, 1)$ нукталардан ўтувчи $x-2y+3z+5=0$ текисликка перпендикуляр текислик тенгламасини тузинг.

Ж: $4x-y-2z-9=0$.

2. Ушбу тўғри чизикларнинг перпендикулярлигини исботланг:

$$\begin{cases} x=2t+1, \\ y=3t-2, \\ z=-6t+1 \end{cases} \quad \text{ва} \quad \begin{cases} 2x+y-4z+2=0, \\ 4x-y-5z+4=0 \end{cases}$$

3. Ушбу

$$2x-3y+6z-14=0 \quad \text{ва} \quad 4x-6y+12z+21=0$$

текисликлар орасидаги d масофани ҳисобланг.

Ж: $d=3,5$ узунлик бирлиги.

4. Ушбу

$$\frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-1}{4} \quad \text{ва} \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-7}{2}$$

тўғри чизиклар l нинг қандай қийматида кесинади?

Ж: $l=3$.

5. Ушбу

$$\frac{x+7}{3} = \frac{y+4}{4} = \frac{z+3}{-2} \quad \text{ва} \quad \frac{x-21}{6} = \frac{y+5}{-4} = \frac{z-2}{-1}$$

тўғри чизиклар орасидаги энг қисқа масофани ҳисобланг.

Ж: 13 узунлик бирлиги

6. $\frac{x-2}{8} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+1}{2}$ тўғри чизикдан ўтувчи ва $x+4y-3z+7=0$ текисликка перпендикуляр текислик тенгламасини тузинг.

Ж: $11x-17y-19z+10=0$

$$7. \begin{cases} 5x - 3y + 2z - 5 = 0 \\ 2x - y - z - 1 = 0 \end{cases} \text{ тўғри чизиқнинг } 4x - 3y + 7z - 7 = 0 \text{ те-}$$

кисликда ётишини исботланг.

8. $A(5, -1)$ нукта томонларидан бири $4x - 3y - 7 = 0$ тўғри чизиқда ётувчи квадратнинг учидир. Шу квадратнинг қолган томонлари тенгламаларини тузинг.

Ж. иккита квадрат масала шартини қаноатлантиради.

$$а) 3x + 4y - 11 = 0, \quad 4x - 3y - 23 = 0, \quad 3x + 4y - 27 = 0;$$

$$б) 3x + 4y - 11 = 0, \quad 4x - 3y - 23 = 0, \quad 3x + 4y + 5 = 0.$$

3- назорат иши

1. ABC учбурчак учларининг координаталари берилган.

а) C учдан ўтказилган медиана тенгламасини тузинг ва унинг узунлигини тошинг;

б) A учдан ўтказилган биссектриса тенгламасини тузинг ва шу биссектриса узунлигини тошинг;

в) B бурчак биссектрисаси тенгламасини тузинг ва унинг узунлигини тошинг.

1.1. $A(4, 1), B(0, -2), C(-5, 10)$

1.2. $A(-7, 3), B(5, -2), C(8, 2)$

1.3. $A(5, -1), B(1, -4), C(-4, 8)$

1.4. $A(-14, 6), B(-2, 1), C(1, 5)$

1.5. $A(6, 0), B(2, -3), C(-3, 9)$

1.6. $A(-9, 2), B(3, -3), C(6, 1)$

1.7. $A(7, -4), B(3, -7), C(-2, 5)$

1.8. $A(-8, 4), B(4, -1), C(7, 3)$

1.9. $A(3, -3), B(-1, -6), C(-6, 6)$

1.10. $A(-6, 5), B(6, 0), C(9, 4)$

1.11. $A(4, 11), B(-1, -1), C(7, 5)$

1.12. $A(3, 13), B(-2, 1), C(6, 7)$

1.13. $A(7, 11), B(2, -1), C(10, 5)$

1.14. $A(6, 13), B(1, 1), C(9, 7)$

1.15. $A(4, 14), B(-1, 2), C(7, 8)$

1.16. $A(6, 10), B(1, -2), C(9, 4)$

1.17. $A(4, 13), B(-1, 1), C(7, 7)$

1.18. $A(6, 11), B(1, -1), C(9, 5)$

- 1.19. $A(4, 10), B(-1, -2), C(7, 4)$
- 1.20. $A(6, 14), B(1, 2), C(9, 8)$
- 1.21. $A(-10, -1), B(-6, -4), C(6, 1)$
- 1.22. $A(18, 8), B(12, 0), C(0, 5)$
- 1.23. $A(-6, -3), B(-2, -6), C(10, -1)$
- 1.24. $A(14, 10), B(8, 2), C(-4, 7)$
- 1.25. $A(-2, -1), B(2, -4), C(14, 1)$
- 1.26. $A(8, 7), B(2, -1), C(-10, 4)$
- 1.27. $A(1, 0), B(5, -3), C(17, 2)$
- 1.28. $A(20, 2), B(14, -6), C(26, -1)$
- 1.29. $A(-1, 7), B(3, 1), C(15, 9)$
- 1.30. $A(7, 6), B(1, 2), C(-11, 3)$

2. M, N, P, Q нукталарнинг координаталари берилган

а) N, P, Q нукталардан ўтувчи текисликка перпендикуляр булган ва M нуктадан ўтувчи тўғри чизиқнинг тенгламасини тузинг;

б) M нуктадан N, P, Q нукталар орқали ўтувчи текисликка ча булган масофани топинг:

- 2.1. $M(1, 7, 5), N(2, 3, 5), P(-1, 12, -4), Q(4, 6, 4)$
- 2.2. $M(2, -4, 3), N(3, 1, 4), P(6, 2, -3), Q(2, -2, 3)$
- 2.3. $M(1, 1, 1), N(2, 2, 5), P(3, 2, 2), Q(2, 0, 3)$
- 2.4. $M(5, 3, -2), N(2, 4, 4), P(1, 3, 5), Q(2, 0, 2)$
- 2.5. $M(5, 2, 6), N(0, 1, -4), P(1, 8, 3), Q(1, 2, 1)$
- 2.6. $M(6, 3, 4), N(2, 5, 1), P(4, -1, 2), Q(1, 1, 1)$
- 2.7. $M(1, 1, 3), N(4, 1, 6), P(2, 2, 1), Q(5, 2, 3)$
- 2.8. $M(4, 1, 6), N(1, 1, 3), P(5, 2, 3), Q(2, 2, 1)$
- 2.9. $M(2, 2, 1), N(5, 2, 3), P(1, 1, 3), Q(4, 1, 6)$
- 2.10. $M(5, 2, 3), N(2, 2, 1), P(4, 1, 5), Q(1, 1, 3)$
- 2.11. $M(7, 3, 0), N(2, 4, 7), P(5, 4, 7), Q(6, 6, 2)$
- 2.12. $M(7, 9, 6), N(4, 5, 7), P(9, 4, 4), Q(7, 5, 3)$
- 2.13. $M(1, 2, 6), N(4, 2, 0), P(4, 6, 6), Q(6, 1, 1)$

- 2.14. $M(5, 8, 2)$, $N(3, 5, 10)$, $P(3, 8, 4)$, $Q(5, 5, 4)$
 2.15. $M(3, 9, 8)$, $N(4, 6, 3)$, $P(4, 1, 5)$, $Q(0, 7, 1)$
 2.16. $M(6, 9, 2)$, $N(5, 7, 8)$, $P(-3, 7, 1)$, $Q(9, 5, 5)$
 2.17. $M(3, 6, 7)$, $N(4, 9, 3)$, $P(7, 6, 3)$, $Q(2, 4, 3)$
 2.18. $M(6, 4, 8)$, $N(1, 9, 9)$, $P(5, 8, 3)$, $Q(3, 5, 4)$
 2.19. $M(8, 5, 8)$, $N(1, 7, 3)$, $P(6, 9, 1)$, $Q(3, 3, 9)$
 2.20. $M(0, 4, -1)$, $N(-1, 1, 6)$, $P(-1, 6, 1)$, $Q(3, 1, 4)$
 2.21. $M(1, 3, -1)$, $N(0, 0, 6)$, $P(0, 0, 0)$, $Q(4, 0, 4)$
 2.22. $M(4, -1, 3)$, $N(-3, 1, 1)$, $P(2, 3, -4)$, $Q(-1, -3, 4)$
 2.23. $M(3, -1, 4)$, $N(-2, 4, 5)$, $P(2, 3, -1)$, $Q(0, 0, 0)$
 2.24. $M(5, 2, 4)$, $N(3, 2, -4)$, $P(2, -5, 3)$, $Q(2, 4, -1)$
 2.25. $M(3, 4, -2)$, $N(-6, 2, -3)$, $P(-6, 2, -3)$, $Q(2, 2, 4)$
 2.26. $M(-1, 3, 1)$, $N(-4, 1, -4)$, $P(0, -5, 0)$, $Q(0, 0, -2)$
 2.27. $M(6, 3, -3)$, $N(2, 3, 5)$, $P(3, -2, 6)$, $Q(2, 2, -5)$
 2.28. $M(0, -1, 2)$, $N(5, -2, -1)$, $P(3, 3, 4)$, $Q(3, -1, -2)$
 2.29. $M(3, 3, 4)$, $N(3, -1, -2)$, $P(5, -2, -1)$, $Q(0, -1, 2)$
 2.30. $M(2, -5, 3)$, $N(5, 2, 4)$, $P(-5, 6, -1)$, $Q(3, 2, -4)$

3. Берилган A нукта ва берилган

$$\frac{x-a}{l} = \frac{y-b}{m} = \frac{z-c}{p}$$

туғри чиқиш орқали ўтувчи текислик тенгламасини тузинг

3.1. $A(3, -2, 1)$, $\frac{x+3}{-3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{4}$

3.2. $A(4, 5, -2)$, $\frac{x+1}{4} = \frac{y-5}{3} = \frac{z}{-2}$

3.3. $A(-3, 1, 2)$, $\frac{x-4}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{3}$

3.4. $A(-1, 2, 1)$, $\frac{x+2}{4} = \frac{y}{-3} = \frac{z-5}{2}$

3.5. $A(2, 1, 2)$, $\frac{x+7}{4} = \frac{y-5}{-3} = \frac{z+2}{8}$

$$3.6. A(-2, 3, 1) \quad \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+5}{4}$$

$$3.7. A(-4, -1, 2), \quad \frac{x-5}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{-2}$$

$$3.8. A(-3, 0, 2), \quad \frac{x}{5} = \frac{y-6}{2} = \frac{z+4}{-3}$$

$$3.9. A(1, 2, 3), \quad \frac{x+7}{3} = \frac{y-6}{2} = \frac{z+6}{-2}$$

$$3.10. A(1, -1, -2), \quad \frac{x}{-4} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+1}{5}$$

$$3.11. A(-3, 2, 4), \quad \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z}{-3}$$

$$3.12. A(4, -3, 1), \quad \frac{x-5}{3} = \frac{y+5}{-4} = \frac{z}{5}$$

$$3.13. A(4, 5, 1), \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-2}{-3}$$

$$3.14. A(4, 2, -2), \quad \frac{x+4}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{3}$$

$$3.15. A(0, 2, 1), \quad \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{3}$$

$$3.16. A(5, -1, 2), \quad \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{5} = \frac{z}{-4}$$

$$3.17. A(4, 2, -1), \quad \frac{x-3}{-5} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+1}{3}$$

$$3.18. A(-1, 4, 5), \quad \frac{x}{-3} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{4}$$

$$3.19. A(-4, -1, 2), \quad \frac{x-1}{6} = \frac{y+3}{4} = \frac{z}{-3}$$

$$3.20. A(2, 5, -1), \quad \frac{x+3}{2} = \frac{y-5}{4} = \frac{z}{-1}$$

$$3.21. A(5, 0, 4), \quad \frac{x}{-3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$$

$$3.22. A(-4, 5, 3), \quad \frac{x-4}{1} = \frac{y+5}{3} = \frac{z-2}{2}$$

$$3.23. A(3, 0, 2), \quad \frac{x+2}{4} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z-2}{5}$$

$$3.24. A(-5, 3, -4), \quad \frac{x-3}{2} = \frac{y+3}{6} = \frac{z}{-3}$$

$$3.25. A(4, 3, 1), \quad \frac{x-2}{4} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+2}{-1}$$

$$3.26. A(-4, 1, -3), \quad \frac{x+3}{-3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-2}{3}$$

$$3.27. A(2, 3, 0), \quad \frac{x+3}{-3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{2}$$

$$3.28. A(-5, 2, -1), \quad \frac{x-5}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z}{-3}$$

$$3.29. A(6, 2, 0), \quad \frac{x-1}{6} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+4}{-3}$$

$$3.30. A(-6, 3, 2), \quad \frac{x}{4} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+5}{-3}$$

3-намунавий ҳисоб топириқлари

1. ABC учбурчакнинг учлари берилган.

Қуйидагиларни тошинг: а) AB томон теңгласини;

б) C учидан AB томонга туширилган баландлик теңгласини;

в) A учидан BC томонга туширилган медиана теңгласини;

г) «б» ва «в» баъдларда топилган баландлик билан медиана-нинг кесинган нуқтасини;

д) C нуқтадан утувчи AB томонга параллел туғри чизик теңгласини;

е) C нуқтадан AB туғри чизиккача бўлган масофани

1.1. $A(4, -5), B(6, 9), C(-4, -1)$

1.2. $A(1, -3), B(-5, 4), C(-2, 10)$

1.3. $A(1, 8), B(-5, -4), C(-1, -3)$

1.4. $A(0, 4), B(5, -3), C(-6, -2)$

1.5. $A(6, -4), B(-8, 3), C(-2, -7)$

1.6. $A(2, 3), B(-4, -7), C(2, 0)$

1.7. $A(-4, -8), B(4, 1), C(0, 7)$

1.8. $A(4, -2), B(7, 0), C(-3, 1)$

1.9. $A(4, 1), B(-2, 8), C(1, -5)$

1.10. $A(4, 0), B(1, -3), C(5, 2)$

1.11. $A(7, 10), B(1, 3), C(4, -2)$

1.12. $A(8, 6), B(1, 3), C(-2, -3)$

1.13. $A(11, -3), B(-1, -3), C(7, 1)$

- 1.14. $A (5, 9), B (4, -1), C (0, 1)$
 1.15. $A (7, 3), B (1, 7), C (-2, 1)$
 1.16. $A (1, 6), B (6, 1), C (-3, -2)$
 1.17. $A (2, 6), B (6, -6), C (2, -4)$
 1.18. $A (10, 1), B (3, 7), C (-3, 4)$
 1.19. $A (8, 3), B (2, 8), C (-4, 4)$
 1.20. $A (7, 7), B (-7, 5), C (-3, -3)$
 1.21. $A (3, -3), B (4, 3), C (-6, 1)$
 1.22. $A (6, 2), B (-6, 8), C (2, -4)$
 1.23. $A (7, 5), B (-4, 0), C (2, -5)$
 1.24. $A (8, -1), B (2, 6), C (-4, 4)$
 1.25. $A (-5, 0), B (2, -6), C (8, -3)$
 1.26. $A (1, -4), B (-1, 10), C (-9, 6)$
 1.27. $A (-3, 7), B (-1, 3), C (2, -4)$
 1.28. $A (10, 4), B (-4, 6), C (-1, 3)$
 1.29. $A (2, -6), B (3, 11), C (-1, 3)$
 1.30. $A (-5, 5), B (4, -7), C (-2, -7)$

2. $ABCD$ пирамиданинг учлари берилган. Қуйидагиларни то-
 шинг:

- а) ABC текислик тенгламасини;
 б) AB кирра тенгламасини;
 в) D учидан ўтувчи ABC ўқка перпендикуляр тўғри чизик
 тенгламасини;
 г) C учидан ўтувчи AB киррага параллел тўғри чизик
 тенгламасини;
 д) D учидан ўтувчи AB киррага перпендикуляр текислик
 тенгламасини;
 е) AD кирра билан ABC ёқ орасидаги бурчак синусини;
 ж) ABC ва ABD ёқлар орасидаги бурчак косинусини;
 з) D учдан ABC ёқкача бўлган масофани.

- 2.1. $A (7, 3, 5), B (5, 3, 2), C (10, 2, 4), D (7, -2, 1)$
 2.2. $A (-8, -6, -3), B (4, 2, 1), C (0, 5, 2), D (0, 2, 5)$
 2.3. $A (7, -3, 14), B (-6, 0, 5), C (1, 2, 1), D (-2, -1, 2)$
 2.4. $A (5, 5, -6), B (-4, -8, 4), C (1, 7, -1), D (-4, 0, -2)$
 2.5. $A (7, -8, -1), B (-3, -6, -2), C (2, -3, -5),$
 $D (5, 4, 14)$
 2.6. $A (16, -8, -13), B (6, 2, 5), C (-3, 0, 3), D (0, 2, 1)$
 2.7. $A (7, 3, -5), B (1, 2, 3), C (-1, 2, 1), D (2, -1, 2)$

- 2.8. $A (8, 3, 2), B (4, -2, 2), C (3, 1, -1), D (2, 1, 1)$
- 2.9. $A (8, -4, -5), B (7, 3, 6), C (-2, 1, 4), D (1, 3, 2)$
- 2.10. $A (6, -7, -3), B (1, 2, 3), C (1, 3, 2), D (2, 1, 1)$
- 2.11. $A (-12, 7, -1), B (0, -2, -5), C (-4, 5, 1),$
 $D (-7, 4, -3)$
- 2.12. $A (-5, -6, 1), B (-2, 1, 2), C (0, -1, 4), D (-3, 2, -1)$
- 2.13. $A (-1, 0, -7), B (4, -5, 3), C (-2, 1, -9), D (1, -1, -3)$
- 2.14. $A (2, 4, -2), B (-1, 1, 2), C (3, 0, -2), D (1, -1, 1)$
- 2.15. $A (4, -1, 2), B (-1, 1, 0), C (2, -1, 1), D (0, 2, 1)$
- 2.16. $A (16, -9, -5), B (1, -2, 2), C (-1, 2, 1), D (2, 0, 1)$
- 2.17. $A (-9, -2, 3), B (6, -1, -2), C (1, 0, 1), D (-3, 2, 1)$
- 2.18. $A (-10, 7, -6), B (-3, 0, -6), C (-5, 3, -2),$
 $D (-1, 10, 3)$
- 2.19. $A (5, 3, -2), B (-1, 0, 3), C (-4, -2, -1), D (4, 2, -1)$
- 2.20. $A (-5, 4, -3), B (5, -1, 2), C (2, 1, -4), D (1, -3, 0)$
- 2.21. $A (0, 3, 4), B (1, 0, 3), C (2, -1, 4), D (0, 3, 1)$
- 2.22. $A (-16, 20, -21), B (-4, 1, 3), C (2, 3, 0),$
 $D (-1, -1, -2)$
- 2.23. $A (2, -1, 1), B (3, 7, -2), C (3, 6, -3), D (-7, 5, 1)$
- 2.24. $A (8, -10, 2), B (-3, 3, -1), C (0, -6, 5), D (-3, -4, 2)$
- 2.25. $A (7, 2, -3), B (4, 1, 1), C (2, 1, 2), D (2, -1, 1)$
- 2.26. $A (5, -4, 5), B (1, 0, -1), C (1, 2, 2), D (6, 3, 1)$
- 2.27. $A (8, 1, -12), B (8, 5, -10), C (0, -3, 2), D (6, 2, -4)$
- 2.28. $A (8, 1, 10), B (-1, -2, -5), C (-2, -1, 7), D (4, 2, 7)$
- 2.29. $A (8, 1, -3), B (2, -3, -7), C (-2, 5, 3), D (4, 1, 2)$
- 2.30. $A (-7, -8, 10), B (-3, 6, 3), C (-3, 0, -6),$
 $D (2, -5, -1)$

3. Тўғри чизиқнинг каноник тенгламаларини ёзинг:

$$3.1. \begin{cases} 2x + 3y - 2z + 6 = 0, \\ 3x + 3y + z - 1 = 0, \end{cases}$$

$$3.2. \begin{cases} x - 3y + z + 3 = 0, \\ 2x - 3y - 2z + 6 = 0 \end{cases}$$

$$3.3. \begin{cases} 3x + 4y + 3z + 1 = 0, \\ 6x - 5y + 3z + 8 = 0, \end{cases}$$

$$3.4. \begin{cases} 2x - 4y - 2z + 4 = 0, \\ 6x + 5y - 4z + 4 = 0 \end{cases}$$

$$3.5. \begin{cases} x - 3y + z + 2 = 0, \\ 5x + 3y + 2z - 4 = 0, \end{cases}$$

$$3.6. \begin{cases} x + 5y - z + 11 = 0, \\ 8x - 5y - 3z - 1 = 0. \end{cases}$$

$$3.7. \begin{cases} x + 3y + 2z + 14 = 0, \\ 5x + 3y + 2z - 1 = 0, \end{cases}$$

$$3.8. \begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0, \\ x + y + z + 11 = 0 \end{cases}$$

- 3.9. $\begin{cases} x+5y+2z-5=0, \\ 2x-5y+z+6=0, \end{cases}$
- 3.10. $\begin{cases} x+y-2z-2=0, \\ 6x-y-4z-3=0 \end{cases}$
- 3.11. $\begin{cases} 2x-5y-z+5=0, \\ x+5y-2z+3=0, \end{cases}$
- 3.12. $\begin{cases} x-y+z+2=0, \\ 7x+y+z-5=0 \end{cases}$
- 3.13. $\begin{cases} 6x-7y-z-2=0, \\ x+7y-z+8=0, \end{cases}$
- 3.14. $\begin{cases} 2x-y-3z-2=0, \\ 3x-y-2z-1=0 \end{cases}$
- 3.15. $\begin{cases} x+7y-4z-5=0, \\ 2x-7y+2z+8=0, \end{cases}$
- 3.16. $\begin{cases} 2x-y+z+6=0, \\ 3x+y+2z-4=0 \end{cases}$
- 3.17. $\begin{cases} x-y+z-2=0, \\ 6x+y-4z+8=0, \end{cases}$
- 3.18. $\begin{cases} 4x+y+z+2=0, \\ 2x-y-3z+4=0. \end{cases}$
- 3.19. $\begin{cases} x-2y-z+4=0, \\ 6x+2y+3z+4=0, \end{cases}$
- 3.20. $\begin{cases} 2x-y-3z-8=0, \\ 2x-5y+2z-4=0 \end{cases}$
- 3.21. $\begin{cases} x-y-z-2=0, \\ x+3y+2z-6=0, \end{cases}$
- 3.22. $\begin{cases} x-2y+z+4=0, \\ 2x+2y+z-4=0 \end{cases}$
- 3.23. $\begin{cases} 5x+y-3z+4=0, \\ 5x-3y-z+8=0, \end{cases}$
- 3.24. $\begin{cases} x-y+2z+2=0, \\ x-3y-z+4=0 \end{cases}$
- 3.25. $\begin{cases} 3x+4y-2z+1=0, \\ x-4y-2z+3=0, \end{cases}$
- 3.26. $\begin{cases} 2x-4y+3z+4=0, \\ x+4y+z-6=0 \end{cases}$
- 3.27. $\begin{cases} x+5y+2z+11=0, \\ 3x-y-2z+7=0, \end{cases}$
- 3.28. $\begin{cases} 2x-4y+3z+4=0, \\ x+4y+z-6=0. \end{cases}$
- 3.29. $\begin{cases} 3x+y-z-6=0, \\ 2x-3y+z-8=0, \end{cases}$
- 3.30. $\begin{cases} 3x-y+2z-4=0, \\ 2x+3y-2z+6=0 \end{cases}$

4. Берилган тўғри чизик билан текисликнинг кесилиш нуқта-
ни тошнг:

4.1. $\frac{x-3}{0} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-5}{10}, \quad x+2y-2z+25=0$

4.2. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+3}{0} = \frac{z-2}{-2}, \quad 2x-7y-3z-21=0$

4.3. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{1}, \quad 5x-2y-z-13=0$

- 4.4. $\frac{x+2}{-2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-2}{3}$. $4x - y + 3z + 6 = 0$
- 4.5. $\frac{x+5}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{6}$. $5x - 2y + 3z - 3 = 0$
- 4.6. $\frac{x+1}{3} = \frac{y}{0} = \frac{z+1}{-2}$. $5x - 2y + 3z - 3 = 0$
- 4.7. $\frac{x-8}{0} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$. $4x + 9y + 5z = 0$.
- 4.8. $\frac{x+8}{7} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-1}$. $6x - y - 4z - 3 = 0$
- 4.9. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{5} = \frac{z-5}{-1}$. $5x - 7y - 3z + 11 = 0$
- 4.10. $\frac{x+5}{0} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{1}$. $3x + 7y + z + 11 = 0$
- 4.11. $\frac{x+5}{12} = \frac{y-8}{-5} = \frac{z-1}{8}$. $3x - 2y - z - 6 = 0$
- 4.12. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-5}{-2}$. $4x - 5y + 2z + 24 = 0$
- 4.13. $\frac{x+3}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{2}$. $7x + 4y + 3z - 16 = 0$
- 4.14. $\frac{x-3}{1} = \frac{y+5}{2} = \frac{z}{1}$. $3x + 4y - 5z + 20 = 0$
- 4.15. $\frac{x-1}{5} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+3}{2}$. $7x - 3y + 2z - 28 = 0$
- 4.16. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-1}{-1}$. $4x + y - 7z - 11 = 0$
- 4.17. $\frac{x-4}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-2}{2}$. $5x - 3y + z - 36 = 0$.
- 4.18. $\frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z+3}{1}$. $4x - y + 5z + 3 = 0$.
- 4.19. $\frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-1}$. $x - 2y - z + 2 = 0$.
- 4.20. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{0} = \frac{z-1}{1}$. $4x + 2y - 3z + 8 = 0$.
- 4.21. $\frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{2}$. $x - 2y - 4z + 11 = 0$.
- 4.22. $\frac{x+3}{0} = \frac{y-2}{0} = \frac{z+2}{1}$. $5x + 3y - 2z + 7 = 0$

$$4.23. \frac{x-4}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-1}, \quad 3x - y + 2z + 23 = 0$$

$$4.24. \frac{x-4}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-1}{2}, \quad 4x - 2y + z - 19 = 0.$$

$$4.25. \frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-2}{1}, \quad 3x - 2y + z - 8 = 0$$

$$4.26. \frac{x-1}{5} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z+1}{3}, \quad 5x + 2y + z - 15 = 0.$$

$$4.27. \frac{x-2}{2} = \frac{y+4}{4} = \frac{z-1}{-1}, \quad 7x + 3y + z - 25 = 0.$$

$$4.28. \frac{x+3}{2} = \frac{y}{0} = \frac{z-1}{1}, \quad 4x - y + 2z = 0.$$

$$4.29. \frac{x-2}{0} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-5}{1}, \quad 5x - y - 3z + 10 = 0.$$

$$4.30. \frac{x-3}{-2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{-3}, \quad x + 3y - 5z - 21 = 0.$$

9-§. Эллипс, гиперболла ва параболанинг каноник тенгламалари

1.9.1. *Эллипс* деб текисликдаги шундай нукталар тўпламига айтиладики, бу нукталарнинг ҳар биридан шу текисликнинг *фокуслар* деб аталувчи икки нуктасигача бўлган масофалар тенгдир.

Фокуслари Ox ўқда координаталар бошига нисбатан симметрик тувчи эллипснинг (10-шакл) каноник тенгласи ушбу кўринишга эга:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b.$$

Бунда a ва b эллипснинг катта ва кичик ярим ўқлари узунликлари. Фокуслар орасидаги масофани $2c$ десак, $c^2 = a^2 - b^2$ муносабат урилади. Эллипснинг эксцентриситети деб


$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} < 1$$

га айтилади.


Эллипснинг $M(x, y)$ нуктасидан фокусларигача бўлган масофалар (r_1 ва r_2 билан белгиланади) унинг *фокал радиуслари* дейилади.

Тенгламалари

$$r = \pm \frac{a}{\varepsilon} = \pm \frac{a^2}{c}, \quad a > b.$$



10-шакл



11-шакл

дан иборат иккита тўғри чизик эллипсининг *директрисалари* дейилади ва улар ушбу хоссага эга:

$$\frac{r_1}{d_1} = \frac{r_2}{d_2} = \epsilon.$$

Агар $a < b$ бўлса, у ҳолда эллипсининг фокуслари Oy ўқда ётади (11-шакл). $2b$ унинг катта ўқи, эксцентриситети эса $\epsilon = \frac{c}{b}$ бўлади. Бунда $c^2 = b^2 - a^2$. Директрисалари тенгламалари:

$$y = \pm \frac{b}{\epsilon} = \pm \frac{b^2}{c}.$$

Агар $a = b$ бўлса, эллипс радиуси a , маркази координаталар бошида бўлган $x^2 + y^2 = a^2$ айланадан иборат бўлади.

1.9.2. *Гипербола* деб текисликдаги шундай нукталар тўпламига айтиладики, бу нукталарнинг ҳар биридан шу текисликнинг *фокуслар* деб аталувчи икки нуктасигача бўлган масофалар айирмаларининг абсолют қийматлари ўзгармас миқдордир.

Фокуслари Ox ўқда координаталар бошига нисбатан симметрик ҳолда ётувчи гиперболанинг каноник тенгламаси

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

кўринишга эга. Бунда a — гиперболанинг ҳақиқий ярим ўқи узунлиги; b — мавҳум ярим ўқи узунлиги. Агар фокуслар орасидати масофани $2c$ десак, $b^2 = c^2 - a^2$ бўлади.

Гипербола *эксцентриситети* деб

$$\epsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} > 1$$

га айтилади

Гиперболатинг *фокал радиуслари* деб, унинг $M(x, y)$ нуктасидан фокусларигача бўлган масофаларига (r_1 ва r_2 билан белгиланади) айтилади.

Гиперболатинг *директрисалари* деб, тенгламалари

$$x = \pm \frac{a}{b} y = \pm \frac{a^2}{c} y$$

дан иборат бўлган ва қуйидаги хоссаларга эга иккита тўғри чизикка айтилади:

$$\frac{r_1}{d_1} = \frac{r_2}{d_2} = e.$$

Гипербола тенгламалари $y = \pm \frac{b}{a} x$ дан иборат иккита асимптотга эга.

Агар $a=b$ бўлса, гипербола *тег ташмакли гипербола* дейилади ва унинг тенгламаси

$$x^2 - y^2 = a^2$$


кўриниши бўлади, асимптоталари тенгламаси $y = \pm x$ дан иборат бўлади.

Агар гиперболатинг асимптоталари Oy ўқда координаталар бошига нисбатан симметрик ётса, у ҳолда унинг тенгламаси


$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1 \quad \text{ёки} \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

кўриниши бўлади. Гиперболатинг эксцентриситети $e = \frac{c}{b}$, ди-

ректрисалари $y = \pm \frac{b}{c} x = \pm \frac{b^2}{c} x$, асимптоталари $y = \pm \frac{b}{a} x$ бўлади.




12-рақам



13-рақам

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ ва } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1 \text{ гипербола-}$$

лар қўшма гиперболалар дейилади (12-шакл).



14-шакл

1.9.3. *Фокус* деб аталувчи берилган нуктадан ва *директриса* деб аталувчи берилган тугри чизикдан тенг узокликда ётувчи текисликдаги нукталар гупиами *парабола* дейилади.

Учи координаталар бошида ётувчи, симметрия ўки Ox ўқдан иборат бўлган параболанинг каноник тенгламаси

$$y^2 = 2px$$

кўринишга эга (13-шакл). Бунда $p > 0$ (парабола параметри) — фокусдан директрисагача бўлган масофа. Директрисанинг тенгламаси $x = -\frac{p}{2}$ кўринишга эга.

Агар r — параболанинг $M(x, y)$ нуктасидан парабола фокусигача бўлган масофа, d — шу $M(x, y)$ нуктадан директрисагача бўлган масофаси бўлса, у ҳолда унинг экцентриситети

$$e = \frac{r}{d} = 1.$$

Учи координаталар бошида, симметрия ўки Oy бўлган параболанинг каноник тенгламаси ушбу кўринишга эга (14-шакл):

$$x^2 = 2py \quad (p > 0).$$

Унинг директрисаси тенгламаси эса: $y = \frac{p}{2}$.

Мисол. Фокуслари орасидаги масофа 10 га ва мавҳум ярим ўки 3 га тенг бўлган гиперболанинг каноник тенгламасини тузинг.

Ечиш. Масаланинг шартига кўра $b = 3$ ва $2c = 10$, булдан $c = 5$ ва $a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$ келиб чиқади. Демак, иزلанаётган каноник тенглама

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

кўринишда бўлади.

1.9.4. Ушбу

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = a^2,$$

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1.$$

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1,$$

$$(y-y_0)^2 = 2p(x-x_0),$$

$$(x-x_0)^2 = 2p(y-y_0)$$

теңграмалар мос равишда марказлари $C(x_0, y_0)$ нуктада бўлган айлана, эллипс гипербола ва учи $C(x_0, y_0)$ нуктада ётувчи параболаларни аниқлайди.

9-дарсхона топшириги

1. $9x^2 + 25y^2 = 225$ эллипс берилган. Унинг ярим ўқларини, фокуслари координаталарини, эксцентриситети, директрисалари теңграмаларини топиш ва шаклини чизинг.

$$\text{Ж: } a=5, b=3, F_1(4, 0); F_2(-4, 0); \epsilon=0.8; x = \pm \frac{25}{4}$$

2. $16x^2 - 9y^2 = 144$ гипербола берилган. Унинг ярим ўқини, фокуслари координаталарини, эксцентриситетини, директрисаси ва асимптоталари теңграмасини топиш. Шаклини чизинг. Ж: $a=3$, $b=4$, $F_1(5, 0)$ ва $F_2(-5, 0)$; $\epsilon = \frac{5}{3}$; $x = \pm \frac{9}{5}$, $y = \pm \frac{4}{3}x$.

3. $y^2 = 6x$ парабола берилган. Унинг p параметрини, директрисаси теңграмасини топиш ва шаклини чизинг.

$$\text{Ж: } p=3, F\left(\frac{3}{2}; 0\right); x = -\frac{3}{2}$$

4. Фокуслари абсцисса ўқида ётувчи ва қуйидаги шартларни қаноатлантирувчи эллипснинг каноник теңграмасини тузинг:

а) унинг кичик ўқи 24 га, фокуслар орасидаги масофа 10 га тенг;

б) директрисалари орасидаги масофа 32 га, эксцентриситети 0,5 га тенг.

5. Эллипснинг фокуслари ординаталар ўқида ётиб,

а) унинг кичик ўқи 16 га, эксцентриситети эса 0,6 га тенг;

б) унинг фокуслари орасидаги масофа 6 га ва директрисалари орасидаги масофа $16\frac{2}{3}$ га тенг бўлса, унинг каноник теңграмасини тузинг.

6. Гиперболанинг фокуслари абсциссалар ўқида ётиб,

а) унинг фокуслари орасидаги масофа 6 га ва эксцентриситети 1,5 га тенг;

б) унинг ҳақиқий ярим ўқи 5 га тенг, учлари эса марказ билан фокуси орасидаги масофани тенг иккига бўлса, унинг каноник теңграмасини тузинг.

7. Гиперболанинг фокуслари Oy ўқида ётиб,

а) асимптоталари теңграмалари $y = \pm \frac{12}{9}x$ ва учлари орасидаги масофа 48 га тенг,

б) фокуслари орасидаги масофа 10 га, эксцентриситети

8 га тенг бўлса, унинг каноник тенгламасини тузинг.

8. Параболанинг каноник тенгламасини тузинг:

а) параболанинг фокуси $F(0, 4)$, б) парабола Ox ўқка нисбатан симметрик ва $A(9, 6)$ нуктадан ўтади.

9. Чизиқлар тенгламаларини соддалаштиринг, уларнинг турини аниқланг, параметрларини топинг ва шаклини чизинг:

а) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$;

б) $2x^2 + 5y^2 + 8x - 10y - 17 = 0$;

в) $x^2 - 6y - 12x + 36y - 48 = 0$;

г) $x^2 - 8x + 2y + 18 = 0$;

д) $y^2 - 4x + 4y + 16 = 0$

9- мустақил иш

1. $x^2 + 4y^2 = 4$ эллипс фокусларидан ўтувчи ва маркази эллипснинг юқори учига бўлган айлана тенгламасини тузинг.

Ж: $x^2 + (y-1)^2 = 4$

2. а) Катта ўқи 6 га тенг, фокуси эса $F(\sqrt{5}, 0)$ нуктада бўлган эллипс;

б) маъхум ўқи 4 га тенг ва фокуси $F(-\sqrt{13}, 0)$ нуктада бўлган гипербола;

в) директрисаси $y = -3$ бўлган параболанинг каноник тенгламасини тузинг.

Ж: а) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$; б) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$; в) $x^2 = 12y$.

3. Ҳар бир нуктасидан $A(3, 2)$ нуктагача бўлган масофа $B(-1, 0)$ нуктагача бўлган масофадан 3 марта ортиқ бўлган чизик тенгламасини тузинг.

Ж: $(x + \frac{3}{2})^2 + (y + \frac{1}{4})^2 = \frac{45}{16}$.

10- §. Иккинчи тартибли сиртларнинг каноник тенгламалари

1.10.1. Иккинчи тартибли сиртлар:

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ — уч ўқли эллипсоид;

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ — бир паллали гиперболоид;

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \text{ — икки паллани гиперболаид;}$$

$$z = \frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} \text{ — эллиптик параболоид (} p \text{ ва } q \text{ ларнинг ишоралари бир хил);}$$

$$z = \frac{x^2}{2p} - \frac{y^2}{2q} \text{ — гиперболик параболоид (} p \text{ ва } q \text{ ларнинг ишоралари бир хил);}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \text{ — конус;}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ — эллиптик цилиндр,}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ — гиперболик цилиндр;}$$

$$y^2 = 2px \text{ — парабولىк цилиндр}$$

Айланиш сиртлари дастлабки тўртта иккинчи тартибли сиртнинг хусусий ҳолидир:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ — айланиш эллипсоиди;}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ — бир паллани айланиш гиперболаиди;}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \text{ — икки паллани айланиш гиперболаиди;}$$

$$x^2 + y^2 = 2pz \text{ — айланиш параболоиди}$$

1) дарсхона таълиқлари

1. Берилган тенгламалар билан аниқланувчи сиртларнинг шаклини чизинг.

- $4x^2 + y^2 + 2z^2 = 2$
- $2x^2 + 9y^2 - 2z^2 = 36$
- $4x^2 + y^2 - 8z^2 = -16$
- $2y = 4x^2 + z^2$
- $x^2 + 4z^2 = 4$
- $y^2 - 4z = 0$

2. Сирт турини аниқланг ва унинг шаклини чизинг:

- $4x^2 + y^2 - z^2 - 24x - 4y + 2z + 35 = 0$
- $x^2 + y^2 - z^2 - 2x - 2y + 2z + 2 = 0$
- $x^2 + y^2 - 6x + 6y - 4z + 18 = 0$
- $x^2 + y^2 - z^2 - 2y + 2z = 0$

10- мустақил иш

Қуйидаги сиртлар билан чегараланган жисмларнинг шаклини чизинг:

1. $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 = 4$ ва $z = 0$;

2. $z = y^2$, $x^2 + y^2 = 9$ ва $z = 0$,

3. $z^2 = 4 - y$ ва $x^2 + y^2 = 4y$.

4- назорат иши

1. Чизик тенгламасини каноник кўринишга келтиринг ва унинг шаклини чизинг:

1.1. а) $4x^2 + 2y^2 - 16x + 4y + 10 = 0$;

б) $5x^2 - 6y^2 + 30x + 12y + 9 = 0$;

в) $x^2 + 10x - 4y + 33 = 0$

1.2. а) $3x^2 + 5y^2 + 6x - 20y + 8 = 0$;

б) $4x^2 - y^2 + 16x + 12 = 0$,

в) $y^2 + 3x + 10y + 46 = 0$.

1.3. а) $x^2 + 2y^2 + 6x - 4y + 9 = 0$;

б) $x^2 - 4y^2 - 2x + 16y - 19 = 0$

в) $x^2 - 4x + 2y - 2 = 0$

1.4. а) $x^2 + 4y^2 + 16y + 12 = 0$;

б) $2x^2 - 3y^2 - 12x - 18y - 15 = 0$;

в) $y^2 + 8x + 10y + 9 = 0$

1.5. а) $6x^2 + 5y^2 - 10y - 25 = 0$,

б) $5x^2 - 6y^2 - 5x - 25 = 0$,

в) $x^2 + 8x - 9y - 29 = 0$

1.6. а) $5x^2 + 6y^2 - 10x - 25 = 0$;

б) $6x^2 - 5y^2 + 10y - 35 = 0$;

в) $y^2 - 16x - 6y + 25 = 0$.

1.7. а) $2x^2 + 3y^2 - 12x + 18y + 39 = 0$;

б) $x^2 - 4y^2 - 16y - 20 = 0$;

в) $x^2 + 8x - 2y + 14 = 0$

1.8. а) $x^2 + 4y^2 - 2x - 16y + 13 = 0$;

б) $x^2 - 2y^2 + 6x + 4y + 5 = 0$;

в) $y^2 + x - 4y + 2 = 0$

- 1.9. а) $4x^2 + y^2 + 16x + 12 = 0$;
 б) $3x^2 - 5y^2 + 6x + 20y - 32 = 0$;
 в) $x^2 + 6x + 5y - 6 = 0$.
- 1.10. а) $5x^2 + 6y^2 + 30x - 12y + 21 = 0$;
 б) $4x^2 - 2y^2 - 8x - 4y + 6 = 0$;
 в) $y^2 - 2x + 6y + 17 = 0$.
- 1.11. а) $16x^2 + 9y^2 + 96x - 18y + 9 = 0$;
 б) $16x^2 - 9y^2 - 160x - 36y + 220 = 0$;
 в) $x^2 - 4x + 5y + 14 = 0$.
- 1.12. а) $4x^2 + 5y^2 - 24x + 70y + 181 = 0$;
 б) $4x^2 - 16y^2 - 72x - 64y + 196 = 0$;
 в) $y^2 - 6x + 2y - 11 = 0$.
- 1.13. а) $3x^2 + 2y^2 - 6x - 12y + 15 = 0$;
 б) $4x^2 - 9y^2 - 16x - 18y - 29 = 0$;
 в) $x^2 - 8x - 3y + 19 = 0$.
- 1.14. а) $2x^2 + 3y^2 - 4x + 6y - 7 = 0$;
 б) $2x^2 - y^2 + 4x + 4y - 10 = 0$;
 в) $y^2 - 5x + 6y + 4 = 0$.
- 1.15. а) $4x^2 + 3y^2 - 8x + 12y - 32 = 0$;
 б) $4x^2 - 25y^2 - 24x - 100y - 164 = 0$;
 в) $x^2 - 6x + 5y - 6 = 0$.
- 1.16. а) $6x^2 + 5y^2 + 12x - 20y - 4 = 0$;
 б) $25x^2 - 9y^2 - 100x - 36y - 161 = 0$;
 в) $y^2 - 3x - 2y + 7 = 0$.
- 1.17. а) $5x^2 + 3y^2 + 20x + 24y + 53 = 0$;
 б) $5x^2 - 8y^2 + 30x + 16y - 3 = 0$;
 в) $x^2 - 7y + 12x + 50 = 0$.
- 1.18. а) $3x^2 + 4y^2 - 12x - 16y + 16 = 0$;
 б) $8x^2 - 9y^2 - 16x + 36y - 100 = 0$;
 в) $y^2 - 4x + 4y + 8 = 0$.
- 1.19. а) $4x^2 + 5y^2 + 24x + 10y + 21 = 0$;
 б) $9x^2 - 5y^2 - 36x - 30y - 54 = 0$;
 в) $x^2 - 3y - 14x + 31 = 0$.
- 1.20. а) $16x^2 + 9y^2 - 64x - 18y - 71 = 0$;
 б) $9x^2 - 4y^2 + 18x + 24y - 63 = 0$;
 в) $y^2 + 2x - 6y + 11 = 0$.

- 1.21. а) $9x^2 + 4y^2 + 18x - 24y + 9 = 0$,
 б) $16x^2 - 9y^2 - 64x + 18y - 62 = 0$,
 в) $x^2 + 4y + 10x - 3 = 0$
- 1.22. а) $9x^2 - 5y^2 - 18x + 30y + 36 = 0$,
 б) $4x^2 - 5y^2 + 24x - 10y + 11 = 0$,
 в) $y^2 + 3x + 10y + 28 = 0$
- 1.23. а) $8x^2 + 9y^2 - 16x - 36y - 28 = 0$,
 б) $3x^2 - 4y^2 - 12x + 16y - 16 = 0$,
 в) $x^2 + 4y - 4x + 24 = 0$.
- 1.24. а) $5x^2 + 8y^2 + 30x - 16y + 13 = 0$,
 б) $6x^2 - 5y^2 + 12x + 20y - 44 = 0$,
 в) $y^2 + 5x + 8y + 1 = 0$
- 1.25. а) $25x^2 + 9y^2 - 100x + 36y - 89 = 0$,
 б) $5x^2 - 3y^2 + 20x - 24y - 43 = 0$,
 в) $x^2 - 4y + 2x + 9 = 0$.
- 1.26. а) $4x^2 + 9y^2 - 24x + 36y + 36 = 0$,
 б) $16x^2 - 25y^2 - 32x + 100y - 484 = 0$,
 в) $y^2 + 6x - 8y + 22 = 0$
- 1.27. а) $5x^2 + 6y^2 + 20x - 12y - 4 = 0$,
 б) $9x^2 - 16y^2 - 54x - 32y - 79 = 0$,
 в) $x^2 - 4y - 6x + 1 = 0$
- 1.28. а) $x^2 + 4y^2 - 4x - 8y + 4 = 0$,
 б) $8x^2 - 5y^2 - 32x + 10y - 13 = 0$,
 в) $y^2 - 3x + 10y + 16 = 0$.
- 1.29. а) $9x^2 + 16y^2 - 54x + 32y - 47 = 0$,
 б) $5x^2 - 6y^2 + 20x + 12y - 16 = 0$,
 в) $x^2 + 3y + 10x + 19 = 0$.
- 1.30. а) $16x^2 + 25y^2 - 32x - 100y - 281 = 0$,
 б) $4x^2 - 9y^2 - 36x - 36y - 36 = 0$,
 в) $y^2 + 5x + 6y - 1 = 0$

2. Сирт турини аниқлаш:

- 2.1. $x^2 + 2y^2 + 4z^2 = 4$. 2.2. $x^2 + 4y^2 = 4$.
 2.3. $x^2 - 2y^2 - 4z^2 = 4$. 2.4. $4x^2 - 5z^2 = 20$.
 2.5. $9x^2 - 2y + z^2 = 18$. 2.6. $y^2 - 4x = 0$.
 2.7. $4x^2 + 2z^2 - y = 0$. 2.8. $4x^2 + 5y = 0$

- 2.9. $3y^2 - 2z^2 + 3x = 0$. 2.10. $6y^2 - z = 0$
 2.11. $6x^2 + y^2 + 3z^2 = 18$. 2.12. $x^2 + 4z = 0$
 2.13. $4x^2 + y^2 - 3z^2 = 12$. 2.14. $5z^2 - x = 0$.
 2.15. $5x^2 - y^2 - z^2 = 5$. 2.16. $2z^2 + 5y = 0$
 2.17. $3x^2 + y^2 - 2z = 0$. 2.18. $4x^2 + 3z^2 = 12$.
 2.19. $2y^2 + z - 3x^2 = 0$ 2.20. $2y^2 + 5z^2 = 10$.
 2.21. $9x^2 + 3y^2 + 5z^2 = 45$ 2.22. $3z^2 - 4y^2 = 12$.
 2.23. $6x^2 - 3y^2 + z^2 = 6$. 2.24. $x^2 - 4y^2 = 4$
 2.25. $4x^2 - 9y^2 - 2z^2 = 18$ 2.26. $3y^2 - x^2 = 3$
 2.27. $3y^2 + 5z^2 - 15x = 0$ 2.28. $4y^2 - 5z^2 = 20$
 2.29. $4z^2 - 3x^2 - 12y = 0$. 2.30. $3z^2 - 4x^2 = 12$

4- нумунавий ҳисоб топшириқлари

1. Қуйидагилар маълум:

A, B — эгри чизикда ётувчи нукталар;

F — фокус;

a — катта ярим ўк (ёки ҳақиқий ярим ўк);

b — кичик (ёки мавҳум) ярим ўк;

e — эксцентриситет;

$y = \pm kx$ — гипербол асимптоталари тенгламалари;

D — эгри чизик директрисаси;

$2c$ — фокус масофаси.

а) эллипсининг; б) гиперболанинг; в) параболанинг каноник тенгламасини тузинг:

1.1. а) $a=9$, $e = \frac{\sqrt{17}}{9}$; б) $b=7$, $F(-\sqrt{130}, 0)$; в) симметрия ўқи Oy , $A(-4, 32)$.

1.2. $b=3$, $F(-\sqrt{55}, 0)$; б) $a=8$, $e = \frac{5}{4}$; в) $D: x=3$.

1.3. $A(5, \frac{5}{9}\sqrt{11})$, $B(-4, \frac{5\sqrt{5}}{3})$; б) $k = \frac{2}{7}$, $e = \frac{\sqrt{53}}{7}$;

в) $D: y = -4$

1.4. а) $e = \frac{1}{5}$, $A(-4, \frac{9}{5})$; б) $A(-5, \frac{9}{4})$ ва $B(\frac{20}{3}, -4)$; в) симметрия ўқи Ox , $A(-6, 10)$.

1.5. а) $2a=18$, $e = \frac{\sqrt{77}}{9}$; б) $k = \frac{6}{7}$, $c = \sqrt{85}$; в) $D: y=5$

1.6. а) $b=5$, $e = \frac{2\sqrt{6}}{7}$; б) $k = \frac{4}{7}$; $2a=14$; в) $D: x=-3$

1.7. а) $a=6$, $e = \frac{7\sqrt{3}}{2}$; б) $b=1$, $F(-\sqrt{17}, 0)$; в) симметрия ўқи

Oy , $A(-4, -10)$.

1.8. а) $b=4$, $F(-3, 0)$; б) $a=3$, $e = \frac{\sqrt{13}}{3}$; в) $D: x=8$.

- 1.9. а) $A(-3\sqrt{5}, 4)$ ва $B(6, -2\sqrt{5})$; б) $k = \frac{5}{9}$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{106}}{9}$;
 в) $Dy = -16$.
- 1.10. а) $\varepsilon = \frac{\sqrt{39}}{8}$; $A(-4, \frac{5\sqrt{3}}{2})$; б) $A(-6, \frac{7\sqrt{7}}{4})$ ва $B(\frac{16\sqrt{6}}{7}, 5)$;
 в) симметрия ўқи Ox , $A(-3, 6)$.
- 1.11. а) $2a = 12$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{5}}{3}$; б) $k = \frac{1}{3}$, $2c = 4\sqrt{10}$; в) $Dy = 8$.
- 1.12. а) $b = 2$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{3}}{2}$; б) $k = \frac{1}{3}$, $2a = 18$; в) $Dx = -5$.
- 1.13. а) $a = 9$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{65}}{9}$; б) $b = 4$, $F(-4\sqrt{5}, 0)$; в) симметрия ўқи Oy , $A(-3, 4)$.
- 1.14. а) $b = 2$, $F(-2\sqrt{15}, 0)$; б) $a = 5$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{29}}{5}$; в) $Dx = \frac{5}{8}$.
- 1.15. а) $A(-3, \frac{6}{7}\sqrt{10})$ ва $B(\frac{7}{3}\sqrt{5}, -2)$; б) $k = \frac{1}{3}$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{10}}{3}$;
 в) $Dy = -\frac{3}{8}$.
- 1.16. а) $\varepsilon = \frac{4\sqrt{2}}{9}$, $A(6, -\frac{7\sqrt{5}}{3})$; б) $A(-\frac{9\sqrt{5}}{2}, 4)$ ва $B(3, -\frac{8\sqrt{10}}{3})$; в) симметрия ўқи Ox , $A(-3, 8)$.
- 1.17. а) $2a = 16$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{7}}{4}$; б) $k = \frac{3}{8}$, $2c = 2\sqrt{73}$; в) $Dy = 6$.
- 1.18. а) $b = 2$, $\varepsilon = \frac{3\sqrt{5}}{7}$; б) $k = \frac{5}{6}$, $2a = 12$; в) $Dx = -\frac{5}{4}$.
- 1.19. а) $a = 4$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{2}}{4}$; б) $b = 3$, $F(-\sqrt{34}, 0)$; в) симметрия ўқи Oy , $A(-3, -4)$.
- 1.20. а) $b = 6$, $F(\sqrt{15}, 0)$; б) $a = 9$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{85}}{9}$; в) $Dx = 6$.
- 1.21. а) $A(4, -\frac{4\sqrt{33}}{7})$ ва $B(-\frac{7\sqrt{7}}{4}, 3)$; б) $k = \frac{5}{7}$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{74}}{7}$;
 в) $Dy = -6$.
- 1.22. а) $\varepsilon = \frac{\sqrt{15}}{4}$, $A(-3, \frac{\sqrt{7}}{4})$; б) $A(8, -\sqrt{17})$ ва $B(10, 4)$;
 в) $Dy = -8$.
- 1.23. а) $2a = 6$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{5}}{3}$; б) $k = \frac{4}{5}$, $2c = 2\sqrt{41}$; в) симметрия ўқи Ox , $A(-2, 6)$.
- 1.24. а) $b = 5$, $\varepsilon = \frac{2\sqrt{14}}{9}$; б) $k = \frac{2}{3}$, $2a = 18$; в) $Dx = -5$.
- 1.25. а) $a = 8$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{15}}{8}$; б) $b = 5$, $F(-\sqrt{89}, 0)$; в) симметрия ўқи Oy , $A(-2, 6)$.

1.26. а) $b=2$, $F(-4\sqrt{2}, 0)$; б) $a=6$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{13}}{3}$; в) $Dx=9$

1.27. а) $A(6, -\sqrt{5})$ ва $B(-3\sqrt{5}, 2)$, б) $k = \frac{1}{2}$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{5}}{2}$;

в) $Dy = -3$.

1.28. а) $\varepsilon = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $A(-6, -\sqrt{7})$, б) $A(10, \frac{4\sqrt{19}}{9})$, $(B \frac{9\sqrt{5}}{2}, -2)$;

в) $Dy=9$.

1.29. а) $2a=10$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{21}}{5}$; б) $k = \frac{1}{4}$, $2c=4\sqrt{17}$, в) симметрия

ўқи Ox , $A(3, -5)$

1.30. а) $b=1$, $\varepsilon = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, б) $k = \frac{3}{7}$, $2a=14$, в) $Dx = -\frac{3}{4}$

2. Ҳар бир N нуктаси қуйидаги шартларни қаноатлантирадиган чизикларнинг тенгламасини тузинг:

2.1. N нукта $A(0, -4)$ нуктадан ва $y+2=0$ тўғри чизикдан бир хил узоқлашган

2.2. N нуктадан $A(-1, 3)$ ва $B(7,3)$ нукталаргача бўлган масофалар йнгиндиси ўзгармас миқдор, ҳамда $C(6, \frac{27}{5})$ нукта изланаётган чизикка тегишли

2.3. N нуктадан $A(8, 0)$ нуктагача бўлган масофа ундан $x-2=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан икки марта катта

2.4. N нуктадан координаталар бошигача ва $A(0, -4)$ нуктагача бўлган масофалар квадратлари йнгиндиси 16 га тенг

2.5. N нукта $A(-4, 3)$ ва $B(1, -2)$ нукталардан бир хил узоқлашган

2.6. N нукта $A(0, 2)$ нуктага $B(0, 6)$ нуктага қараганда икки марта яқин турлади

2.7. N нукта $x+6=0$ тўғри чизик ва координаталар бошидан бир хил узоқлашган

2.8. N нуктадан $A(0, 4)$ нуктагача бўлган масофа ундан $y-36=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан уч марта кичик

2.9. N нуктадан $A(0, -1)$ нуктагача бўлган масофа ундан $y+9=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан уч марта ортик

2.10. N нукта ординаталар ўқидан ва $A(2, 0)$ нуктадан бир хил узоқлашган

2.11. N нукта $A(5, -1)$ ва $B(0, 4)$ нукталардан бир хил узоқлашган

2.12. N нуктадан $A(0, 1)$ нуктагача бўлган масофа ундан $B(0, 4)$ нуктагача бўлган масофадан икки марта кичик

2.13. N нуктадан координаталар бошигача ва $A(5, 0)$ нуктагача бўлган масофалар нисбати 2:1 га тенг

2.14. N нуктадан $A(-1, 1)$ нуктагача бўлган масофа ундан $x+4=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан икки марта кичик

2.15. N нуктадан $x-1=0$ тўғри чизиккача бўлган масофа ундан $A(4, 1)$ нуктагача бўлган масофадан икки марта кичик

2.16. A нуктадан $A(2, 0)$ нуктагача ва $5x+8=0$ тўғри чизиккача бўлган масофалар нисбати 5:4 га тенг.

2.17. A нукта координаталар бошидан ва $x+4=0$ тўғри чизикдан бир хил узоқлашган.

2.18. A нуктадан $A(-8, 1)$ нуктагача бўлган масофа ундан $x+2=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан икки марта катта.

2.19. A нукта $A(2, 2)$ нуктадан ва абсциссалар укидан бир хил узоқлашган.

2.20. A нуктадан $A(3, 0)$ нуктагача бўлган масофа ундан ординаталар ўқигача бўлган масофадан икки марта катта.

2.21. A нуктадан координаталар бошигача ва $3x+16=0$ тўғри чизиккача бўлган масофалар нисбати 3:5 га тенг.

2.22. A нуктадан $A(1, 0)$ нуктагача бўлган масофа ундан $B(-2, 0)$ нуктагача бўлган масофадан икки марта кичик.

2.23. A нуктадан координаталар бошигача ва $A(0, 5)$ нуктагача масофалар нисбати 3:2 га тенг.

2.24. A нуктадан $A(0, 1)$ нуктагача бўлган масофа ундан $y-4=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан икки марта кичик.

2.25. A нукта $A(4, 2)$ нуктадан ва ординаталар укидан бир хил узоқлашган.

2.26. A нуктадан $A(4, 0)$ нуктагача бўлган масофа ундан $x-1=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан икки марта катта.

2.27. A нуктадан $A(1, 4)$ нуктагача бўлган масофа ундан $x+7=0$ чизиккача бўлган масофадан уч марта катта.

2.28. A нуктадан $A(4, 0)$ ва $B(-2, 2)$ нукталаргача бўлган масофалар квадратлари йигиндиси 28 га тенг.

2.29. A нуктадан $A(-1, 7)$ нуктагача бўлган масофа ундан $x-8=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан икки марта кичик.

2.30. A нуктадан $A(3, -2)$ ва $B(4, 6)$ нукталаргача масофалар нисбати 3:5 га тенг.

3. Сирт номини аниқланг ва шаклини чизинг:

3.1. а) $4x^2 + 4y^2 + 5z^2 - 20 = 0$;

б) $9x^2 + 4y^2 = 36$;

3.2. а) $5x^2 + 5y^2 - 6z^2 - 30 = 0$;

б) $z^2 = 4x - 3$

3.3. а) $4x^2 - 3y^2 + 2z^2 - 24 = 0$;

б) $2x^2 - 3z^2 = 6$;

3.4. а) $5x^2 + y^2 - 3z = 0$;

б) $z^2 = 2y + 4$

3.5. а) $x^2 + 4z^2 - 6y = 0$;

б) $4x^2 + 3z^2 = 12$;

3.6. а) $8x^2 - y^2 + 4z^2 + 32 = 0$;

б) $3y^2 + 2z^2 = 6$

3.7. а) $6x^2 + 5y^2 - 10z^2 - 30 = 0$;

б) $5x^2 - 4z^2 = 20$

3.8. а) $2x^2 - 2y^2 + 5z^2 - 10 = 0$;

б) $4z^2 + 3x = 12$

3.9. а) $3y^2 + 5z^2 - 5x = 0$;

б) $z^2 - 2y + 3 = 0$

3.10. а) $5x^2 + 6y^2 + 15z^2 - 30 = 0$;

б) $8x^2 + 5y^2 - 40 = 0$

3.11. а) $3x^2 + 5y^2 - 4z = 0$;

б) $5x^2 + 4z = 20$

3.12. а) $9x^2 + 12y^2 + 4z^2 - 72 = 0$;

б) $4x^2 - 3y^2 = 12$

3.13. а) $10x^2 - 9y^2 - 15z^2 - 90 = 0$;

б) $y^2 = 2z$

- 3.14. a) $6z^2 - 3y^2 - 2x^2 - 18 = 0$; б) $3y^2 - 4z^2 = 12$
 3.15. a) $3x^2 - 9y^2 + z^2 + 27 = 0$; б) $x^2 - 4z^2 = 10$.
 3.16. a) $4x^2 + z^2 - 2y = 0$; б) $y^2 = x + 3$
 3.17. a) $2y^2 + 6z^2 = 3x$; б) $z^2 = x - 4$
 3.18. a) $4x^2 - 12y^2 + 3z^2 - 24 = 0$; б) $3x^2 + z^2 = 30$.
 3.19. a) $2x^2 + 4y^2 - 5z^2 = 0$; б) $7x^2 - 5y^2 = 35$
 3.20. a) $7x^2 + 2y^2 + 6z^2 - 42 = 0$; б) $x^2 + 4z^2 = 4$.
 3.21. a) $2x^2 - 3y^2 - 5z^2 + 30 = 0$; б) $3z^2 - 2x = 6$.
 3.22. a) $x^2 - 6y^2 + z^2 - 12 = 0$; б) $2x^2 - 3z^2 = 6$.
 3.23. a) $3z^2 + 9y^2 - x = 0$; в) $3x^2 + 5z^2 = 15$
 3.24. a) $y - 4z^2 = 3x^2$; б) $x^2 - 4z^2 = 4$.
 3.25. a) $8x^2 - y^2 - 2z^2 - 32 = 0$; б) $2x^2 + 3z^2 = 6$.
 3.26. a) $6x^2 + y^2 + 6z^2 - 18 = 0$; б) $2x^2 - 6y^2 = 12$
 3.27. a) $3x^2 + 12y^2 + 4z^2 - 48 = 0$; б) $2y^2 + 3z = 6$
 3.28. a) $x^2 - 7y^2 - 14z^2 - 21 = 0$; б) $4y^2 + 3z^2 = 12$.
 3.29. a) $3x^2 + y^2 + 9z^2 - 9 = 0$; в) $3y^2 - 2x^2 = 6$.
 3.30. a) $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 72$; б) $2y^2 - 3x = 12$.

МАТЕМАТИК АНАЛИЗГА ҚИРИШ

1-§. Элементар функциялар

2.1.1. Агар x микдорнинг бирор D тўпلامдан олинган ҳар бир қийматига бирор E тўпلامдан олинган y микдорнинг бирдан-бир аниқ қиймати мос қўйилган бўлса, y ҳолда y ўзгарувчи микдор x ўзгарувчи микдорнинг *функцияси* дейилади.

x микдор эркин ўзгарувчи ёки *аргумент*, y микдор эса боғлиқ ўзгарувчи ёки *функция* дейилади. Функцияни белгилаш учун ушбу ёзувлардан фойдаланилади:

$$y = f(x), y = y(x), y = \varphi(x)$$

ва х.к.

x ўзгарувчининг $f(x)$ функция маънога эга бўладиган қийматлари тўплами функциянинг *аниқланиш соҳаси* дейилади ва $D(f)$ кўринишида белгиланади. $y = f(x)$ функциянинг $x = x_0$ даги қиймати, бунда $x_0 \in D(f)$, функциянинг *хусусий қиймати* дейилади ва y_0 ёки $f(x_0)$ кўринишида белгиланади. Шундай қилиб,

$$y_0 = f(x_0) \text{ ёки } y|_{x=x_0} = y_0.$$

Функциянинг қабул қиладиган қийматлари тўплами унинг *ўзгариш соҳаси* дейилади ва $E(f)$ билан белгиланади.

Оху текасликнинг $y = f(x)$ муносабатини каноатлантирувчи $M(x, y)$ нукталари тўплами $y = f(x)$ функциянинг *графици* дейилади.

2.1.2. Агар $y = f(x)$ функция $D(f)$ соҳани $E(f)$ соҳага ўзаро бир қийматли асслантирса, y ҳолда x ни y орқали бир қийматли ифодалаш мумкин:

$$x = \varphi(y).$$

Ҳосил бўлган функция $y = f(x)$ функцияга нисбатан *тесқари функция* дейилади.

$y = f(x)$ ва $x = \varphi(y)$ функциялар *ўзаро тесқари* функциялардир.

$x = \varphi(y)$ тескари функцияни, одатда, x ва y ларнинг уринларини алмаштириш билан стандарт кўринишда ёзилади:

$$y = \varphi(x)$$

Узгар тескари $y = f(x)$ ва $y = \varphi(x)$ функцияларнинг графиклари биринчи ва учинчи координата чоракларининг биссектрисасига нисбатан симметрик. $y = f(x)$ функциянинг аниқланиш соҳаси $y = \varphi(x)$ тескари функциянинг қийматлари соҳаси бўлади.

$y = \varphi(x)$ функциянинг аниқланиш соҳаси D , қийматлар соҳаси V бўлсин, $y = f(u)$ функциянинг аниқланиш соҳаси V бўлиб, ўзгариш соҳаси I бўлсин, у ҳолда $y = f(\varphi(x))$ аниқланиш соҳаси D ва ўзгариш соҳаси I бўлган мураккаб функция ёки f ва φ функцияларнинг композицияси дейилади.

У ўзгарувчи *оралиқ ўзгарувчи* дейилади. $y = f(x)$ кўринишидаги функция *ошкор функция* дейилади $F(x, y) = 0$ кўринишидаги тенглама ҳам, умуман айтганда x ва y ўзгарувчилар орасидаги функционал боғланишни беради. Бу ҳолда таърифга кўра y ўзгарувчи x нинг *ошқормас* функцияси бўлади. Масалан, $x^2 + y^2 = 4$ тенглама y ни x нинг ошқормас функцияси сифатида аниқлайди. Аниқланиш соҳаси $D(f)$ координаталар бошига нисбатан симметрик бўлган $f(x)$ функция x нинг ҳар қандай $x \in D(f)$ қиймати учун $f(-x) = f(x)$ (ёки $f(-x) = -f(x)$) муносабат бажарилса, *жуфт* (ёки *тоқ*) функция дейилади.

Жуфт функция графиги ординатлар ўкига нисбатан симметрик, тоқ функция графиги эса координатлар бошига нисбатан симметрикдир.

Агар $T > 0$ ўзгармас сон мавжуд бўлиб, ҳар бир $x \in D(f)$ ва $(x+T) \in D(f)$ да $f(x+T) = f(x)$ тенглик бажарилса, $f(x)$ функция *даврий функция* дейилади.

Айтилган ҳоҳсага эга бўлган T ларнинг энг кичиги T_0 функциянинг *даври* дейилади.

2.1.3. Қуйидаги функциялар *асосий элементар функциялар* дейилади:

а) $y = x^\alpha$ даражали функция, бунда $\alpha \in \mathbb{R}$, $D(f)$ ва $E(f)$ лар α га боғлиқ,

б) $y = a^x$ кўрсаткичли функция, бунда $a > 0$ ва $a \neq 1$, $D(f) = \mathbb{R}$ ва $E(f) = (0, +\infty)$;

в) $y = \log_{ax}$ логарифмик функция, бунда $a > 0$, $a \neq 1$, $D(f) = (0, +\infty)$ ва $E(f) = \mathbb{R}$,

г) тригонометрик функциялар:

$y = \sin x$, $D(f) = \mathbb{R}$ ва $E(f) = [-1, 1]$; $T_0 = 2\pi$;

$y = \cos x$, $D(f) = \mathbb{R}$ ва $E(f) = [-1, 1]$, $T_0 = 2\pi$,

$y = \operatorname{tg} x$, $D(f) = \{x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}\}$ ва $E(f) = \mathbb{R}$, $T_0 = \pi$;

$y = \operatorname{ctg} x$, $D(f) = \{x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}\}$ ва $E(f) = \mathbb{R}$, $T_0 = \pi$.

$y = \operatorname{sec} x$, $D(f) = \{x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}\}$ ва

$E(f) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$; $T_0 = 2\pi$

$y = \operatorname{cosec} x$, $D(f) = \{x \neq \pi k, k \in Z\}$ ва
 $E(f) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$; $T_0 = 2\pi$

д) тескари тригонометрик функциялар

$y = \arcsin x$, $D(f) = [-1, 1]$ ва $E(f) = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$;

$y = \arccos x$, $D(f) = [-1, 1]$ ва $E(f) = [0, \pi]$;

$y = \operatorname{arctg} x$, $D(f) = R$ ва $E(f) = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$;

$y = \operatorname{arccot} x$, $D(f) = R$ ва $E(f) = (0, \pi)$;

$y = \operatorname{arcssec} x$, $D(f) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ ва $E(f) = \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$

$y = \operatorname{arccosec} x$, $D(f) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ ва $E(f) = \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Элементар функция деб асосий элементар функциялардан чекли сондаги арифметик амаллар ёрдамида тузилган мураккаб функцияларга айтилади.

1-дарсхона топшириги

1. Қуйидаги функцияларнинг аниқлаinish соҳасини топинг:

а) $y = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 3x + 2}}$; б) $y = \arcsin \frac{x-2}{2}$;

в) $y = \frac{1}{\lg(4-x^2)}$; г) $y = \sqrt{25-x^2} + \lg \sin x$.

Ж: а) $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$; б) $[0, 4]$.

в) $(-2, -\sqrt{3}) \cup (-\sqrt{3}, \sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, 2)$; г) $[-5, -\pi) \cup (0, \pi)$.

2. Қуйидаги функцияларнинг ўзгариш соҳасини топинг:

а) $y = \sqrt{16-x^2}$; б) $y = 3\cos x - 1$; в) $y = 3^{-x^2}$.

Ж: а) $[0, 4]$; б) $[-4, 2]$; в) $(0, 1]$.

3. Қуйидаги функцияларнинг жуфт ёки тоқ функция эканини аниқланг:

а) $y = x^4 \sin 3x$; б) $y = x^4 - x^2 + x$; в) $y = \lg \cos x$

Ж: а) тоқ, б) тоқ ҳам эмас, жуфт ҳам эмас; в) жуфт

4. Қуйидаги функцияларнинг даврларини топинг:

а) $y = \sin 5x$; б) $y = \lg \cos 2x$; в) $y = \lg 3x + \cos 4x$.

Ж: а) $\frac{2\pi}{5}$; б) π ; в) π

5. Мураккаб функцияларни асосий элементар функцияларнинг композициялари тарзида ифодаланг:

а) $y = \sqrt{\operatorname{arctg} \sqrt{3x^2}}$; б) $y = \operatorname{Intg} \frac{\sqrt{x^2-1}}{4x}$.

1- мустақил иш

1. Функцияларнинг аниқлавиш соҳа: трини топинг:

$$а) y = \lg(3^{4x} - 9); \quad б) y = \frac{1}{x^2 - 6x + 5};$$

$$в) y = \lg(-x^2 - 4x + 5).$$

Ж: а) $(\frac{1}{2}, \infty)$; б) $(-\infty, 1) \cup (5, \infty)$; в) $(-5, 1)$.

2. Берилган функцияларга мос келувчи тескари функцияларни топинг. Берилган ва топилган тескари функция графикларини чизинг:

$$а) y = x^2, \text{ агар } x \leq 0,$$

$$б) y = \begin{cases} -x, & \text{агар } x < 1, \\ x^2 - 2, & \text{агар } x \geq 1; \end{cases}$$

$$в) y = \begin{cases} x, & \text{агар } x \leq 0, \\ x^2, & \text{агар } x > 0; \end{cases}$$

$$г) y = \sqrt{1 - x^2}, \text{ агар } x \in [-1, 0];$$

$$д) y = \begin{cases} x, & \text{агар } x < 1, \\ x^2, & \text{агар } 1 \leq x \leq 4, \\ 2^x, & \text{агар } x > 4. \end{cases}$$

3. Куйидаги функцияларнинг жуфт ёки тоқлигини аниқланг:

$$а) y = \sqrt[4]{(1-x)^2} + \sqrt[3]{(1+x)^2};$$

$$б) y = \ln \frac{1-x}{1+x};$$

$$в) y = \ln(x + \sqrt{1+x^2});$$

$$г) y = 2^x + 2^{-x}.$$

Ж: а) жуфт; б) тоқ; в) тоқ; г) жуфт.

2-§. Элементар функцияларнинг графиклари

$f(x)$ функция графигини чизишда ҳар хил усуллар қўлланилади: нукталар бўйича, графиклар билан амаллар бажариш, графикларни алмаштириш. $f(x)$ функция графигидан фойдаланиб содда алмаштиришлар ёрдамида мураккаброқ функциялар графикларини ҳосил қилиш мумкин.

а) $y = f(x-a)$ функциянинг графиги $y = f(x)$ функция графигидан, бу графикни Ox ўқ бўйлаб $a > 0$ да унга, $a < 0$ булганда эса чапга a бирлик суриш билан ҳосил қилинади.

б) $y = f(x) + b$ функция графиги $y = f(x)$ функция графигидан, бу графикни Oy ўқ бўйлаб $b > 0$ да юқорига, $b < 0$ да пастга b бирлик сурши билан ҳосил қилинади.

в) $y = f(kx)$ ($k \neq 0$, $k \neq 1$) функциянинг графиги $y = f(x)$ функция графигидан, унинг нуқталари ординаталарини сақлаган ҳолда $|k| < 1$ да абсциссаларини $\frac{1}{|k|}$ марта чўзиш билан, $|k| > 1$ да эса абсциссаларини $|k|$ марта сиқиш билан ҳосил қилинади.

г) $y = mf(x)$ ($m \neq 0$, $m \neq 1$) функция графиги $y = f(x)$ функция графигидан, унинг нуқталари мос абсциссаларини сақлаган ҳолда ординаталарини $|m| < 1$ да $\frac{1}{|m|}$ марта қисши, $|m| > 1$ да эса $|m|$ марта чўзиш орқали ҳосил қилинади.

д) $y = f(-x)$ функция графиги $y = f(x)$ функция графигидан, бу графикни Oy ўққа нисбатан симметрик акслантириш ёрдамида ҳосил қилинади.

е) $y = -f(x)$ функция графиги $y = f(x)$ функция графигидан, бу графикни Ox ўққа нисбатан симметрик акслантириш ёрдамида ҳосил қилинади.

ж) $y = |f(x)|$ функция графиги Ox ўқнинг $f(x) \geq 0$ бўладиган қисмларида $y = f(x)$ функция графиги билан бир хил бўлади. Ox ўқнинг $f(x) < 0$ бўладиган қисмида бу графикни $y = f(x)$ функция графигини Ox ўққа нисбатан симметрик акслантириш ёрдамида ҳосил қилинади.

Мисол $y = -2\sin(2x + 2)$ функциянинг графигини $y = \sin x$ функция графигидан фойдаланиб чизинг.

Ечиш $y = \sin x$ функция графигидан фойдаланиб, $y = -2\sin(2x + 2)$ функция графигини чизиш қуйидаги шакл алмаштиришлар орқали амалга оширилади.

$$y_1 = \sin 2x_1, \quad y_2 = -2\sin 2x_1.$$

$$y = -2\sin 2(x + 1) = -2\sin(2x + 2)$$

Геометрик нуқтан назардан бу 15-шаклдаги ясашларга олиб келади.

1. $0 \leq x \leq 2\pi$ ораликда $y = \sin x$ синусоидани чизамиз.


2. Синусоидада бир нечта нуқта белгилаймиз ва ординаталарини ўзгартирмай, абсциссаларини икки марта камайтираемиз:

$x_1 = \frac{1}{2}x$, $y_1 = y$. Ҳосил бўлган нуқталарни силлиқ чизик билан

бирлаштириб, $y_1 = \sin 2x_1$ функциянинг графигини чизамиз.

3. Ҳосил бўлган графикдаги нуқталар абсциссаларини ўзгартирмай, ординаталарини 2 марта орттираемиз ва уларнинг ишораларини алмаштираемиз: $y_2 = -2y_1$, $x_2 = x_1$. Ҳосил бўлган нуқталарни силлиқ чизик билан бирлаштириб, $y_2 = -2\sin x_2$ функциянинг графигини чизамиз.

4. Охириги графикни абсциссалар ўқи бўйича (-1) га кучираемиз: $x = x_2 - 1$, $y = y_2$. Ҳосил қилинган нуқталарни силлиқ чизик билан бирлаштириб, $y = -2\sin(2x + 2)$ функция графигини чизамиз (15-шакл).



15-нақш

2-даражона топшириги

Функциялар графикларини чизинг:

1. $y = 2\sin(2x - 1)$

2. $y = -\operatorname{ctg}|x + 1|$

3. $y = 1 + \lg(x + 2)$

4. $y = \log_2|1 - x|$

5. $y = -\sqrt{x^2 - 4x + 4}$

6. $y = | -3^x |$

7. $y = |x^2 - 7x + 12|$

2-мустақил иш

Функциялар графикларини чизинг:

1. $y = |3x + 4 - x^2|$

2. $y = |\log_2(2x - 1)|$

3. $y = 2(x - 1)^4$

4. $y = 2\cos \frac{x - \pi}{3}$


5. $y = \sin^2 x$

6. $y = 1 - 2^{-x}$

3-§. Икки функция йитиндиси, айирмаси, қўпайтмаси ва бўлинимасининг графиклари

Алгебра элементар функциялар хоссаларидан фойдаланиб, уларнинг графикларини би-бир-бирига қарата, катта ҳисоблаш ишларини бажармай туриб, бундай функцияларнинг мураккаб графикларини шунингдек графикларнинг комбинациясига (йитиндиси, айирмаси, қўпайтмаси ва бўлинимаси) оқиб келтириш мумкин.

2.3.1. Шундай ҳоллар бўладики, $y = f(x)$ функция графикини графиклари оқиб келтирилганда $y_1 = f_1(x)$ ва $y_2 = f_2(x)$ функциялар йитиндиси шаклида оқиб келтириш мумкин бўлади. Унда $y = f(x)$ функция графикини $y_1 = f_1(x)$ ва $y_2 = f_2(x)$ функцияларнинг оқиб келтирилган графиклари оқиб келтириш мумкин. $y = y_1 + y_2$



16-шакл

Шуни таъкидлаيمизки, икки функция айирмасини икки функциянинг тегишли йиғиндисига келтириш мумкин.

$$y = f_1(x) - f_2(x) = f_1(x) + (-f_2(x)).$$

1-мисол. Ушбу

$$y = x + \sin x$$

функция графигини чизинг.


Ечиш. $y_1 = x$ ва $y_2 = \sin x$ деб олиб, битта чизманинг ўзида қўшилувчи функциялар графикларини чизамиз (нуқтир чизиклар).

Шу функциялар графикларини кесадиган бир қатор вертикал тўғри чизиклар ўтказамиз. Шундан кейин бу графикларнинг мос ординаталарини геометрик қўшиб, изланаётган графикнинг бир қатор нуқталарини топамиз, бу нуқталарни узлуксиз эгри чизик билан бирлаштириб, изланаётган графикни ясаймиз (16-шаклдаги туташ чизик). Хосил бўлган график, тақрибий булади.

2.3.2. Ординаталарни геометрик квантириш анча қийин. Аммо, шунга қарамай, агар $y_1 = f_1(x)$ ва $y_2 = f_2(x)$ функциялар графикларини олдиндан ясаб олинса, икки функциянинг $y = f_1(x) \cdot f_2(x)$ кўпайтмасини таҳлил қилиш кўпинча осонлашади. Таҳлил қилишда y_1 ва y_2 функциялар 0, 1 ва -1 га тенг бўладиган нуқталарга алоҳида эътибор бериш керак.

2-мисол. $y = x \cdot \sin x$ функция графигини чизинг.

Ечиш. Берилган функция иккита тоқ функциянинг кўпайтмаси сифатида жуфт функция бўлишини пайқаймиз ва шу сабабли таҳлилчи $x \geq 0$ лар учун ўтказамиз. $y = x$ ва $y_2 = \sin x$ графикларини (нуқтир чизиклар) битта чизмада чизамиз (17-шакл).



17- шакл

$y_2 = \sin x = 0$ бўладиган нукталарда $y = y_1 \cdot y_2 = 0$ га эга бўламиз.

$y_2 = \sin x = 1$ бўладиган нукталарда $y = y_1 \cdot y_2 = x$ га эга бўламиз.

$y_2 = \sin x = -1$ бўладиган нукталарда $y = y_1 \cdot y_2 = -y_1 = -x$ ($y_3 = -x$ функция графигини чизамиз).

Бир қатор шундай нукталарни белгилаб ва оралиқ нукталар учун $|y| = |x \sin x| < |x|$ эканини ҳисобга олиб, $x \geq 0$ лар учун илланаётган графикка (туташ чизик) эга бўламиз. $x < 0$ да берилган функция жуфт функция бўлгани учун график Oy ўқка нисбатан симметрик акслантириш билан ҳосил қилинади (17- шакл).


2.3.3. Икки функциянинг қўпайтмаси ҳақида айтилган мулоҳазаларнинг ҳаммаси икки функциянинг

$$y = \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$$

бўлиниши учун ҳам бир ҳилда тегишлидир.

Битта чизманинг ўзида $y_1 = f_1(x)$ ва $y_2 = f_2(x)$ функциялар графикларини чизиб, уларни таҳлил қилиш йўли билан $y = \frac{y_1}{y_2}$

бўлиниш x га боғлиқ ҳолда қандай ўзгаришини текширамиз ва шу йўл билан илланаётган графикнинг умумий кўринишига эга бўламиз. Таҳлил қилишда асосий эътиборни y_1 ва y_2 функциялар қийматлари 0, 1 ва -1 га тенг бўладиган нукталарга, улар ўзаро тенг бўладиган ёки иншоралари билан фарқ қиладиган нукталарга қаратиш керак.



18- шакл

3- мисол. $y = \frac{x}{x^2 - 1}$ функция графигини чизинг.

Ечиш. Функция тоқ, шу сабабли $x \geq 0$ лар учунгина таҳлил қиламиз.

$y_1 = x$ ва $y_2 = x^2 - 1$ деб олиб, бу функцияларнинг $x \geq 0$ даги графикаларини (пунктир чизик) чизамиз.

Эслатма: а) $x = 0$ да $y_1 = 0$, шу сабабли, $\frac{y_1}{y_2} = 0$;

б) бирор $x = a$ да $y_1 = y_2$ бўлиб, $y = \frac{y_1}{y_2} = 1$ бўлиши равшан;

в) бирор $x = b$ да $y_1 = -y_2$ бўлиб, $y = \frac{y_1}{y_2} = -1$ бўлиши равшан;

г) $x = 1$ да $y_2 = 0$, $y_1 = 1$, шу сабабли $x = 1$ тўғри чизик вертикал асимптотадир.

д) $x \rightarrow \infty$ да $y \rightarrow 0$ мусбатлигича қолади, яъни абсциссалар уқи горизонтал асимптота бўлишини кўрамиз. Бу фикрларнинг ҳаммасини бирлаштириб графикнинг умумий кўринишига (туташ чизик) эга бўламиз.

$y = \frac{x}{x^2 - 1}$ функциянинг тоқ эканлиги туфайли $x < 0$ да график координаталар бошига нисбатан симметрик акслантиришдан иборат бўлади (18- шакл).

3- дарсхона топшириғи

Функциялар графикаларини чизинг:

1. $y = x^3 + 2x^2$.

2. $y = 2^x + \sin x$.

3. $y = \sin 2x + 2\cos x$.

4. $y = x^3 \cos x$.

5. $y = \frac{\sin x}{1 + x^2}$.

3-мустақил иш

Функциялар графикларини чизинг:

1 $y = x + \operatorname{arctg} x$

4 $y = x \cdot \cos x$

2 $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

5 $y = \frac{e^{-x}}{\sin x}$

3 $y = x + \cos x$

4-§. Кетма-кетликнинг limiti. Функциянинг limiti

2.4.1. Натурал сонлар тупламида аниқланган функция *соғи кетма-кетлик* дейлади ва $\{x_n\}$ куралишида белгиланади.

Агар шундай M мусбат сон мавжуд бўлиб, ҳар қандай натурал сон n учун

$$|x_n| \leq M$$

тенгсизлик уриши бўлса, $\{x_n\}$ *чегараланган кетма-кетлик* дейлади.

Агар ҳар қандай натурал сон n учун

$$x_{n+1} > x_n$$

тенгсизлик бажарилса, $\{x_n\}$ *ўсувчи кетма-кетлик* дейлади.

Агар ҳар қандай натурал сон n учун

$$x_{n+1} < x_n$$

тенгсизлик бажарилса, $\{x_n\}$ *камаювчи кетма-кетлик* дейлади.

Фақат ўсувчи ёки камаювчи кетма-кетлик *монотон кетма-кетлик* дейлади.

Агар исталган $\varepsilon > 0$ сон учун шундай $N = N(\varepsilon) > 0$ сон мавжуд бўлсаки, барча $n \geq N$ лар учун

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

тенгсизлик бажарилса, узгармас a сон $\{x_n\}$ кетма-кетликнинг *limiti* дейлади ва бу қуйидагича ёзилади:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

Агар $\{x_n\}$ кетма-кетлик limitiга эга бўлса, у *яқинлашувчи*, аке ҳолда *узқлашувчи кетма-кетлик* дейлади.

Ҳар қандай чегараланган ва монотон кетма-кетлик limitiга эга

1 мисол $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2n+1} = 1$ тенгсизлигини исбот қилинг ва $N(\varepsilon)$ ни аниқланг.

Ечиш. Агар ихтиёрий $\varepsilon > 0$ учун шундай $N(\varepsilon)$ сон мавжуд бўлсаки, барча $n \geq N(\varepsilon)$ лар учун

$$|x_n - a| = \left| \frac{2n+3}{2n+1} - 1 \right| < \varepsilon$$

тенгсизлик бажарилса, лимитнинг таърифига кура қуйилган масала ҳал бўлади. Юқоридаги тенгсизлик қуйидагиги тенг кучли:

$$\frac{2}{2n+1} < \varepsilon.$$

бундан

$$2n+1 > \frac{2}{\varepsilon} \text{ ёки } n > \frac{2-\varepsilon}{2\varepsilon}$$

тенгсизликка эриша бўламиз. Демак, $N = N(\varepsilon) = \frac{2-\varepsilon}{2\varepsilon}$. Шундай

қилиб, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2n+1} = 1$.

2.4.2. Агар ҳар қандай $\varepsilon > 0$ сон учун шундай $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ сон мавжуд бўлиб, $|x-a| < \delta$ да $|f(x) - b| < \varepsilon$ тенгсизлик бажарилса, b сони $f(x)$ функциянинг $x \rightarrow a$ даги лимити дейилади ва бундай ёзилади:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b.$$

Агар ихтиёрий $\varepsilon > 0$ учун шундай $N = N(\varepsilon) > 0$ сон мавжуд бўлиб, барча $|x| > N$ лар учун $|f(x) - b| < \varepsilon$ тенгсизлик бажарилса, b сони $f(x)$ функциянинг $x \rightarrow \infty$ даги лимити дейилади ва бундай ёзилади:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b.$$

Агар ихтиёрий $M > 0$ учун шундай $\delta = \delta(M) > 0$ мавжуд бўлиб, $|x-a| < \delta$ да $|f(x)| > M$ тенгсизлик бажарилса, $f(x)$ функция $x \rightarrow a$ да *чексиз катта* дейилади ва бундай ёзилади:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

Агар $x \rightarrow a$ да $x > a$ бўлса, у ҳолда $x \rightarrow a+0$ белги, агар $x \rightarrow a$ да $x < a$ бўлса, у ҳолда $x \rightarrow a-0$ белги қўлланилади. $f(x)$ функциянинг a нуктадаги *chap* ва *ўнг* лимитлари деб мос равишда

$$f(a-0) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) \text{ ва } f(a+0) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$$

сонларга айтивлади.

$f(x)$ функциянинг $x \rightarrow a$ даги limiti mavjud bulishi uchun $f(a-0) = f(a+0)$ bulishi zarur va etarli

2.4.3. Limitlar haqida quyidagi teoremlar urinli (limitga utish kondalari):

а) Agar C uzgarmas bulsa,

$$\lim_{x \rightarrow a} C = C.$$

б) Agar $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ va $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)$ mavjud bulsa,

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + \varphi(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x).$$

в) Agar $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ va $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)$ limitlar mavjud bulsa, u holda

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)$$

tenqlik urinli.

г) Agar $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ va $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) \neq 0$ bulsa, u holda

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)}$$

tenqlik urinli

Agar bu teoremlarning shartlari bajarilmasa, u holda $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, $0 \cdot \infty$ kurinishidagi *anikmasliklar* pайdo bulishi mumkin.

Bu anikmasliklar baъzi hollarda algebrank almashiriшlar erdamida ochiladi.

2 misol. Limitni hisoblang:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 5n - 1}{n^2 + 3}$$

Ечиш. Бу misolda kasrning surат va maxrajini cheksizlikka intiladi, яъni $\frac{\infty}{\infty}$ kurinishidagi anikmaslikka эгамиз.

Kasrning surат va maxrajini n^2 ga bulsak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 5n - 1}{n^2 + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{5}{n} - \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{3}{n^2}} = \frac{3}{1} = 3.$$

3- misol. Limitni hisoblang:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^n + (n+1)^n}{(n+3)^n}$$

Ечиш Бунда $\frac{\infty}{\infty}$ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз $(n+2)! = (n+1)!(n+2)$ ва $(n+3)! = (n+1)!(n+3)(n+2)$ алмаштиришларни бажарсак:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)! + (n+1)!}{(n+3)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!(n+3)}{(n+1)!(n+2)(n+3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = 0.$$

4- дарсхона топшириги

1. $\{x_n\} = \left\{ \frac{3n}{n+3} \right\}$ кетма-кетлик $a=3$ лимитга эга эканлигини исбот қилинг ва $N(\varepsilon)$ ни аниқлаи.

2. Қуйидаги лимитларни топинг:

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^3 + (n-2)^3}{n^4 + 2n^2 - 1}$ Ж: 0.

б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 4n + 8}{4n^2 + 5n - 9}$ Ж: ∞ .

в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! + (n+2)!}{(n-1)! + (n+2)!}$ Ж: 1.

г) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3+6+9+\dots+3n}{n^2+1}$ Ж: $\frac{3}{2}$.

д) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 7^n}{2^n - 7^n - 1}$ Ж: -7.

е) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+2} - \sqrt{n-3})$ Ж: $\frac{5}{2}$.

4- мустақил иш

Қуйидаги лимитларни топинг:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 - (n+1)^2}{(n-1)^3 - (n+1)^3}$ Ж: $-\infty$.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3-n)^3}{(n+1)^2 - (n+1)^3}$ Ж: 1.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)! + (2n+2)!}{(2n+3)! - (2n+2)!}$ Ж: 0.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+4)! - (n+2)!}{(n+3)!}$ Ж: ∞ .

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n - 2^n}{3^{n-1} + 2^n}$ Ж: 3.

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^3+8} (\sqrt{n^3+2} - \sqrt{n^3-1})$ Ж: $\frac{3}{2}$.

5-§. Функциянинг лимитини ҳисоблаш

Функциянинг лимитини амалда ҳисоблаш олдинги параграфда баён қилинган теоремалар ва баъзи шакл алмаштиришларга асосланади

1 м и с о л. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x-2}{x^2+1}$$

Е ч и ш. $x \rightarrow 2$ да касрнинг сурати $3 \cdot 2 - 2 = 4$ га, махражи эса $2^2 + 1 = 5$ га интилади. Демак,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x-2}{x^2+1} = \frac{4}{5}$$

2- м и с о л. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^2 + x^2 - x - 1}$$

Е ч и ш. Бу мисолда касрнинг сурати ҳам, махражи ҳам $x \rightarrow 1$ да нолга интилади $\frac{0}{0}$ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз.

Касрнинг сурат ва махражини кўпайтувчиларга ажратсак:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^2 + x^2 - x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2(x-1) - (x-1)}{x^2(x+1) - (x+1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2-1)}{(x+1)(x^2-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x+1} = \frac{0}{2} = 0. \end{aligned}$$

3- м и с о л. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2-4} - \frac{1}{x-2} \right)$$

Е ч и ш. $\infty - \infty$ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз. Ҳисоб-
лаймиз:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2-4} - \frac{1}{x-2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4 - (x+2)}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{x^2-4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)(x+2)} = - \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

4-ми с о л. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2}}{x^2 + 2x}$$

Е ч и ш. $\frac{0}{0}$ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз. Қасрнинг сурати на махражини $(\sqrt{2+x} + \sqrt{2})$ ифодага кўпайтирсак,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2}}{x^2 + 2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2+x} - \sqrt{2})(\sqrt{2+x} + \sqrt{2})}{x(x+2)(\sqrt{2+x} + \sqrt{2})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2+x-2}{x(x+2)(\sqrt{2+x} + \sqrt{2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(x+2)(\sqrt{2+x} + \sqrt{2})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x+2)(\sqrt{2+x} + \sqrt{2})} = \frac{1}{2 \cdot 2 \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{8} \end{aligned}$$

5-дарсхона топшириви

Лимитларни ҳисобланг:

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 4x^3 - 1}{2x^4 + 3x^2 + 5}$. Ж: ∞
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 8x + 3} - \sqrt{x^2 + 4x + 3})$. Ж: 2
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right)$. Ж: -1
4. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 3x^2 + 3}{x^2 - 1}$. Ж: $-\frac{1}{3}$
5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x^2 + 2}{x^2 - 7x + 6}$. Ж: $\frac{3}{5}$
6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{6-x} - 1}{\sqrt{8x-7} - 3}$. Ж: $-\frac{3}{10}$

5-мустақил иш

Лимитларни ҳисобланг:

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - 8x + 12}$. Ж: $\frac{1}{2}$
2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 - 8x + 12}$. Ж: $\frac{3}{4}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x} - 1}$. Ж: 3

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2}}{x^2-x} \quad \text{Ж: } -1$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+13} - 4}{x^2-9} \quad \text{Ж: } \frac{1}{148}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x+2}{x^2-5x+4} + \frac{x-4}{3(x^2-3x+2)} \right) \quad \text{Ж: } 0$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x(x-2)^2} - \frac{1}{x^2-3x+2} \right) \quad \text{Ж: } \infty$$

6-§. Биринчи ва иккинчи ажойиб лимитлар

Кўпгина лимитларни топишда қуйидаги маълум формула-лардан фойдаланилади:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha}{\alpha} = 1 - \text{биринчи ажойиб лимит};$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = e - \text{иккинчи ажойиб лимит}.$$

Мисоллар ечганда қуйидаги тенгликларни назарда тутиш фойдали:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + k\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x} \right)^x = e^k.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a, \quad (a > 0).$$

1-мисол. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}.$$

Ечиш $\frac{0}{0}$ кўринишидаги аниқмасликка эгамиз. Биринчи ажойиб лимитдан фойдаланамиз:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cdot \sin 3x}{3x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} = 3.$$

2-мисол. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\pi - 2x}$$

Ечиш $\frac{0}{0}$ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз $\frac{\pi}{2} - x = z$ белгилаш киритсак, у ҳолда $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ да $z \rightarrow 0$ бўлади. Ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\pi - 2x} &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} - z)}{\pi - 2(\frac{\pi}{2} - z)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{\pi - \pi + 2z} = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{2z} = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

3-мисо. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x+1}{2x-3} \right)^{4x-1}$$

Ечиш Қасрнинг суратини махражига бўлиб, бутун қисмини ажратиб оламиз:

$$\frac{2x+1}{2x-3} = \frac{(2x-3)+4}{2x-3} = 1 + \frac{4}{2x-3}$$

Шундай қилиб, $x \rightarrow \infty$ да берилган функция асоси бирга интилувчи, кўрсаткичи эса чексизликка интилувчи даражани ифодалайди, яъни 1^∞ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз. Функцияни иккинчи ажойиб лимитдан фойдаланиш мумкин бўладиган қилиб ўзгартирамиз:

$$\begin{aligned} \left(\frac{2x+1}{2x-3} \right)^{4x-1} &= \left(1 + \frac{4}{2x-3} \right)^{4x-1} = \left[\left(1 + \frac{4}{2x-3} \right)^{\frac{2x-3}{4}} \right]^{\frac{4(4x-1)}{2x-3}} = \\ &= \left[\left(1 + \frac{4}{2x-3} \right)^{\frac{2x-3}{4}} \right]^{\frac{4(4-\frac{1}{x})}{2-\frac{3}{x}}}. \end{aligned}$$

$x \rightarrow \infty$ да $\frac{4}{2x-3} \rightarrow 0$ бўлгани сабабли иккинчи ажойиб лимитга кўра

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{4}{2x-3} \right)^{\frac{2x-3}{4}} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4(4-\frac{1}{x})}{2-\frac{3}{x}} = 8 \text{ эканини ҳисобга олиб, узил-кесил}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x+1}{2x-3} \right)^{4x-1} = e^8 \text{ эканини топамиз.}$$

6-фарсхони топишириги

Лимитларни ҳисобланг:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{x - \sin 5x} \quad \text{Ж: } \frac{18}{5}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{3x} \quad \text{Ж: } \frac{1}{3}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin 3x}{\sin 2x} \quad \text{Ж: } -\frac{3}{2}.$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 1} (3 - 2x)^{\frac{1}{x-1}} \quad \text{Ж: } e^{-2}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-4}{3x+2} \right)^{\frac{x+1}{2}} \quad \text{Ж: } e^{-\frac{7}{3}}.$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{3x} - 1}{\sin 2x} \quad \text{Ж: } \frac{3}{2} \ln 2.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x)}{3x} \quad \text{Ж: } \frac{4}{3}.$$

6-мустақил иш

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\operatorname{tg} 5x} \quad \text{Ж: } \frac{3}{5}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^2} \quad \text{Ж: } \frac{1}{2}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x-1}{4x+1} \right)^{2x} \quad \text{Ж: } \frac{1}{e}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} (2x+1) (\ln(3x+1) - \ln(3x-2)) \quad \text{Ж: } 2.$$

7-§. Эквивалент чексиз кичик функциялар ва улар ёрдамида лимитларни ҳисоблаш

Агар $\alpha(x)$ ва $\beta(x)$ $x \rightarrow x_0$ ҳолда чексиз кичик функциялар бўлиб,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$$

бўлса, у ҳолда улар *эквивалент* дейилади ва $x \rightarrow x_0$ да $\alpha(x) \sim \beta(x)$ каби белгиланади. Масалан, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, шу сабабли $x \rightarrow 0$ да $\sin x \sim x$.

Шунга ўхшаш $x \rightarrow 0$ да қуйидаги чексиз кичик функциялар эквивалентдир:

$$\arcsin x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \operatorname{tg} x \sim x,$$

$$\operatorname{arctg} x \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad a^x - 1 \sim x \ln a,$$

$$\ln(1+x) \sim x, \quad (1+x)^m - 1 \sim mx \quad \text{ва } x \rightarrow 0 \text{ к.}$$

Иккита чексиз кичик функциялар нисбатининг limiti уларга эквивалент чексиз кичик функциялар нисбатининг limitига тенг, яъни агар $x \rightarrow x_0$ да $\alpha(x) \sim \alpha_1(x)$ ва $\beta(x) \sim \beta_1(x)$ бўлса, у ҳолда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$$

1-мисол. Limitни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{\operatorname{tg}^2 3x}$$

Ечиш. Ушбу $1 - \cos 4x \sim 8x^2$, $\operatorname{tg}^2 3x \sim 9x^2$ эквивалент чексиз кичик функциялардан фойдалансак:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{\operatorname{tg}^2 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{9x^2} = \frac{8}{9}$$

2-мисол. Limitни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x} - 2}{\sqrt[4]{16+5x} - 2}$$

Ечиш. Каснинг сурат ва махражини 2 га бўлиб, сўнгра уларни эквивалент чексиз кичик функциялар билан алмаштирамиз:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x} - 2}{\sqrt[4]{16+5x} - 2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 + \frac{3}{8}x} - 1}{\sqrt[4]{1 + \frac{5}{16}x} - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{3}{8}x\right)^{\frac{1}{3}} - 1}{\left(1 + \frac{5}{16}x\right)^{\frac{1}{4}} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8}x}{\frac{1}{4} \cdot \frac{5}{16}x} = \frac{8}{5} \end{aligned}$$

7-дарсхона топшириғи

Қуйдаги limitларни эквивалент чексиз кичик функциялардан фойдаланиб ҳисобланг:

1 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin 4(x-2)}{x^2 - 4x + 2}$ Ж. 1

4 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ Ж. $\ln 3$

2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\operatorname{tg} 3x}$ Ж. $\frac{3}{3}$

5 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{2^x - 1}$ Ж. $-\frac{2}{\ln 2}$

3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-4x)}{\cos x}$ Ж. $-\frac{1}{2}$

7- мустақил иш

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x}{1 - \cos x}$ Ж: 4

4. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\ln \cos 2x}{\ln \cos 4x}$ Ж: $\frac{1}{4}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lg(\pi(1 + \frac{x}{2}))}{\ln(x+1)}$ Ж: $\frac{\pi}{2}$

5. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\ln(2 + \cos x)}{(3^{\sin x} - 1)^2}$ Ж: $\frac{1}{21\pi^2 3}$

3. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 5x}{\lg 3x}$ Ж: $-\frac{5}{3}$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{3x} - 3^{2x}}{\sin 7x - \sin 2x}$ Ж: $\frac{1}{5} \ln \frac{8}{9}$

8- §. Чексиз кичик функцияларни таққослаш

$x \rightarrow x_0$ да $\alpha(x)$ ва $\beta(x)$ чексиз кичик функциялар бўлсин. Бу функцияларни таққослаш учун улар нисбатининг $x \rightarrow x_0$ даги limiti hisoblanadi:

а) Агар $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$ бўлса, у ҳолда $\alpha(x)$ функция $\beta(x)$ га нисбатан юқори тартибли чексиз кичик функция дейилади ва $\alpha = o(\beta)$ каби белгиланади.

б) Агар $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$ бўлса, у ҳолда $\alpha(x)$ функция $\beta(x)$ га нисбатан қуйи тартибли чексиз кичик функция дейилади. Равшанки бу ҳолда $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 0$ ёки $\beta = o(\alpha)$.

в) Агар $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = A \neq 0$ ва A чекли сон бўлса, у ҳолда $\alpha(x)$ ва $\beta(x)$ бир хил тартибли чексиз кичик функциялар дейилади.

Хусусан, агар $A=1$ бўлса, у ҳолда эквивалент чексиз кичик функцияларга эга бўламиз.

г) Агар $\alpha(x)^k$ ва $\beta(x)$ бир хил тартибли чексиз кичик функциялар бўлиб, $k > 0$ бўлса, у ҳолда $\beta(x)$ чексиз кичик функция $\alpha(x)$ га нисбатан k -тартибга эга дейилади.

Мисол $x \rightarrow 0$ да $y = \sqrt{1 + x \sin x} - 1$ чексиз кичик функциянинг x га нисбатан тартибининг аниқланг.

Ечиш. $\frac{y}{x^k}$ нисбатининг $x \rightarrow 0$ даги лимитини қараймиз ва k нинг бу лимит мавжуд ва нолдан фаркли бўладиган қийматини аниқлаймиз:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x^k} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \sin x} - 1}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1 + x \sin x} - 1)(\sqrt{1 + x \sin x} + 1)}{x^k \cdot (\sqrt{1 + x \sin x} + 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x \sin x - 1}{x^k (\sqrt{1 + x \sin x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{x^k (\sqrt{1 + x \sin x} + 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^{k-2} (\sqrt{1 + x \sin x} + 1)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} x^{2-k}, \text{ чунки} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1 + x \sin x} + 1) = 2 \end{aligned}$$

Равшаники $k=2$ да $\lim_{x \rightarrow 0} x^{k-2} = 1$. Демак, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x^2} = \frac{1}{2}$. Шундай

килиб, y ва x^2 чексиз кичик миқдорларнинг тартиби бир хил. Шу сабабли y миқдор x чексиз кичик миқдорга нисбатан *иккинчи тартибли* ($k=2$) чексиз кичик миқдор бўлади.

8-дарсхона топшириги

1. $x \rightarrow 0$ да $\alpha = x \sin^2 x$ ва $\beta = 2x \sin x$ чексиз кичик функцияларни таккосланг. Ж: $\alpha = o(\beta)$.

2. $x \rightarrow 0$ да $\alpha = x \ln(1+x)$ ва $\beta = x \sin x$ чексиз кичик функцияларни таккосланг. Ж: $\alpha \sim \beta$.

3. $x \rightarrow 1$ да $\alpha = 1-x$ ва $\beta = 1 - \sqrt[3]{x}$ чексиз кичик функцияларнинг бир хил тартибли бўлишига ишонч ҳосил қилинг. Булар эквивалент бўладими?

4. $x \rightarrow 0$ да чексиз кичик бўлган $y = \frac{7x^{10}}{x^3+1}$ нинг x га нисбатан тартибини аниқланг. Ж: $k=10$.

8-мустиқил иш

1. $x=0$ да $\alpha = x^2 \sin^2 x$ ва $\beta = x \cdot \lg x$ чексиз кичик функцияларни таккосланг. Ж: $\alpha = o(\beta)$.

2. $x=0$ да $\alpha = a^x - 1$ ва $\beta = x \ln a$ чексиз кичик функцияларни таккосланг. Ж: $\alpha \sim \beta$.

3. $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ да $\alpha = \sec x - \lg x$ ва $\beta = \pi - 2x$ функциялар бир хил тартибли чексиз кичик бўлишига ишонч ҳосил қилинг. Улар эквивалент бўладими?

4. а) $y = \sqrt{1+x^3} - 1$ ва б) $y = 1 - \cos x$ чексиз кичик функцияларнинг x чексиз кичикка нисбатининг тартибини аниқланг. Ж: а) $k=3$; б) $k=2$.

9-§. Функциянинг узлуксизлиги.

Функциянинг узлиш нукталари ва уларнинг турлари.
Функциянинг ноли

2.9.1. Агар x_0 ва унинг атрофида аниқланган $y=f(x)$ функция шу нуктада чекли лимитга эга бўлиб, бу лимит функциянинг x_0 нуктадаги қийматига тенг, яъни

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

бўлса, у ҳолда бу функция x_0 нуктада *узлуксиз* дейилади.

Функциянинг узлуксизлиги хақидаги қуйидаги таъриф юқоридаги таърифга тенг кучлидир.

Агар $y=f(x)$ функция x_0 нуктада ва унинг атрофида аниқланган бўлиб, аргументнинг чексиз кичик орттирмасига функциянинг чексиз кичик орттирмаси мос келса, яъни

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$$

бўлса, у ҳолда функция x_0 нуктада *узлуксиз* дейилади. Бу ерда $\Delta x = x - x_0$ ва $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ — мос равишда аргумент ва функция орттирмалари.

$f(x)$ функциянинг x_0 нуктада узлуксиз бўлиши учун узлуксизлигини қуйидаги шартлари бажарилиши зарур ва етарлидир:

а) функция x_0 нукта ва унинг атрофида аниқланган,

б) функциянинг $x=x_0$ нуктадаги чап ва ўнг лимитлари тенг: $f(x_0-0) = f(x_0+0)$;

в) $x=x_0$ нуктадаги бир томонли лимитлар $f(x_0)$ га тенг, яъни $f(x_0-0) = f(x_0+0) = f(x_0)$.

2.9.2. $f(x)$ функция x_0 нуктанинг атрофида аниқланган, ammo бу нуктанинг ўзида узлуксизлик шартларидан ақалли биттаси бажарилмаса, бу функция x_0 нуктада *узилишга эга* дейилади.

Агар $f(x)$ функция учун *чекли* бир томонли $f(x_0-0)$ ва $f(x_0+0)$ лимитлар мавжуд бўлса ва, шу билан бирга, $f(x_0)$, $f(x_0-0)$, $f(x_0+0)$ сонлар ўзаро тенг бўлмаса, у ҳолда x_0 нукта *1-тур узилиш нуқтаси* дейилади.

Хусусан, агар $f(x_0-0) = f(x_0+0) \neq f(x_0)$ бўлса, у ҳолда x_0 *биртарф қилинадиган узилиш нуқтаси* дейилади.

Агар $f(x_0-0)$ ёки $f(x_0+0)$ бир томонли лимитлардан ақалли биттаси ∞ га тенг бўлса, x_0 нукта *2-тур узилиш нуқтаси* дейилади.

2.9.3. Агар функция оралиқнинг ҳамма нуктасида узлуксиз бўлса, у шу оралиқда *узлуксиз* дейилади. Элементар функцияларнинг ҳаммаси ўзлариининг аниқланиш соҳаларида узлуксиздир.

2.9.4. Агар $f(x)$ ва $\varphi(x)$ функциялар x_0 нуктада узлуксиз бўлса, у ҳолда:

а) $f(x) \pm \varphi(x)$, б) $f(x) \cdot \varphi(x)$; в) $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$ ($\varphi(x) \neq 0$) функциялар ҳам

x_0 нуктада узлуксиз бўладилар.

Агар $f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада узлуксиз бўлса, у

а) шу кесмада чегараланиган;

б) шу кесмада энг кичик ва энг катта қийматларга эришади;

в) берилган иккита қиймати орасидаги барча қийматларни қабул қилади, яъни агар $f(\alpha) = A$, $f(\beta) = B$ ($a < \alpha < \beta \leq b$) ва $A \neq B$ бўлса, у ҳолда A ва B орасида етган C сони ҳар қандай булганда ҳам x нинг ақалли битта $x = \gamma$ ($\alpha < \gamma < \beta$) қиймати топиладики, $f(\gamma) = C$ бўлади.

Хусусан, агар $f(\alpha)$ ва $f(\beta)$ ҳар хил ишорали бўлса (яъни $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$ бўлса), шундай $x = \gamma$ ($\alpha < \gamma < \beta$) қиймат топиладики, унда $f(\gamma) = 0$ бўлади.

$f(\gamma) = 0$ бўладиган $x = \gamma$ нукта функциянинг *ноли* дейилади.

Бу агар $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$ бўлса, $f(x) = 0$ тенглама (α, β) оралиқда ақалли битта илдизга эга бўлишини билдиради.

Бу ҳоҳсадан $f(x)$ функция нолини уз ичига олган оралиқни топишда фойдаланилади.

9- дарсхона топшириғи

1. $y = \frac{x}{x-4}$ функциянинг узилиш нуктасини топинг ва узилиш турини аниқланг.

2. $y = \operatorname{arctg} \frac{1}{x-2}$ функциянинг узилиш нуктасини топинг ва узилиш турини аниқланг.

3. a нинг қандай қийматларида

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-3}, & \text{агар } x \neq 3, \\ a, & \text{агар } x = 3 \end{cases}$$

функция $x=3$ нуктада узлуксиз бўлади? Функция графигини чизинг.

4. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{2}, & \text{агар } x \leq 2, \\ x, & \text{агар } x > 2 \end{cases}$$

функциянинг узилиш нукталарини топинг ва узилиш турини аниқланг. Функция графигини чизинг.

5. $x^5 - 3x = 1$ тенглама $[1; 2]$ кесмада ақалли битта илдизга эга эканига ишонч ҳосил қилинг.

9- мустақил иш

1. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x}, & \text{агар } 0 \leq x \leq 1, \\ 4-2x, & \text{агар } 1 < x < 2.5, \\ 2x-7, & \text{агар } 2.5 \leq x < +\infty \end{cases}$$

функциянинг узилиш нукталарини топинг ва уларнинг турини аниқланг. Функция графигини чизинг.

2. a нинг қандай қийматларида

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{агар } x \leq 1, \\ 3-ax^2, & \text{агар } x > 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{2^x - 1}{2^x + 1}$$

Функциянинг узилиш нуқталари турини аниқланг.

4. $f(x) = \frac{1}{x^2 + x}$ функциянинг узилиш нуқталарини топинг ва уларнинг турини аниқланг.

5. $x \cdot 2^x = 1$ тенглама ақалли битта 1 дан катта булмаган мусбат илдизга эга бўлишини кўрсатинг.

5-назорат иши

1. Лимитларни топинг:

1.1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 4x - 6}{2x^3 - 7x^2 + 2}$

1.2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - 4x + 1}{x + 3x^2 + 2x^4}$

1.3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + 2x - 3}$

1.4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 2x - 5}{x^4 + 5x^2 + 1}$

1.5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^4 - 3x^2 + x}{4x^3 + 3x - 5}$

1.6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + 3x - 4x^2}{2x^2 - x + 4}$

1.7. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - 2x + 1}{2x^4 + x^2 + 5}$

1.8. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - 2x + 4x^2}{6 + 5x - 3x^2}$

1.9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 3x^2 + 4}{6x^3 + x - 5}$

1.10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + 3x^2 - x}{x^2 - x^3 + 3x^4}$

1.11. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{14x^2 + 3x}{7x^2 + 2x - 8}$

1.12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^4 - 4x^2 + 5}{2x^3 - 3x^2 + 1}$

1.13. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^6 - 3x^2 + 7}{3x^5 + 4x^3 - 2}$

1.14. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - 2x + 3}{5x^2 - 3x + 2}$

1.15. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^4 - 2x^2 + 2}{x^4 - 3x}$

1.16. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x - 4x + 5}{6x^3 + 3x - 7}$

1.17. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - 2x^2 - x^4}{4 + x^2 + 5x^4}$

1.18. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2 - 1x + 5}{2 + x - 4x^2}$

1.19. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^7 - 4x^5 + 3}{x + 3x^5 - 6x^7}$

1.20. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - 3x - 1}{3x^2 + 5x - 2}$

1.21. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^6 - 1}{4x^4 - 5x^8}$

1.22. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x^2 + 3}{3 - 4x - 10x^3}$

$$1.23. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + x - 5}{4x^3 - 7}$$

$$1.24. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - 3x^2 + 1}{1 + 3x^2 - x^4}$$

$$1.25. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9x^3 - 4x + 1}{3x^3 + 2x^2 - 5}$$

$$1.26. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 4x + 2}{5x^2 + 3x - 8}$$

$$1.27. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^4 - 4x^2 + 3}{2x^4 + 1}$$

$$1.28. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - 3x + 2}{5x^3 + 4x^2 - 3}$$

$$1.29. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x^5 - 5x^2 + 7}{1 - 2x - 5x^5}$$

$$1.30. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x - 2}{6 - 2x - 3x^2}$$

2. Кўрсатилган лимитларни топинг:

$$2.1. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 7x + 4}{x^3 - 8}$$

$$2.2. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2 - 7x + 3}{x^3 - 27}$$

$$2.3. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{7x^2 + 4x - 3}{5x^2 + 4x - 1}$$

$$2.4. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{3x^2 - 6x - 45}{x^2 - 2x - 15}$$

$$2.5. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 12x + 20}{x^2 + x - 6}$$

$$2.6. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 7x - 6}{6 + x - x^2}$$

$$2.7. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + 3x + 1}{3x^2 + x - 2}$$

$$2.8. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{4x^2 + 3x - 1}$$

$$2.9. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{2x^2 - 9x + 10}$$

$$2.10. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 16}$$

$$2.11. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + x - 20}{x^2 - 3x - 4}$$

$$2.12. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2 + x - x^2}{x^3 - 3x^2 - 2}$$

$$2.13. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - x - 10}{x^2 - 3x - 10}$$

$$2.14. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x^2 - 3x - 35}{x^2 - 3x - 10}$$

$$2.15. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - x - 2}{4x^2 - x - 3}$$

$$2.16. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{3x^2 - x - 10}$$

$$2.17. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{4x^2 + 3x + 15}{2x^2 + 5x - 3}$$

$$2.18. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^3 + 1}$$

$$2.19. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{4x^2 + 7x - 2}{5x^2 + 3x - 14}$$

$$2.20. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{12 + x - x^2}{2x^2 - 3x - 9}$$

$$2.21. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 2}{2x^2 - x - 3}$$

$$2.22. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 + 8x + 4}{3x^2 + x - 14}$$

$$2.23. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 3x - 4}{40 + 2x - 3x^2}$$

$$2.24. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + x - 4}{x^2 + 3x + 2}$$

$$2.25. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x^2 + 5x - 14}$$

$$2.26. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 + x - 5}{2x^2 - x - 1}$$

$$2.27. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{4x^2 + 7x - 2}$$

$$2.28. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4x - 5}$$

$$2.29. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 6x - 27}{3x^2 + 10x + 3}$$

$$2.30. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x^2 - 5x + 6}$$

3 Кўрсатилган лимитларни топинг:

$$3.1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 4x + 1}{\sqrt{x+8} - \sqrt{10-x}}$$

$$3.2. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 3x - 9}{\sqrt{x+10} - \sqrt{4-x}}$$

$$3.3. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x-2} - \sqrt{4-x}}{x^2 + 2x - 15}$$

$$3.4. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{5-x} - \sqrt{x+1}}{x^2 + 5x - 14}$$

$$3.5. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 4x + 1}{\sqrt{8-x} - \sqrt{4-5x}}$$

$$3.6. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x^2 - 7x - 15}{\sqrt{x+4} - \sqrt{2x-1}}$$

$$3.7. \lim_{x \rightarrow -5} \frac{\sqrt{3x+17} - \sqrt{7+x}}{x^2 + 4x - 5}$$

$$3.8. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 - x - 21}{\sqrt{7+x} - \sqrt{1-x}}$$

$$3.9. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x - 6}{\sqrt{2-x} - \sqrt{x+6}}$$

$$3.10. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{6-x}}{x^2 - 3x + 2}$$

$$3.11. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 - 3x - 1}{\sqrt{3+2x} - \sqrt{x+4}}$$

$$3.12. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x - 12}{\sqrt{5x+1} - 4}$$

$$3.13. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{5+3x}}{4x^2 + 3x - 1}$$

$$3.14. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{2x+1} - \sqrt{x+6}}{x^2 - 8x + 15}$$

$$3.15. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+4} - \sqrt{2x-1}}{x^2 - 4x - 5}$$

$$3.16. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x+20} - \sqrt{12-x}}{x^2 + 3x - 4}$$

$$3.17. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x+1} - \sqrt{9-2x}}{3x^2 - 2x - 8}$$

$$3.18. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-2} - \sqrt{3x-10}}{x^2 - 16}$$

$$3.19. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{4x-3} - \sqrt{2x+3}}{x^2 - 2x - 3}$$

$$3.20. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + 4x - 7}{\sqrt{8+x} - \sqrt{4x+5}}$$

$$3.21. \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x^2 - 10x + 9}{\sqrt{2x+7} - \sqrt{3x-2}}$$

$$3.22. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{4+3x} - \sqrt{2+x}}{x^2 - 7x - 8}$$

$$3.23. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2}{\sqrt{7+2x} - 3}$$

$$3.24. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{\sqrt{4x+1} - \sqrt{x+7}}$$

$$3.25. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1} - \sqrt{3x-11}}{x^2 + 4x - 40}$$

$$3.26. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{5+x} - \sqrt{2x+9}}{x^3 + 64}$$

$$3.27. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{3x-5}}{x^2 - 9}$$

$$3.28. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 5x + 2}{\sqrt{4-3x} - \sqrt{6-x}}$$

$$3.29. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x^2 - 3x - 10}{\sqrt{3x-4} - \sqrt{x}}$$

$$3.30. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{\sqrt{3-x} - \sqrt{1-2x}}$$

4. Кўрсатилган лимитларни топинг

$$4.1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x}{4x^2}$$

$$4.2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos^3 x}{3x^2}$$

$$4.3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 5x - \cos x}{2x^2}$$

$$4.4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - \sin x}{4x}$$

$$4.5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x + \operatorname{tg} x}$$

$$4.6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 2x - \sin 2x}{x^2}$$

$$4.7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{\sin x + \sin 7x}$$

$$4.8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - \cos^2 2x}{x^2}$$

$$4.9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 4x}{3 \sin 3x}$$

$$4.10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arc} \sin 3x}{\sin 5x}$$

$$4.11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x - \sin^2 x}{3x^2}$$

$$4.12. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 4x - \cos^3 4x}{4x^2}$$

$$4.13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 2x}{x \cdot \operatorname{arc} \sin x}$$

$$4.14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{3x^2}$$

$$4.15. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arc} \operatorname{tg} 2x}{\operatorname{tg} 3x}$$

$$4.16. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos^5 x}{x \cdot \sin x}$$

$$4.17. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin 2x} - \frac{1}{\operatorname{tg}^2 x} \right)$$

$$4.18. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^3}$$

$$4.19. \lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}$$

$$4.20. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arc} \sin 5x}{x^2 - x}$$

$$4.21. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{1 - \operatorname{tg} x}$$

$$4.22. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{\sin 3x + \sin x}$$

$$4.23. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{1 - \cos 8x}$$

$$4.24. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \operatorname{tg} x$$

$$4.25. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - 1}{x^2}$$

$$4.26. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \operatorname{tg} 3x}{\cos x - \cos^3 x}$$

$$4.27. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^3 x - \cos x}{1 - \cos 3x}$$

$$4.28. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\pi - 2x}$$

$$4.29. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - 1}{1 - \cos 2x}$$

$$4.30. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \operatorname{tg} 4x}{\operatorname{arc} \operatorname{tg} 3x}$$

5. Кўрсатилган лимитларни топинг

$$5.1. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x-1}{4x+3} \right)^{3x+2}$$

$$5.2. \lim_{x \rightarrow \infty} (3x-2)^{\frac{1}{x}}$$

$$7.15. f(x) = 6^{\frac{1}{x-4}}$$

$$7.17. f(x) = 5^{\frac{7}{2-x}}$$

$$7.19. f(x) = 4^{\frac{1}{x-5}}$$

$$7.21. f(x) = 3^{\frac{2}{x-8}}$$

$$7.23. f(x) = 5^{\frac{3}{4-x}}$$

$$7.25. f(x) = 6^{\frac{1}{x-3}}$$

$$7.27. f(x) = 4^{\frac{3}{3-x}}$$

$$7.29. f(x) = 6^{\frac{2}{4-x}}$$

$$7.16. f(x) = 9^{\frac{1}{x+2}}$$

$$7.18. f(x) = 6^{\frac{3}{x+1}}$$

$$7.20. f(x) = 8^{\frac{1}{x+4}}$$

$$7.22. f(x) = 5^{\frac{3}{x+4}}$$

$$7.24. f(x) = 5^{\frac{4}{x+3}}$$

$$7.26. f(x) = 5^{\frac{4}{3-x}}$$

$$7.28. f(x) = 3^{\frac{2}{x+1}}$$

$$7.30. f(x) = 4^{\frac{3}{x+2}}$$

БИР ЎЗГАРУВЧИ ФУНКЦИЯСИНING ДИФФЕРЕНЦИАЛ ҲИСОБИ

1-§. Ҳосила. Ҳосилалар жадвали

3.1.1. $y=f(x)$ функциянинг x_0 нуктадаги орттирмаси Δy нинг аргумент орттирмаси Δx га нисбатининг Δx нолга интилгандаги limiti мавжуд бўлса, бу лимит $y=f(x)$ функциянинг x_0 нуктадаги *ҳосиласи* дейилади.

Ҳосиланинг белгиланиши:


$$y' \text{ ёки } f'(x_0) \text{ ёки } \frac{dy}{dx} \text{ ёки } \frac{df}{dx}.$$

Шундай қилиб, таърифга кўра:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Агар $y=f(x)$ функция x_0 нуктада ҳосилага эга бўлса, у ҳолда $f(x)$ функция x_0 нуктада *дифференциалланувчи* дейилади, ҳосилани топиш жараёни *дифференциаллаш* дейилади.

3.1.2. Геометрик нуктаи назардан $y=f(x)$ функциянинг x_0 нуктадаги ҳосиласи унинг графигига $M(x_0, f(x_0))$ нуктада ўтказилган уринманинг Ox ўқининг мусбаат йўнидаши билан ҳосил қилган бурчагининг тангенсига тенг (19-шакл).



19-шакл

1. $y = \frac{8}{4+x^2}$ эгри чизикка $x_0=2$ нуктада ўтказилган уринма ва нормалнинг тенгласини тузинг.

Ж: $y = -\frac{x}{2} + 2$ ва $y = 2x - 3$.

2. $y = \frac{3x-2}{4x+7}$ функция ҳосиласини таърифдан фойдаланиб топинг.

Ж: $\frac{29}{(4x+7)^2}$

3. Қуйидаги функцияларнинг ҳосиласини топинг:

а) $y = \frac{3x + \sqrt{x}}{\sqrt{x^2 + 2}}$;

б) $y = 2 \sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}}$;

в) $y = 3x \sin^3 x + 3 \cos x - \cos^3 x$;

г) $y = \operatorname{tg}^4 \frac{x}{2} - \operatorname{ctg}^4 \frac{x}{2}$;

д) $y = \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right)^2$;

е) $y = \operatorname{cosec}^2 \frac{x}{2}$.

2- дарсхона топшириғи

Қуйидаги функцияларнинг ҳосилаларини дифференциаллаш коидалари ва формулаларидан фойдаланиб топинг:

1. а) $y = x^2 \sin 2x$;

б) $y = e^{4x} \operatorname{tg} 2x$;

в) $y = \sqrt[3]{x^3 + \sin^3 x}$;

г) $y = \sqrt{x^2 + 1} \cdot \operatorname{ctg}^2 3x$;

д) $y = 3^{-\cos^3 3x}$;

е) $y = e^{-\arcsin \sqrt{x}}$.

2. а) $y = (3x^3 - \operatorname{ctg}^4 x)^3$;

б) $y = \ln^3(\sqrt{x} - 2^{-x^2})$;

в) $y = \ln \operatorname{tg} \sqrt{x}$;

г) $y = e^{-\sqrt{x^2 - 3x + 3}}$;

д) $y = \operatorname{sh}^2 x^3$;

е) $y = \arcsin \operatorname{tg} \sqrt{1+x^2}$.

3. а) $y = (2^{x^3} - \operatorname{tg}^4 2x)^3$;

б) $y = x^3 \operatorname{th}^3 x$;

в) $y = \lg^4(x^5 - \sin^5 2x)$;

г) $y = \arcsin \operatorname{ctg} \sqrt{1+e^{-x^2}}$;

д) $y = (\sin 2x)^{\cos 4x}$;

е) $y = (x^2 + 1)^{\operatorname{ctg} 2x}$.

4. а) $y = \frac{(x-2)^9}{\sqrt{(x-1)^5 (x-3)^{11}}}$;

б) $y = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt[3]{(x+2)^2} \cdot \sqrt{(x+3)^3}}$

Қуйидаги функцияларнинг ҳосилаларини топинг:

1. а) $y = x^2 \cdot \cos^3 2x$;

б) $y = \sqrt{\frac{1 + \cos^2 x}{1 + \sin^2 x}}$;

в) $y = (3^{\sin 2x} - \cos 3x)^2$;

г) $y = e^{x^2} \cdot \cos^2 x$.

2. а) $y = x^3 \cdot e^{\operatorname{ctg} 3x}$;

б) $y = (\sin^3 3x + \cos^3 2x)^2$;

в) $y = \ln \operatorname{arctg} e^{-x}$;

г) $y = \sin^3 3x \cdot \operatorname{tg}^2 2x$.

3. а) $y = x \cdot \operatorname{ctg}^2 4x$;

б) $y = (x^3 + \operatorname{ctg}^3 2x)^2$;

в) $y = \cos(x^4 - \operatorname{tg}^4 x)$;

г) $y = \cos 2x \cdot e^{-2x}$.

4. а) $y = \ln \frac{\sqrt{x^4 + 1} - x^2}{\sqrt{x^4 + 1} + x^2}$;

б) $y = e^x \sqrt{1 - e^{2x}} - \operatorname{arcsin} e^x$;

в) $y = x^{\frac{1}{\ln x}}$;

г) $y = \frac{2^x \cdot (x+1)^3}{(x-1)^2 \sqrt{2x+1}}$.

2- §. Юқори тартибли ҳосилалар

3.2.1. $y=f(x)$ функциянинг *иккинчи тартибли* ёки *иккинчи ҳосиласи* деб унинг биринчи тартибли ҳосиласидан олинган ҳосиллага, яъни (y') ' га айтилади.

Иккинчи тартибли ҳосила қуйидагиларнинг бири билан белгиланади:

$$y'', f''(x), \frac{d^2 y}{dx^2}.$$

$y=f(x)$ функциянинг *n-тартибли* ёки *n-ҳосиласи* деб унинг $(n-1)$ - тартибли ҳосиласидан олинган ҳосиллага айтилади. *n-тартибли* ҳосила учун ушбу белгилашлардан бири қўлланилади:

$$y^{(n)}, f^{(n)}(x), \frac{d^n y}{dx^n}.$$

Белгилашга кўра

$$y^{(n)} = (y^{(n-1)})'.$$

1- м и с о л. $y = \ln x$ функциянинг *n- тартибли* ҳосиласини топинг.

Е ч и ш. *n* марта кетма-кет дифференциаллаб, қуйидагига эга бўламиз:

$$y' = \frac{1}{x}, y'' = -\frac{1}{x^2}, y''' = \frac{2}{x^3}, y^{IV} = -\frac{2 \cdot 3}{x^4}, \dots,$$

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^{n+1}}{x^n} (n-1)!$$

3.2.2. x ўзгарувчининг y функцияси ошқормас шаклда $F(x, y) = 0$ тенглама билан берилган бўлса, y ҳолда y' ҳосилани топиш учун $F(x, y) = 0$ тенгликнинг иккала қисмини x бўйича дифференциаллаб, сўнгра ҳосил бўлган y' га нисбатан чизиқли тенгламадан ҳосилани топиш керак. Иккинчи ва ундан юқорирок тартибли ҳосилалар ҳам шу каби топилади.

2- м и с о л. Ошқормас ҳолда

$$x^2 + y^2 = 64$$

тенглама билан берилган y функциянинг y' ва y'' ҳосилаларини топинг.

Е ч и ш. y ўзгарувчи x нинг функцияси деб ҳисоблаб, берилган тенгламанинг иккала қисмини x бўйича дифференциаллаймиз: $2x + 2y \cdot y' = 0$. Бундан $y' = -\frac{x}{y}$. Топилган биринчи y' ҳосилани яна x бўйича дифференциаллаймиз:

$$y'' = (y')' = -\frac{y - xy'}{y^2}$$

Энди $y' = -\frac{x}{y}$ эканини ҳисобга олиб,

$$y'' = -\frac{y - x\left(-\frac{x}{y}\right)}{y^2}$$

ни ҳосил қиламиз.

Шундай қилиб, $y'' = -\frac{y^2 + x^2}{y^3}$ ёки $y'' = -\frac{64}{y^3}$, чунки шартга кўра $x^2 + y^2 = 64$.

3.2.3. Агар y функциянинг x аргументга боғлиқлиги

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases}$$

тенгламалар билан параметрик шаклда берилган бўлса, y ҳолда

$$y_x = \frac{y_t}{x_t}, \quad y_x'' = \left(\frac{y_t}{x_t} \right)' \cdot \frac{1}{x_t} = \frac{y_{tt}x_t' - x_{tt}y_t'}{(x_t')^3}$$

3- м и с о л. Ушбу

$$\begin{cases} x = 8\cos t, \\ y = 8\sin t \end{cases}$$

параметрик тенгламалар билан берилган функциянинг биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилаларини топинг.

Ечиш. Юқорида келтирилган формуладан фойдаланиб, қуйидагиларни осон топамиз:

$$x'_t = -8 \sin t, \quad y'_t = 8 \cos t;$$

$$y_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{8 \cos t}{-8 \sin t} = -\operatorname{ctg} t;$$

$$y''_x = \left(\frac{y'_t}{x'_t} \right)'_t \cdot \frac{1}{x'_t} = (-\operatorname{ctg} t)'_t \cdot \frac{1}{-8 \sin t} = -\frac{1}{8 \cdot \sin^3 t}.$$

3- дарсхона топшириғи

1. $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ функциянинг биринчи ва иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

2. $y = \frac{1+x}{1-x}$ функциянинг n - тартибли ҳосиласини топинг.

3. Қуйидаги тенгламалар билан ошқормас ҳолда берилган функцияларнинг биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилаларини топинг:

$$\text{а) } y^2 = 2px; \quad \text{б) } y = x + \operatorname{arctg} y.$$

4. Параметрик тенгламалар билан берилган функцияларнинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг:

$$\text{а) } \begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = t^2, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t). \end{cases}$$

5. Ушбу

$$\begin{cases} x = \frac{5t}{1+t^2}, \\ y = \frac{5t^2}{1+t^2} \end{cases}$$

параметрик тенгламалар билан берилган эгри чизикка $M_0(2, 4)$ нуктада ўтказилган уринма ва нормал тенгламасини топинг.

3- мустақил иш

1. а) $y = \frac{x^2}{4}(2\ln x - 3)$ функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

б) Ушбу

$$\begin{cases} x = \arccos \sqrt{t}, \\ y = \sqrt{1-t^2} \end{cases}$$

параметрик тенгламалар билан берилган функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

в) $e^x + e^y - 2^{xy} - 1 = 0$ тенглама билан ошқормас ҳолда берилган y функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

2. а) $y = x^2 \sin(5x - 3)$ функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

б) Ушбу

$$\begin{cases} x = \ln t, \\ y = \frac{1}{t} \end{cases}$$

параметрик тенгламалар билан берилган функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

в) $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ тенглама билан ошқормас ҳолда берилган y функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

3. а) $y = \frac{1}{2} \ln^2 x$ функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

б) Ушбу

$$\begin{cases} x = \operatorname{sh}^2 t, \\ y = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 t} \end{cases}$$

параметрик тенгламалар билан берилган функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

в) $x^4 - xy + y^4 = 1$ тенглама билан ошқормас ҳолда берилган функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

3-§. Функциянинг дифференциали

3.3.1. $y = f(x)$ функциянинг дифференциали деб, унинг орттирмасининг эрки ўзгарувчи x нинг орттирмасига нисбатан чизикли бўлган бош қисмига айтилади.

$y = f(x)$ функциянинг дифференциали dy билан белгиланади. Функциянинг дифференциали унинг ҳосиласи билан эрки ўзгарувчи орттирмасининг кўпайтмасига тенг:


$$dy = f'(x) \Delta x \quad \text{ёки} \quad dy = y' \cdot \Delta x$$

Равшанки, $dx = \Delta x$. Шу сабабли

$$dy = f'(x) dx \quad \text{ёки} \quad dy = y' dx.$$

Дифференциал геометрик жиҳатдан $y = f(x)$ функция графигига $M(x, y)$ нуктада ўтказилган уринма ординатасининг орттирмасига тенг (20-шакл).

Функциянинг дифференциали dy унинг Δy орттирмасидан Δx га нисбатан юқори тартибли чексиз кичик миқдорга фарк қилади.



20- шакл

3.3.2. Агар $u = u(x)$ ва $v = v(x)$ функциялар дифференциалланувчи бўлса, у ҳолда дифференциалнинг таърифи ва дифференциаллаш қоидаларидан бевосита дифференциалнинг асосий хоссаларига эга бўламиз:

1. $d(C) = 0$, бунда C — ўзгармас.
2. $d(Cu) = Cdu$.
3. $d(u \pm v) = du \pm dv$.
4. $d(u \cdot v) = u dv + v du$.
5. $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2}$, бунда $v \neq 0$.

6. $df(u) = f'_u(u) \cdot u' dx = f'(u) du$.

1- м и с о л. $y = \operatorname{tg}^2 2x$ функция дифференциалини топинг.

Е ч и ш. Олдин берилган функциянинг хосиласини топамиз:

$$y' = 8 \operatorname{tg}^3 2x \cdot \frac{1}{\cos^2 2x} = 8 \operatorname{tg}^3 2x \sec^2 2x.$$

У ҳолда $dy = 8 \operatorname{tg}^3 2x \cdot \sec^2 2x dx$.

3.3.3. $y = f(x)$ функциянинг *иккинчи тартибли дифференциали* деб биринчи тартибли дифференциалдан олинган дифференциалга айтилади ва

$$d^2 y = d(dy)$$

каби белгиланади.

$y = f(x)$ функциянинг n - тартибли дифференциали деб $(n - 1)$ -тартибли дифференциалдан олинган дифференциалга айтилади, яъни:

$$d^n y = d(d^{n-1} y).$$

$y = f(x)$ функция берилган бўлиб, бунда x — эркин ўзгарувчи бўлса, у ҳолда унинг юқори тартибли дифференциаллари ушбу формулалар бўйича ҳисобланади:

$$d^2 y = y'' dx^2, d^3 y = y''' dx^3, \dots, d^n y = y^{(n)} dx^n.$$

2- мисол. $y = x(\ln x - 1)$ функциянинг иккинчи тартибли дифференциалини топинг.

Ечиш. Берилган функциянинг биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилаларини топамиз:

$$y' = \ln x - 1 + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x, \quad y'' = \frac{1}{x}.$$

Демак, $dy = \ln x dx$, $d^2y = \frac{1}{x} dx^2$.

3.3.4. Функциянинг dy дифференциали унинг Δy орттирмасидан $\Delta x = dx$ га нисбатан юкори тартибли чексиз кичик микдорга фарк қилади, шу сабабли $\Delta y \approx dy$ ёки

$$f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x) \Delta x,$$

бундан

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x$$

формулага эга бўламиз, бу формула функция қийматларини тақрибий ҳисоблашларда қўлланилади.

3- мисол. $\arcsin 0,51$ нинг тақрибий қийматини ҳисобланг.

Ечиш. $y = \arcsin x$ функцияни қараймиз: $x = 0,5$, $\Delta x = 0,01$ деб олиб ва $\arcsin(x + \Delta x) \approx \arcsin x + (\arcsin x)' \Delta x$ формуладан фойдаланиб топамиз:

$$\begin{aligned} \arcsin 0,51 &\approx \arcsin 0,5 + \frac{1}{\sqrt{1 - (0,5)^2}} \cdot 0,01 = \\ &= \frac{\pi}{6} + 0,011 \approx 0,534. \end{aligned}$$

Шундай қилиб, $\arcsin 0,51 \approx 0,534$ радиан.

4- дарсхона топишириғи

1. $y = 2x^3 + 5x^2$ функция берилган. Унинг:

а) орттирмасини топинг;

б) орттирмасининг бош қисмини топинг.

Ж: а) $\Delta y = (6x^2 + 10x) \Delta x + (6x + 5) \Delta x^2 + 2\Delta x^3$;

б) $dy = (6x^2 + 10x) \Delta x$.

2. Қуйидаги функцияларнинг биринчи тартибли дифференциалларини топинг:

а) $y = \sqrt{1 + x^2}$; б) $y = \arcsin \frac{1}{x}$; в) $y = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$.

3. Қуйидаги функцияларнинг иккинчи тартибли дифференциалларини топинг:

а) $y=e^{-x^3}$; б) $y=x(\ln x-1)$; в) $y=\arccos x$.

4. Қуйидаги функцияларнинг учинчи тартибли дифференциалларини ҳисобланг:

а) $y=\cos^2 2x$; б) $y=(2x-3)^3$; в) $y=\frac{\ln x}{x}$.

5. Қуйидаги функцияларнинг тақрибий қийматларини вергулдан кейинги икки хонасигача аниқликда ҳисобланг:

а) $x=1,03$ да $y=x^3-4x^2+5x+3$;

б) $x=0,2$ да $y=\sqrt{1+x}$.

Ж: а) 5,00; б) 1,10.

6. $\sqrt[4]{17}$ нинг тақрибий қийматини вергулдан кейинги икки хонасигача аниқликда ҳисобланг.

Ж: 2,03.

4- мустақил иш

1. Агар

а) $y=x^3 \ln x$; б) $y=e^{-3x} \cdot \cos 2x$

бўлса, dy , d^2y , d^3y дифференциалларни ҳисобланг.

2. Функцияларнинг тақрибий қийматларини вергулдан кейинги икки хонасигача аниқликда ҳисобланг:

а) $x=0,1$ да $y=\sqrt[3]{\frac{1-x}{1+x}}$;

б) $x=0,98$ да $y=\sqrt{x^2-7x+10}$.

Ж: а) 1,03; б) 2,09.

4- §. Ролл, Лагранж, Коши теоремалари. Лопиталь қондаси

3.4.1. Ролл теоремаси. Агар $y=f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада узлуксиз, (a, b) ораликда дифференциалланувчи ва $f(a)=f(b)$ бўлса, у ҳолда ақалли битта шундай $x=c$ ($a < c < b$) нукта мавжудки, унда $f'(c)=0$ бўлади.

Бу теорема ҳосиланинг ноллари ёки илдизлари ҳақидаги теорема ҳам дейилади.

Лагранж теоремаси. Агар $y=f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада узлуксиз, (a, b) ораликда дифференциалланувчи бўлса, у ҳолда ақалли битта шундай $x=c$ ($a < c < b$) нукта мавжудки,

$$f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a)$$

бўлади.

Бу теорема чекли айримлар ҳақидаги теорема ҳам дейилади.
 Коши теоремаси. Агар $y=f(x)$ ва $y=\varphi(x)$ функциялар $[a, b]$ кесмада узлуксиз, (a, b) ораликда дифференциалланувчи, шу билан бирга бу ораликда $\varphi'(x) \neq 0$ бўлса, у ҳолда акалли битта шундай $x=c (a < c < b)$ нукта мавжудки,

$$\frac{f(b)-f(a)}{\varphi(b)-\varphi(a)} = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)}$$

бўлади, бунда $\varphi(b) \neq \varphi(a)$.

1-мисол. $[1, 5]$ кесмада $f(x) = x^2 - 6x + 100$ функция учун Ролл теоремаси ўринлими? x нинг қандай қийматида $f'(x) = 0$ бўлади?

Ечиш. $f(x)$ функция x нинг барча қийматларида узлуксиз, дифференциалланувчи ва унинг $[1, 5]$ кесма охириларидаги қийматлари тенг: $f(1) = f(5) = 95$ бўлгани учун Ролл теоремаси шартлари бажарилади. x нинг $f'(x) = 0$ бўладиган қиймати $f'(x) = 2x - 6 = 0$ тенгламадан аниқланади, яъни $x = 3$.

2-мисол. $f(x) = 2x - x^2$ эгри чизиқнинг AB ёйида шундай M нуктани топинки, бу нуктада эгри чизиққа ўтказилган уринма AB ватарга параллел бўлсин, бунда $A(1, 1)$ ва $B(3, -3)$.

Ечиш. $f(x) = 2x - x^2$ функция x нинг барча қийматларида узлуксиз ва дифференциалланувчи. Изланаётган M нуктада ўтказилган уринманинг бурчак коэффициенти шартга кўра $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ га тенг, иккинчи томондан, Лагранж теоремасига кўра иккита $a = 1$ ва $b = 3$ қиймат орасида

$$f(b) - f(a) = f'(c) (b - a)$$

тенгликни қаноатлантирувчи $x = c$ қиймат мавжуд, бунда $f'(x) = 2 - 2x$. Тегишли қийматларни қўйсақ,

$$f(3) - f(1) = (3 - 1)f'(c)$$

ёки

$$(2 \cdot 3 - 3^2) - (2 \cdot 1 - 1^2) = (3 - 1) (2 - 2c).$$

Бу охири тенгламани c га нисбатан ечсак, $c = 2$, $f(2) = 0$. Шундай қилиб, M нукта $(2, 0)$ координаталарга эга.

3-мисол. $f(x) = \sqrt[3]{(x-8)^2}$ функция учун $[0; 10]$ кесмада Лагранж теоремаси ўринлими?

Ечиш. $f(x)$ функция x нинг барча қийматларида узлуксиз, аммо унинг $f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x-8}}$ ҳосиласи $(0; 10)$ ораликнинг $x = 8$ нук-

тасида мавжуд эмас, шунга кўра Лагранж теоремаси ўринли эмас.

3.4.2. Аниқмасликларни очишнинг Лопиталь қоида си $(\frac{0}{0})$ ёки $(\frac{\infty}{\infty})$ кўринишдаги аниқмасликларни очиш. $f(x)$ ва $\varphi(x)$ функциялар x_0 нуктанинг бирор атрофида (x_0 нукта-

нинг ўзидан ташкари) дифференциалланувчи ва $\varphi'(x) \neq 0$ бўлсин. Агар $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = 0$ ёки $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \infty$ бўлиб,

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\varphi(x)}$ мавжуд бўлса, у ҳолда $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}$ бўлади.

$x \rightarrow \infty$ да ҳам Лопиталь қоидаси ўринли.

$0 \cdot \infty$ ёки $\infty - \infty$ шаклидаги аниқмасликлар алгебраик алмаштиришлар орқали $\frac{0}{0}$ ёки $\frac{\infty}{\infty}$ кўринишдаги аниқмасликларга келтирилиб, сўнгра Лопиталь қоидасидан фойдаланилади.

0^0 , ∞^0 ёки 1^∞ кўринишдаги аниқмасликлар логарифмлаш орқали $\frac{0}{0}$ ёки $\frac{\infty}{\infty}$ кўринишдаги аниқмасликларга келтирилади.

4- м и с о л. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ ни топинг.

Е ч и ш. Ифоданинг сурати ва махражи $x \rightarrow 0$ да нолга интилади, шу сабабли $\frac{0}{0}$ шаклидаги аниқмасликка эгамиз. Лопиталь қоидасидан фойдалансак,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}.$$

Бу ерда Лопиталь қоидаси икки марта қўлланилди.

5- м и с о л. $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 \ln x$ ни топинг.

Е ч и ш. $0 \cdot \infty$ шаклидаги аниқмасликка эгамиз, $x^2 \ln x$ кўпайтма-ни $\frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}}$ бўлинма шаклида ифодаласак, натижада $\frac{\infty}{\infty}$ шаклидаги

аниқмасликка эга бўламиз. Лопиталь қоидасини қўллаймиз:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{2}{x^3}} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0.$$

6- м и с о л. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^x$ ни топинг.

Е ч и ш. 0^0 шаклидаги аниқмасликка эгамиз. Берилган функцияни y билан белгилаб: $y = (\sin x)^x$, буни логарифмлаймиз:

$$\ln y = x \ln \sin x = \frac{\ln \sin x}{\frac{1}{x}}.$$

Лопиталь қондасини қўллаймиз:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \ln y &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{-\frac{1}{x^2}} = \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos x}{\sin x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \cdot \frac{x}{\sin x} \cdot \cos x \right) = 0. \end{aligned}$$

Шундай қилиб, $\lim_{x \rightarrow 0} y = e^0 = 1$.

5- дарсхона топшириғи

1. $[-1; 0]$ ва $[0; 1]$ кесмаларда $f(x) = x - x^3$ функция учун Ролл теоремаси ўринлими? Агар ўринли бўлса, у ҳолда x нинг тегишли қийматларини топинг.

Ж: $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$.

2. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ функция илдизлари орасида ҳосиланинг илдизи борлигини текширинг.

3. $[-1, 2]$ кесмада $\frac{4}{x}$ ва $1 - \sqrt[3]{x^2}$ функцияларга Лагранж теоремасини қўллаб бўладими?

4. Қайси нуктада $f(x) = 4 - x^2$ функцияга ўтказилган уринма $A(-2, 0)$ ва $B(1, 3)$ нукталарни тортиб турувчи ватарга параллел?

Ж: $(-0,5; 3,75)$ нуктада.

5. $f(x) = x^3$ ва $\varphi(x) = x^2$ функциялар учун Коши формуласини ёзинг ва c нуктани топинг.

6. Лопиталь қондасидан фойдаланиб, лимитларни топинг:

а) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 7x^2 + 4x + 2}{x^3 - 5x + 4}$; д) $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{tg} x \cdot \ln x$;

б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x - \sin x}$; е) $\lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{tg} x)^{\sin x}$;

в) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{\sin 3x}$; ж) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x$.

г) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}\right)$;

Ж: а) $\frac{7}{2}$; б) 3; в) $\frac{5}{3}$; г) $\frac{1}{2}$; д) 0; е) 1; ж) 3.

5- мустақил иш

1. $[-1; 1]$ кесмада $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x}$ функция учун Ролл теоремасини қўллаб бўладими?

2. Ушбу

а) $f(x) = \operatorname{arctg} x$ функция учун $[0; 1]$ кесмада;

б) $f(x) = \operatorname{arcsin} x$ функция учун $[0; 1]$ кесмада;

в) $f(x) = \ln x$ функция учун $[1; 2]$ кесмада Лагранж формуласини ёзинг ва $x=c$ ни топинг.

$$\text{Ж: а) } \sqrt{\frac{4}{\pi} - 1}; \text{ б) } \sqrt{1 - \frac{4}{\pi^2}}; \text{ в) } \frac{1}{\ln 2}.$$

3. Ушбу

а) $\sin x$ ва $\cos x$ функциялар учун $[0; \frac{\pi}{2}]$ кесмада;

б) x^2 ва \sqrt{x} функциялар учун $[1; 4]$ кесмада Коши формуласини ёзинг ва $x=c$ ни топинг.

$$\text{Ж: а) } \frac{\pi}{4}; \text{ б) } \sqrt[3]{\left(\frac{15}{4}\right)^2}.$$

4. Лопиталь қоидадан фойдаланиб қуйидаги лимитларни топинг:

$$\text{а) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\ln(1+x)}; \quad \text{б) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}{\ln(1-x)};$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{arcsin} x \cdot \operatorname{ctg} x; \quad \text{г) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \operatorname{ctg}^2 x \right);$$

$$\text{д) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\pi - 2x)^{\cos x}; \quad \text{е) } \lim_{x \rightarrow \infty} (x + 2^x)^{\frac{1}{x}}.$$

$$\text{Ж: а) } 2; \text{ б) } \infty; \text{ в) } 1; \text{ г) } \frac{2}{3}; \text{ д) } 1; \text{ е) } 2.$$

5-§. Тейлор формуласи

3.5.1. Агар $y=f(x)$ функция x_0 нуқтанинг бирор атрофида $(n+1)$ - тартибгача ҳосилаларга эга бўлса ($(n+1)$ - тартибли ҳосила ҳам кирди), у ҳолда бу атрофнинг ҳар қандай x нуқтаси учун n - тартибли Тейлор формуласи ўринли:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \\ + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + R_n(x),$$

бунда $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$ Тейлор формуласининг Лагранж шаклидаги қолдиқ ҳади дейилади, ξ нукта x ва x_0 нукталар орасида ётади, яъни $\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$ ва $0 < \theta < 1$.

1- м и с о л. $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 5$ кўпхадни $(x-2)$ иккиҳаднинг бутун мусбат даражалари бўйича ёйинг.

Е чи ш. Масалани ҳал қилиш учун кўпхадни ва унинг ҳосилаларининг $x_0=2$ нуктадаги қийматларини топиш керак. Тегишли ҳисоблашларни бажарамиз:

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 3; f''(x) = 6x - 4; f'''(x) = 6; n \geq 4 \text{ учун } f^{(n)}(x) = 0.$$

Бундан: $f(2) = 11; f'(2) = 7; f''(2) = 8; f'''(2) = 6$.
 Демак,

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 5 = 11 + \frac{7}{1!}(x-2) + \frac{8}{2!}(x-2)^2 + \frac{6}{3!}(x-2)^3$$

ёки

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 5 = 11 + 7(x-2) + 4(x-2)^2 + (x-2)^3.$$

2- м и с о л. $x_0 = -1$ да $f(x) = e^x$ функция учун учинчи тартибли Тейлор формуласини ёзинг.

Е чи ш. Барча n лар учун $f^{(n)}(x) = e^x$ ва $f^{(n)}(-1) = \frac{1}{e}$ экани равшан.

Демак,

$$e^x = \frac{1}{e} + \frac{1}{e} \frac{x+1}{1!} + \frac{1}{e} \frac{(x+1)^2}{2!} + \frac{1}{e} \frac{(x+1)^3}{3!} + R_3(x),$$

шу билан бирга $R_3(x) = e^{\xi} \frac{(x+1)^4}{4!}$, бу ерда ξ нукта x ва -1 орасида ётади ёки

$$\xi = -1 + \theta(x+1), 0 < \theta < 1.$$

3.5.2. Агар Тейлор формуласида $x_0=0$ олинса, у ҳолда, n - тартибли Маклорен формуласи ҳосил бўлади:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x),$$

бунда $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$ — қолдиқ ҳад, ξ нукта x ва 0 нукталар орасида ётади, яъни $\xi = \theta x$, $0 < \theta < 1$.

Баъзи функцияларнинг Маклорен формуласи бўйича ёйилмасини келтирамиз:

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1}; \\
 \sin x &= \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots - (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \\
 &\quad + (-1)^n \cos \theta x \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}; \\
 \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots - (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + (-1)^{n+1} \cos \theta x \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}; \\
 (1+x)^m &= 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \dots + \\
 &\quad + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n + \frac{m(m-1)\dots(m-n)}{(n+1)!} (1+\theta x)^{m-n-1} \cdot x^{n+1}.
 \end{aligned}$$

$f(x) = (1+x)^m$ функциянинг ёйилмаси *биномиал ёйилма* дейилади.

3-мисол. Маклорен формуласи ёрдамида $f(x) = \ln(1+x)$ функцияни x нинг даражалари бўйича ёйинг.

Ечиш. $f(0) = 0$ экани равшан. Берилган функциянинг ҳосилаларини ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{1+x}; \quad f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}; \quad f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}; \\
 f^{(IV)}(x) &= -\frac{2 \cdot 3}{(1+x)^4}; \quad \dots; \quad f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}.
 \end{aligned}$$

Шундай қилиб,

$$\begin{aligned}
 f'(0) &= 1; \quad f''(0) = -1; \quad f'''(0) = 2!; \quad f^{(IV)}(0) = -3!, \dots, \\
 f^{(n)}(0) &= (-1)^{n+1} (n-1)!; \quad f^{(n+1)}(x) = \frac{n!}{(1+x)^{n+1}}.
 \end{aligned}$$

Буларни Маклорен формуласига қўйсак,

$$\begin{aligned}
 \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3 \cdot 2!}{3!} - \frac{x^4 \cdot 3!}{4!} + \dots + \\
 &\quad + (-1)^{n+1} \frac{(n-1)!}{n!} x^n + R_n(x)
 \end{aligned}$$

ёки

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + R_n(x)$. Бу ерда қолдиқ ҳад $R_n(x) = (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{1}{(1+\xi)^{n+1}}$, ξ нукта эса 0 ва x нукталар орасида ётади.

1. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5x + 1$ кўпхадни $x + 1$ иккихаднинг даражалари бўйича ёйнинг.

$$\text{Ж: } f(x) = -9 + 17(x+1) - 9(x+1)^2 + 2(x+1)^3.$$

2. $x_0 = 1$ нуктада $f(x) = \sqrt{x}$ функция учун учинчи тартибли Тейлор формуласини ёзинг.

$$\text{Ж: } f(x) = 1 - \frac{x-1}{2} + \frac{3}{8}(x-1)^2 - \frac{5}{16}(x-1)^3 + R_3(x),$$

$$\text{бу ерда } R_3(x) = \frac{35}{128} \frac{(x-1)^4}{\xi^2}.$$

3. $f(x) = \operatorname{tg} x$ функция учун иккинчи тартибли Маклорен формуласини ёзинг.

$$\text{Ж: } f(x) = x + \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1 + 2\sin^2 \xi}{\cos^4 \xi}.$$

4. $f(x) = xe^x$ функция учун n -тартибли Маклорен формуласини ёзинг.

$$\text{Ж: } f(x) = x + \frac{x^2}{1!} + \frac{x^3}{2!} + \dots + \frac{x^n}{(n-1)!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} (\xi + n + 1)e^{\xi}.$$

6- мустақил иш

1. Кўпхадлар ёйилмасини ёзинг:

а) $f(x) = x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x - 1$ ни $(x-1)$ иккихад даражалари бўйича;

б) $f(x) = x^4 - 5x^3 + x^2 - 3x + 4$ кўпхадни $(x-4)$ иккихад даражалари бўйича.

2. а) $x_0 = 2$ нуктада $f(x) = \frac{x}{x-1}$ функция учун учинчи тартибли Тейлор формуласини ёзинг;

б) $x_0 = 1$ нуктада $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ функция учун учинчи тартибли Тейлор формуласини ёзинг.

3. а) $f(x) = \arcsin x$ функция учун учинчи тартибли Маклорен формуласини ёзинг;

б) $f(x) = \sin^2 x$ функция учун $2n$ -тартибли Маклорен формуласини ёзинг.

6- §. Тақрибий ҳисоблашларга Тейлор формуласининг татбиқи

Тейлор формуласи ихтиёрий $f(x)$ функцияни

$$f(x) \approx f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

кўпхад шаклида тақрибий ифодалаш имконини беради. Бу кўпхад n - тартибли Тейлор кўпҳади дейилади. Хусусан, $x_0=0$ да n - тартибли Маклорен кўпҳадига эга бўламиз.

Баъзи функцияларнинг Маклорен кўпҳади шаклидаги тақрибий ифодаларини келтираемиз:

$$e^x \approx 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!};$$

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!};$$

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!};$$

$$(1+x)^m \approx 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n.$$

$n=1, 2, 3$ деб олиб, куйидаги тақрибий формулаларга эга бўламиз:

$$e^x = 1 + x; \quad e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}; \quad e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6};$$

$$\sin x \approx x, \quad \sin x \approx x - \frac{x^3}{6}; \quad \sin x \approx x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120};$$

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}; \quad \cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}; \quad \cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} +$$

$$+ \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720};$$

$$(1+x)^m \approx 1 + mx; \quad (1+x)^m \approx 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2}x^2;$$

$$(1+x)^m \approx 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{6}x^3.$$

Келтирилган функцияларнинг ҳар бири учун тақрибий формулалар аниқликнинг ортиб бориши тартибида берилган.

Тейлор (Маклорен) формуласи функциялар қийматларини берилган аниқликда ҳисоблашларда қўлланилади.

Масалан, $f(x)$ функциянинг $x=a$ нуктадаги қийматини хатолиги ϵ дан катта бўлмайдиган аниқликда ҳисоблаш учун Тейлор кўпҳадини шундай k - тартибгача олиш керакки, бу k сон $|R_n(a)| < \epsilon$ тенгсизликни қаноатлантирувчи n ларнинг энг кичиги қилиб танланади.

1- мис ол. e сонини 0,0001 гача аниқликда ҳисобланг.

Ечиш. $x=a=1$ эканлигини ҳисобга олсак, Маклорен формуласига кўра:

$$e = f(1) = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + R_n(1).$$

n нинг $R_n(1) = \frac{e^3}{(n+1)!} < 0,0001$ шартни канаотлантнрвчи энг кичик киймати $k=6$ бўлади, бунда $0 < \xi < 1$. Демак,

$$e \approx 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{6!} = 2,718.$$

2- мисол. $\sqrt[3]{29}$ нинг қийматини 0,001 гача аниқликда ҳисоб-ланг.

Ечиш. Берилган илдишни бундай ифодалаймиз:

$$\sqrt[3]{29} = \sqrt[3]{27+2} = 3 \sqrt[3]{1 + \frac{2}{27}} = 3 \left(1 + \frac{2}{27}\right)^{\frac{1}{3}}.$$

Ушбу биномиал ёйилмадан фойдаланамиз:

$$(1+x)^m = 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n + R_n(x).$$

Бу ерда

$$R_n(x) = \frac{m(m-1)\dots(m-n)}{(n+1)!} x^{n+1} (1+\xi)^{m-n-1}, \quad 0 < \xi < 1.$$

$R_n(x)$ нинг қийматини ўрнига қўйиб,

$$(1+x)^m \approx 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n \quad \text{тақри-}$$

бий тенгликка эга бўламиз. $R_n(x)$ хатоликни $|x| < 1$ ва етарлича катта n ларда исталганча кичик қилиш мумкин.

$x = \frac{2}{27}$ ва $m = \frac{1}{3}$ деб олсак,

$$\sqrt[3]{29} = 3 \left(1 + \frac{2}{81} - \frac{2 \cdot 2}{81 \cdot 81} + \dots + R_n\left(\frac{2}{27}\right)\right).$$

Ҳисоблашларнинг кетма-кет хатоликлари катталиги $3|R_n|$ ни баҳолаб, топамиз:

$$3|R_1| < \frac{3 \cdot 2 \cdot 2}{81^2} < 0,002, \quad 3|R_2| < \frac{3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5}{81^3} < 0,0003.$$

Демак, берилган аниқликда ҳисоблаш учун учта ҳадни ($k=3$) олиш етарли экан, яъни

$$\sqrt[3]{29} \approx 3(1 + 0,024 - 0,0006) = 3,072.$$

7- дарсхона топшириги

1. $y = \frac{x}{x-1}$ функция учун $x_0 = 2$ нуктада учинчи тартибли Тейлор кўпхадини ёзинг. Берилган функция ва унинг кўпхадни графикларини чизинг.

2. $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$ тақрибий формуладан фойдаланиб $\frac{1}{\sqrt[3]{e}}$ ни топинг ва хатоликни баҳоланг.

Ж: $\frac{1}{\sqrt[3]{e}} \approx 0,78$; $\varepsilon < 0,01$.

3. Қуйидагиларни 0,001 гача аниқликда ҳисобланг:

а) $\cos 41^\circ$; б) $\sqrt[3]{121}$.

Ж: а) 0,754; б) 4,946.

7- мустақил иш

1. $f(x) = \arcsin x$ функция учун учинчи тартибли Маклорен кўпхадини ёзинг. Берилган функция ва унинг кўпхадни графикларини ясанг.

2. Қуйидагиларни 0,001 гача аниқликда ҳисобланг:

а) $\sqrt[3]{e}$; б) $\sqrt[3]{129}$; в) $\sin 36^\circ$.

Ж: а) 1,395; б) 2,002; в) 0,587.

ФУНКЦИЯЛАРНИ ХОСИЛАЛАР ЁРДАМИДА ТЕКШИРИШ

1-§. Биринчи тартибли ҳосила ёрдамида функцияларнинг экстремумларини текшириш

4.1.1. Агар (a, b) ораликнинг $x_2 > x_1$ тенгсизликни қаноатлантирувчи иккита ихтиёрий x_1 ва x_2 нукталари учун $f(x_2) > f(x_1)$ тенгсизлик бажарилса, $f(x)$ функция (a, b) ораликда *ўсувчи* дейилади.

Агар (a, b) ораликнинг $x_2 > x_1$ тенгсизликни қаноатлантирувчи иккита ихтиёрий x_1 ва x_2 нукталари учун $f(x_2) < f(x_1)$ тенгсизлик бажарилса, $f(x)$ функция (a, b) ораликда *камаювчи* дейилади.

Ораликда ўсувчи ёки камаювчи функциялар *монотон функциялар* дейилади.

Монотонликнинг зарур шартлари:

1. Агар (a, b) ораликда дифференциалланувчи $y=f(x)$ функция ўсувчи бўлса, у ҳолда $f'(x) > 0$.

2. Агар (a, b) ораликда дифференциалланувчи $y=f(x)$ функция камаювчи бўлса, у ҳолда $f'(x) < 0$.

Монотонликнинг етарлилик шартлари.

1. Агар (a, b) ораликда дифференциалланувчи $y=f(x)$ функция мусбат ҳосиллага эга бўлса, яъни $f'(x) > 0$, у ҳолда функция шу ораликда *ўсувчи функция* бўлади.

2. Агар (a, b) ораликда дифференциалланувчи $y=f(x)$ функция манфий ҳосиллага эга бўлса, яъни $f'(x) < 0$, функция шу ораликда *камаювчи функция* бўлади.

Функциянинг биринчи тартибли ҳосиласи нолга тенг ёки узилишга эга бўладиган нукталари *критик нуқталар* дейилади.

Энг содда ҳолларда $y=f(x)$ функциянинг аниқланиш соҳасини чекли сондаги критик нуқталар билан чегараланган монотонлик оралиқларга бўлиш мумкин.

4.1.2. Агар x_0 нуктанинг шундай атрофи мавжуд бўлсаки, бу атрофнинг ҳар қандай $x \neq x_0$ нуктаси учун $f(x) < f(x_0)$ тенгсизлик уринли бўлса, у ҳолда $y=f(x)$ функция x_0 нуктада *максимумга эришади* дейилади.

Агар x_0 нуктанинг шундай атрофи мавжуд бўлсаки, бу атрофнинг ҳар қандай $x \neq x_0$ нуктаси учун $f(x) > f(x_0)$ тенгсиз-

лик ўринли бўлса, у ҳолда $y=f(x)$ функция x_0 нуктада *минимумга эришади* дейилади.

Функция максимум ёки минимумга эришадиган нукталар унинг *экстремум* нукталари дейилади. Функциянинг экстремум нукталаридаги қийматлари функциянинг *экстремал* (*максимал* ёки *минимал*) *қийматлари* дейилади.

Экстремумнинг зарурий шарти. Агар $y=f(x)$ функция x_0 нуктада экстремумга эга бўлса, у ҳолда $f'(x_0)$ нолга тенг ёки мавжуд бўлмайди.

Аmmo ҳар қандай критик нукта ҳам экстремум нуктаси бўлавермайди.

Экстремумнинг етарлилик шарти. Агар x_0 нукта $y=f(x)$ функциянинг критик нуктаси бўлиб, функциянинг ҳосиласи бу нуктадан ўтишда ишорасини *ўзгартирса*, у ҳолда x_0 — бу функциянинг *экстремум нуктаси* бўлади, шу билан бирга:

1. Агар x_0 нуктадан чапдан ўнгга ўтишда $f'(x)$ ўз ишорасини мусбатдан манфийга ўзгартирса, у ҳолда x_0 нуктада функция максимумга эришади.

2. Агар x_0 нуктадан чапдан ўнгга ўтишда $f'(x)$ ўз ишорасини манфийдан мусбатга ўзгартирса, у ҳолда x_0 нуктада функция минимумга эришади.

Шундай қилиб, монотонлик ораликларини ва функция экстремумини топиш учун олдин функциянинг аниқланиш соҳасини критик нукталар ёрдамида монотонлик ораликларига бўлиш ва уларда ҳосила ишорасини текшириш керак.

Шундан кейин монотонлик ва экстремумнинг етарлилик шартларидан фойдаланиб, ўсиш ва камайиш ораликларини, максимум ва минимум нукталарини топиш ҳамда функциянинг бу нукталардаги қийматларини ҳисоблаб, натижаларни тегишли жадвалга ёзиш керак.

1- м и с ол. $y=x^3-3x^2$ функциянинг монотонлик ораликларини ва экстремумларини топинг.

Е ч и ш. Берилган функциянинг аниқланиш соҳаси — бутун Ox ўқи бўлиб, унинг ҳосиласи $y'=3x(x-2)$.

Ҳосилани нолга тенглаштириб, критик нукталарни топамиз: $x_1=0$ ва $x_2=2$. Ox ўқи бу нукталар билан учта ораликка бўлинади: $(-\infty; 0)$, $(0; 2)$ ва $(2; +\infty)$.

Бу ораликларда ҳосиланинг ишорасини текшириб, натижаларни қуйидаги жадвалга ёзамиз:

x	$(-\infty; 0)$	0	$(0; 2)$	2	$(2; +\infty)$
y'	+	0	-	0	+
y		max 0		min -4	

$$y_{\max}=f(0)=0^3-3\cdot 0^2=0; \quad y_{\min}=f(2)=2^3-3\cdot 2^2=-4.$$

4.1.3. $y=f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада ўзининг энг кичик ($m=y_{\text{кич}}$) ёки энг катта ($M=y_{\text{кат}}$) қийматларига (a, b) ораликда ётувчи критик нукталарида ёки $[a, b]$ кесманинг охирларида эришади.

2- м и с о л. $y=x^3-2x^2+3$ функциянинг $[-3; 2]$ кесмадаги энг кичик ва энг катта қийматларини топинг.

Е ч и ш. Берилган функциянинг ҳосиласи: $y'=4(x^3-x)$. $y'=0$ шартдан $x_1=0$, $x_2=1$ ва $x_3=-1$.

Критик нукталарнинг ҳаммаси $(-3; 2)$ ораликка тегишли. Берилган функциянинг бу нукталардаги ва кесманинг охирларидаги қийматларини ҳисоблаймиз:

$$y(0)=3, y(1)=2, y(-1)=2, y(-3)=66, y(2)=11.$$

Шундай қилиб, $[-3; 2]$ кесмада $y_{\text{кат}}=66$, $y_{\text{кич}}=2$.

1- дарсхона топшириги

1. Функцияларнинг монотонлик ораликларини топинг:

а) $y=2-3x+x^3$; б) $y=x(1+\sqrt{x})$;

в) $y=x-2\sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$.

Ж: а) $(-\infty, -1)$ ва $(1, +\infty)$ да ўсади, $(-1, 1)$ да камаяди;

б) $[0, +\infty)$ да ўсувчи;

в) $(\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3})$ да ўсувчи; $(0, \frac{\pi}{3})$ ва $(\frac{5\pi}{3}, 2\pi)$ да камаювчи.

2. Функциянинг экстремумларини топинг:

а) $y=\frac{x^2}{x-2}$; б) $y=x+\frac{1}{x}$; в) $y=\frac{\ln x}{x}$.

Ж: а) $x=0$ да $y_{\text{max}}=0$; $x=4$ да $y_{\text{min}}=8$;

б) $x=1$ да $y_{\text{min}}=2$; $x=0$ да $y_{\text{max}}=-2$;

в) $x=e$ да $y_{\text{max}}=\frac{1}{e}$.

3. Ушбу

а) $y=\frac{x-1}{x+1}$ функциянинг $[0, 4]$ кесмадаги;

б) $y=\arctg\frac{1-x}{1+x}$ функциянинг $[0, 1]$ кесмадаги энг кичик ва энг

катта қийматларини топинг.

Ж: а) $M=0,6, m=-1$; б) $M=\frac{\pi}{4}, m=0$.

1- мустақил иш

1. Функцияларнинг монотонлик ораликлари ва экстремум нукталарини топинг:

а) $y=x\sqrt{1-x^2}$; б) $y=x-2\ln x$; в) $y=\ln x - \arctg x$.

Ж: а) $\left(-1, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ ва $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right)$ да камаювчи; $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ да
 усади; $y_{\min} = y\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, $y_{\max} = y\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}$;

б) $(0, 2)$ да камаювчи; $(2, +\infty)$ да ўсувчи; $y_{\min} =$
 $= y(2) = 2(1 - \ln 2) \approx 0,61$;

в) $(0, +\infty)$ да ўсувчи.

2. Ушбу

а) $y = \frac{1-x+x^2}{1+x-x^2}$ нинг $[0, 1]$ кесмадаги;

б) $y = \sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1}$ нинг $[0, 1]$ кесмадаги;

в) $y = x + 2\sqrt{x}$ нинг $[0, 4]$ кесмадаги энг кичик ва энг катта
 кийматларини тошинг:

Ж: а) $y_{\max} = 1$, $y_{\min} = 0,6$;

б) $y_{\max} = 2$, $y_{\min} = \sqrt[3]{2}$;

в) $y_{\max} = 8$, $y_{\min} = 0$.

2- §. Функциянинг кавариклиги ва ботиклиги. Эгилиш нукталари. Асимптоталар

4.2.1. $y = f(x)$ функциянинг графиги (a, b) ораликнинг исталган
 нуктасида ўтказилган уринмадан *пистда* ётса, у холда функция
 графиги *кавариқ* дейилади.

$y = f(x)$ функциянинг графиги (a, b) ораликнинг исталган
 нуктасида утказилган уринмадан *юқорида* ётса, у холда функция
 графиги *ботиқ* дейилади.

Функция графигининг каварик қисмини ботиқ қисмидан ажра-
 тувчи $M_0(x_0, f(x_0))$ нукта графикнинг эгилиш нуктаси дейилади.

Функция графигининг каварик ёки ботик
 бўлишининг етарлилик шартлари. Агар (a, b) ора-
 ликда дифференциалланувчи $y = f(x)$ функциянинг иккинчи тартиб-
 ли ҳосиласи манфий, яъни $f''(x) < 0$ бўлса, у холда бу ораликда
 функция графиги каварик бўлади.

Агар (a, b) ораликда дифференциалланувчи $y = f(x)$ функция-
 нинг иккинчи тартибли ҳосиласи мусбат, яъни $f''(x) > 0$ бўлса,
 у холда бу ораликда функция графиги ботик бўлади.

Кавариклик оралигини ботиклик оралигидан ажратиб турувчи
 эгилиш нуктасидан ўтишда функциянинг иккинчи тартибли ҳосила-

си ишорасини ўзгартиради. Бундай нукталарда функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласи ё нолга тенг, ёки мавжуд бўлмайди.

$f''(x) = 0$ ёки $f''(x)$ мавжуд бўлмайдиган нукталар *иккинчи тур критик нуқталар* дейилади.

Эгилиш нукталари мавжуд бўлишининг етарлилик шarti. Агар x_0 нукта $y = f(x)$ функция учун иккинчи тур критик нукта бўлса ва $f''(x)$ иккинчи тартибли ҳосила бу нуктадан ўтишда ишорасини ўзгартирса, у ҳолда бу функция графигининг x_0 абсциссали нуктаси эгилиш нуктаси бўлади.

Демак, функция графигининг кавариклик ва ботиклик ораликларини, эгилиш нукталарини топиш учун олдин функция аниқланиш соҳасини иккинчи тур критик нукталар билан ораликларга бўлиш ва бу ораликларда иккинчи тартибли ҳосила ишорасини текшириш керак. Шундан кейин етарлилик шартларидан фойдаланиб, кавариклик, ботиклик ораликлари ва эгилиш нукталари аниқланади.

1- мисол. $y = xe^x$ функциянинг кавариклик, ботиклик ораликларини ва эгилиш нукталарини топинг.

Ечиш. Берилган функциянинг аниқланиш соҳаси бутун Ox ўқдан иборат. Биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилаларни топамиз:

$$y' = e^x(1+x); \quad y'' = e^x(2+x).$$

Иккинчи тартибли ҳосилани нолга тенглаштириб, иккинчи тур критик нуктани топамиз: $x = -2$. Ox ўқ бу нукта билан иккита ораликка бўлинади: $(-\infty; -2)$, $(-2; +\infty)$.

Бу ораликларда иккинчи тартибли ҳосила ишорасини текшириб, ушбу жадвални тузамиз:

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, +\infty)$
y''	$-$	0	$+$
y		$-2e^{-2}$	

$x = -2$ да графикда ординатаси $y = -2e^{-2}$ бўлган эгилиш нуктасига эга бўламиз.

4.2.2. Агар $y = f(x)$ функция графигидаги нукта шу график бўйлаб чексиз узоклашганда ундан бирор тўғри чизиккача бўлган масофа нолга интилса, бу тўғри чизик $y = f(x)$ функция графигининг *асимптотаси* деб аталади.

Агар $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ бўлса, $x = a$ тўғри чизик $y = f(x)$ функция графигининг *вертикал асимптотаси* дейилади.

Агар

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{ва} \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx)$$

ёки

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} \text{ ва } b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - kx)$$

лимитлар мавжуд бўлса, у ҳолда $y = kx + b$ тўғри чизик $y = f(x)$ функциянинг *огма асимптотаси* дейилади.

Хусусан, $k=0$ да *горизонтал асимптотага* эга бўламиз.

2- мисол. $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 2}$ функциянинг асимптоталарини тоинг.

Ечиш. $\lim_{x \rightarrow -2} y = \infty$ бўлгани учун $x = -2$ вертикал асимптота бўлади. Огма асимптоталарни топамиз:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x + 3}{x(x + 2)} = 1,$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 2x + 3}{x + 2} - x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x + 3}{x + 2} = -4. \end{aligned}$$

Шундай қилиб, огма асимптотанинг тенгнамаси $y = x - 4$ кўри-нишга эга

2- дарсхона топшириғи

1. Қуйидаги функцияларнинг кавариклик, ботиклик ораликларини ва эгилиш нукталарини тоинг:

а) $y = x^3 + 5x - 6$; б) $y = (x - 4)^5 + 4x + 4$; в) $y = e^{\frac{x^2}{2}}$.

Ж: а) $(-\infty, 0)$ да каварик; $(0, +\infty)$ да ботик; эгилиш нуктаси: $M_0(0, 6)$;

б) $(-\infty, 4)$ да ботик; $(4, +\infty)$ да каварик; эгилиш нуктаси: $M_0(4, 20)$;

в) $(-\infty, -1)$ ва $(1, +\infty)$ да ботик; $(-1, 1)$ да каварик; эгилиш нукталари: $M_1(-1, e^{\frac{1}{2}})$ ва $M_2(1, e^{\frac{1}{2}})$.

2. Қуйидаги функцияларнинг асимптоталарини тоинг:

а) $y = \sqrt[5]{\frac{x}{x-2}}$; б) $y = 3x + \arctg 5x$; в) $y = \frac{\ln(x+1)}{x^2} + 2x$.

Ж: а) $x=2$ ва $y=1$,

б) $y = 3x + \frac{\pi}{2}$ ($x \rightarrow +\infty$ да) ва $y = 3x - \frac{\pi}{2}$ ($x \rightarrow -\infty$ да);

в) $x=0, y=2x, x=-1$ ($x \rightarrow -1+0$ да).

2- мустақил иш

1. Қуйидаги функцияларнинг кавариклик, ботиклик, ораликларини ва эгилиш нукталарини топинг:

а) $y = \ln(1+x^2)$; б) $y = \operatorname{arctg} x - x$.

Ж: а) $(-\infty, -1)$ ва $(1, +\infty)$ да каварик; $(-1, 1)$ да ботик; эгилиш нукталари: $M_1(1, \ln 2)$ ва $M_2(-1, \ln 2)$

б) $(-\infty, 0)$ да каварик; $(0, +\infty)$ да ботик; эгилиш нуктаси: $O(0, 0)$.

2. Қуйидаги функцияларнинг асимптоталарини топинг:

а) $y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}$; б) $y = \frac{x^3}{4(x+1)^2}$.

Ж: а) $x = \pm 1, y = \pm x$; б) $x = -1, y = \frac{1}{2}x + 1$.

3-§. Функцияларнинг графикларини чизиш

$y=f(x)$ функция графикини чизишда олдин унинг асосий хусусиятларини аниқлаб олиш керак. Бунинг учун қуйидагиларга амал қилнади:

1. Функциянинг аниқланиш соҳаси топилади.
2. Функциянинг жуфт-тоқлиги ва даврийлиги текширилади.
3. Функция графикининг координата ўқлари билан кесишиш нукталари топилади.
4. Функциянинг ишораси ўзгармайдиган ораликлари топилади.
5. Функция графикининг асимптоталари топилади.
6. Функциянинг ўсиш, камайиш ораликлари ва унинг экстремумлари топилади.
7. Эгри чизикнинг кавариклик, ботиклик ораликлари ва унинг эгилиш нукталари топилади.

Мисол. $y = \frac{x^3+4}{x^2}$ функцияни текширинг ва унинг графикини чизинг.

Ечиш. 1. Функциянинг аниқланиш соҳаси:

$$D(f) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty).$$

2. Функция жуфт ҳам, тоқ ҳам эмас, даврий ҳам эмас.
3. Графикнинг координата ўқлари билан кесишиш нукталарини топамиз:

Ох ўк билан: $\frac{x^3+4}{x^2} = 0$, бундан $x = -\sqrt[3]{4}$, яъни $A(-\sqrt[3]{4}, 0)$ —

Ох ўк билан кесишиш нуктаси.

$x \neq 0$ бўлгани учун график Оу ўк билан кесишмайди.

4. Функциянинг ишораси ўзгармайдиган ораликларини толамиз: $x < -\sqrt[3]{3}$ да функция манфий (график Ох ўкдан пастда

жойлашган); $x > -\sqrt[4]{3}$ да функция мусбат (функция графиги Ox ўқдан юқорида жойлашган).

5. Функциянинг асимптоталарини топамиз.

Oy ўқ, яъни $x=0$ тўғри чизик эгри чизикнинг вертикал асимптотасидир, чулки

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3+4}{x^2} = \infty.$$

$y=kx+b$ оғма асимптотани аниқлаш учун k ва b ни топамиз:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3+4}{x^3} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3+4}{x^2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x^2} = 0.$$

Демак $y=x$ чизик оғма асимптота экан.

6. Функциянинг ўсиш, камайиш ораликларини ва унинг экстремумларини биринчи тартибли хосила $y' = \frac{x^3-8}{x^3}$ дан фойдаланиб,

$y'=0$ ва $y'=\infty$ тенгламалардан эса критик нуқталарни топамиз:

$x_1=2$ ва $x_2=0$ (функциянинг узилиш нуқтаси)

$x_1=2$ ва $x_2=0$ (функциянинг узилиш нуқтаси)

Қуйидаги жалвални тузамиз:


x	$(-\infty; 0)$	0	$(0; 2)$	2	$(2; +\infty)$
y'	+	∞	-		+
y	↗		↘		↗
		узилиш нуқтаси		3	
				min	

7. $y = \frac{24}{x^4}$ иккинчи тартибли хосиладан фойдаланиб, эгри

чизикнинг кавариклик, ботиклик ораликларини ва эгилиш нуқталарини топамиз. Иккинчи тартибли хосила ҳамма жойда мусбат, шу

боис функция графиги ботик, эгилиш нуқталари йўқ. $y = \frac{x^3+4}{x^2}$

функция графигини чизамиз (21-шакл).



21- шакл

3- дарсхона тоқлириғи

Функцияларни тўла текширинг ва уларнинг графикларини чизинг:

$$1. y = \frac{x}{x^2 - 4} \quad 2. y = \sqrt{(x+3)x^2} \quad 3. y = x \cdot e^{-x} \quad 4. y = \frac{x}{\ln x}$$

3- мустақил иш

Функцияларни тўла текширинг ва уларнинг графикларини чизинг:

$$1. y = \frac{x}{x^2 - 4} \quad 2. y = \ln(x^2 + 2x + 2) \quad 3. y = (3-x)e^{2-x}$$

6- назорат иши

1. Функцияни тўла текширинг ва графигини чизинг:

$$1.1. y = 3\left(\frac{x^4}{2} - x^2\right)$$

$$1.2. y = x^3 - 9x^2 + 24x - 15$$

$$1.3. y = x^3 - \frac{5}{3}x^2$$

$$1.4. y = 2x^4 + 3x^2 - 12x - 5$$

$$1.5. y = (x-3)^2(x-2)$$

$$1.6. y = x^4 - 8x^3 + 16x^2$$

$$1.7. y = x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}$$

$$1.8. y = \frac{1}{10}(2x^3 - 6x^2 - 18x + 15)$$

$$1.9. y = x^5 - x^3 - 2x$$

$$1.10. y = 1 - x^2 - \frac{x^4}{8}$$

$$1.11. y = -4x + x^4$$

$$1.12. y = (x+1)(x-2)^2$$

$$1.13. y = x^3 - 3x^2 + 4$$

$$1.14. y = x^3 - 9x^2 + 24x - 7$$

$$1.15. y = x^4 - 8x^2 + 16$$

$$1.16. y = -4x^3 + 6x^2 - 3x - \frac{1}{2}$$

$$1.17. y = x^4 - \frac{1}{2}x^2 - 4x + 2$$

$$1.18. y = \frac{1}{10}(x^4 - 12x)$$

$$1.19. y = x^4 - 2x^2 + 3$$

$$1.20. y = (x+2)(x-1)^2$$

1.21. $y = x^3 - 3x^2 + 2$

1.22. $y = 8 + 2x^2 - x^4$

1.23. $y = \frac{1}{5}x^5 - 4x^2$

1.24. $y = 2x^3 - 15x^2 + 36x$

1.25. $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 - \frac{9}{4}$

1.26. $y = 2x^3 + 3x^2 - 1$

1.27. $y = x^4 - 10x^2 + 9$

1.28. $y = \frac{x^4}{2} - 4x^2$

1.29. $y = 3x^4 + 4x^3 + 1$

1.30. $y = (x+3)(x-2)^2$

2. Функцияни тўла текширинг ва графигини чизинг:

2.1. $y = \frac{x-1}{x^2-2x}$

2.2. $y = \frac{2-4x^2}{1-4x^2}$

2.3. $y = \frac{2x^2}{4x^2-1}$

2.4. $y = \frac{2x+1}{x^2}$

2.5. $y = \frac{1}{x^2-9}$

2.6. $y = \frac{4x^2}{x^2-1}$

2.7. $y = \frac{x^4}{x^3-1}$

2.8. $y = \frac{x^2-x-1}{x^2-2x}$

2.9. $y = \frac{(x-3)^2}{4(x-1)}$

2.10. $y = \frac{x^2+4x+1}{x^2}$

2.11. $y = \frac{x^2+16}{4x}$

2.12. $y = \frac{3x}{1+x^2}$

2.13. $y = \frac{3-x^2}{x+2}$

2.14. $y = \frac{5x^2}{x^2-25}$

2.15. $y = \frac{x^2+1}{x}$

2.16. $y = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}$

2.17. $y = \frac{x^3+1}{x^2}$

2.18. $y = \frac{x}{3-x^2}$

2.19. $y = \frac{(x+1)^2}{(x-1)^2}$

2.20. $y = \frac{x}{(x-1)^2}$

2.21. $y = \frac{2x-1}{(x-1)^2}$

2.22. $y = \frac{x^3}{2(x+1)^2}$

2.23. $y = \frac{1}{1-x^2}$

2.24. $y = \frac{2}{x^2+x+1}$

2.25. $y = \frac{x^3-1}{4x^2}$

2.26. $y = \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^2$

2.27. $y = \frac{x^3+16}{x}$

2.28. $y = \frac{4x}{(x+1)^2}$

2.29. $y = \frac{x^2-3x+3}{x-1}$

2.30. $y = \frac{4}{x^2+2x-3}$

3. Функцияни тўла текширинг ва графигини чизинг:

$$3.1. y = \frac{e^{x-1}}{x-1}$$

$$3.2. y = \ln \frac{x}{x-2} - 2$$

$$3.3. y = (x-2)e^{3-x}$$

$$3.4. y = \ln(2x^2 + 3)$$

$$3.5. y = \frac{1}{e^x - 1}$$

$$3.6. y = x - \ln(x+1)$$

$$3.7. y = e^{\frac{1}{x+2}}$$

$$3.8. y = x \ln x$$

$$3.9. y = x^3 e^{-x}$$

$$3.10. y = \ln(x^2 - 4)$$

$$3.11. y = \frac{e^{3-x}}{3-x}$$

$$3.12. y = 2 \ln \frac{x+3}{x} - 3$$

$$3.13. y = (4-x)e^{x-3}$$

$$3.14. y = \ln(x^2 - 2x + 6)$$

$$3.15. y = \frac{1}{e^{2x} - 1}$$

$$3.16. y = x - \ln x$$

$$3.17. y = e^{\frac{1}{x-3}}$$

$$3.18. y = 1 - \ln^3 x$$

$$3.19. y = x^2 e^{\frac{1}{x}}$$

$$3.20. y = \ln(x^2 - 4) + x$$

$$3.21. y = \frac{e^{2(x-1)}}{2(x-1)}$$

$$3.22. y = \ln \frac{x}{x+3} - 1$$

$$3.23. y = -(2x+3)e^{2(x+2)}$$

$$3.24. y = -x \ln^2 x$$

$$3.25. y = \frac{1}{e^{3x} - 1}$$

$$3.26. y = x - \ln(1+x^2)$$

$$3.27. y = e^{\frac{1}{x+4}}$$

$$3.28. y = x^2 \ln x$$

$$3.29. y = x^3 e^{x+1}$$

$$3.30. y = x^2 - 2 \ln x$$

ҲАҚИҚИЙ ҲЗГАРУВЧИНИНГ ВЕКТОР ВА КОМПЛЕКС ФУНКЦИЯЛАРИ

1- §. Скаляр аргументнинг вектор функциясини дифференциаллаш

5.1.1. Агар $t \in D \subset R$ ўзгарувчининг ҳар бир қийматига маълум \vec{a} вектор қўғри келса, у ҳолда бу вектор t скаляр аргументнинг вектор функцияси дейилади ва бундай белгиланади:

$$\vec{a} = \vec{a}(t).$$

$\vec{a} = \vec{a}(t)$ вектор функциянинг бериллиши учта скаляр функция: $a_x(t)$, $a_y(t)$, $a_z(t)$ — \vec{a} вектор координаталарининг бериллишига тенг кучли:

$$\vec{a} = a_x(t)\vec{i} + a_y(t)\vec{j} + a_z(t)\vec{k}$$

ёки қисқача: $\vec{a} = \{a_x(t), a_y(t), a_z(t)\}$.

Агар ўзгарувчи \vec{a} векторнинг боши координаталар боши билан устма-уст тушса, яъни у $M(x, y, z)$ нуктанинг радиус-вектори бўлса, у ҳолда вектор функция бундай белгиланади:

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}.$$

\vec{r} векторнинг охири фазода чизадиган L чизик $\vec{r} = \vec{r}(t)$ вектор функциянинг *годографи* дейилади. Координаталар боши *годограф қутби* дейилади.

Агар \vec{r} векторнинг модулигина ўзгарса-ю, йўналиши ўзгаришсиз қолса, *годограф* қутбдан чиқадиган нур бўлади.

Агар \vec{r} векторнинг модули ўзгаришсиз ($|\vec{r}| = \text{const}$) қолса-ю, унинг йўналишигина ўзгарса, у ҳолда маркази қутбда, радиуси эса $|\vec{r}|$ га тенг бўлган сферада ётувчи чизик *годограф* бўлади.

Фазодаги ҳамма чизикни бирор векторнинг *годографи* дейиш мумкин.

Годографнинг параметрик тенгламалари ушбу кўринишда ёзилади:

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t),$$

бу ерда t ўзгарувчи *параметр* дейилади.

5.1.2. $\vec{a} = \vec{a}(t)$ вектор функциянинг t параметр бўйича ҳосиласи янги вектор функция бўлиб, ушбу тенглик билан аниқланади:

$$\frac{d\vec{a}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{a}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{a}(t + \Delta t) - \vec{a}(t)}{\Delta t}.$$

$$\vec{a} = \vec{a}(t) = \{a_x(t), a_y(t), a_z(t)\}.$$

Вектор функциянинг ҳосиласи ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\frac{d\vec{a}}{dt} = \frac{da_x}{dt} \vec{i} + \frac{da_y}{dt} \vec{j} + \frac{da_z}{dt} \vec{k}.$$

Вектор функцияни дифференциаллашнинг асосий қондаларини келтирамиз (бунда $\vec{a} = \vec{a}(t)$, $\vec{b} = \vec{b}(t)$):

$$1. \frac{d}{dt} (\vec{a} \pm \vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{dt} \pm \frac{d\vec{b}}{dt}.$$

$$2. \frac{d\vec{c}}{dt} = 0, \text{ бу ерда } \vec{c} \text{ — ўзгармас вектор.}$$

$$3. \frac{d}{dt} (\alpha \vec{a}) = \alpha \frac{d\vec{a}}{dt}, \text{ бу ерда } \alpha \text{ — ўзгармас сон.}$$

4. $\frac{d}{dt} (\varphi \vec{a}) = \vec{a} \frac{d\varphi}{dt} + \varphi \frac{d\vec{a}}{dt}$, бу ерда $\varphi = \varphi(t)$ — t нинг скаляр функцияси.

$$5. \frac{d}{dt} (\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot \frac{d\vec{b}}{dt} + \frac{d\vec{a}}{dt} \cdot \vec{b}.$$

$$6. \frac{d}{dt} (\vec{a} \times \vec{b}) = \left(\frac{d\vec{a}}{dt} \times \vec{b} \right) + \left(\vec{a} \times \frac{d\vec{b}}{dt} \right).$$

7. $\frac{d}{dt} \vec{a}(\varphi(t)) = \frac{d\vec{a}}{dt} \cdot \frac{d\varphi}{dt}$, бу ерда $\varphi = \varphi(t)$ — t нинг скаляр функцияси.

Агар $\vec{r} = \vec{r}(t) = \{x(t), y(t), z(t)\}$ бўлса, у ҳолда $\frac{d\vec{r}}{dt}$ ҳосила вектор бўлиб, $\vec{r}(t)$ вектор функциянинг годографига ўтказилган уринма бўйлаб t параметрнинг ўсиши тарафига йўналган бўлади.

1-мисол. $\vec{r} = (t^2 - 1)\vec{i} + (t + 1)\vec{j} + t^3\vec{k}$ вектор функциянинг $t = 1$ даги бирлик уринма векторини топинг.

Ечиш. \vec{r} векторнинг годографига уринма бирлик векторни топамиз:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = 2t\vec{i} + \vec{j} + 3t^2\vec{k}$$

Бу векторнинг модулини ҳисоблаймиз:

$$\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \sqrt{4t^2 + 1 + 9t^4}$$

$\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right|$ нинг $t=1$ даги қиймати $\sqrt{14}$ га тенг, $\left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_{t=1} = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$

Шундай қилиб, изланаётган бирлик вектор бундай ёзилади:

$$\frac{1}{\sqrt{14}} (2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k})$$

2-мисол. $\vec{r}(t) = \vec{i}\cos t + \vec{j}\sin t + \vec{k}$ ва $\frac{d\vec{r}}{dt}$ векторлар ўзаро перпендикуляр векторлар эканлигини кўрсатинг.

Ечиш. Берилган скаляр аргументли функция ҳосиласини топамиз: $\frac{d\vec{r}}{dt} = -\vec{i}\sin t + \vec{j}\cos t$. Энди $\vec{r}(t)$ ва $\frac{d\vec{r}}{dt}$ векторларнинг $\vec{r} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}$ — скаляр қўнаймасини ҳисоблаймиз.

$\vec{r} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = -\cos t \cdot \sin t + \sin t \cdot \cos t = 0$. Демак, \vec{r} ва $\frac{d\vec{r}}{dt}$ векторлар ўзаро перпендикуляр экан.

1-дарсхона топшириғи

1. Вектор функцияларнинг ҳосилаларини топинг:

а) $\vec{r} = \sin t \cdot \vec{i} + \cos^2 t \cdot \vec{j} + \sin t \cos t \cdot \vec{k}$;

б) $\vec{r} = (t + \cos t)\vec{i} + t\vec{j} + \sin t \cdot \vec{k}$;

в) $\vec{r} = e^t \vec{i} + \cos t \cdot \vec{j} + (t^2 + 1)\vec{k}$.

Ж: а) $\frac{d\vec{r}}{dt} = \cos t \vec{i} - \sin 2t \vec{j} + \cos 2t \vec{k}$;

б) $\frac{d\vec{r}}{dt} = (1 - \sin t)\vec{i} + \vec{j} + \cos t \cdot \vec{k}$;

в) $\frac{d\vec{r}}{dt} = e^t \vec{i} - \sin t \vec{j} + 2t \vec{k}$.

2. Ҳаракат қилаётган моддий нуктанинг t вақтдаги радиус-вектори $\vec{r}(t) = a(t - \sin t)\vec{i} + a(1 - \cos t)\vec{j}$ тенглама билан берилган. $t = \frac{\pi}{2}$ ва $t = \pi$ лар учун $\frac{d\vec{r}}{dt}$ векторини топинг.

Ж: $a(\vec{i} + \vec{j})$; $2a\vec{i}$.

3. $\vec{r} = e^{2t}\vec{i} - (t+8)^{\frac{4}{3}}\vec{j}$ вектор функция годографига $t=0$ даги бирлик уринма векторни топинг.

Ж: $0.6\vec{i} - 0.8\vec{j}$.

1. Вектор функциянинг ҳосиласини топинг:

$$\vec{r} = i\text{ch}^2 t + \vec{j}\text{sh}t\text{cht} + \vec{k}\text{sh}2t.$$

Ж: $\frac{d\vec{r}}{dt} = \text{sh}2t\vec{i} + \vec{j}\text{cht} + \vec{k}\text{sh}2t.$

2. Агар $\vec{r} = \vec{i}\text{sh}t + \vec{j}\text{cht} + \vec{k}\sqrt{\text{ch}^2 t - 3\text{sh}^2 t}$ бўлса, $\frac{d(\vec{r}^2)}{dt}$ ни топинг.

Ж: 0.

3. Агар $\vec{r}_1 = \vec{i}t + \vec{j}t^2 + \vec{k}t^3$, $\vec{r}_2 = \vec{i}t^2 + \vec{j}t^3 + \vec{k}t$ бўлса, $\frac{d(\vec{r}_1 \times \vec{r}_2)}{dt}$ ни топинг.

Ж: $\frac{d(\vec{r}_1 \times \vec{r}_2)}{dt} = 3(t^2 - 2t^5)\vec{i} + (5t^4 - 2t)\vec{j}.$

4. $\vec{r} = 2t \cdot \vec{i} + \vec{j}\ln t + \vec{k} \cdot t^2$ вектор функциянинг $t=1$ даги уринма векторининг йўналирувчи косинусларини топинг:

Ж: $\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}.$

2- §. Скаляр аргументли вектор функция ҳосиласининг татбики

5.2.1. Кинематикада моддий нукта ҳаракатини ўрганишда унинг \vec{r} радиус-вектори t вақтнинг функцияси бўлиб, $\vec{r} = \vec{r}(t)$ тенглама ҳаракат тенгламаси дейилади, $\vec{r} = \vec{r}(t)$ вектор-функциянинг годографи ҳаракат йўлининг шаклини (траекториясини) аниқлайди.

Агар t скаляр аргумент вақт деб қаралса, у ҳолда $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$ — \vec{r} вектор охирининг тезлик вектори, $\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{\omega}$ эса тезланиш вектори дейилади.

1- мисол. Моддий нуктанинг ҳаракат тенгламаси $\vec{r} = 2(t - \sin t)\vec{i} + 2(1 - \cos t)\vec{j}$ кўринишда берилган. Ихтиёрий вақтдаги тезлик ва тезланишни топинг.

Ечиш. \vec{v} тезлик ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2(1 - \cos t)\vec{i} + 2\sin t \cdot \vec{j}.$$

Тезланиш эса,

$$\vec{\omega} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 2\sin t\vec{i} + 2\cos t\vec{j}.$$

5.2.2. $\vec{r} = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$ фазовий эгри чизикнинг t_0 параметрга мос келадиган $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктасидаги уринма тенгламаси ушбу кўринишга эга:

$$\frac{x-x_0}{x_0} = \frac{y-y_0}{y_0} = \frac{z-z_0}{z_0},$$

бу ерда $x_0 = x(t_0)$, $y_0 = y(t_0)$, $z_0 = z(t_0)$,

$$x_0 = \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=t_0}; \quad y_0 = \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=t_0}; \quad z_0 = \left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=t_0};$$

x , y , z — уринма нуктасининг ўзгарувчи координаталари.

Уриниш нуктасидан ўтиб, уринмага перпендикуляр бўлган текислик *нормал текислик* дейилади.

Эгри чизикнинг $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктасидаги нормал текислик тенгламаси ушбу кўринишга эга:

$$x_0(x-x_0) + y_0(y-y_0) + z_0(z-z_0) = 0.$$

2-мисол. Параметр $t = \frac{\pi}{4}$ га тенг бўлганда $x = a \sin^2 t$, $y = b \sin t \cos t$, $z = c \cos^2 t$ фазовий эгри чизикка ўтказилган уринма ва нормал текисликларнинг тенгламаларини тузинг.

Ечиш. Тегинли ҳосилаларни топамиз:

$$\dot{x} = a \cdot \sin 2t, \quad \dot{y} = b \cos 2t, \quad \dot{z} = -c \sin 2t$$

$t = \frac{\pi}{4}$ нуктада $x_0 = \frac{a}{2}$, $y_0 = \frac{b}{2}$, $z_0 = \frac{c}{2}$; $\dot{x}_0 = a$, $\dot{y}_0 = 0$; $\dot{z}_0 = -c$ бўлади, демак, уринманинг тенгламаси:

$$\frac{x - \frac{a}{2}}{a} = \frac{y - \frac{b}{2}}{0} = \frac{z - \frac{c}{2}}{-c}.$$

нормал текислик тенгламаси:

$$a\left(x - \frac{a}{2}\right) - c\left(z - \frac{c}{2}\right) = 0$$

ёки

$$ax - cz - \frac{a^2 - c^2}{2} = 0.$$

Шундай қилиб, уринма Oy ўқка перпендикуляр, нормал текислик эса Oy ўқка параллел экан.

2- дарсхона топшириги

1. Ҳаракатдаги моддий нуктанинг радиус-вектори $\vec{r} = 4t\vec{i} - 3t\vec{j}$ тенглама билан берилган. Ҳаракат тезлиги ва тезланишини топинг.

$$\text{Ж: } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 4\vec{i} - 3\vec{j}; \quad \vec{\omega} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}.$$

2. Моддий нуктанинг ҳаракат тенгламаси $\vec{r} = 3t\vec{i} + (4t - t^2)\vec{j}$ кўринишда берилган. Унинг тезлиги ва тезланишини топинг.

$$\text{Ж: } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 3\vec{i} + 2(2 - t)\vec{j}; \quad \vec{\omega} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -2\vec{j}.$$

3. $\vec{r} = a\cos t\vec{i} + b\sin t\vec{j}$ ҳаракат тенгламаси берилган. Ҳаракат тезлиги ва тезланишини топинг.

$$\text{Ж: } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -a\sin t \cdot \vec{i} + b\cos t \cdot \vec{j};$$

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -a\cos t \vec{i} - b\sin t \cdot \vec{j}.$$

4. Берилган нуктадан ўтувчи уринма ва нормал текислик тенгламаларини тузинг:

а) $x = 4\sin^2 t, y = 2\sin 2t, z = 2\cos^2 t, t = 0$ да;

б) $x = \frac{1}{2}t^2, y = \frac{1}{3}t^3, z = \frac{1}{4}t^4, t = 2$ да;

в) $x = a \cdot \text{cht}, y = a \cdot \text{sht}, z = at, t = 0$ да.

Ж: а) $\frac{x}{0} = \frac{y}{4} = \frac{z-2}{0}$ (уринма),

$$y = 0 \quad (\text{нормал текислик});$$

б) $\frac{x-2}{1} = \frac{y-\frac{8}{3}}{2} = \frac{z-4}{4}, \quad 3x + 6y + 12z - 70 = 0;$

в) $\frac{x-a}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1},$

$$y + z = 0.$$

2- мустақил иш

1. $\vec{r} = 2\cos t \cdot \vec{i} + \sin t \cdot \vec{k}$ ҳаракат тенгламаси берилган. Ҳаракат тезлиги ва тезланишини аниқланг.

$$\text{Ж: } \vec{v} = -2\sin t \cdot \vec{i} + \cos t \cdot \vec{k},$$

$$\vec{\omega} = -2\cos t \cdot \vec{i} - \sin t \cdot \vec{k}.$$

2. Ҳаракат тенгламаси берилган: $\vec{r} = (2t^2 - 3)\vec{i} - 3t\vec{j} + (4t^2 - 5)\vec{k}$. Ҳаракат тезлиги ва тезланишини аниқланг.

$$\text{Ж: } \vec{v} = 4t\vec{i} - 6t\vec{j} + 8t\vec{k};$$

$$\vec{\omega} = 4\vec{i} - 6\vec{j} + 8\vec{k}.$$

3. Моддий нукта харакатининг $\vec{r} = \cos^3 t \cdot \vec{i} + \sin^2 t \cdot \vec{j}$ тенгламаси-
ни билган ҳолда, унинг параметрнинг $t = \frac{\pi}{6}$ ва $t = \frac{\pi}{4}$ кийматлар-
даги тезлик ва тезланиш векторларини топинг.

$$\text{Ж: } t = \frac{\pi}{6} \text{ да: } \vec{v} = -\frac{9}{8}\vec{i} + \frac{3\sqrt{3}}{8}\vec{j},$$

$$\vec{w} = -\frac{3\sqrt{3}}{8}\vec{i} + \frac{15}{6}\vec{j};$$

$$t = \frac{\pi}{4} \text{ да: } \vec{v} = -\frac{3\sqrt{2}}{4}\vec{i} + \frac{3\sqrt{2}}{4}\vec{j},$$

$$\vec{w} = \frac{3\sqrt{2}}{4}\vec{i} + \frac{3\sqrt{2}}{4}\vec{j}.$$

4. Эгри чизикка берилган нуктада ўтказилган уринма ва
нормал текислик тенгламаларини тузинг.

$$\text{а) } x = \cos^2 \frac{t}{2}, y = \sin t, z = \sin \frac{t}{2}, t = \pi \text{ да;}$$

$$\text{б) } x = t, y = t^2, z = t^3, t = 1 \text{ да.}$$

$$\text{Ж: а) } \frac{x}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{0}; y = 0;$$

$$\text{б) } \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}, x + 2y + 3z - 6 = 0.$$

6- намунавий ҳисоб топшириқлари

1. Биринчи тартибли ҳосилани топинг:

$$1.1. y = \sqrt{x^2 + 3x} - \sqrt[5]{(6x-1)^2}$$

$$1.2. y = \frac{2x}{\sqrt{1+x}} - 4\sqrt{1+x}$$

$$1.3. y = \sqrt[3]{\frac{1+x^3}{1-x^3}}$$

$$1.4. y = \sqrt{x} + \sqrt{x}$$

$$1.5. y = \sqrt{x^2+1} + \sqrt[3]{x^3+1}$$

$$1.6. y = x\sqrt{1+x^2}$$

$$1.7. y = 5\sqrt[5]{4x+3} - \frac{2}{\sqrt{x^2+x+1}}$$

$$1.8. y = 3\sqrt{x^5+5x^4} - \frac{5}{x}$$

$$1.9. y = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}}$$

$$1.10. y = x + \sqrt[5]{\frac{1+x^5}{1-x^5}}$$

$$1.11. y = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$1.12. y = \frac{x-1}{x+1} \sqrt{x^2-6}$$

$$1.13. y = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$$

$$1.14. y = \frac{2}{\sqrt{x^3-x+1}}$$

$$1.15. y = \frac{5}{\sqrt[4]{(2-x^2)^3}}$$

$$1.16. y = \frac{x}{2} \sqrt{x^2+4}$$

$$1.17. y = 2\sqrt[3]{(2-x^3)^2}$$

$$1.18. y = \sqrt[3]{x} \sqrt{x^2+1}.$$

$$1.19. y = \frac{1}{\sqrt{4x-x^2}}.$$

$$1.20. y = \sqrt[4]{\frac{1+x^4}{1-x^4}}.$$

$$1.21. y = \frac{x}{\sqrt{9-x^2}}.$$

$$1.22. y = \frac{1}{\sqrt{9x+4}} + \frac{12}{\sqrt{x^3+10}}.$$

$$1.23. y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}.$$

$$1.24. y = \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-1}}.$$

$$1.25. y = \left(\frac{x-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}} \right)^2.$$

$$1.26. y = \sqrt{(2x-3)(3-x)^2}.$$

$$1.27. y = \frac{\sqrt{2x-1}}{x+1}.$$

$$1.28. y = \left(\frac{x}{3-4x} \right)^3.$$

$$1.29. y = (\sqrt{x}+1) \left(\frac{1}{\sqrt{x}}-1 \right)$$

$$1.30. y = \frac{9}{\sqrt{x^2-4x-5}}.$$

2. Биринчи тартибли y' ҳосилани топинг:

$$2.1. y = \frac{1+\operatorname{tg}x}{1-\operatorname{tg}x}.$$

$$2.2. y = \sin^3 2x.$$

$$2.3. y = e^{1+\ln^2 x}.$$

$$2.4. y = \operatorname{tg} \ln \sqrt{x}.$$

$$2.5. y = \sin \sqrt{1+x^2}.$$

$$2.6. y = \cos \ln^2 x.$$

$$2.7. y = \frac{1+\sin 3x}{1-\sin 3x}.$$

$$2.8. y = \sqrt{1+\ln^2 x}.$$

$$2.9. y = x \operatorname{arcsin} \frac{2x+1}{3}.$$

$$2.10. y = e^{-x^2} \cos^3(2x+3).$$

$$2.11. y = \frac{1+e^{-x}}{1-e^{-x}}.$$

$$2.12. y = \sin^2 3x.$$

$$2.13. y = \sqrt{1-\ln^3 x}.$$

$$2.14. y = \frac{4 \ln x}{1-\ln x}.$$

$$2.15. y = \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x - \operatorname{tg} x + x.$$

$$2.16. y = \ln \sqrt{\frac{1+\operatorname{tg} x}{1-\operatorname{tg} x}} - x.$$

$$2.17. y = \ln \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\cos x}}.$$

$$2.18. y = \ln(e^x + \sqrt{1+e^{2x}}).$$

$$2.19. y = \frac{\ln x}{\sqrt{x^2-1}}.$$

$$2.20. y = \operatorname{tg}^2(x^3+1)$$

$$2.21. y = \sqrt[3]{\operatorname{tg}^2 3x}$$

$$2.22. y = 5^{\frac{1}{\sin^2 x}}.$$

$$2.23. y = \sin^6 10x + \cos^6 10x.$$

$$2.24. y = \sqrt[3]{\operatorname{tg} 6x + 1}.$$

$$2.25. y = e^{\sin x - \cos x} \cdot (\sin x + \cos x)$$

$$2.26. y = \frac{\sin^{\frac{x}{4}}}{1 + \cos^{\frac{x}{4}}}$$

2.27. $y = e^{2x} (3\sin 2x - \cos 2x)$.

2.29. $y = \frac{1}{10} \cdot \frac{1 + \operatorname{tg} 5x}{1 - \operatorname{tg} 5x}$

2.28. $y = \sqrt{1 + \sin 4x} - \sqrt{1 - \sin 4x}$

2.30. $y = \frac{1}{\sin^2 10x}$

3. Биринчи тартибли y' ҳосилани топинг:

3.1. $y = \operatorname{arctg} \sqrt{x} - \sqrt{x}$

3.17. $y = \frac{4 \ln x}{1 - \ln x}$

3.2. $y = x \cdot \arcsin x + \sqrt{1 - x^2}$

3.18. $y = 7^{x^2 + 2x}$

3.3. $y = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$

3.19. $y = e^{-x} \cdot \ln x$

3.4. $y = 3^{\cos^2 x}$

3.20. $y = \frac{x}{\sqrt{8 - x^2}}$

3.5. $y = \ln \operatorname{ctg} \sqrt[3]{x}$

3.21. $y = \frac{2}{5} \ln^2 (3 \operatorname{ctg} 5x + 2)$

3.6. $y = (e^{\sin x} - 1)^2$

3.22. $y = \ln^5 \sqrt{\frac{10}{e^{3x} - e^{-5x}}}$

3.7. $y = x^3 \sqrt{\frac{2}{1+x}}$

3.23. $y = \frac{1}{3} \ln \frac{x+1}{\sqrt{x^2 - 2x}}$

3.8. $y = e^{\frac{1}{x^2}}$

3.24. $y = \ln \sqrt{1 + e^{2x} + e^{4x}}$

3.9. $y = e^{-\cos 5x}$

3.10. $y = x \cdot \operatorname{arctg}^3 5x + \ln \operatorname{tg} x$

3.25. $y = \ln^3 \sqrt{3 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 4}$

3.11. $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$

3.26. $y = \ln(\sqrt{2x+1} - \sqrt{2x})$

3.12. $y = x^2 e^{-2x}$

3.27. $y = (1 + \ln \sin 2x)^2$

3.13. $y = 2^{\frac{1}{x}}$

3.28. $y = \ln \sqrt{e^{2x} + e^{-2x}}$

3.14. $y = x \cdot \ln^{-\lambda} x$

3.29. $y = \ln^j (1 + e^i)$

3.15. $y = 3e^{\sin^2 x}$

3.30. $y = \ln \operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right)$

3.16. $y = \ln \frac{1+x}{1-x}$

4. Биринчи тартибли y' ҳосилани топинг:

4.1. $y = x^{\frac{1}{x}}$

4.5. $y = x^{\frac{1}{x^2}}$

4.2. $y = x^{e^x}$

4.6. $y = (\ln x)^x$

4.3. $y = x^{\arcsin x}$

4.7. $y = 2x^{\sqrt{x}}$

4.4. $y = (\cos x)^{\cos x}$

4.8. $y = (\cos x)^{\sqrt{x}}$

- 4.9. $y = (\sin x)^{\cos x}$.
- 4.10. $y = (\operatorname{arctg} 2x)^{\sin x}$.
- 4.11. $y = x^{\operatorname{arccos} x}$.
- 4.12. $y = x^{\lg x}$.
- 4.13. $y = (\ln(5x-4))^{\operatorname{arctg} x}$.
- 4.14. $y = (\sin(7x+4))^{\operatorname{arccos} x}$.
- 4.15. $y = (\operatorname{arcsin} 2x)^{\lg(x+1)}$.
- 4.16. $y = (\sin 3x)^{\operatorname{arccos} x}$.
- 4.17. $y = (\sqrt{3x+2})^{\operatorname{arctg} 3x}$.
- 4.18. $y = (\operatorname{arccos} x)^{\sqrt{\cos x}}$.
- 4.19. $y = (\operatorname{ctg} 2x^3)^{\sin \sqrt{x}}$.
- 4.20. $y = (\cos(x+5))^{\operatorname{arcsin} 3x}$.
- 4.21. $y = (\operatorname{tg} 3x^4)^{\sqrt{x+3}}$.
- 4.22. $y = (\ln(x+3))^{\sin \sqrt{x}}$.
- 4.23. $y = (\operatorname{arctg} 2x)^{\sin x}$.
- 4.24. $y = (\ln(7x+4))^{\lg x}$.
- 4.25. $y = (\ln(7x-5))^{\operatorname{arctg} 2x}$.
- 4.26. $y = (\operatorname{arcsin}(2+x))^{\ln(x+3)}$.
- 4.27. $y = (\operatorname{arccos}(x+2))^{\lg 3x}$.
- 4.28. $y = (\operatorname{arcsin} 5x)^{\lg \sqrt{x}}$.
- 4.29. $y = (\operatorname{ctg}(7x+4))^{\sqrt{x+3}}$.
- 4.30. $y = (\operatorname{ctg} 3x^4)^{\sqrt{x-3}}$.

5. Ошқормас ҳолда куйидаги тенгламалар билан берилган функцияларнинг биринчи тартибли y' ҳосиласини топинг:

- 5.1. $x \sin 2y - y \cos 2x = 10$.
- 5.2. $(e^y - x)^2 = x^2 + 4$.
- 5.3. $x \cdot \operatorname{tg} y - x^2 + y^2 = 4$.
- 5.4. $y - x^2 = \operatorname{arctg} y$.
- 5.5. $e^{xy} - x^2 + y^3 = 0$.
- 5.6. $y = x + x \sin y$.
- 5.7. $e^{2y} - e^{-3x} + \frac{y}{x} = 1$.
- 5.8. $e^y + 3x^2 e^{-y} = 4x$.
- 5.9. $\ln(x^2 + y^2) + \operatorname{arctg} \frac{x}{y} = 0$.
- 5.10. $x \sin y - y \cos x = 0$.
- 5.11. $3^{x+y} - xy \ln 3 = 15$.
- 5.12. $e^{xy} - x^2 + y^2 = 0$.
- 5.13. $y \sin x + \cos(x-y) = \cos y$.
- 5.14. $\cos(x-y) - 2x + 4y = 0$.
- 5.15. $xe^x + ye^x = xy$.
- 5.16. $\cos xy = \frac{y}{x}$.
- 5.17. $xy + \ln y - 2 \ln x = 0$.
- 5.18. $e^{x+y} = \sin \frac{y}{x}$.
- 5.19. $(x+y)^2 - (x-2y)^4 = 0$.
- 5.20. $y \ln x - x \ln y = x + y$.
- 5.21. $y^3 - 3y + 6x = 0$.
- 5.22. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5y$.
- 5.23. $x^2 + y^3 - 10x + y = 0$.
- 5.24. $x^2 = 6y - y^3$.
- 5.25. $x^2 - 2xy + y^4 = 1$.
- 5.26. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3 + \frac{1}{4}y^2$.
- 5.27. $y^3 - 3x^3 y + 9 = 0$.
- 5.28. $y \sin x = \cos y$.
- 5.29. $y^4 - 4x^2 y + 9 = 0$.
- 5.30. $\sqrt{x^3} + \sqrt{y^3} = \sqrt[3]{4}$.

6. Берилган функциянинг биринчи тартибли y' ва иккинчи тартибли y'' ҳосилаларини топинг:

6.1. $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$

6.2. $y = \frac{x}{x^2-1}$

6.3. $y = x^3 \ln x$

6.4. $y = \operatorname{arctg} \frac{2x}{1-x^2}$

6.5. $y = \operatorname{Intg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right)$

6.6. $y = xe^{x^2}$

6.7. $y = x \cdot \operatorname{arctg} x$

6.8. $y = x - \operatorname{arctg} x$

6.9. $y = \cos x - \frac{1}{3} \cos^3 x$

6.10. $y = \operatorname{arctg} x$

6.11. $y = \frac{x-1}{x+1} e^{-x}$

6.12. $y = \operatorname{arctg} x^2$

6.13. $y = x^2 \ln x$

6.14. $y = \sqrt{\frac{1-x^2}{x}}$

6.15. $y = \operatorname{Intg} 4x$

6.16. $y = \sqrt[3]{(1-x)^2}$

6.17. $y = \cos^2 x$

6.18. $y = x \cdot e^{\frac{1}{x}}$

6.19. $y = x \cdot e^{-x}$

6.20. $y = \ln(\ln x)$

6.21. $y = (1+x^2) \operatorname{arctg} x$

6.22. $y = e^{\sqrt{x}}$

6.23. $y = \frac{1}{1+x^2}$

6.24. $y = \sqrt{4-x^2}$

6.25. $y = \frac{1}{4+\sqrt{x}}$

6.26. $y = \sqrt{1-x^2} \cdot \operatorname{arcsin} x$

6.27. $y = x^x$

6.28. $y = \sin^4 x + \cos^4 x$

6.29. $y = \ln(x + \sqrt{x})$

6.30. $y = e^{-x} \sin x$

7. Параметрик кўринишда берилган y функциянинг x бўйича биринчи тартибли y' ва иккинчи тартибли y'' ҳосилаларини топинг:

7.1. $\begin{cases} x = \ln \cos 2t, \\ y = \sin^2 2t. \end{cases}$

7.2. $\begin{cases} x = 1 - e^{3t}, \\ y = \frac{1}{3} (e^{3t} + e^{-3t}). \end{cases}$

7.3. $\begin{cases} x = \frac{1-t}{t^2}, \\ y = \frac{1+t}{t^2}. \end{cases}$

7.4. $\begin{cases} x = \sin^3 4t, \\ y = \frac{1}{2} \cos^3 4t. \end{cases}$

7.5. $\begin{cases} x = \frac{1}{3} t^3 + t, \\ y = \ln(t^2 + 1). \end{cases}$

7.6. $\begin{cases} x = \operatorname{tg} t, \\ y = \frac{1}{\sin^2 t}. \end{cases}$

7.7. $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = t - \operatorname{arctg} t. \end{cases}$

7.8. $\begin{cases} x = \frac{\sin t}{1 + \sin t}, \\ y = \frac{\cos t}{1 + \sin t}. \end{cases}$

$$7.9. \begin{cases} x = 4 - e^{-2t}, \\ y = \frac{3}{e^{2t} + 1} \end{cases}$$

$$7.10. \begin{cases} x = 2(t - \sin t), \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases}$$

$$7.11. \begin{cases} x = t \cos t, \\ y = t \sin t \end{cases}$$

$$7.12. \begin{cases} x = \cos \frac{t}{2}, \\ y = t - \sin t \end{cases}$$

$$7.13. \begin{cases} x = t + \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$$

$$7.14. \begin{cases} x = t^2, \\ y = \frac{1}{3}t^3 - t \end{cases}$$

$$7.15. \begin{cases} x = \cos 3t, \\ y = \sin 3t \end{cases}$$

$$7.16. \begin{cases} x = \sin \frac{t}{2}, \\ y = \cos t \end{cases}$$

$$7.17. \begin{cases} x = e^{2t}, \\ y = \cos t \end{cases}$$

$$7.18. \begin{cases} x = \operatorname{tg} t + \operatorname{ctg} t, \\ y = 2 \ln \operatorname{ctg} t \end{cases}$$

$$7.19. \begin{cases} x = t^2 + 1; \\ y = e^{t^3} \end{cases}$$

$$7.20. \begin{cases} x = 3 \cos^2 t, \\ y = 2 \sin^3 t \end{cases}$$

$$7.21. \begin{cases} x = t + \ln \cos t, \\ y = t - \ln \sin t \end{cases}$$

$$7.22. \begin{cases} x = 2t - \sin 2t, \\ y = \sin t \end{cases}$$

$$7.23. \begin{cases} x = t + \frac{1}{2} \sin 2t, \\ y = \cos^3 t \end{cases}$$

$$7.24. \begin{cases} x = t^5 + 2t, \\ y = t^3 + 8t - 1 \end{cases}$$

$$7.25. \begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + t, \\ y = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{t} \end{cases}$$

$$7.26. \begin{cases} x = \arcsin(t^2 - 1), \\ y = \arccos 2t \end{cases}$$

$$7.27. \begin{cases} x = t^2 + t + 1, \\ y = t^3 + t \end{cases}$$

$$7.28. \begin{cases} x = \operatorname{ctg} t, \\ y = \frac{1}{\cos^2 t} \end{cases}$$

$$7.29. \begin{cases} x = \frac{2-t}{2+t^2}, \\ y = \frac{t^2}{2+t^2} \end{cases}$$

$$7.30. \begin{cases} x = 2 \cos^3 2t, \\ y = \sin^3 2t \end{cases}$$

3-§. Комплекс сонлар ва улар устида амаллар. Эйлер формулалари

5.3.1. $z = x + iy$ кўринишдаги ифода комплекс сон дейилади, бунда x ва y — хақиқий сонлар, i эса $i^2 = -1$ тенглик билан аниқланади ва у *мавхум бирлик* деб аталади.

x ва y сонлар z комплекс соннинг мос равишда ҳақиқий ва комплекс қисми дейилади ва $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$ кўринишда белгиланади.

Агар $y=0$ бўлса, $z=x$ — ҳақиқий сон, агар $x=0$ бўлса, $z=iy$ — соф мавҳум сон бўлади. Шундай қилиб, ҳақиқий ва мавҳум сонлар z комплекс соннинг хусусий ҳолидир.

Агар $z_1=x_1+iy_1$, ва $z_2=x_2+iy_2$ икки комплекс соннинг мос равишда ҳақиқий ва мавҳум қисмлари тенг бўлса, яъни $x_1=x_2$ ва $y_1=y_2$ бўлса, бу комплекс сонлар тенг дейилади, яъни $z_1=z_2$.

Мавҳум қисмларининг ишораси билангина фарк қилувчи $z=x+iy$ ва $\bar{z}=x-iy$ комплекс сонлар *қўшма комплекс сонлар* дейилади.

5.3.2. Агар $z_1=x_1+iy_1$ ва $z_2=x_2+iy_2$ иккита комплекс сон берилган бўлса, улар устида алгебраик амаллар қуйидагича бажарилади:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2),$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 + iy_1) - (x_2 + iy_2) = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2),$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1),$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}.$$

Комплекс сонларни даражага кўтариш иккиҳадни даражага кўтариш каби бажарилади, бунда i сонининг даражалари қуйидаги формулалар бўйича аниқланади:

$$i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1 \text{ ва ҳ. к.}$$

Умуман, $i^{4k} = 1$, $i^{4k+1} = i$, $i^{4k+2} = -1$, $i^{4k+3} = -i$.

1-мисол. Ушбу $z_1=3-i$, $z_2=-2+3i$, $z_3=4+3i$ комплекс сонлар берилган бўлсин. $z = \frac{z_1 - z_2 \cdot z_3}{z_1^2 + z_3}$ ни ҳисобланг.

Ечиш. Кетма-кет ҳисоблаймиз:

$$z_2 \cdot z_3 = (-2 + 3i)(4 + 3i) = (-8 - 9) + i(12 - 6) = -17 + 6i;$$


$$z_1 - z_2 \cdot z_3 = (3 - i) - (-17 + 6i) = (3 + 17) + i(-1 - 6) = 20 - 7i;$$

$$z_1^2 = (3 - i)^2 = 27 - 27i + 9i^2 - i^2 = (27 - 9) + i(-27 + 1) = 18 - 26i;$$

$$z_1^2 + z_3 = (18 - 26i) + (4 + 3i) = (18 + 4) + i(-26 + 3) = 22 - 23i.$$

Шундай қилиб,

$$\begin{aligned} z &= \frac{20 - 7i}{22 - 23i} = \frac{(20 - 7i)(22 + 23i)}{(22 - 23i)(22 + 23i)} = \frac{(440 + 161) + i(460 - 154)}{22^2 + 23^2} = \\ &= \frac{601}{1013} + i \frac{306}{1013}. \end{aligned}$$



22-шакл

z комплекс сонига мос ҳаёувчи N нуктанинг ҳолатини r ва φ кутб координаталари билан ҳам аниқлаш мумкин (22-шакл). Бунда координаталар бошидан N нуктагача булган масофага тенг $r = |ON|$ сони *комплекс соннинг модули* дейилади ва $|z|$ билан белгиланади; ON векторнинг Ox ўқининг мусбат йўналишини билан ҳосил қилган φ бурчак *комплекс соннинг аргументи* дейилади ва у $\text{Arg}z$ деб белгиланади.

Ҳар қандай $z = x + iy$ комплекс сон учун қуйидаги формулалар ўринлидир:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \text{tg} \varphi = \frac{y}{x}. \end{aligned}$$

бунда $\varphi = \text{arg}z$ нинг бош қиймати $0 \leq \text{arg}z < 2\pi$ шартни қаноатлантиради.

2-мисол. $z = -\sqrt{3} + i$ комплекс соннинг модули ва аргументини топинг.

Ечиш. $x = -\sqrt{3}$, $y = 1$ бўлганлиги учун $r = \sqrt{x^2 + y^2} = 2$

$\text{tg} \varphi = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ тенгламадан φ аргументни топамиз:

$$\varphi = -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5\pi}{6}.$$

Шундай қилиб, $r = 2$, $\varphi = \frac{5\pi}{6}$.

5.3.4. Комплекс соннинг $z = x + iy$ кўринишдаги ифодаси комплекс соннинг *алгебраик шакли* дейилади.

Комплекс соннинг $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ кўринишдаги ифодаси унинг *тригонометрик шакли* дейилади.

Эйлернинг

$$\cos \varphi + i \sin \varphi = e^{i\varphi}$$

5.3.3. Ҳар бир $z = x + iy$ комплекс сон геометрик жиҳатдан Oxy координаталар текислигининг (x, y) нуктаси ёки ON вектори билан тасвирланади. Комплекс сон тасвирланадиган Oxy текислиги *комплекс текислик* дейилади ва (z) каби белгиланади. $z = x$ ҳақиқий сонлар *ҳақиқий ўқ* деб аталувчи Ox ўқ нукталари билан тасвирланади. Соф мавҳум $z = iy$ сонлар *мавҳум ўқ* деб аталувчи Oy ўқнинг нукталари билан тасвирланади.

формуласидан фойдаланиб, комплекс сон ёзлишининг *кўрсаткичли шаклига* эга бўламиз:

$$z = re^{i\varphi}.$$

2- мисолда $z = -\sqrt{3} + i$ комплекс соннинг модули $r = 2$ ва аргументи $\varphi = \frac{5\pi}{6}$ эканини аниқлаган эдик.

Шуларни инобатга олсак, бу соннинг тригонометрик ва кўрсаткичли шакллари мос равишда қуйидагича бўлади:

$$z = 2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right), \quad z = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}.$$

5.3.5. Комплекс сонларни кўпайтириш, бўлиш, даражага кўтариш, улардан илдиз чиқаришда комплекс сон ёзлишининг тригонометрик ва кўрсаткичли шаклларида фойдаланилади:

Агар

$$z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1),$$

$$z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$$

бўлса, ушбу формулалар ўринлидир:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)) = r_1 \cdot r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)},$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2)) = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)},$$

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i\sin n\varphi) = r^n \cdot e^{in\varphi}.$$

Охириги формула *Муавр формуласи* дейилади.

Тригонометрик ёки кўрсаткичли шаклдаги комплекс сондан n даражали илдиз чиқариш учун ушбу формуладан фойдаланилади:

$$\begin{aligned} \omega_k &= \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r(\cos\varphi + i\sin\varphi)} = \sqrt[n]{r} (\cos\frac{\varphi + 2\pi k}{n} + \\ &+ i\sin\frac{\varphi + 2\pi k}{n}) = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{(\varphi + 2\pi k)}{n}} \end{aligned}$$

k га $0, 1, 2, \dots, n-1$ кийматлар бериб, илдизнинг n та ҳар хил кийматларига эга бўламиз (бунда $\sqrt[n]{r}$ арифметик илдиз).

Илдизнинг барча n та кийматларини тасвирловчи нукталарнинг геометрик талқини маркази кутбада, радиуси $\sqrt[n]{r}$ бўлган айланага ички чизилган мунтазам n бурчакнинг учларини англатишидан иборатдир.

3-мисол. $(-\sqrt{3} + i)^6$ ни ҳисобланг.

Ечиш. 2-мисол ва Муавр формуласидан фойдаланиб қуйидаги ечимга эга бўламиз:

$$\begin{aligned} z^6 &= 2^6 \left(\cos \frac{5\pi}{6} \cdot 6 + i \sin \frac{5\pi}{6} \cdot 6 \right) = 2^6 e^{5\pi i} = \\ &= 64 (\cos 5\pi + i \sin 5\pi) = -64. \end{aligned}$$

4-мисол. $\sqrt[3]{-1}$ ни топинг.

Ечиш. $z = -1$ сон учун $r = 1$, $\varphi = \pi$. Шу сабабли унинг тригонометрик шакли қуйидагича ёзилади:

$$z = 1 \cdot (\cos \pi + i \sin \pi).$$

n - даражали илдиз чиқариш формуласидан фойдаланиб, ушбуга эга бўламиз:

$$\begin{aligned} \omega_k &= \sqrt[3]{\cos \pi + i \sin \pi} = \cos \frac{\pi + 2\pi k}{3} + i \sin \frac{\pi + 2\pi k}{3} = \\ &= e^{\frac{i(\pi + 2\pi k)}{3}}, \text{ бунда } k = 0, 1, 2. \end{aligned}$$

k га кетма-кет 0, 1, 2 қийматларни бериб, илдизнинг учала қийматини топамиз:

$$\omega_0 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = e^{i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\omega_1 = \cos \pi + i \sin \pi = e^{i\pi} = -1,$$

$$\omega_2 = \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} = e^{-i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

5.3.6. Эйлернинг

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

формуласи даража кўрсаткичи комплекс ўзгарувчидан иборат кўрсаткичли функцияни тригонометрик функциялар орқали ифода-лайди. Тригонометрик функциялар $\cos \varphi$ ва $\sin \varphi$ кўрсаткичли функциялар орқали қуйидагича ифодаланadi:

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}.$$

3- дарсхона топшириғи

1. Агар $z_1 = 1 - i$, $z_2 = 3 + 4i$, $z_3 = -1 + 3i$ бўлса, $z = \frac{z_1 + 3z_2}{z_1 z_2 - z_3^2}$

нинг қийматини ҳисобланг.

Ж: $\frac{227}{274} + \frac{99}{274}i$

2. $z_1 = 3 - 2i$; $z_2 = 4 + i$; $z_3 = -2 + i$ комплекс сонлар берилган.

$$z = \frac{z_1(z_2 - z_3)}{z_3^2 + z_1}$$

ни ҳисобланг.

$$\text{Ж: } -\frac{45}{41} - \frac{87}{41}i.$$

3. (z) комплекс текисликда қуйида берилган шартларни каноатлантирувчи $z = x + iy$ нукталар соҳасини аниқланг:

а) $0 < \operatorname{Re} 3zi < 2$; б) $\operatorname{Im}(iz) \geq 2$;

в) $|z - 3 + 4i| < 3$; г) $1 < |z - i| 2$;

д) $2 < |z| < 3$,

$$0 \leq \operatorname{arg} z \leq \frac{\pi}{2}.$$

4. Қуйидаги комплекс сонларни тригонометрик ва кўрсаткичли шаклларда ифодаланг:

а) $z_1 = 3 - 3i$; б) $z_2 = -1 - i$; в) $z_3 = -i$; г) $z_4 = -2$.

Ж: а) $z_1 = 3\sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) = 3\sqrt{2} e^{-\frac{\pi}{4}i}$;

б) $z_2 = \sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) \right) = \sqrt{2} e^{-\frac{3\pi}{4}i}$;

в) $z_3 = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = e^{-\frac{\pi}{2}i}$;

г) $z_4 = 2(\cos\pi + i\sin\pi) = 2e^{i\pi}$.

5. Қуйидагиларни ҳисобланг:

а) $\sqrt[6]{-1}$; б) $\sqrt[3]{i}$; в) $\sqrt[4]{-1 + \sqrt{3}i}$.

Ж: а) $k=0, \omega_0 = \cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}$;

$$k=1, \omega_1 = \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2};$$

$$k=2, \omega_2 = \cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6};$$

$$k=3, \omega_3 = \cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6};$$

$$k=4, \omega_4 = \cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2};$$

$$k=5, \omega_5 = \cos\frac{11\pi}{6} + i\sin\frac{11\pi}{6};$$

$$\text{б) } k=0, \quad \omega_0 = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6};$$

$$k=1, \quad \omega_1 = \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6};$$

$$k=2, \quad \omega_2 = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2};$$

$$\text{в) } k=0, \quad \omega_0 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right);$$

$$k=1, \quad \omega_1 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right);$$

$$k=2, \quad \omega_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right);$$

$$k=3, \quad \omega_3 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right).$$

3- мустақил иш

1. Агар $z_1 = i - 1$, $z_2 = -2 + i$, $z_3 = 3 - 4i$ бўлса,

$$z = \frac{z_1(z_2 + z_3^2)}{z_1 - z_2}$$

ни топинг.

$$\text{Ж: } \frac{64}{5} - \frac{38}{5}i.$$

2. Агар $z_1 = -3 + i$, $z_2 = 4 - i$, $z_3 = 1 + 3i$ бўлса,

$$z = \frac{z_1 + z_2 z_3}{z_2^3 - z_3}$$

ни топинг.

$$\text{Ж: } -\frac{396}{5101} + \frac{812}{5101}i.$$

3. (z) комплекс текисликда қуйидаги шартларни қаноатлантирувчи $z = x + iy$ нукталар соҳасини аниқланг:

$$\text{а) } \operatorname{Re} \frac{1}{z} > 1; \quad \text{б) } \operatorname{Im}(2iz) > 3;$$

$$\text{в) } 3 < |z + 1 - 2i| < 4; \quad \text{г) } \frac{\pi}{2} \leq \operatorname{arg} z < \pi,$$

$$3 < |z| < 4$$

4. Комплекс сонларни тригонометрик ва кўрсаткичли шаклда ифодаланг:

$$\text{а) } z_1 = \frac{2}{1+i}; \quad \text{б) } z_2 = -\sqrt{3} - i;$$

$$в) z_3 = -\frac{1}{3}; \quad г) z_4 = 1 + \sqrt{3}i.$$

$$\text{Ж: а) } z_1 = \sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) \sqrt{2} e^{\frac{\pi}{4}i};$$

$$б) z_2 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i\sin \frac{5\pi}{6} \right) = 2e^{\frac{5\pi}{6}i};$$

$$в) z_3 = \frac{1}{3} (\cos \pi + i\sin \pi) = \frac{1}{3} e^{\pi i};$$

$$г) z_4 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i\sin \frac{\pi}{3} \right) = 2e^{\frac{\pi}{3}i}.$$

5. Қуйндагиларни ҳисобланг:

$$\text{а) } \sqrt{i}; \quad б) \sqrt[8]{1}; \quad в) \sqrt[4]{-1}.$$

$$\text{Ж: а) } k=0, \omega_0 = \cos \frac{\pi}{4} + i\sin \frac{\pi}{4};$$

$$k=1, \omega_1 = \cos \frac{5\pi}{4} + i\sin \frac{5\pi}{4};$$

$$\text{б) } k=0, \omega_0 = \cos 0^\circ + i\sin 0^\circ;$$

$$k=1, \omega_1 = \cos \frac{\pi}{4} + i\sin \frac{\pi}{4};$$

$$k=2, \omega_2 = \cos \frac{\pi}{2} + i\sin \frac{\pi}{2};$$

$$k=3, \omega_3 = \cos \frac{3\pi}{4} + i\sin \frac{3\pi}{4};$$

$$k=4, \omega_4 = \cos \pi + i\sin \pi;$$

$$k=5, \omega_5 = \cos \frac{5\pi}{4} + i\sin \frac{5\pi}{4};$$

$$k=6, \omega_6 = \cos \frac{3\pi}{2} + i\sin \frac{3\pi}{2};$$

$$k=7, \omega_7 = \cos \frac{7\pi}{4} + i\sin \frac{7\pi}{4};$$

$$\text{в) } k=0, \omega_0 = \cos \frac{\pi}{4} + i\sin \frac{\pi}{4};$$

$$k=1, \omega_1 = \cos \frac{3\pi}{4} + i\sin \frac{3\pi}{4};$$

$$k=2, \omega_2 = \cos \frac{5\pi}{4} + i\sin \frac{5\pi}{4};$$

$$k=3, \omega_3 = \cos \frac{7\pi}{4} + i\sin \frac{7\pi}{4};$$

БИР УЗГАРУВЧИ ФУНКЦИЯСИННИГ ИНТЕГРАЛ ҲИСОБИ

1-§. Аниқмас интеграл ва интеграллашнинг сода усуллари

6.1.1. Бирор ораликда аниқланган $f(x)$ функция учун бу ораликнинг ҳамма кийматларида

$$F'(x) = f(x) \text{ ёки } dF(x) = f(x)dx$$

шарт бажарилса, у ҳолда $F(x)$ функция $f(x)$ нинг *бошланғич функцияси* дейлади.

Агар $f(x)$ функция $F(x)$ бошланғич функцияга эга бўлса, у ҳолда $F(x) + C$ $f(x)$ нинг ҳамма бошланғич функциялари туплами бўлади, бунда C — ихтиёрӣ узгармас. Шунга кўра берилган $f(x)$ функциянинг ҳар қандай иккита бошланғич функцияси бир-биридан ихтиёрӣ узгармасга фарқ қилади.

$f(x)$ (ёки $f(x)dx$ ифода)дан олинган аниқмас интеграл деб, бу функциянинг барча $F(x) + C$ бошланғич функциялари тупламига айтилади ва бундай белгиланади: $\int f(x)dx = F(x) + C$.

Аниқмас интегрални топиш жараёни *интеграллаш* дейлади.

6.1.2. Аниқмас интегралнинг асосӣ хоссалари (интеграллаш қоидалари):

а) $(\int f(x)dx)' = f(x)$;

б) $d(\int f(x)dx) = f(x)dx$;

в) $\int dF(x) = F(x) + C$,

г) $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$ (k — узгармас);

д) $\int (f(x) \pm g(x))dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$;

е) агар $\int f(x)dx = F(x) + C$ ва $u = \Phi(x)$ ҳар қандай дифференциалланувчи функция бўлса, у ҳолда:

$$\int f(u) du = F(u) + C.$$

6.1.3. Аниқмас интеграллар жадвали:

1. $\int du = u + C$.

2. $\int u^\alpha du = \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1$

3. $\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C.$
4. $\int \frac{du}{\sqrt{u}} = 2\sqrt{u} + C.$
5. $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C.$
6. $\int e^u du = e^u + C.$
7. $\int \sin u du = -\cos u + C.$
8. $\int \cos u du = \sin u + C.$
9. $\int \frac{du}{\cos^2 u} = \operatorname{tg} u + C.$
10. $\int \frac{du}{\sin^2 u} = -\operatorname{ctg} u + C.$
11. $\int \operatorname{tg} u du = -\ln|\cos u| + C.$
12. $\int \operatorname{ctg} u du = \ln|\sin u| + C.$
13. $\int \frac{du}{\sin u} = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{u}{2} \right| + C = \ln \left| \frac{1}{\sin u} - \operatorname{ctg} u \right| + C.$
14. $\int \frac{du}{\cos u} = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{u}{2} \right) \right| + C = \ln \left| \frac{1}{\cos u} + \operatorname{tg} u \right| + C.$
15. $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arc} \operatorname{ctg} \frac{u}{a} + C = -\frac{1}{a} \operatorname{arc} \operatorname{ctg} \frac{u}{a} + C.$
16. $\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| + C.$
17. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \operatorname{arc} \sin \frac{u}{a} + C = -\operatorname{arc} \cos \frac{u}{a} + C.$
18. $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln \left| u + \sqrt{u^2 \pm a^2} \right| + C.$

Интеграллаш натижасининг тўғрилиги топилган бошланғич функцияни дифференциаллаш билан текширилади. Келтирилган жадвалда u эркин ўзгарувчини, шунингдек, дифференциалланувчи функцияни ифодалайди.

6.1.4. Интеграллашнинг қуйидаги содда усуллари келтирилмиз:

а) интеграл остидаги функцияни содда функциялар йнгиндисига ёйиш ва интегралларнинг хоссаларидан фойдаланиш усули;

б) дифференциал белгиси остига киритиш усули. Масалан:

$$dx = \frac{1}{k} d(kx + a), \text{ агар } a, k \text{ — ўзгармас бўлса;}$$

$$x dx = \frac{1}{2} d(x^2), \quad \cos x dx = d(\sin x),$$

$$\frac{dx}{x} = d(\ln x), \quad \frac{dx}{\cos^2 x} = d(\operatorname{tg} x), \quad \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$= d(\operatorname{arc} \operatorname{tg} x) \text{ ва } x \text{ к.}$$

1- м и с о л. $\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)} dx$ аниқмас интегрални топинг.

Ечиш. Интеграл остидаги функцияни шаклан алмаштириб, аниқмас интегралнинг д) хоссасидан фойдалансак:

$$\begin{aligned} \int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)} dx &= \int \frac{(1+x^2)+x^2}{x^2(1+x^2)} dx = \int \left[\frac{1+x^2}{x^2(1+x^2)} + \frac{x^2}{x^2(1+x^2)} \right] dx = \\ &= \int \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dx}{1+x^2} = -\frac{1}{x} + \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + C. \end{aligned}$$

2- м и с о л. $\int 4\cos^2 \frac{x}{2} dx$ аниқмас интегрални топинг.

Ечиш. Интеграл остидаги функцияни даражани пасайтириш формуласидан фойдаланиб алмаштирамиз:

$$2\cos^2 \frac{x}{2} = 1 + \cos x.$$

Сўнгра аниқмас интегралнинг г) ва д) хоссаларидан фойдалансак,

$$\begin{aligned} \int 4\cos^2 \frac{x}{2} dx &= \int 2(1 + \cos x) dx = 2 \int (1 + \cos x) dx = \\ &= 2 \int dx + 2 \int \cos x dx = 2x + 2\sin x + C. \end{aligned}$$

3- м и с о л. Аниқмас интегрални топинг:

$$\int 3^x \cdot e^{3x} dx.$$

Ечиш. $\int 3^x \cdot e^{3x} dx = \int (3 \cdot e^3)^x dx = \frac{(3e^3)^x}{\ln(3e^3)} + C.$

4- м и с о л. Аниқмас интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3x-5}}.$$

Ечиш. Дифференциал остига киритиш усулини қўлаймиз. Буни учун $dx = \frac{1}{3}d(3x-5)$ деб олиб, қадвалдаги (4) интегрални фойдаланамиз

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3x-5}} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x-5)}{\sqrt{3x-5}} = \frac{2}{3} \sqrt{3x-5} + C.$$

5- м и с о л. Аниқмас интегрални топинг:

$$\int \frac{x - \operatorname{ar} \sin x}{1-x^2} dx.$$

Ечиш. Ейиш ва дифференциал белгиси остига киритиш усулларидан биргаликда фойдаланамиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{x - \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} - \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} - \int \arcsin x d(\arcsin x) = \\ &= -\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2} \arcsin^2 x + C. \end{aligned}$$

6-ми с о л. Аниқмас интегрални топинг:

$$\int \frac{3x^2 - 4x}{x^3 - 2x^2 + 4} dx$$

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^2 - 4x}{x^3 - 2x^2 + 4} dx &= \int \frac{d(x^3 - 2x^2 + 4)}{x^3 - 2x^2 + 4} = \\ &= \ln|x^3 - 2x^2 + 4| + C. \end{aligned}$$

1-дарсхона топшириғи

Аниқмас интегралларни топинг, интеграллаш натижаларини дифференциаллаш билан текширинг:

1. $\int \left(4x^5 - 2\sqrt[3]{x^2} + \frac{3}{\sqrt[4]{x^3}} - \frac{5}{x^6} \right) dx.$

2. $\int (\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x)^2 dx.$

3. $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} dx.$

4. $\int \frac{(1+x^2)}{x(1+x^2)} dx.$

5. $\int \frac{dx}{(3x-4)^5}.$

6. $\int \operatorname{tg} 4x dx.$

7. $\int \frac{x^2 dx}{1+x^3}.$

8. $\int \frac{3^x}{\sqrt{9-9^x}} dx.$

9. $\int \frac{\sqrt{\arcsin x - x}}{1+x^2} dx.$

10. $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx.$

11. $\int \frac{dx}{(x-2)^2 + 4}.$

12. $\int \frac{dx}{x^2 + 6x + 13}.$

13. $\int \frac{dx}{\sqrt{8+6x-9x^2}}.$

14. $\int \cos^3 x dx.$

15. $\int \sin^2 x dx.$

1- м и с о л. $\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)} dx$ аниқмас интегрални топинг.

Ечиш. Интеграл остидаги функцияни шаклан алмаштириб, аниқмас интегралнинг д) хоссасидан фойдалансак:

$$\begin{aligned}\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)} dx &= \int \frac{(1+x^2)+x^2}{x^2(1+x^2)} dx = \int \left[\frac{1+x^2}{x^2(1+x^2)} + \frac{x^2}{x^2(1+x^2)} \right] dx = \\ &= \int \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dx}{1+x^2} = -\frac{1}{x} + \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + C.\end{aligned}$$

2- м и с о л. $\int 4\cos^2 \frac{x}{2} dx$ аниқмас интегрални топинг.

Ечиш. Интеграл остидаги функцияни даражани пасайтириш формуласидан фойдаланиб алмаштирамиз:

$$2\cos^2 \frac{x}{2} = 1 + \cos x.$$

Сўнгра аниқмас интегралнинг г) ва д) хоссаларидан фойдалансак,

$$\begin{aligned}\int 4\cos^2 \frac{x}{2} dx &= \int 2(1 + \cos x) dx = 2 \int (1 + \cos x) dx = \\ &= 2 \int dx + 2 \int \cos x dx = 2x + 2\sin x + C.\end{aligned}$$

3- м и с о л. Аниқмас интегрални топинг:

$$\int 3^x \cdot e^{3x} dx$$

Ечиш. $\int 3^x \cdot e^{3x} dx = \int (3 \cdot e^3)^x dx = \frac{(3e^3)^x}{\ln(3e^3)} + C$

4- м и с о л. Аниқмас интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3x-5}}$$

Ечиш. Дифференциал остига киритиш усулини қўлаймиз. Буни учун $dx = \frac{1}{3}d(3x-5)$ деб олиб, қадвалдаги (4) интегрални фойдаланамиз

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3x-5}} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x-5)}{\sqrt{3x-5}} = \frac{2}{3} \sqrt{3x-5} + C.$$

5- м и с о л. Аниқмас интегрални топинг:

$$\int \frac{x - \sin x}{1 - x^2} dx.$$

Ечиш. Ейиш ва дифференциал белгиси остига киритиш усулларидан биргаликда фойдаланамиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{x - \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} - \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} - \int \arcsin x d(\arcsin x) = \\ &= -\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2} \arcsin^2 x + C. \end{aligned}$$

6-мисол. Аниқмас интегрални топинг:

$$\int \frac{3x^2 - 4x}{x^3 - 2x^2 + 4} dx.$$

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^2 - 4x}{x^3 - 2x^2 + 4} dx &= \int \frac{d(x^3 - 2x^2 + 4)}{x^3 - 2x^2 + 4} = \\ &= \ln|x^3 - 2x^2 + 4| + C. \end{aligned}$$

1-дарсхона топшириғи

Аниқмас интегралларни топинг, интеграллаш натижаларини дифференциаллаш билан текширинг:

1. $\int \left(4x^5 - 2\sqrt[3]{x^2} + \frac{3}{\sqrt{x^3}} - \frac{5}{x^6} \right) dx.$

8. $\int \frac{3^x}{\sqrt{9-9^x}} dx.$

2. $\int (\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x)^2 dx.$

9. $\int \frac{\sqrt{\arcsin x} - x}{1+x^2} dx.$

3. $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} dx.$

10. $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx.$

4. $\int \frac{(1+x^2)}{x(1+x^2)} dx.$

11. $\int \frac{dx}{(x-2)^2 + 4}.$

5. $\int \frac{dx}{(3x-4)^5}.$

12. $\int \frac{dx}{x^2 + 6x + 13}.$

6. $\int \operatorname{tg} 4x dx.$

13. $\int \frac{dx}{\sqrt{8+6x-9x^2}}.$

7. $\int \frac{x^2 dx}{1+x^3}.$

14. $\int \cos^3 x dx.$

15. $\int \sin^2 x dx.$

Е чи ш. Илдиэ остидаги ифодани t^2 билан белгиласак,

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-9}} = \left\{ \begin{array}{l} 2x-9=t^2; \quad t=\sqrt{2x-9}; \\ x=\frac{1}{2}(t^2+9); \quad dx=tdt \end{array} \right\} =$$

$$= \int \frac{tdt}{\frac{1}{2}(t^2+9) \cdot t} = 2 \int \frac{dt}{9+t^2} = \frac{2}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{t}{3} + C =$$

$$= \frac{2}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{\sqrt{2x-9}}{3} + C.$$

4-мисол. Аникмас интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x-1}}$$

Е чи ш. $t = \frac{1}{x+1}$ янги ўзгарувчини киритамиз:

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x-1}} = \left\{ \begin{array}{l} t = \frac{1}{x+1}; \quad x = \frac{1}{t} - 1; \\ dx = -\frac{1}{t^2} dt \end{array} \right\} =$$

$$= \int \frac{-\frac{1}{t^2} dt}{\frac{1}{t} \sqrt{\left(\frac{1}{t} - 1\right)^2 + \frac{1}{t} - 1 - 1}} = - \int \frac{dt}{\sqrt{1-2t+t^2+t-2t^2}} =$$

$$= - \int \frac{dt}{\sqrt{1-t-t^2}} = - \int \frac{d\left(t+\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\frac{5}{4} - \left(t+\frac{1}{2}\right)^2}} = \operatorname{arc} \cos \frac{t+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + C =$$

$$= \operatorname{arc} \cos \frac{2t+1}{\sqrt{5}} + C = \operatorname{arc} \cos \frac{\frac{2}{x+1} + 1}{\sqrt{5}} + C =$$

$$= \operatorname{arc} \cos \frac{x+3}{\sqrt{5}(x+1)} + C.$$

6.2.2. Бўлаклаб интеграллаш усули

$$\int u dv = uv - \int v du$$

формулага асосланади, бунда u ва v — x ниңг интегралланувчи функциялари.

Бу усул ҳар хил синфдаги функциялар кўпайтмаларини интеграллашда фойдаланилади:

$$\int P_n(x) e^{ax} dx, \int P_n(x) \cos ax dx, \int P_n(x) \sin ax dx,$$

$$\int P_n(x) \operatorname{arc} \operatorname{tg} x dx, \int P_n(x) \operatorname{arc} \sin x dx,$$

$$\int P_n(x) \cos x dx, \int P_n(x) \ln x dx.$$

Дастлабки учта интегралда u учун $P_n(x)$ кўпхад қабул қилинади, охириг тўртта интегралда эса u учун $\arctg x$, $\arcsin x$, $\arccos x$, $\ln x$ қабул қилинади.

Баъзи ҳолларда бўлақлаб интеграллаш формуласини бир неча марта қўллаш зарур бўлади.

5- м и с о л. $\int x e^{-5x} dx$ ни тонинг.

Е ч и ш. $u = x$ ва $dv = e^{-5x} dx$ деб оламиз, у ҳолда

$$\int x e^{-5x} dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x, \quad du = dx, \\ dv = e^{-5x} dx, \quad v = \int e^{-5x} dx = -\frac{1}{5} e^{-5x} \end{array} \right\} =$$

$$= -\frac{x}{5} e^{-5x} - \frac{1}{25} e^{-5x} + C.$$

v ни топишда интеграллаш доимийсини хар доим нолга тенг деб ҳисоблаш мумкин.

6- м и с о л. $\int \arctg x dx$ ни тонинг.

Е ч и ш. $u = \arctg x$ деб оламиз, у ҳолда

$$\int \arctg x dx = \left\{ \begin{array}{l} u = \arctg x, \quad du = \frac{dx}{1+x^2}, \\ dv = dx, \quad v = \int dx = x \end{array} \right\} =$$

$$= x \cdot \arctg x - \int \frac{x dx}{1+x^2} = x \cdot \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} =$$

$$= x \cdot \arctg x - \frac{1}{2} \ln |1+x^2| + C.$$

7- м и с о л. $\int (x^2+1) \cos x dx$ интегрални тонинг.

Е ч и ш. Бу мисолда бўлақлаб интеграллаш формуласини икки марта қўллашга тўғри келади.

$$\int (x^2+1) \cos x dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x^2+1, \quad du = 2x dx; \\ dv = \cos x dx, \quad v = \sin x \end{array} \right\} =$$

$$= (x^2+1) \sin x - 2(-x \cdot \cos x + \int \cos x dx) =$$

$$= (x^2+1) \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C =$$

$$= 2x \cos x + (x^2-1) \sin x + C.$$

8- м и с о л. Аниқмас интегрални ҳисобланг:

$$\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx.$$

Е ч и ш. Бу интегрални икки марта бўлақлаб интеграллаймиз.

$$\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx = \left\{ \begin{array}{l} u = e^{\alpha x}, \quad du = \alpha e^{\alpha x} dx; \\ dv = \cos \beta x dx, \quad v = \frac{1}{\beta} \sin \beta x \end{array} \right\} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\beta} e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x - \frac{\alpha}{\beta} \int e^{\alpha x} \sin \beta x dx = \\
&= \left\{ \begin{array}{l} u = e^{\alpha x}, du = \alpha \cdot e^{\alpha x} dx \\ dv = \sin \beta x dx, v = -\frac{1}{\beta} \cos \beta x \end{array} \right\} = \\
&= \frac{1}{\beta} e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x - \frac{\alpha}{\beta} \left(-\frac{1}{\beta} e^{\alpha x} \cos \beta x + \frac{\alpha}{\beta} \int e^{\alpha x} \cos \beta x dx \right) = \\
&= \frac{e^{\alpha x}}{\beta^2} (\beta \sin \beta x + \alpha \cos \beta x) - \frac{\alpha^2}{\beta^2} \int e^{\alpha x} \cos \beta x dx.
\end{aligned}$$

Бунда

$$I = \int e^{\alpha x} \cos \beta x dx$$

деб ушбу тенгликка эга бўламиз:

$$I = \frac{e^{\alpha x}}{\beta^2} (\beta \sin \beta x + \alpha \cos \beta x) - \frac{\alpha^2}{\beta^2} I.$$

Бу тенгламани I га нисбатан ечсак,

$$I = \int e^{\alpha x} \cos \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}}{\alpha^2 + \beta^2} (\beta \sin \beta x + \alpha \cos \beta x) + C.$$

2- дарсхона топшириғи

Аниқмас интегралларни топинг:

- $\int \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{x+1}}$ Ж: $\frac{3}{2}(x+1)^{\frac{2}{3}} - 3(x+1)^{\frac{1}{3}} + 3 \ln |1 + \sqrt[3]{x+1}|$
- $\int \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}}$ Ж: $x + \frac{6}{5}x^{\frac{5}{6}} + \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}} + 2x^{\frac{1}{2}} + 3x^{\frac{1}{3}} + 6x^{\frac{1}{6}} + 6 \ln |\sqrt[6]{x} - 1| + C.$
- $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2+4}}$ Ж: $C - \frac{\sqrt{x^2+4}}{4x}.$
- $\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx.$ Ж: $C - \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} - \arcsin x.$
- $\int \frac{dx}{(x+1) \sqrt{1-x-x^2}}$ Ж: $C - \ln \left| \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{1-x-x^2}}{x+1} \right|.$
- $\int x \cdot \arcsin x dx$ Ж: $\frac{x^2+1}{2} \arcsin x - \frac{x}{2} + C.$
- $\int \frac{xdx}{\sin^2 x}.$ Ж: $C - x \cdot \operatorname{ctg} x + \ln |\sin x|.$

8. $\int \arcsin x dx$ Ж: $x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$.
9. $\int \frac{\ln^3 x}{x^2} dx$ Ж: $C - \frac{1}{x} (\ln^3 x + 3 \ln^2 x + 6 \ln x + 6)$.
10. $\int x^2 \sin x dx$ Ж: $C - x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x$.
11. $\int \sin \ln x dx$ Ж: $\frac{x}{2} (\sin \ln x - \cos \ln x) + C$.
12. $\int \sqrt{4+x^2} dx$ Ж: $\frac{x}{2} \sqrt{4+x^2} + 2 \ln|x + \sqrt{4+x^2}| + C$.

2- мустақил иш

Аниқмас интегралларни топинг:

1. $\int x \sqrt{x-1} dx$ Ж: $\frac{2}{5}(x-1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}} + C$.
2. $\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}}$ Ж: $2\sqrt{x} - 4\sqrt[4]{x} + 4 \ln|1 + \sqrt[4]{x}| + C$.
3. $\int x^2 \sqrt{4-x^2} dx$ Ж: $\frac{x}{4}(x^2-2) \sqrt{4-x^2} + 2 \arcsin \frac{x}{2} + C$.
4. $\int \frac{dx}{(x+1) \sqrt{x^2+2x+10}}$ Ж: $C - \frac{1}{3} \ln \left| \frac{3}{x+1} + \sqrt{\frac{9}{(x+1)^2} + 1} \right|$.
5. $\int \ln(x^2+1) dx$ Ж: $x \ln(x^2+1) - 2x + 2 \arctg x + C$.
6. $\int \frac{x \cos x}{\sin^3 x} dx$ Ж: $C - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{\sin^2 x} + \operatorname{ctg} x \right)$.
7. $\int e^{-\frac{x}{2}} \cdot x^2 dx$ Ж: $C - 2e^{-\frac{x}{2}}(x^2 + 4x + 8)$.
8. $\int \cos \ln x dx$ Ж: $\frac{x}{2} (\cos \ln x + \sin \ln x) + C$.

3- §. Каср-рационал функцияни энг содда касрларга ёйиш. Рационал функцияларни интеграллаш

6.3.1. Иккита кўпхаднинг нисбатига тенг

$$R(x) = \frac{Q_m(x)}{P_n(x)}$$

Функция каср-рационал функция ёки рационал каср дейилади, бунда m ва n $Q_m(x)$ ва $P_n(x)$ кўпхадларнинг даража кўрсаткичлари бўлиб, улар натурал сонлардир. $m < n$ да $R(x)$ каср-рационал функция тўғри каср, $m \geq n$ да эса нотўғри каср дейилади.

Куйидаги тўғри касрлар энг содда касрлар дейилади:

$$I. \frac{A}{x-\alpha}$$

$$II. \frac{A}{(x-\alpha)^k}, \text{ бунда } k \geq 2 - \text{ бутун сон.}$$

$$III. \frac{Ax+B}{x^2+px+q}, \text{ бунда } D=p^2-4q < 0.$$

$$IV. \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^s}, \text{ бунда } s \geq 2 - \text{ бутун сон, } D=p^2-4q < 0.$$

Юқоридаги касрларда A, B, p, q, α — ҳақиқий сонлар.

6.3.2. Ҳар қандай ҳақиқий коэффициентли n -даражали $P_n(x)$ кўпхад ҳақиқий сонлар тўпламида ушбу кўринишда тасвирлаши мумкин:

$$P_n(x) = a_0(x-\alpha_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x-\alpha_p)^{k_p} (x^2+px+q)^{s_1} \cdot \dots \cdot (x^2+px+q)^{s_l},$$

бунда $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ — $P_n(x)$ кўпхаднинг мос равишда k_1, \dots, k_p каррალი ҳақиқий илдиэлари, ҳамма квадрат учхадлар учун дискриминант $D_i < 0$ ($i=1, l$); $k_1 + \dots + k_p + 2s_1 + \dots + 2s_l = n$; $k_1, \dots, k_p, s_1, \dots, s_l$ — натурал сонлар; a_0 — $P_n(x)$ кўпхадда x^n олдидаги коэффициент.

Агар $R(x) = \frac{Q_m(x)}{P_n(x)}$ тўғри рационал касрнинг махражи $P_n(x)$

юқорида кўрсатилгандек ифодаланган бўлса, у ҳолда бундай касрни I — IV кўринишдаги энг содда рационал касрлар йиғиндисига ёйиш мумкин. Бу ёйилмада $P_n(x)$ кўпхаднинг ҳар бир k каррალი илдиэига, яъни $(x-\alpha)^k$ кўринишдаги кўпайтувчига, ушбу k та касрлар йиғиндисини мос келади:

$$\frac{A_1}{x-\alpha} + \frac{A_2}{(x-\alpha)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x-\alpha)^k}$$

$P_n(x)$ кўпхаднинг s каррალი комплекс кўшма илдиэининг ҳар бир жуфтига, яъни $(x^2+px+q)^s$ кўринишдаги кўпайтувчига ушбу s та касрдан иборат йиғиндини мос келади:

$$\frac{M_1x+N_1}{x^2+px+q} + \frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^2} + \dots + \frac{M_sx+N_s}{(x^2+px+q)^s}$$

Ёйилмадаги A_i, N_i, M_i коэффициентларни топишда хусусий усуллар ёрдамида ёки номаълум коэффициентлар усулидан фойдаланилади. Баъзан бу икки усул биргаликда қўлланилади.

$R(x) = \frac{Q_m(x)}{P_n(x)}$ рационал каср нотўғри каср бўлган ҳолда бутун

қисмини ажратиб, сўнгра тўғри каср қисми юқоридаги каби энг содда касрларга ёйилади.

$$R(x) = \frac{15x^2 - 4x - 81}{(x-3)(x+4)(x-1)}$$

рационал касрни энг содда касрларнинг йиғиндисига ёйинг.

Ечиш. Берилган $R(x)$ рационал каср тўғри каср. Махражининг ҳамма илдизлари (3, -4, 1) бир каррали (оддий) ва хакикий, шунинг учун

$$R(x) = \frac{15x^2 - 4x - 81}{(x-3)(x+4)(x-1)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+4} + \frac{C}{x-1}$$

бунда A, B, C — аникланиши керак бўлган коэффициентлар. Тенгликнинг ўнг қисмини умумий махражга келтириб, иккала қисмининг ҳам махражларини ташлаб юборсак:

$$\begin{aligned} 15x^2 - 4x - 81 &= A(x+4)(x-1) + \\ &+ B(x-3)(x-1) + C(x-3)(x+4) \end{aligned}$$

а) *Хусусий қийматлар усулининг* мазмуни шундаки, унда ҳосил бўлган айниятга x нинг ҳар хил (одатда махражнинг хакикий илдизлари) қийматлари кўйилади. Қаралаётган мисолда бу куйидагича амалга оширилади:

$$\begin{array}{l|l} x=3 & 42=14A, \\ x=-4 & 175=35B, \\ -x=1 & 70=-10C. \end{array}$$

Ҳосил қилинган тенгламалар системасидан $A=3, B=5, C=7$. Шундай қилиб,

$$R(x) = \frac{15x^2 - 4x - 81}{(x-3)(x+4)(x-1)} = \frac{3}{x-3} + \frac{5}{x+4} + \frac{7}{x-1}$$

б) *Номаълум коэффициентлар усулининг* моҳияти шундаки, унда ҳосил бўлган айниятда x нинг ўнгдаги ва чапдаги бир хил даражалари олдидаги коэффициентларни тенглаб, A, B, C коэффициентларни топиш учун тенгламалар системаси тузилади, яъни:

$$\begin{array}{l|l} x^2 & 15 = A + B + C, \\ x & -4 = 3A - 4B + C, \\ x^0 & -81 = -4A + 3B - 12D. \end{array}$$

Ҳосил бўлган тенгламалар системасини ечиб, $A=3, B=5, C=7$ эканини топамиз.

2- мисол. Ушбу рационал касрни содда касрлар йиғиндисига ёйинг:

$$R(x) = \frac{x}{(x-1)(x+1)^2}$$

Е чи ш. Тўғри рационал касрни қуйидагича ёямиз:

$$R(x) = \frac{x}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

Бундан

$$x = A(x+1)^2 + B(x-1)(x+1) + C(x-1).$$

Кoeffициентларни топиш учун юқорида баён қилинган иккала сулдан ҳам биргаликда фойдаланамиз:

$$\begin{array}{l|l} x=1 & 1=4A, \\ x=-1 & -1=-2C, \\ x^2 \text{ да} & 0=A+B. \end{array}$$

Системани ечсак, $A = \frac{1}{4}, B = -\frac{1}{4}, C = \frac{1}{2}$.

Демак,

$$R(x) = \frac{x}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{1}{4(x-1)} - \frac{1}{4(x+1)} + \frac{1}{2(x+1)^2}.$$

3-ми с о л. Қуйидаги рационал касрни содда касрларга ёйинг:

$$R(x) = \frac{x^4 + 4x^3 + 11x^2 + 12x + 8}{(x^2 + 2x + 3)^2(x+1)}$$

Е чи ш. Рационал каср тўғри касрдир, уни энг содда касрларга ёямиз:

$$R(x) = \frac{x^4 + 4x^3 + 11x^2 + 12x + 8}{(x^2 + 2x + 3)^2(x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+3} + \frac{Dx+E}{(x^2+2x+3)^2}$$

Ушбу

$$x^4 + 4x^3 + 11x^2 + 12x + 8 = A(x^2 + 2x + 3)^2 + (Bx + C)(x+1)(x^2 + 2x + 3) + (Dx + E)(x+1).$$

енгликдан фойдаланиб номаълум коэффицентларни топиш учун тенгламалар системасини тузамиз:

$$\begin{array}{l|l} x=-1 & 4=4A, \\ x^4 \text{ да} & 1=A+B \\ x^3 \text{ да} & 4=4A+2B+C, \\ x^2 \text{ да} & 11=10A+3B+3C+D \\ x \text{ да} & 12=12A+B+5C+D+E. \end{array}$$

Тенгламалар системасини ечсак,

$$A=1, B=0, C=0, D=1, E=-1.$$

Демак,

$$R(x) = \frac{x^4 + 4x^3 + 11x^2 + 12x + 8}{(x^2 + 2x + 3)^2(x+1)} = \frac{1}{x+1} + \frac{x-1}{(x^2 + 2x + 3)^2}$$

6.3.3. Тўғри рационал касрларни интеграллаш энг содда касрларни интеграллашга келтирилади.

I. $\int \frac{A dx}{x-\alpha} = A \ln|x-\alpha| + C.$

II. $\int \frac{A dx}{(x-\alpha)^k} = \frac{A}{(1-k)(x-\alpha)^{k-1}} + C,$

III. $\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx = \frac{A}{2} \ln|x^2+px+q| +$
 $+ \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x+\frac{p}{2}}{\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}} + C.$

IV. $\int \frac{(Ax+B) dx}{(x^2+px+q)^s} = \frac{A}{2} \int \frac{(2x+p) dx}{(x^2+px+q)^s} + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{d\left(x+\frac{p}{2}\right)}{\left(\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+q-\frac{p^2}{4}\right)^s},$

бунда

$a^2 = q - \frac{p^2}{4}$, $t = x + \frac{p}{2}$ белгилашлар киритиб, иккинчи интеграл

$I_s = \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^s}$ кўринишга келтирилади ва у куйидаги рекуррент формула ёрдамида топилади:

$$I_s = \frac{t}{2(s-1)a^2(t^2+a^2)^{s-1}} + \frac{2s-3}{2(s-1)a^2} I_{s-1}$$

4- мисол. Интегрални ҳисобланг: $\int \frac{3x-1}{x^2+4x+8} dx.$

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{3x-1}{x^2-4x+8} dx &= \int \frac{\frac{3}{2}(2x-4)+6-1}{x^2-4x+8} dx = \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{2x-4}{x^2-4x+8} dx + 5 \int \frac{dx}{x^2-4x+8} = \\ &= \frac{3}{2} \ln|x^2-4x+8| + 5 \int \frac{dx}{(x-2)^2+2^2} = \\ &= \frac{3}{2} \ln|x^2-4x+8| + \frac{5}{2} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x-2}{2} + C. \end{aligned}$$

5- м и с о л. Интегрални тошинг:

$$\int \frac{3x+2}{(x^2+2x+10)^2} dx.$$

Е ч и ш.

$$\begin{aligned} \int \frac{3x+2}{(x^2+2x+10)^2} dx &= \int \frac{\frac{3}{2}(2x+2) - 3 + 2}{(x^2+2x+10)^2} dx = \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{(2x+2)dx}{(x^2+2x+10)^2} - \int \frac{dx}{(x^2+2x+10)^2} = \frac{3}{2} \int \frac{d(x^2+2x+10)}{(x^2+2x+10)^2} - \\ &- \int \frac{d(x+1)}{[(x+1)^2+3^2]^2} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{x^2+2x+10} - I_2 \end{aligned}$$

Инда $I_2 = \int \frac{d(x+1)}{[(x+1)^2+3^2]^2}$, $s=2$, $u=x+1$ ва $a^2=9$ деб белгилаб,

қоридаги рекуррент формуладан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int \frac{du}{(u^2+9)^2} = \frac{1}{2 \cdot 9 \cdot 1} \left(\frac{u}{u^2+9} + (2 \cdot 2 - 3) I_1 \right) = \\ &= \frac{1}{18} \left(\frac{u}{u^2+9} + \int \frac{du}{u^2+9} \right) = \frac{1}{18} \left(\frac{u}{u^2+9} + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{u}{3} \right). \end{aligned}$$

Ўзгарувчи x га қайтсак,

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{18} \left(\frac{x+1}{(x+1)^2+9} + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{3} \right) = \\ &= \frac{1}{18} \left(\frac{x+1}{x^2+2x+10} + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{3} \right). \end{aligned}$$

Шундай қилиб,

$$\begin{aligned} \int \frac{(3x+2)dx}{(x^2+2x+10)^2} &= -\frac{3}{2(x^2+2x+10)} - \frac{x+1}{18(x^2+2x+10)} - \\ &- \frac{1}{54} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{3} + C. \end{aligned}$$

6.3.4. $\frac{Q_m(x)}{P_n(x)}$ рационал қасрни интеграллашдан олдин қуйидаги

гебранк алмаштиришлар ва ҳисоблашлар бажарилади:

а) берилган қаср тўғри қаср эканини текшириш; агар қаср тўғри бўлса, у ҳолда унинг бутун қисмини ажратиш, яъни

$$\frac{Q_m(x)}{P_n(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{P_n(x)}$$

шаклга келтириш, бунда $q(x)$ — кўпхад, $\frac{r(x)}{P_n(x)}$ эса тўғри рационал каср;

б) касрнинг махражи $P_n(x)$ ни $(x-\alpha)^k$ ва $(x^2+px+q)^s$ кўри-нишдаги чизикли ва квадрат кўпайтувчиларга ажратиш ($p^2-4q < 0$):

в) тўғри рационал касрни энг содда касрлар йигиндисига ёйиш;

г) ёйилманинг коэффициентларини ҳисоблаш.

б- м и с о л. Интегрални топинг:

$$\int \frac{x^5+1}{x^4-8x^2+16} dx.$$

Е ч и ш. Берилган рационал каср нотўғри каср бўлганлиги учун унинг бутун қисмини ажратамиз:

$$\frac{x^5+1}{x^4-8x^2+16} = \left| \frac{x^4-8x^2+16}{x} \right. \\ \left. \frac{x^5-8x^3+16x}{8x^3-16x+1} \right.$$

Демак,

$$\frac{x^5+1}{x^4-8x^2+16} = x + \frac{8x^3-16x+1}{x^4-8x^2+16} = \\ = x + \frac{8x^3-16x+1}{(x-2)^2(x+2)^2}.$$

Тўғри касрни энг содда касрлар йигиндисига ёямиз:

$$\frac{8x^3-16x+1}{(x-2)^2(x+2)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{x+2} + \frac{D}{(x+2)^2}.$$

Махражлардан қутулсак,

$$8x^3-16x+1 = A(x+2)^2(x-2) + B(x+2)^2 + \\ + C(x-2)^2(x+2) + D(x-2)^2.$$

Номаълум коэффициентларни топиш учун тенгламалар системасини тузамиз:

$$\begin{array}{l} x=2 \\ x=-2 \\ x^3 \text{ да} \\ x^2 \text{ да} \end{array} \left| \begin{array}{l} 33=16B, \\ -31=16D, \\ 8=A+C \\ 0=2A+B-2C+D. \end{array} \right.$$

Бу системани ечиб, коэффициентларни топамиз:

$$A = \frac{127}{32}, B = \frac{33}{16}, C = \frac{129}{32}, D = -\frac{31}{16}.$$

Демак.

$$\int \frac{(x^3+1)dx}{x^4-8x^2+16} = \int \left(x + \frac{127}{x-2} + \frac{33}{(x-2)^2} + \frac{129}{x+2} - \frac{31}{(x+2)^2} \right) dx = \frac{x^2}{2} + \frac{127}{32} \ln|x-2| - \frac{33}{16(x-2)} + \frac{129}{32} \ln|x+2| + \frac{31}{16(x+2)} + C.$$

3- дарсхона топшириги

Берилган аниқмас интегралларни топинг:

1. $\int \frac{x^3-3x^2-3x-2}{x^3-x^2-2x} dx.$ Ж: $\frac{(x+1)^2}{2} + \frac{1}{3} \ln \frac{|x|^3}{(x-2)^2(x+1)} + C.$
2. $\int \frac{2x^2-3x+3}{x^3-2x^2+x} dx.$ Ж: $C - \frac{2}{x-1} + \ln \frac{|x|^3}{|x-1|}.$
3. $\int \frac{x^3+1}{x(x-1)^3} dx.$ Ж: $C - \frac{x}{(x-1)^2} + \ln \frac{(x-1)^2}{|x|}.$
4. $\int \frac{xdx}{x^3+1}.$ Ж: $C + \frac{1}{6} \ln \frac{x^2-x+1}{(x+1)^2} + \frac{\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}}.$
5. $\int \frac{(x+1)dx}{(x^2+x+2)(x^2+4x+5)}.$ Ж: $C + \frac{2}{3\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{3} \operatorname{arctg}(x+2).$
- i. $\int \frac{dx}{(x+1)(x^2+x+1)^2}.$ Ж: $C + \frac{1}{2} \ln \frac{(x+1)^2}{x^2+x+1} + \frac{x+2}{3(x^2+x+1)} + \frac{5}{3\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}}.$

3- мустақил иш

аниқмас интегралларни топинг:

- $\int \frac{5x^3+9x^2-22x-8}{x^3-4x} dx.$ Ж: $5x + \ln x^2(x+2)^4|x-2|^3 + C.$
- $\int \frac{dx}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3}.$ Ж: $\frac{9x^2+50x+68}{4(x+2)(x+3)^2} + \frac{1}{8} \ln \left| \frac{(x+1)(x+2)^{16}}{(x+3)^{17}} \right| + C.$
- $\int \frac{dx}{(x^2-4x+4)(x^2-4x+5)}.$ Ж: $C - \frac{1}{x-2} - \operatorname{arctg}(x-2).$

$$4. \int \frac{dx}{(1+x)(1+x^2)(1+x^3)} \quad \text{Ж: } C - \frac{1}{6(1+x)} + \frac{1}{6} \ln \frac{(1+x)^2}{1-x+x^2} + \\ + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{3\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}}.$$

$$5. \int \frac{x^3+3}{(x+1)(x^2+1)} dx \quad \text{Ж: } \frac{x+2}{2(x^2+1)} + 2\operatorname{arctg} x + \ln \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x^2+1}} + C$$

$$6. \int \frac{(x+1)^4 dx}{(x^2+2x+2)^3} \quad \text{Ж: } \frac{3}{8} \operatorname{arctg}(x+1) - \frac{5x^3+15x^2+18x+8}{8(x^2+2x+2)^2} + C.$$

4-§. $\int R(\sin x, \cos x) dx$ кўринишдаги интеграллар

$\int R(\sin x, \cos x) dx$ кўринишидаги интеграллар (R — $\sin x$ ва $\cos x$ га нисбатан рационал функция) $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ алмаштириш ёрдамида рационал функцияларнинг интегралларига (3-§) келтирилади. Чунки,

$$\sin x = \frac{2\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2};$$

$$\cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2};$$

$$x = 2\operatorname{arctg} t; \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

Бундай алмаштириш кўп ҳолларда мураккаб ҳисоблашларга олиб келади. Шу сабабли баъзи хусусий ҳолларда кўрсатилган хилдаги интегралларни топишда қуйидаги содда ўрнига қўйишлардан фойдаланилади:

а) агар $R(\sin x, \cos x)$ ифода $\sin x$ га нисбатан тоқ функция, яъни

$$R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$$

бўлса, у ҳолда $\cos x = t$ ўрнига қўйиш бу функцияни рационаллаштиради;

б) агар $R(\sin x, \cos x)$ ифода $\cos x$ га нисбатан тоқ функция, яъни

$$R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$$

бўлса, у ҳолда интеграл $\sin x = t$ ўрнига қўйиш билан рационал функцияларни интеграллашга келтирилади;

в) агар $R(\sin x, \cos x)$ ифода $\sin x$ ва $\cos x$ га нисбатан жуфт функция, яъни

$$R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$$

бўлса, у ҳолда бу функция $\operatorname{tg}x = t$ ўрнига қўйиш билан рационаллаштирилади. Бу ҳолда

$$\cos^2 x = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{1 + t^2},$$

$$\sin^2 x = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{t^2}{1 + t^2},$$

$$x = \operatorname{arctg} t; \quad dx = \frac{dt}{1 + t^2}.$$

г) агар $R(\operatorname{tg}x)$ бўлса, у ҳолда интеграл остидаги ифода яна $\operatorname{tg}x = t$ ўрнига қўйиш билан рационаллаштирилади.

1- мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{4\sin x + 3\cos x + 5}.$$

Ечиш. $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ ўрнига қўйишдан фойдаланиб, интегрални тонамиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4\sin x + 3\cos x + 5} &= \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}; \\ dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right\} = \\ &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{4 \cdot \frac{2t}{1+t^2} + 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} + 5} = 2 \int \frac{dt}{2t^2 + 8t + 8} = \int \frac{dt}{t^2 + 4t + 4} = \\ &= \int \frac{dt}{(t+2)^2} = -\frac{1}{t+2} + C = C - \frac{1}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 2}. \end{aligned}$$

2- мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{(\sin x + \sin^3 x)}{\cos 2x} dx.$$

Ечиш. Интеграл остидаги функция $\sin x$ га нисбатан тоқ функция, шунинг учун $\cos x = t$ ўрнига қўйишдан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin x + \sin^3 x}{\cos 2x} dx &= \left\{ \begin{array}{l} \cos x = t; \quad \sin^2 x = 1 - t^2, \\ \sin x dx = -dt; \quad \cos 2x = 2t^2 - 1 \end{array} \right\} = \\ &= \int \frac{(1 + \sin^2 x) \sin x}{\cos 2x} dx = \int \frac{(2 - t^2)(-dt)}{2t^2 - 1} = \int \frac{t^2 - 2}{2t^2 - 1} dt = \frac{1}{2} \int \frac{(2t^2 - 4) dt}{2t^2 - 1} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{3}{2t^2 - 1} \right) dt = \frac{t}{2} - \frac{3}{2} \int \frac{dt}{2t^2 - 1} = \\
 &= \frac{t}{2} - \frac{3}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}t - 1}{\sqrt{2}t + 1} \right| + C = \frac{1}{2} \cos x - \frac{3}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} \cos x - 1}{\sqrt{2} \cos x + 1} \right| + C.
 \end{aligned}$$

3- мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{\cos^3 x + \cos^5 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx.$$

Ечиш. Интеграл остидаги функция $\cos x$ га нисбатан тоқ функция, шу сабабли $\sin x = t$ ўрнига қўйишдан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\cos^3 x + \cos^5 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx &= \int \frac{\cos^2 x (1 + \cos^2 x) \cos x}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx = \\
 &= \left\{ \begin{array}{l} \sin x = t, \cos^2 x = 1 - t^2 \\ \cos x dx = dt \end{array} \right\} = \int \frac{(1 - t^2)(2 - t^2)}{t^2 + t^4} dt = \int \frac{t^4 - 3t^2 + 2}{t^4 + t^2} dt.
 \end{aligned}$$

Энди нотўғри рационал касрнинг бутун қисмини ажратиб ва тўғри рационал касрни энг содда касрларга ёйиб, интегрални топамиз:

$$\int \frac{t^4 - 3t^2 + 2}{t^4 + t^2} dt = \int \left(1 + \frac{2}{t^2} - \frac{6}{1 + t^2} \right) dt = t - \frac{2}{t} - 6 \operatorname{arctg} t + C.$$

Шундай қилиб, эски ўзгарувчига қайтсак:

$$\int \frac{\cos^3 x + \cos^5 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx = \sin x - \frac{2}{\sin x} - 6 \operatorname{arctg}(\sin x) + C.$$

4- мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x + 3}.$$

Ечиш. Интеграл остидаги функция $\sin x$ ва $\cos x$ га нисбатан жуфт функция, шу сабабли $\operatorname{tg} x = t$ деб оламиз:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sin^2 x + 3} &= \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t, \sin^2 x = \frac{t^2}{1 + t^2}, \\ x = \operatorname{arctg} t, dx = \frac{dt}{1 + t^2} \end{array} \right\} = \int \frac{\frac{dt}{1 + t^2}}{\frac{t^2}{1 + t^2} + 3} = \\
 &= \int \frac{dt}{3 + 4t^2} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2t)}{(\sqrt{3})^2 + (2t)^2} = \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2t}{\sqrt{3}} + C = \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2 \operatorname{tg} x}{\sqrt{3}} + C.
 \end{aligned}$$

5- м и с о л. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{1+\operatorname{tg}x}$$

Е ч и ш. Интеграл остидаги функция факат $\operatorname{tg}x$ га боғлиқ бўлгани учун $\operatorname{tg}x=t$ деб оламиз:

$$\int \frac{dx}{1+\operatorname{tg}x} = \left\{ \operatorname{tg}x=t, x=\operatorname{arctg}t, \right. \left. dx=\frac{dt}{1+t^2} \right\} = \int \frac{dt}{(1+t^2)(1+t)}$$

Интеграл остидаги функцияни энг содда касрларга ёйиб, интегрални топамиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{dt}{(1+t^2)(1+t)} &= \int \left(\frac{1}{2(1+t)} - \frac{t-1}{2(1+t^2)} \right) dt = \\ &= \frac{1}{2} \ln|1+t| - \frac{1}{4} \ln|1+t^2| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg}t + C. \end{aligned}$$

Эски ўзгарувчи x га кайтсак,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1+\operatorname{tg}x} &= \frac{1}{2} \ln|1+\operatorname{tg}x| - \frac{1}{4} \ln(1+\operatorname{tg}^2x) + \frac{1}{2}x + C = \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\operatorname{tg}x}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2x}} \right| + \frac{1}{2}x + C = \frac{1}{2} \ln |\cos x(1+\operatorname{tg}x)| + \\ &+ \frac{1}{2}x + C = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \ln |\cos x + \sin x| + C. \end{aligned}$$

4- дарсхона топишириғи

Берилган аниқмас интегралларни топинг:

- $\int \frac{dx}{3+5\sin x+3\cos x}$. Ж: $\frac{1}{5} \ln \left| 5\operatorname{tg}\frac{x}{2}+3 \right| + C.$
- $\int \frac{dx}{5-3\cos x}$. Ж: $\frac{1}{2} \operatorname{arctg}\left(2\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right) + C.$
- $\int \frac{\cos^3 x dx}{\sin^2 x + \sin x}$. Ж: $\ln|\sin x| - \sin x + C.$
- $\int \frac{dx}{\sin x(2\cos^2 x - 1)}$. Ж: $\ln \left| \operatorname{tg}\frac{x}{2} \right| + \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1+\sqrt{2}\cos x}{1-\sqrt{2}\cos x} \right| + C.$
- $\int \frac{dx}{4-3\cos^2 x+5\sin^2 x}$. Ж: $\frac{1}{3} \operatorname{arctg}(3 \operatorname{tg}x) + C.$
- $\int \frac{\sin^2 x \cos x dx}{\sin x + \cos x}$. Ж: $\frac{1}{4} \ln|\sin x + \cos x| - \frac{1}{4} \cos x(\sin x + \cos x) + C.$

$$7. \int \frac{dx}{4 + \operatorname{tg}x + 4\operatorname{ctg}x} \quad \text{Ж: } \frac{4}{25}x - \frac{3}{25}\ln|\operatorname{tg}x + 2| + \frac{2}{5(\operatorname{tg}x + 2)} - \frac{3}{25}\ln|\cos x| + C.$$

$$8. \int \frac{(2\operatorname{tg}x + 3)dt}{\sin^2x + 2\cos^2x} \quad \text{Ж: } \ln(\operatorname{tg}^2x + 2) + \frac{3}{\sqrt{2}}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg}x}{\sqrt{2}} + C.$$

4- мустақил иш

Берилган аниқмас интегралларни топинг:

$$1. \int \frac{dx}{5 + 4\sin x} \quad \text{Ж: } \frac{2}{3}\operatorname{arctg}\frac{5\operatorname{tg}\frac{x}{2} + 4}{3} + C.$$

$$2. \int \frac{2 - \sin x}{2 + \cos x} dx \quad \text{Ж: } \ln(2 + \cos x) + \frac{4}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right) + C.$$

$$3. \int \frac{\cos x dx}{\sin^2x - 6\sin x + 5} \quad \text{Ж: } \frac{1}{4}\ln\frac{5 - \sin x}{1 - \sin x} + C.$$

$$4. \int \frac{dx}{1 + 3\cos^2x} \quad \text{Ж: } \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{tg}x}{2}\right) + C.$$

$$5. \int \frac{dx}{3\sin^2x + 5\cos^2x} \quad \text{Ж: } \frac{1}{\sqrt{15}}\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{3}\operatorname{tg}x}{\sqrt{5}} + C.$$

$$6. \int \frac{1 + \operatorname{tg}x}{1 - \operatorname{tg}x} dx \quad \text{Ж: } C - \ln|\cos x - \sin x|.$$

5- §. Таркибида тригонометрик функциялар бўлган баъзи интеграллар

6.5.1. $\int \sin^n x \cos^m x dx$ кўринишидаги интеграллар куйидагича топилади:

а) агар $n > 0$ ток бўлса, $\cos x = t$, $\sin x dx = -dt$ ўрнига қўйиш интегрални рационаллаштиради.

1-ми с ол. Интегрални топинг:

$$\int \sin^3 x \cdot \cos^2 x dx.$$

Е чи ш. $\sin^3 x$ даражада битта $\sin x$ кўпайтувчини ажратамиз ва уни дифференциал остига киритамиз:

$$\begin{aligned} \int \sin^3 x \cdot \cos^2 x dx &= \int \sin^2 x \cos^2 x \sin x dx = \\ &= -\int \sin^2 x \cos^2 x d(\cos x) = -\int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x d(\cos x) = \\ &= -\int (\cos^2 x - \cos^4 x) d(\cos x) = C - \frac{1}{3}\cos^3 x + \frac{1}{5}\cos^5 x; \end{aligned}$$

б) агар $m > 0$ ток бўлса, u ҳолда $\sin x = t$, $\cos x dx = dt$ ўрнига қўйиш интегрални рационаллаштиради.

2-мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{\cos^3 x dx}{\sqrt{\sin^4 x}}$$

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos^3 x dx}{\sin^{4/3} x} &= \int \frac{\cos^2 x \cos x dx}{\sin^{3/4} x} = \\ &= \int \frac{(1 - \sin^2 x) d(\sin x)}{\sin^{4/3} x} = \int \left(\sin^{-\frac{4}{3}} x - \sin^{\frac{2}{3}} x \right) d(\sin x) = \\ &= -3 \sin^{-\frac{1}{3}} x - \frac{3}{5} \sin^{\frac{5}{3}} x + C = C - \frac{3}{\sqrt[3]{\sin x}} - \frac{3}{5} \sqrt[3]{\sin^5 x}. \end{aligned}$$

в) агар $m, n \geq 0$ жуфт бўлсалар, у ҳолда

$$\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2} \sin 2\alpha, \quad \sin^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\alpha),$$

$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\alpha)$ формулалардан фойдаланган ҳолда иккиланган бурчакларга ўтиб, синус ва косинуснинг даражасини пасайтириш керак.

3-мисол. Интегрални топинг:

$$\int \sin^4 x dx.$$

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \sin^4 x dx &= \int (\sin^2 x)^2 dx = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 dx = \\ &= \frac{1}{4} \int (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x) dx = \frac{1}{4} (x - \sin 2x + \\ &+ \int \cos^2 2x dx) = \frac{1}{4} (x - \sin 2x + \frac{1}{2} \int (1 + \cos 4x) dx) = \\ &= \frac{1}{4} (x - \sin 2x + \frac{1}{2} x + \frac{1}{8} \sin 4x) + C = \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{3x}{2} - \sin 2x + \frac{1}{8} \sin 4x \right) + C. \end{aligned}$$

г) агар $m, n \leq 0$ ва улардан бири тоқ бўлса, у ҳолда сурат ва махражни $\sin x$ ёки $\cos x$ га, буларнинг қайсиниси тоқ даражадалигига қараб, қўшимча кўпайтириш усулидан фойдаланиш керак.

4-мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sin x}.$$

Ечиш.

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\sin x dx}{\sin^2 x} = - \int \frac{d(\cos x)}{1 - \cos^2 x} =$$

$$= -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} \right| + C = \ln \sqrt{\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} + C = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C.$$

д) агар $m+n < 0$ ва жуфт бўлса, у ҳолда $\operatorname{tg} x = t$ ёки $\operatorname{ctg} x = t$ ўрнига қўйишдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Агар бунда $m < 0$ ва $n < 0$ бўлса, у ҳолда сунъий усул қўлланиши мумкин, бунинг учун суратдаги 1 ни $(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^n = 1$ «тригонометрик бир»га алмаштириш керак. Бу формулада $k = \frac{|m+n|}{2} - 1$.

5- мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{\sin^{\frac{1}{3}} x}{\cos^{\frac{13}{3}} x} dx$$

Ечиш. Бунда $m = \frac{1}{3}$, $n = -\frac{13}{3}$, $m+n = -4 < 0$.

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin^{\frac{1}{3}} x}{\cos^{\frac{13}{3}} x} dx &= \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t, \frac{dx}{\cos^2 x} = dt, \\ \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2} \end{array} \right\} = \int \frac{\operatorname{tg}^{\frac{1}{3}} x dx}{\cos^2 x \cos^{\frac{13}{3}} x} = \int \frac{t^{\frac{1}{3}} dt}{1+t^2} = \\ &= \int t^{\frac{1}{3}} (1+t^2) dt = \int (t^{\frac{1}{3}} + t^{\frac{7}{3}}) dt = \int t^{\frac{1}{3}} dt + \int t^{\frac{7}{3}} dt = \frac{3}{4} t^{\frac{4}{3}} + \\ &+ \frac{3}{10} t^{\frac{10}{3}} + C = \frac{3}{4} \operatorname{tg}^{\frac{4}{3}} x + \frac{3}{10} \operatorname{tg}^{\frac{10}{3}} x + C. \end{aligned}$$

6- мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^4 x}$$

Ечиш. Бунда $m = -2$, $n = -4$, $m+n = -6 < 0$,

$k = \frac{|m+n|}{2} - 1 = \frac{6}{2} - 1 = 2$. Шундай қилиб:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^4 x} &= \int \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x)^2}{\sin^2 x \cos^4 x} dx = \int \frac{(\sin^4 x + 2\sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x) dx}{\sin^2 x \cos^4 x} = \\ &= \int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx + \int \frac{2dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \\ &= \int \frac{\sin^2 x dx}{\cos^2 x \cos^2 x} + 2 \operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C = \\ &= \int \operatorname{tg}^2 x dx + 2 \operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C = \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x + 2 \operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C. \end{aligned}$$

6.5.2. $\int \operatorname{tg}^n x dx$ ва $\int \operatorname{ctg}^n x dx$ шаклдаги интеграллар, бунда $n > 0$ — бутун сон

Бу хил интегралларни топишда $\operatorname{tg}^2 x$ ёки $\operatorname{ctg}^2 x$ кўпайтувчилар ажратилади ва улар $\operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$ ва $\operatorname{ctg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} - 1$ формулалар бўйича алмаштирилади, бу формулалар тангенс ва котангенс даражаларини кетма-кет пасайтиради. Бу хил интегралларни $\operatorname{tg} x = t$ ёки $\operatorname{ctg} x = t$ ўрнига қўйишлар ёрдамида ҳам топиш мумкин.

7- м и с о л. Интегрални топинг:

$$\int \operatorname{tg}^4 x \, dx.$$

Е ч и ш. Бу мисолга юқоридаги усулни қўллаймиз:

$$\begin{aligned} 1\text{- усул.} \quad \int \operatorname{tg}^4 x \, dx &= \int \operatorname{tg}^2 x \cdot \operatorname{tg}^2 x \, dx = \int \operatorname{tg}^2 x \frac{dx}{\cos^2 x} - \int \operatorname{tg}^2 x \, dx = \\ &= \int \operatorname{tg}^2 x d(\operatorname{tg} x) - \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x - \operatorname{tg} x + x + C. \end{aligned}$$

2- усул.

$$\begin{aligned} \int \operatorname{tg}^4 x \, dx &= \begin{cases} \operatorname{tg} x = t, \\ x = \arctg t, \, dx = \frac{dt}{1+t^2} \end{cases} = \int \frac{t^4 dt}{1+t^2} = \int \frac{(t^4-1)+1}{1+t^2} dt = \\ &= \int \left(t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2} \right) dt = \frac{t^3}{3} - t + \arctg t + C = \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} - \operatorname{tg} x + x + C. \end{aligned}$$

6.5.3. $\int \sec^n x \, dx$ ва $\int \operatorname{cosec}^n x \, dx$ кўринишдаги интеграллар Иккита ҳолни кўрамиз:

а) агар n тоқ бўлса, у ҳолда $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ алмаштиришдан фойдаланилади;

б) агар n жуфт бўлса, у ҳолда $\operatorname{tg} x = t$ ўрнига қўйишдан фойдаланилади ёки $\sec^2 x$, ёки $\operatorname{cosec}^2 x$ кўпайтувчи ажратилиб, $\sec^2 x \, dx = d(\operatorname{tg} x)$ ёки $\operatorname{cosec}^2 x = d(\operatorname{ctg} x)$ деб олинади, қолган даражалар эса

$$\sec^2 x = 1 + \operatorname{tg}^2 x \quad \text{ёки} \quad \operatorname{cosec}^2 x = 1 + \operatorname{ctg}^2 x$$

формулалар бўйича алмаштирилади.

8- м и с о л. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sin^3 x}$$

Е ч и ш. $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ универсал ўрнига қўйишдан фойдаланамиз:

$$\int \frac{dx}{\sin^3 x} = \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \\ x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \end{array} \right\} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\left(\frac{2t}{1+t^2} \right)^3} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4} \int \frac{(1+t)^2}{t^3} dt = \frac{1}{4} \int \frac{1+2t^2+t^4}{t^3} dt = \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{t^3} + \frac{2}{t} + t \right) dt = \\
&= \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{2t^2} + 2\ln|t| + \frac{t^2}{2} \right) + C = \frac{1}{2} \ln|t| + \frac{t^4-1}{8t^2} + C = \\
&= \frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \frac{\operatorname{tg}^4 \frac{x}{2} - 1}{8 \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} + C = \frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \\
&+ \frac{\left(\sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2} \right) \cdot 1}{\cos^2 \frac{x}{2} \cdot 8 \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2}} + C = \frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| - \frac{\cos x}{2 \sin^2 x} + C.
\end{aligned}$$

9- мисол. $\int \frac{dx}{\cos^6 x}$ интегрални топинг.

Ечиш. $\frac{1}{\cos^2 x}$ кўпайтувчини ажратамиз ва $\frac{dx}{\cos^2 x} = d(\operatorname{tg} x)$ деб

оламиз

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\cos^6 x} &= \int \frac{1}{\cos^4 x} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)^2 d(\operatorname{tg} x) = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x)^2 d(\operatorname{tg} x) = \\
&= \int (1 + 2\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg}^4 x) d(\operatorname{tg} x) = \operatorname{tg} x + \frac{2}{3} \operatorname{tg}^3 x + \frac{1}{5} \operatorname{tg}^5 x + C.
\end{aligned}$$

6.5.4. $\int \sin mx \cdot \cos nx dx$, $\int \cos mx \cdot \cos nx dx$, $\int \sin mx \cdot \sin nx dx$ кўри-нишдаги интеграллар куйидаги маълум тригонометрик формула-лардан фойдаланилса, осон ҳисобланади:

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta));$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta));$$

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)).$$

Бу формулалар тригонометрик функциялар кўпайтмасини йиғинди шаклида ифодалаш имконини беради.

10- мисол. $\int \sin 2x \cos 5x dx$ интегрални топинг.

Ечиш. Тригонометрик функциялар кўпайтмасини йиғинди билан алмаштирамиз:

$$\begin{aligned}
\int \sin 2x \cos 5x dx &= \frac{1}{2} \int (\sin 7x + \sin(-3x)) dx = \frac{1}{2} \int \sin 7x dx - \\
&- \frac{1}{2} \int \sin 3x dx = -\frac{1}{14} \cos 7x + \frac{1}{6} \cos 3x + C.
\end{aligned}$$

11- мисол. Интегрални топинг:

$$\int \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x dx.$$

Ечиш. Келтирилган формулаларни икки марта қўлаймиз:

$$\begin{aligned} \int \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x dx &= \frac{1}{2} \int (\cos 3x + \cos(-x)) \cos 4x dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \cos 3x \cos 4x dx + \frac{1}{2} \int \cos x \cos 4x dx = \\ &= \frac{1}{4} \int (\cos 7x + \cos(-x)) dx + \frac{1}{4} \int (\cos 5x + \cos(-3x)) dx = \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{7} \sin 7x + \frac{1}{5} \sin 5x + \frac{1}{3} \sin 3x + \sin x \right) + C = \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{7} \sin 7x + \frac{1}{5} \sin 5x + \frac{1}{3} \sin 3x + \sin x \right) + C. \end{aligned}$$

5- дарсхона топшириғи

Берилган аниқмас интегралларни топинг:

- $\int \cos^3 x \cdot \sin^6 x dx.$ Ж: $C + \frac{1}{3\sin^3 x} - \frac{1}{5\sin^5 x}.$
- $\int \sin^5 x \sqrt{\cos^3 x} dx.$ Ж: $\frac{5}{9} \sqrt{\cos^{18} x} - \frac{5}{8} \sqrt{\cos^8 x} - \frac{5}{28} \sqrt{\cos^{28} x} + C.$
- $\int \sin^2 x \cdot \cos^4 x dx.$ Ж: $\frac{1}{16} x - \frac{1}{64} \sin 4x + \frac{1}{48} \sin^2 2x + C.$
- $\int \frac{dx}{\sin^4 x \cos^4 x}.$ Ж: $\frac{(\operatorname{tg}^2 x - 1)(\operatorname{tg}^4 x + 10\operatorname{tg}^2 x + 1)}{3\operatorname{tg}^3 x} + C.$
- $\int \frac{\sin^2 x dx}{\cos^6 x}.$ Ж: $\frac{1}{5} \operatorname{tg}^5 x + \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x + C.$
- $\int \operatorname{tg}^3 x dx.$ Ж: $\frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x + \ln |\cos x| + C.$
- $\int \frac{dx}{\sin^6 x}.$ Ж: $C - \operatorname{ctg} x - \frac{2}{3} \operatorname{ctg}^3 x - \frac{1}{5} \operatorname{ctg}^5 x.$
- $\int \cos x \cdot \cos^2 3x dx.$ Ж: $C + \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{28} \sin 7x + \frac{1}{20} \sin 5x$

5- мустақил иш

Берилган аниқмас интегралларни топинг:

1. $\int \sin^2 x dx$. Ж: $C - \cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$.
2. $\int \cos^4 \frac{x}{2} dx$. Ж: $\frac{3x}{8} + \frac{\sin x}{2} + \frac{\sin 2x}{16} + C$.
3. $\int \frac{dx}{\sin^4 x \cdot \cos^5 x}$. Ж: $C - \frac{1}{2 \operatorname{tg}^2 x} + 3 \ln |\operatorname{tg} x| + \frac{3}{2} \operatorname{tg}^2 x + \frac{1}{4} \operatorname{tg}^4 x$.
4. $\int \frac{dx}{\cos^5 x}$. Ж: $\frac{\sin x}{4 \cos^4 x} + \frac{3}{8} \frac{\sin x}{\cos^2 x} + \frac{3}{8} \ln |\operatorname{tg} x + \sec x| + C$.
5. $\int \frac{dx}{\cos^4 x}$. Ж: $\operatorname{tg} x + \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x + C$.
6. $\int \sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x dx$. Ж: $\frac{1}{24} \cos 6x - \frac{1}{16} \cos 4x - \frac{1}{8} \cos 2x + C$.

6-§. Иррационал ифодаларни интеграллаш

$$6.6.1. \int R \left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{\frac{m_1}{n_1}}, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{\frac{m_2}{n_2}}, \dots \right) dx$$

кўринишдаги интеграллар (R — рационал функция ва m_1, n_1, m_2, n_2 — бутун сонлар) $\frac{ax+b}{cx+d} = t^s$ ўрнига қўйиш ёрдамида интегралланади, бунда $s = \frac{m_1}{n_1}, \frac{m_2}{n_2}, \dots$ сонларнинг энг кичик умумий карралиси (ЭКУК), яъни $s = \text{ЭКУК}(n_1, n_2, \dots)$.

Хусусан, $\int R(x, (ax+b)^{\frac{m_1}{n_2}}, (ax+b)^{\frac{m_2}{n_2}}, \dots) dx$ кўринишдаги интеграллар $ax+b = t^s$ ўрнига қўйиш ёрдамида топилади,

$\int R(x, x^{\frac{m_1}{n_1}}, x^{\frac{m_2}{n_2}}, \dots) dx$ кўринишдаги интеграллар эса $x = t^s$ ўрнига қўйиш ёрдамида янги ўзгарувчи t нинг рационал функциясиа интегралига келтирилади, бунда умумий ҳолдагидек, $s = \text{ЭКУК}(n_1, n_2, \dots)$.

1- мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(2x+1)^2 - \sqrt{2x+1}}}$$

Ечиш. ЭКУК (2, 3) = 6, шунинг учун:

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(2x+1)^2} - \sqrt{2x+1}} = \left\{ \begin{array}{l} 2x+1 = t^6; \\ x = \frac{1}{2}(t^6-1); dx = 3t^5 dt \end{array} \right\} =$$

$$= \int \frac{3t^5 dt}{t^4 - t^3} = 3 \int \frac{t^2 dt}{t-1} = 3 \int \frac{(t^2-1)+1}{t-1} dt =$$

$$= 3 \int \left(t+1 + \frac{1}{t-1} \right) dt = \frac{3}{2}(t+1)^2 + \ln|t-1| + C =$$

$$= \left\{ t = \sqrt[6]{2x+1} \right\} = \frac{3}{2} \left(\sqrt[6]{2x+1} + 1 \right)^2 + \ln \left| \sqrt[6]{2x+1} - 1 \right| + C$$

6.6.2. $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx$ кўринишдаги интеграллар (R — рационал функция) квадрат учхаддан тўла квадрат ажратилганидан ва ўзгарувчи $z = x + \frac{b}{2a}$ деб олинганидан кейин куйидаги кўринишдаги интеграллардан бирига келтирилади:

а) $\int R(z, \sqrt{m^2 - z^2}) dz,$

б) $\int R(z, \sqrt{m^2 + z^2}) dz,$

в) $\int R(z, \sqrt{z^2 - m^2}) dz.$

Агар

а) $z = m \sin t$ ёки $z = m \cos t,$

б) $z = m \operatorname{tg} t$ ёки $z = m \operatorname{ctg} t,$

в) $z = m \operatorname{sect}$ ёки $z = m \operatorname{cosect}$

тригонометрик ўрнига қўйишлардан фойдаланилса, бу интеграллар $\int R(\sin t, \cos t) dt$ кўринишдаги интегралларга келтирилади.

2- мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+4x+7)^3}}$$

Ечиш. Квадрат учхаддан тўла квадрат ажратамиз ва янги z ўзгарувчини киритамиз. Шундан кейин юкорида келтирилган б) тригонометрик ўрнига қўйишдан фойдаланамиз:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+4x+7)^3}} = \int \frac{dx}{\sqrt{[(x+2)^2+3]^3}} = \left\{ \begin{array}{l} x+2 = z, \\ dx = dz \end{array} \right\} =$$

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{dz}{\sqrt{(z^2+3)^3}} = \left\{ z = \sqrt{3} \operatorname{tg} t, \right. \\
&\quad \left. dz = \frac{\sqrt{3} dt}{\cos^2 t} \right\} = \int \frac{\frac{\sqrt{3} dt}{\cos^2 t}}{\sqrt{(3 \operatorname{tg}^2 t + 3)^3}} = \\
&= \frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} \int \frac{dt}{\cos^2 t \sqrt{(1+\operatorname{tg}^2 t)^3}} = \frac{1}{3} \int \frac{dt}{\cos^2 t \cdot \frac{1}{\cos^3 t}} = \\
&= \frac{1}{3} \int \cos t dt = \frac{1}{3} \sin t + C = \frac{1}{3} \frac{\operatorname{tg} t}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 t}} + \frac{\frac{z}{\sqrt{3}}}{\sqrt{1+\frac{z^2}{3}}} + C = \\
&= \frac{1}{3} \frac{z}{\sqrt{3+z^2}} + C = \frac{1}{3} \frac{x+2}{\sqrt{3+(x+2)^2}} + C = \frac{x+2}{3\sqrt{x^2+4x+7}} + C.
\end{aligned}$$

6.6.3. $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ кўринишдаги интеграл квадрат учаддан тўла квадрат ажратиш йўли билан $\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}}$ ёки $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}}$ жадвал интегралларидан бирига келтирилади.

3- мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+5}}$$

Ечиш. Квадрат учадни ушбу кўринишга келтирамыз: $x^2+2x+5 = (x+1)^2+4$. Бундан фойдаланиб, интегрални топамиз:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+5}} = \int \frac{d(x+1)}{\sqrt{(x+1)^2+4}} = \ln |x+1 + \sqrt{x^2+2x+5}| + C.$$

6.6.4. $\int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ кўринишдаги интеграллар суратдан квадрат

учаднинг ҳосиласини ажратиш натижасида иккита интегралга келтирилади: улардан бири $\int \frac{du}{\sqrt{u}}$ жадвал интеграл, иккинчиси эса

6.6.3- бандда қаралган интегралдир.

4- мисол. $\int \frac{3x+4}{\sqrt{6x-x^2-8}} dx$ интегрални топинг.

Ечиш. Суратда интеграл остидаги ифоданинг ҳосиласини ажратамыз:

$$\begin{aligned} \int \frac{3x+4}{\sqrt{6x-x^2-8}} dx &= \int \frac{-\frac{3}{2}(-2x+6) + 13}{\sqrt{6x-x^2-8}} dx = \\ &= -\frac{3}{2} \int \frac{-2x+6}{\sqrt{6x-x^2-8}} dx + 13 \int \frac{d(x-3)}{\sqrt{1-(x-3)^2}} = \\ &= -3\sqrt{6x-x^2-8} + 13 \operatorname{arcsin}(x-3) + C. \end{aligned}$$

6.6.5. $\int \frac{dx}{(x-\alpha)\sqrt{ax^2+bx+c}}$ кўринишдаги интеграллар $\frac{1}{x-\alpha} = t$

ўрнига қўйиш ёрдамида 6.6.3- бандда қаралган интегралга келтирилади.

5- мисол. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+3x-3}}$ интегрални топинг.

Ечиш. $\frac{1}{x+1} = t$ ўрнига қўйишдан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+3x+3}} &= \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{x+1} = t; \quad x = \frac{1}{t} - 1; \\ x+1 = \frac{1}{t}; \quad dx = -\frac{dt}{t^2} \end{array} \right\} = \\ &= -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{t}-1\right)^2 + 3\left(\frac{1}{t}-1\right) + 3}} = -\int \frac{dt}{t\sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} + 1}} = \\ &= -\int \frac{dt}{\sqrt{t^2+t+1}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}} = C - \ln \left| t + \frac{1}{2} + \sqrt{t^2+t+1} \right| = \\ &= C - \ln \left| \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{x^2+3x+3}}{x+1} \right|. \end{aligned}$$

6.6.6. $\int x^m(a+bx^n)^p dx$ кўринишдаги интеграллар (m, n, p — рационал сонлар) дифференциал биномлари интеграллари деб аталиб, унга ҳолдагина элементар функциялар орқали фойдаланади:

а) агар p — бутун сон бўлса, у ҳолда интеграл $x=t^s$ ўрнига қўйиш ёрдамида (бунда s — касрлар махражлари m ва n нинг энг кичик умумий қарралиси) рационал функция интегралига келтирилади;

б) агар $\frac{m+1}{n}$ — бутун сон бўлса, у ҳолда интеграл $a+bx^n = t^s$ ўрнига қўйиш билан рационаллаштирилади, бунда s — p касрнинг махражи;

в) $\frac{m+1}{n} + p$ — бутун сон бўлса, у ҳолда $a + bx^n = t^s \cdot x^n$ деб оламиз, бунда $s = p$ қасрнинг махражи.

6-мисол. $\int \sqrt[3]{x} (2 + \sqrt{x})^2 dx$ интегрални ҳисобланг.

Ечиш. $p=2$ — бутун сон, демак, биринчи а) ҳолга эгамиз:

$$\begin{aligned} \int x^{\frac{1}{3}} (x + x^2)^2 dx &= \left\{ m = \frac{1}{3}, n = \frac{1}{2}; \right. \\ &\quad \left. s = \text{ЭКУК}(2, 3) = 6, x = t^6, dx = 6t^5 dt \right\} = \\ &= \int t^2 (2 + t^3)^2 6t^5 dt = 6 \int (4t^7 + 4t^{10} + t^{13}) dt = \\ &= 6 \left(\frac{1}{2} t^8 + \frac{4}{11} t^{11} + \frac{1}{14} t^{14} \right) + C = \{ t = \sqrt[6]{x} \} = \\ &= 3 \sqrt[3]{x^3} + \frac{24}{11} \sqrt[6]{x^{11}} = \frac{3}{7} \sqrt[3]{x^7} + C. \end{aligned}$$

7-мисол. Интегрални ҳисобланг:

$$\int \frac{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{x^2}} dx.$$

Ечиш. Бунда $m = -\frac{2}{3}$, $n = \frac{1}{3}$, $p = \frac{1}{2}$, $\frac{m+1}{n} = \left(-\frac{2}{3} + 1\right) : \frac{1}{3} = 1$ — бутун сон. Иккинчи б) ҳолга эгамиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{x^2}} dx &= \left\{ \begin{aligned} 1 + x^{\frac{1}{3}} &= t^2, & \frac{dx}{3\sqrt[3]{x^2}} &= 2t dt \\ x^{\frac{1}{3}} &= t^2 - 1 \end{aligned} \right\} = \\ &= \int 6t^2 dt = 2t^3 + C = 2 \sqrt{(1 + \sqrt[3]{x})^3} + C. \end{aligned}$$

8-мисол. $\int \frac{dx}{x^{11} \sqrt{1+x^4}}$ интегрални топинг:

Ечиш. Бунда $p = -\frac{1}{2}$, $m = -11$, $n = 4$, $\frac{m+1}{n} = \frac{-11+1}{4} = -\frac{5}{2}$ — қаср сон, аммо $\frac{m+1}{n} + p = -\frac{5}{2} - \frac{1}{2} = -3$ — бутун сон. Учинчи в) ҳолга эгамиз:

$$\begin{aligned}
 \int x^{-11} (1+x^4)^{-\frac{1}{2}} dx &= \left\{ 1+x^4 = t^2 \cdot x^4, \right. \\
 & \left. x = \frac{1}{(t^2-1)^{\frac{1}{4}}}; dx = -\frac{tdt}{2(t^2-1)^{5/4}} \right\} = \\
 &= \int -\frac{1}{2} (t^2-1)^{-\frac{1}{4}(1-11)} \cdot \left(\frac{t^2}{t^2-1} \right)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{tdt}{(t^2-1)^{\frac{5}{4}}} = \\
 &= -\frac{1}{2} \int (t^2-1)^{\frac{11}{4}} \cdot \frac{tdt}{(t^2-1)^{\frac{5}{4}}} = -\frac{1}{2} \int (t^2-1)^2 dt = \\
 &= C - \frac{t^6}{10} + \frac{t^3}{3} - \frac{t}{2} = C - \frac{\sqrt{(1+x^4)^5}}{10x^{10}} + \frac{\sqrt{(1+x^4)^3}}{3x^6} - \frac{\sqrt{1+x^4}}{2x^2}.
 \end{aligned}$$

6- дарсхона топшириги

Аниқмас интегралларни топинг:

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-2x} - \sqrt[4]{1-2x}}$

Ж: $C - \sqrt{1-2x} - 2\sqrt[4]{1-2x} - 2 \ln \left| \sqrt[4]{1-2x} - 1 \right|$.

2. $\int \frac{\sqrt[6]{x} dx}{1 + \sqrt[3]{x}}$

Ж: $\frac{6}{5} \sqrt[6]{x^5} - 2\sqrt{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6 \operatorname{arctg} \sqrt[6]{x} + C$

3. $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \frac{dx}{x}$

Ж: $\ln \left| \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \right| + 2 \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + C$

4. $\int \frac{3x+2}{\sqrt{x^2+x+2}} dx$

Ж: $3\sqrt{x^2+x+2} + \frac{1}{2} \ln \left| x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2+x+2} \right| + C$

5. $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x^2-2x-1}}$

Ж: $C - \operatorname{arc} \sin \frac{x+1}{x\sqrt{3}}$

6. $\int \frac{dx}{(x+2)\sqrt{x^2+2x}}$

Ж: $C + \sqrt{\frac{x}{x+2}}$

7. $\int \frac{dx}{\sqrt{x} (\sqrt[4]{x}+1)^{10}}$

Ж: $C - \frac{1}{2(\sqrt[4]{x}+1)^8} + \frac{4}{9(\sqrt[4]{x}+1)^9}$

$$8. \int \sqrt[3]{x} \sqrt[4]{2 + \sqrt{x^2}} dx.$$

$$\text{Ж: } \frac{2}{3} \left(\sqrt[4]{2 + \sqrt{x^2}} \right)' - \frac{12}{5} \left(\sqrt[4]{2 + \sqrt{x^2}} \right)^5 + C.$$

$$9. \int \frac{dx}{x^3 \sqrt{1+x^2}} \quad \text{Ж: } \frac{(2x^2-1)\sqrt{1+x^2}}{3x^3} + C.$$

$$10. \int \sqrt{x^2-4} dx. \quad \text{Ж: } \frac{x}{2} \sqrt{x^2-4} - 2 \ln|x + \sqrt{x^2-4}| + C.$$

6- мустақил иш

Аниқмас интегралларни топинг.

$$1. \int \frac{dx}{\sqrt{x+3} (\sqrt[4]{x+3}-1)} \quad \text{Ж: } 4 \sqrt[4]{x+3} + 4 \ln |\sqrt[4]{x+3}-1| + C.$$

$$2. \int \frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt[3]{x}+1)\sqrt{x}} dx$$

$$\text{Ж: } \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} - 3 \sqrt[3]{x} - 6 \sqrt[6]{x} + 3 \ln |\sqrt[3]{x}+1| + 6 \operatorname{arctg} \sqrt[6]{x} + C$$

$$3. \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2+x+1}} \quad \text{Ж: } \sqrt{x^2+x+1} - \frac{1}{2} \ln \left| x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2+x+1} \right| + C.$$

$$4. \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{6x-x^2-5}} \quad \text{Ж: } C - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{5-x}{x-1}}.$$

$$5. \int \sqrt{1-2x-x^2} dx \quad \text{Ж: } \frac{x+1}{2} \sqrt{1-2x-x^2} + \arcsin \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C.$$

$$6. \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{(x^2+1)^5}} \quad \text{Ж: } C + \frac{x^3}{3 \sqrt{(1+x^2)^3}}$$

$$7. \int \sqrt[3]{x} \sqrt[7]{1 + \sqrt[3]{x^4}} dx \quad \text{Ж: } \frac{21}{32} \sqrt[7]{(1 + \sqrt[3]{x^4})^8} + C.$$


7-§. Аниқ интеграл. Ньютон — Лейбниц формуласи.

Аниқ интегралда ўзгарувчини алмаштириш.

Бўлаклар интеграллаш

6.7.1. $f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада аниқланган ва узлуксиз бўлсин. Бу кесмани $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ нукталар билан n та қисмга бўламиз. Ҳар бир (x_{i-1}, x_i) ораликдан ихтиёрий ξ_i нуктани оламиз ва ушбу йиғиндини тузамиз:

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$



23-шакл

буида $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. Ушбу $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x$

кўринишдаги йиғинди *интеграл йиғинди*, бу йиғиндининг $\max \Delta x_i \rightarrow 0$ даги лимитини, агар бу лимит мавжуд бўлса, $f(x)$ функциядан a дан b гача олинган *аниқ интеграл* дейилади ва

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

кўринишда белгиланади. Бу ҳолда $f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада *интегралланувчи функция* дейилади. a ва b сонлар мос равишда интеграллашнинг *қуйи* ва *юқори чегаралари* дейилади.

Функция $[a, b]$ кесмада интегралланувчи бўлиши учун унинг шу кесмада узлуксиз бўлиши етарли.

Агар $[a, b]$ кесмада $f(x) > 0$ бўлса, у ҳолда $\int_a^b f(x) dx$ интеграл

геометрик жиҳатдан $y=f(x)$, $y=0$, $x=a$ ва $x=b$ чизиклар билан чегараланган эгри чизикли трапеция кўринишидаги шаклнинг юзини ифодалайди (23-шакл).

6.7.2. Аниқ интегралнинг асосий хоссаларини келтирамыз.

а) $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx;$

б) $\int_a^a f(x) dx = 0;$

в) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx;$

г) $\int_a^b (f_1(x) \pm f_2(x)) dx = \int_a^b f_1(x) dx \pm \int_a^b f_2(x) dx.$

д) $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$, буида k — ўзгармас;

е) агар $[a, b]$ кесмада $f(x) \geq 0$ бўлса, у ҳолда $\int_a^b f(x) dx \geq 0;$

ж) агар $[a, b]$ кесмада $f(x) \geq g(x)$ булса, у ҳолда $\int_a^b f(x) dx \geq$

$\int_a^b g(x) dx;$

з) агар m ва M мос равишда $f(x)$ функциянинг $[a, b]$ кесмадаги энг кичик ва энг катта киймати бўлса, у ҳолда

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

тенгсизлик ўринли (аник интегрални баҳолаш ҳақидаги теорема);

и) $\int_a^b f(x) dx = f'(c)(b-a)$, бунда $c \in (a, b)$ (ўрта киймат ҳақидаги теорема).

6.7.3. Агар $F(x)$ $[a, b]$ кесмада узлуксиз $f(x)$ функциянинг бошланғич функцияларидан бири бўлса, у ҳолда Ньютон — Лейбницнинг қуйидаги формуласи ўринли:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

Бу формуладан аниқ интегралларни ҳисоблашда фойдаланилади.

1- мисол. Интегрални ҳисобланг: $\int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x}$.

Ечиш. $\int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x} = \int_e^{e^2} \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \ln |\ln x| \Big|_e^{e^2} = \ln(\ln e^2) - \ln(\ln e) = \ln 2$.

2- мисол. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx$ ни ҳисобланг.

Ечиш. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \sin x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 x) d(\cos x) =$
 $= -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{3} \cos^3 x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) + \frac{1}{3}(\cos^3 \frac{\pi}{2} - \cos^3 0) = \frac{2}{3}$.

6.7.4. Агар $f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада узлуксиз, $x = \varphi(t)$ функция эса дифференциалланувчи бўлиб, шу билан бирга $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$ бўлса, у ҳолда ушбу тенглик ўринли:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Куллича $x = \varphi(t)$ урнига кўйиш ўрнига $t = \psi(x)$ тескари алмаштиришдан фойдаланилади. Бу ҳолда интеграллашнинг янги чегаралари α ва β бевосита $\alpha = \psi(a)$ ва $\beta = \psi(b)$ тенгликлардан топилади. Бунда интеграллаш чегараларини алмаштиришни қуйидаги жадвал шаклида ёзиш қулай:

x	t
a	α
b	β

3- мисол. $\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx$ интегрални ҳисобланг.

Ечиш. $x = \sin t$ ўрнига кўйишдан фойдаланамиз:

$$\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx = \left\{ \begin{array}{l} x = \sin t, \\ dx = \cos t dt, \end{array} \right. \left. \begin{array}{|c|c|} \hline x & t \\ \hline \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\pi}{4} \\ \hline 1 & \frac{\pi}{2} \\ \hline \end{array} \right\} =$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin^2 t} \cos t dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t} dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin^2 t}{\sin^2 t} dt =$$

$$= (-\operatorname{ctg} t - t) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \left(-\operatorname{ctg} \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) - \left(-\operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right) = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

4- мисол. $\int_3^8 \frac{x dx}{\sqrt{x+1}}$ интегрални ҳисобланг.

Ечиш. $t = \sqrt{x+1}$ формула бўйича ўзгарувчини алмаштирамиз:

$$\int_3^8 \frac{x dx}{\sqrt{x+1}} = \left\{ \begin{array}{l} t = \sqrt{x+1}, \\ x = t^2 - 1, \\ dx = 2t dt \end{array} \right. \left. \begin{array}{|c|c|} \hline x & t \\ \hline 3 & 2 \\ \hline 8 & 3 \\ \hline \end{array} \right\} =$$

$$= \int_2^3 \frac{(t^2-1)2t dt}{t} = 2 \int_2^3 (t^2-1) dt = 2 \left(\frac{t^3}{3} - t \right) \Big|_2^3 =$$

$$= 2(9-3) - 2 \left(\frac{8}{3} - 2 \right) = \frac{32}{3}.$$

6.7.5. Агар $u = u(x)$, $v = v(x)$ функциялар ва уларнинг ҳосилалари $[a, b]$ кесмада узлуксиз бўлса, у ҳолда

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

тенглик ўринли (бўлак-бўлак интеграллаш формуласи).

5- мисол. $\int_1^e x \ln^2 x dx$ интегрални топинг.

Ечиш. Бўлак-бўлак интеграллаш формуласини қўлаймиз:

$$\begin{aligned} \int_1^e x \ln^2 x dx &= \left\{ \begin{array}{l} u = \ln^2 x, \quad du = 2 \ln x \cdot \frac{dx}{x}, \\ dv = x dx, \quad v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right\} = \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x \Big|_1^e - \int_1^e x \ln x dx = \\ &= \left\{ \begin{array}{l} u = \ln x, \quad du = \frac{dx}{x}, \\ dv = x dx, \quad v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right\} = \frac{1}{2} e^2 - \left(\frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x dx \right) = \\ &= \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \frac{x^2}{4} \Big|_1^e = \frac{1}{4} (e^2 - 1). \end{aligned}$$

7- дарсхона топириғи

Интегралларни ҳисобланг:

1. $\int_0^1 (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x^2}) dx$. Ж: $\frac{19}{15}$.
2. $\int_1^2 \frac{dx}{2x-1}$. Ж: $\frac{1}{2} \ln 3$.
3. $\int_1^e \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)}$. Ж: $\frac{\pi}{4}$.
4. $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{2+3x-2x^2}}$. Ж: $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.
5. $\int_1^9 \frac{dx}{1+\sqrt{3x-2}}$. Ж: $\frac{2}{3} \left(3 + \ln \frac{2}{5} \right)$.

6. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{3+2\cos x}$ Ж: $\frac{2}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{5}}$.
7. $\int_{\ln 2}^{\ln 6} \frac{e^x \sqrt{e^x - 2}}{e^x + 2} dx$ Ж: $4 - \pi$.
8. $\int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{dx}{x \sqrt{1+4x^2}}$ Ж: $\ln \frac{\sqrt{5}+3}{2}$.
9. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-3x} \sin^4 x dx$ Ж: $\frac{1}{25} \left(e^{\frac{3\pi}{4}} + 1 \right)$.
10. $\int_0^1 x \cdot \operatorname{arctg} x dx$ Ж: $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$.

7- мустақил иш

Аниқ интегралларни ҳисобланг:

1. $\int_3^1 \frac{x^2+3}{x-2} dx$ Ж: $\frac{11}{2} + 7 \ln 2$.
2. $\int_0^1 \frac{dx}{4x^2+4x+5}$ Ж: $\frac{1}{4} \operatorname{arctg} \frac{4}{7}$.
3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x dx$ Ж: $\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}$.
4. $\int_1^5 \frac{dx}{x + \sqrt{2x-1}}$ Ж: $2 \ln 2 - \frac{1}{2}$.
5. $\int_2^{\frac{4}{\sqrt{3}}} \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx$ Ж: $\frac{2\sqrt{3}}{3} - \frac{\pi}{3}$.
6. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1+2\sin^2 x}$ Ж: $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$.
7. $\int_0^{\frac{\pi}{1}} x^2 \cos 2x dx$ Ж: $\frac{\pi^2 - 8}{32}$.

$$8. \int_0^1 \frac{\arcsin x dx}{\sqrt{1+x}}$$

$$\text{Ж: } \pi \sqrt{2} - 4$$

8-§. Ясси фигураларнинг юзларини ҳисоблаш

6.8.1. $y=f(x)$ функция графиги, $x=a$, $x=b$ иккита тўғри чизик ва Ox ўқ билан чегараланган фигура эгри чизикли трапеция дейилади.

Бундай эгри чизикли трапециянинг юзи $f(x) \geq 0$ бўлса,

$$S = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b y dx$$

формула бўйича ҳисобланади (24-шакл).

$y=f_1(x)$ ва $y=f_2(x)$ ($f_2(x) \geq f_1(x)$) эгри чизиклар ва $x=a$ ҳамда $x=b$ иккита тўғри чизик билан чегараланган фигуранинг юзи

$$S = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx$$


формула бўйича ҳисобланади (25-шакл)

Агар эгри чизикли трапеция $x=f(y)$ функция графиги, $y=c$, $y=d$ тўғри чизиклар ва Oy ўқ билан чегараланган бўлса, унинг юзи $f(y) \geq 0$ учун


$$S = \int_c^d f(y) dy = \int_c^d x dy$$

формула бўйича ҳисобланади (26-шакл).


$x=f_1(y)$ ва $x=f_2(y)$ ($f_2(y) \geq f_1(y)$) эгри чизиклар, $y=c$ ва $y=d$ иккита тўғри чизик билан чегараланган фигура юзи




24-шакл



25-шакл



26- шакл



27- шакл

$$S = \int_c^d (f_2(y) - f_1(y)) dy$$

формула бўйича ҳисобланади (27- шакл).

6.8.2. Агар эгри чизик $x=x(t)$, $y=y(t)$ параметрик тенгламалар билан берилган бўлса, у ҳолда шу эгри чизик, $x=a$, $x=b$ тўғри чизиклар ва Ox ўқ билан чегараланган эгри чизикли трапециянинг юзи

$$S = \int_{t_1}^{t_2} y(t) \cdot x'(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} y(t) dx(t)$$

формула бўйича ҳисобланади, бунда t_1 ва t_2 $a=x(t_1)$, $b=x(t_2)$ ($y(t) \geq 0$) тенгламалардан аниқланади.

6.8.3. $r=r(\varphi)$ функция графиги ва $\varphi=\alpha$, $\varphi=\beta$ никита нур билан чегараланган фигура эгри чизикли сектор дейилади, бунда φ ва r — кутб координаталари (28- шакл). Эгри чизикли секторнинг юзи


$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\varphi$$

формула бўйича ҳисобланади.


1- мисол. $y = \frac{x^2}{2}$ парабола, $x=1$, $x=3$ тўғри чизиклар ва Ox ўқ билан чегараланган фигуранинг юзини ҳисобланг.

Ечиш. Аввал шаклни чизамиз (29- шакл). Изланаётган юз ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$S = \int_a^b y dx = \int_1^3 \frac{x^2}{2} dx = \frac{x^3}{6} \Big|_1^3 = \frac{1}{6} (3^3 - 1^3) = \frac{26}{6} = \frac{13}{3} \text{ (қв. бирл.)}$$



28-шакл



29-шакл

2-мисол. $x=2-y-y^2$ эгри чизик ва ординаталар ўқи билан чегараланган фигуранинг юзини ҳисобланг.

Ечиш. Фигура Oy ўқка ёпишиб туради (30-шакл), унинг юзи $S = \int_c^d xdy$ формула бўйича ҳисобланади.


$$S = \int_{-2}^1 xdy = \int_{-2}^1 (2-y-y^2) dy = \left(2y - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right) \Big|_{-2}^1 = \\ = \left(2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) - \left(-4 - \frac{4}{2} + \frac{8}{3}\right) = \frac{9}{2} \text{ (кв. бирл.)}$$

3-мисол. $y=2-x^2$ ва $y^3=x^2$ эгри чизиклар билан чегараланган фигуранинг юзини топинг.


Ечиш. Берилган тенгламалар системасини ечиб, эгри чизикларнинг кесишиш нукталарини топамиз: $A(-1, 1)$ ва $B(1, 1)$. Интеграллаш чегаралари бўлиб $x=-1$ ва $x=1$ хизмат қилади.

Фигура юзи $S = \int_c^d (f_2(x) - f_1(x)) dx$ формула бўйича ҳисобланади

(31-шакл).



30-шакл



31-шакл

$$\begin{aligned}
 S &= \int_c^d (f_2(x) - f_1(x)) dx = \int_{-1}^1 (2 - x^2 - \sqrt[3]{x^3}) dx = \\
 &= \left(2x - \frac{x^3}{3} - \frac{3}{5} \sqrt[3]{x^5} \right) \Big|_{-1}^1 = \left(2 - \frac{1}{3} - \frac{3}{5} \right) - \\
 &- \left(-2 + \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \right) = \frac{16}{15} + \frac{16}{15} = \frac{32}{15} \text{ (кв. бирл.)}.
 \end{aligned}$$

4-ми с ол. Эллипсинг

$$\begin{cases} x = acost, \\ y = bsint \end{cases}$$

параметрик тенгнамаларидан фойдаланиб, унинг юзини топинг.


Ечиш. Эллипсинг симметриклигидан фойдаланиб, изланаётган юзинг тўртдан бирини ҳисоблаймиз (32-шакл). $x = acost$ тенгламада $x=0$ ва $x=a$ деб олсак, ушбу интеграллаш чегараларига эга бўламиз: $t_1 = \frac{\pi}{2}$, $t_2 = 0$. Ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4} S &= \int_{t_1}^{t_2} y dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 bsint (-asint) dt = ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \\
 &= \frac{ab}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2t) dt = \frac{ab}{2} \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{ab}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi ab}{4}.
 \end{aligned}$$


Демак, бутун фигуранинг юзи

$$S = \pi ab \text{ (кв бирл.)}.$$

5-ми с ол. $r^2 = 2\cos 2\varphi$ Бернулли лемнискатаси билан чегараланган фигура юзини топинг



32-шакл



33-шакл

Ечиш. Эгри чизиқнинг симметриклигидан фойдаланиб, олдин изланаётган юзнинг тўртдан бирини топамиз (33-шакл). Изланаётган юзнинг тўртдан бир қисми φ нинг 0 дан $\frac{\pi}{4}$ гача ўзгаришига тўғри келади.

Фигура юзини қуйидаги формула бўйича ҳисоблаймиз:

$$\frac{1}{4}S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2\cos 2\varphi d\varphi = \frac{1}{2} \sin 2\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2}.$$

Шундай қилиб, изланаётган юз: $S = \frac{1}{2}$ (қв. бирл.).

8-дарсхона топшириғи

Берилган чизиклар билан чегараланган фигуралар юзларини ҳисобланг:

1. $y = 4x - x^2$ ва Ox ўқ билан. Ж: $\frac{32}{3}$ (қв. бирл.).

2. $y = (x-1)^2$ ва $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ Ж: $\frac{10}{3} + \frac{\sqrt{2}}{2} \ln(3 + \sqrt{8}) \approx 4,58$ (қв. бирл.).

3. $\begin{cases} x = 2(t - \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases}$ (бир аркаси) ва $y = 0$. Ж: 12π (қв. бирл.).

4. $r = 2a\cos\varphi$ ва $r = 2a\sin\varphi$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$.

Ж: $\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)a^2$ (қв. бирл.).

5. $y = \frac{1}{1+x^2}$, $y = \frac{x^2}{2}$. Ж: $\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3}$ (қв. бирл.).

6. $y = x^2 + 4x$, $y = x + 4$. Ж: $\frac{125}{6}$ (қв. бирл.).

7. $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 = 9$, $y = x$, $y = -x\sqrt{3}$. Ж: $\frac{25\pi}{24}$ (қв. бирл.).

8. $x = 3t^2$, $y = 3t - t^3$. Ж: $\frac{72\sqrt{3}}{5}$ (қв. бирл.).

8-мустақил иш

Берилган чизиклар билан чегараланган фигуралар юзларини ҳисобланг:

1. $y = -x^2$, $x + y + 2 = 0$. Ж: 4,5 (кв. бирл.).
2. $xy = 20$, $x^2 + y^2 = 4$ (I чорак). Ж: $\frac{41}{2} \arcsin \frac{9}{41} + 20 \ln 0,8$ (кв. бирл.).
3. $x = a \cos^2 t$, $y = a \sin^2 t$. Ж: $\frac{3}{8} \pi a^2$ (кв. бирл.).
4. $x = 2t$, $y = 4t^2 - 6t$ ва $y = 0$. Ж: $\frac{9}{2}$ (кв. бирл.).
5. $r = a \sin 3\varphi$ (битта ҳалка). Ж: $\frac{\pi a^2}{12}$ (кв. бирл.).
6. $r = a \cos \varphi$, $r = 2a \cos \varphi$. Ж: $\frac{3}{2} \pi a^2$ (кв. бирл.).

9-§. Эгри чизик ёйлари узунликларини ҳисоблаш

Агар тўғри бурчакли координаталарда $y = f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада силлик (яъни $y' = f'(x)$ ҳосила узлуксиз) бўлса, у ҳолда бу эгри чизик мос ёйнинг узунлиги

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

формула бўйича ҳисобланади.

Эгри чизик

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

параметрик тенгламалар билан берилган бўлса, бу эгри чизикнинг $t \in [t_1, t_2]$ параметрнинг монотон ўзгаришига мос ёйнинг узунлиги


$$l = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

формула билан ҳисобланади.


Агар силлик эгри чизик кутб координаталарда $r = r(\varphi)$ ($\alpha \leq \varphi \leq \beta$) тенглама билан берилган бўлса, у ҳолда ёй узунлиги

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi$$

формула билан ҳисобланади.



34-шакл



35-шакл

1-мисол. $y^2 = x^2$ ярим кубик параболанинг координаталар бошидан $A(4, 8)$ нуктагача бўлган ёйи узунлигини топинг.

Ечиш. Аввал шаклни чизамиз (34-шакл). Парабола тенгламасини дифференциаллаймиз:

$$y = x^{\frac{1}{2}}, \quad y' = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}.$$

Формулага кўра:

$$\begin{aligned} l &= \int_0^4 \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}\right)^2} dx = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx = \\ &= \frac{4 \cdot 2}{9 \cdot 3} \left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{\frac{1}{2}} \Big|_0^4 = \frac{8}{27} (10\sqrt{10} - 1) \text{ (узун. бирл.)} \end{aligned}$$

2-мисол. Битта циклоида узунлигини топинг:

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t). \end{cases}$$

Ечиш. Циклоиданинг барча аркаси бир хил, қайси арка бўйлаб t параметр 0 дан 2π гача ўзгарса, ўша аркани оламиз (35-шакл):


$$x' = a(1 - \cos t), \quad y' = a \sin t.$$

Шу сабабли:

$$\begin{aligned} l &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt = a \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos t} dt = \\ &= 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = -4a \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = 8a \text{ (узун. бирл.)} \end{aligned}$$

3-мисол. $r = a \sin^3 \frac{\varphi}{4}$ ёрик эгри чизикнинг узунлигини ҳисобланг.

Ечиш. Берилган функция жуфт функция. Шу сабабли берилган эгри чизик кутб ўкига нисбатан симметрик. Нукта бутун эгри



36-шакл

чизикни φ 0 дан 4π гача ўзгарганда чизади, шунга кўра эгри чизикнинг ярми φ 0 дан 2π гача ўзгарганда чизилади (36-шакл).

$r' = a \sin^3 \frac{\varphi}{4} \cdot \cos \frac{\varphi}{4}$. Демак,

$$\begin{aligned} \frac{l}{2} &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \sin^8 \frac{\varphi}{4} + a^2 \sin^6 \frac{\varphi}{4} \cos^2 \frac{\varphi}{4}} d\varphi = \\ &= a \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{\varphi}{4} d\varphi = -4a \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{\varphi}{4} d\left(\cos \frac{\varphi}{4}\right) = \\ &= -4a \int_0^{2\pi} \left(1 - \cos^2 \frac{\varphi}{4}\right) d\left(\cos \frac{\varphi}{4}\right) = -4a \left(\cos \frac{\varphi}{4} - \frac{\cos^3 \frac{\varphi}{4}}{3}\right) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= 4a \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}a. \text{ Демак, } l = \frac{16}{3}a \text{ (узун. бирл.)}. \end{aligned}$$

9- дарсхона топшириғи

Эгри чизиклар ёйлари узунликларини ҳисобланг:

- $y = \ln \sin x$, $x = \frac{\pi}{3}$ дан $x = \frac{\pi}{2}$ гача. Ж: $\frac{1}{2} \ln 3$ (узун. бирл.).
- $y = \frac{2}{5}x^4 \sqrt{x} - \frac{2}{3} \sqrt{x^3}$ абсиссалар ўқи билан кесишиш нуқталари орасидаги. Ж: $\frac{20}{9} \sqrt{\frac{5}{3}}$ (узун. бирл.).
- $x = \frac{1}{3}t^3 - t$, $y = t^2 + 2$, $t = 0$ дан $t = 3$ гача. Ж: 12 (узун. бирл.).
- $x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$, $t = 0$ дан $t = \ln \pi$ гача. Ж: $\sqrt{2} (\pi - 1)$ (узун. бирл.).
- $r = \varphi^2$, $\varphi = 0$ дан $\varphi = \pi$ гача. Ж: $[(\pi^2 + 4) \sqrt{\pi^2 + 4} - 8] \cdot \frac{1}{3}$ (узун. бирл.).
- $r = a \sin \theta$. Ж: $4a$ (узун. бирл.).

9- мустақил иш

Эгри чизиклар ёйлари узунликларини ҳисобланг:

1. $y = \frac{x^2}{2}$, $x=0$ дан $x=1$ гача. Ж: $0.5 [\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ (узун. бирл.).
2. $y = 1 - \ln \cos x$, $x=0$ дан $x = \frac{\pi}{6}$ гача. Ж: $\frac{1}{2} \ln 3$ (узун. бирл.).
3. $x = 8 \sin t + 6 \cos t$, $y = 6 \sin t - 8 \cos t$, $t=0$ дан $t = \frac{\pi}{2}$ гача. Ж: 5л (узун. бирл.).
4. $x = a(2 \cos t - \cos 2t)$, $y = a(2 \sin t - \sin 2t)$. Ж: $16a$ (узун. бирл.).
5. $r = a \cos \frac{3\varphi}{3}$, $\varphi=0$ дан $\varphi = \frac{\pi}{2}$ гача. Ж: $\frac{a}{8} (2\pi + 3\sqrt{3})$ (узун. бирл.).
6. $r = 1 - \cos \varphi$ Ж: 8 (узун. бирл.).

10- §. Ҳажмларни ҳисоблаш

6.10.1. Агар $S(x)$ юз жисмнинг Ox ўққа перпендикуляр текислик билан кесишишидан ҳосил бўлган қесими бўлиб, $[a, b]$ кесмада узлуксиз функция бўлса, жисмнинг ҳажми

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

формула билан ҳисобланади.

6.10.2. $y=f(x)$ эгри чизик ва $x=a$, $x=b$, $y=0$ тўғри чизиклар билан чегараланган эгри чизикли трапеция Ox ўқи атрофида айлантирилса, V ҳолда айланиш жисмининг ҳажми

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx$$

формула билан ҳисобланади.

Агар шу фигуранинг ўзи Oy ўқи атрофида айлантирилса, V ҳолда айланиш жисмининг ҳажми

$$V = 2\pi \int_a^b xy dx$$

формула билан ҳисобланади

6.10.3. Агар $y_1=f_1(x)$ ва $y_2=f_2(x)$ (бунда $f_1(x) \geq f_2(x)$) эгри чизиклар ҳамда $x=a$, $x=b$ тўғри чизиклар билан чегараланган фигура Ox ўқи атрофида айланса, айланиш жисмининг ҳажми

$$V = \pi \int_a^b (y_2^2 - y_1^2) dx$$

формула буйича ҳисобланади.

Агар шу фигуранинг ўзи Oy ўқ атрофида айланса, айланиш жисмининг ҳажми

$$V = 2\pi \int_a^b x(y_2 - y_1) dx$$

формула бўйича ҳисобланади.

6.10.4. Агар эгри чизикли трапеция $x=f(y)$ функция графиги, $y=c$, $y=\alpha$ тўғри чизиклар ва Oy ўқи билан чегараланса, бу фигуранинг Oy ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган жисмининг ҳажми

$$V = \pi \int_c^d x^2 dy$$

формула бўйича ҳисобланади.

Агар шу фигуранинг ўзи Ox ўқи атрофида айланса, айланиш жисмининг мос ҳажми

$$V = 2\pi \int_c^d xy dy$$

формула бўйича аниқланади.

6.10.5. Агар $x_1=f_1(y)$ ва $x_2=f_2(y)$ (бунда $x_2 \geq x_1 \geq 0$) эгри чизиклар ва $y=c$, $y=d$ тўғри чизиклар билан чегараланган фигура Oy ўқи атрофида айланса, у ҳолда айланиш жисмининг ҳажми

$$V = \pi \int_c^d (x_2^2 - x_1^2) dy$$

формула бўйича топилади.

Агар шу фигуранинг ўзи Ox ўқи атрофида айланса, у ҳолда айланиш жисмининг мос ҳажми ушбуга тенг бўлади:


$$V = 2\pi \int_c^d y(x_2 - x_1) dy.$$

6.10.6. Агар эгри чизик параметрик ёки қутб координаталарда берилса, у ҳолда келтирилган формулаларда мос ўринга қўйишларни бажариш керак бўлади.


1-мисол. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ эллипсоиднинг ҳажмини топинг.

Ечиш. Эллипсоиднинг Ox ўққа перпендикуляр бирор текислик билан кесилдан ҳосил бўлган кесимининг ярим ўқлари

$$b_1 = b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \quad \text{ва} \quad c_1 = c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$$



37- шакл



38- шакл

бўлган

$$\frac{y^2}{b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)} + \frac{z^2}{c^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)} = 1$$

эллипсидир. Демак, кесим юзи (8- §, 4- мисол):

$$S(x) = \pi b_1 c_1 = \pi bc \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right),$$

бунда x ўзгарувчи $-a$ дан a гача ўзгаради. Шунга кўра эллипсоиднинг ҳажми ушбуга тенг:

$$\begin{aligned} V &= \int_{-a}^a S'(x) dx = \pi bc \int_{-a}^a \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx = \pi bc \left(x - \frac{x^3}{3a^2}\right) \Big|_{-a}^a = \\ &= \pi bc \left[\left(a - \frac{a^3}{3a^2}\right) - \left(-a + \frac{a^3}{3a^2}\right)\right] = \frac{4}{3} \pi abc \text{ (куб бирл.)} \end{aligned}$$

2- мисол. $y = \sin x$ синусоиданинг битта ярим тўлкини ва Ox ўқнинг $[0, \pi]$ кесмаси билан чегараланган фигуранинг а) Ox ўқи атрофида ва б) Oy ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган jismlarнинг ҳажмини ҳисобланг (37- шакл).

$$\begin{aligned} \text{Е ч и ш. а) } V &= \pi \int_0^b y^2 dx = \pi \int_0^{\pi} \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} (1 - \cos 2x) dx = \\ &= \frac{\pi}{2} \left(x - \frac{\sin 2x}{2}\right) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{2} (\pi) = \frac{\pi^2}{2} \text{ (куб бирл.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{б) } V &= 2\pi \int_0^{\pi} xy dx = 2\pi \int_0^{\pi} x \cdot \sin x dx = \\
 &= \left\{ \begin{array}{l} u = x, du = dx \\ dv = \sin x dx, v = -\cos x \end{array} \right\} = 2\pi \left(-x \cdot \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x dx \right) = \\
 &= 2\pi \left(-\pi \cos \pi + \sin x \Big|_0^{\pi} \right) = 2\pi^2 \text{ (куб. бирл.)}
 \end{aligned}$$

3-ми с о л. $x^2 + (y-b)^2 \leq R^2$ ($b > R$) доиранинг Ox ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган торнинг ҳажмини топинг (38-шакл).

Е ч и ш. $x^2 + (y-b)^2 = R^2$ айлана тенгласидан:

$$y_1 = b - \sqrt{R^2 - x^2},$$

$$y_2 = b + \sqrt{R^2 - x^2},$$

Шунинг учун

$$V = \pi \int_{-R}^R (y_2^2 - y_1^2) dx = \pi \int_{-R}^R [(b + \sqrt{R^2 - x^2})^2 - (b - \sqrt{R^2 - x^2})^2] dx =$$

$$= 4\pi b \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} dx = \left. \begin{array}{l} x = R \sin t, \\ dx = R \cos t dt, \end{array} \right\} \begin{array}{|c|c|} \hline x & t \\ \hline -R & -\frac{\pi}{2} \\ \hline R & \frac{\pi}{2} \\ \hline \end{array}$$

$$= 4\pi b \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{R^2 - R^2 \sin^2 t} \cdot R \cos t dt =$$

$$= 4\pi b R^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t dt = 2\pi b R^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt =$$


$$= 2\pi b R^2 \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 2\pi^2 b R^2 \text{ (куб. бирл.)}$$

4-ми с о л. $y = x^2$ ва $8x - y^2$ параболалар билан чегараланган фигуранинг Oy ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг (39-шакл).


Е ч и ш.

$$\begin{cases} y = x^2, \\ y^2 = 8x \end{cases}$$

тенгламалар системасидан параболаларнинг кесишиш нуқталарини топамиз: $O(0, 0)$ ва $A(2, 4)$



39-шакл



40-шакл

$x_2(y) = \sqrt{y} \geq x_1(y) = \frac{y^2}{8}$ га эгамиз, ўзгарувчи y 0 дан 4 гача ўзгаради. Демак,

$$V = \pi \int_0^4 (x_2^2 - x_1^2) dy = \pi \int_0^4 \left(y - \frac{y^4}{64} \right) dy =$$

$$= \pi \left(\frac{y^2}{2} - \frac{y^5}{320} \right) \Big|_0^4 = \pi \left(8 - \frac{32}{10} \right) = \frac{24\pi}{5} \text{ (куб бирл.)}$$

5-мисол. $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ астроида билан чегараланган фигуранинг Ox ўқи атрофида айлантирилишидан ҳосил бўлган жисмнинг ҳажмини ҳисобланг (40-шакл).

Ечиш. Изланаётган ҳажм OAB фигурани айлантиришдан ҳосил бўлган ҳажмнинг иккиланганига тенг. Шунинг учун

$$V = 2\pi \int_0^a y^2 dx.$$

Ўзгарувчини алмаштирамиз:

$$V = 2\pi \int_0^a y^2 dx = \left. \begin{array}{|c|c|} \hline x & t \\ \hline 0 & \frac{\pi}{2} \\ \hline a & 0 \\ \hline \end{array} \right\} =$$

$$= 2\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a^2 \sin^6 t (-3a \cos^2 t \sin t) dt = 6\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 t \cos^2 t dt =$$

$$= -6\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 t)^3 \cos^2 t d(\cos t) = -6\pi a^3 \left(\frac{1}{3} \cos^3 t - \frac{3}{5} \cos^5 t + \right.$$

$$\left. + \frac{3}{7} \cos^7 t - \frac{1}{9} \cos^9 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 6\pi a^3 \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{5} + \frac{3}{7} - \frac{1}{9} \right) = \frac{32}{105} \pi a^3 \text{ (куб бирл.)}$$

10- дарсхона топшириғи

1. $x=2$ ва $x=3$ текисликлар билан $x^2+y^2+z^2=16$ шардан қирқилган шар қатламининг ҳажмини ҳисобланг: Ж: $\frac{29}{3}\pi$ (куб бирл.)

2. Координата ўқлари ва $x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{1}{2}}$ парабола билан чегараланган юзни Ox ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг. Ж: $\frac{\pi a^3}{15}$ (куб бирл.) .

3. $y=\sin x$ синусоида ёйи, ординаталар ўқи ва $y=1$ тўғри чизик билан чегараланган фигурани Oy ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг.

Ж: $\frac{\pi(\pi^2-8)}{4}$ (куб бирл.) .

4. $y=\frac{1}{4}x^2+2$ парабола ва $5x-8y+14=0$ тўғри чизик билан чегараланган фигурани Ox ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг. Ж: $\frac{891\pi}{1280}$ (куб. бирл.) .

5. Ушбу $\begin{cases} x=a(t-\sin t), \\ y=a(1-\cos t) \end{cases}$ циклоиданинг бир аркасини Ox ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг. Ж: $5a^3\pi^2$ (куб бирл.) .

10- мустақил иш

1. $z=\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}$ ва $z=1$ сиртлар билан чегараланган жисм ҳажмини ҳисобланг. Ж: $\pi\sqrt{2}$ (куб бирл.) .

2. а) $y=\frac{64}{x^2+16}$ ва $x^2=8y$, б) $y^2=x$ ва $x^2=y$ чизиклар билан чегараланган фигураларни Ox ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг.

Ж: а) $\frac{16\pi}{5}(5\pi+8)$ (куб. бирл.); б) $0,3\pi$ (куб. бирл.) .

3. а) $y=x^3$, $y=0$, $x=2$; б) $x^2-y^2=4$, $y=\pm 2$ чизиклар билан чегараланган фигурани Oy ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг. Ж: а) $\frac{64}{5}\pi$ (куб. бирл.) ;

б) $\frac{64}{3}\pi$ (куб. бирл.) .

4. $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ циклоиданинг бир аркаси ва Ox ўқи билан чегараланган фигуранини: а) Oy ўқи атрофида; б) фигуранинг симметрия ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жнем хажмини ҳисобланг.

Ж: а) $6\pi^3 a^3$ (куб. бирл.); б) $\frac{\pi a^3}{6}(9\pi^2 - 16)$ (куб. бирл.) .

11-§. Хосмас интеграллар, яқинлашиши хосмас интегрални ҳисоблаш.

Интегралланиш чегаралари чексиз бўлган интеграллар ёки чегараланмаган функциялардан олинган интеграллар *хосмас интеграллар* дейилади:

6.11.1. $[a, +\infty)$ ораликда узлуксиз бўлган $f(x)$ функциядан олинган интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^N f(x) dx$$

тенглик билан аниқланади.

Агар шу лимит мавжуд бўлиб, чекли бўлса, хосмас интеграл *яқинлашувчи*, акс ҳолда хосмас интеграл *узоқлашувчи* дейилади.

Агар $F(x)$ функция $f(x)$ нинг бошланғич функцияси бўлса, у ҳолда:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = F(+\infty) - F(a), \text{ бунда } F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x).$$

Қуйидаги интеграллар ҳам шунга ўхшаш аниқланади:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{N \rightarrow -\infty} \int_N^b f(x) dx,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{N_1 \rightarrow -\infty} \int_{N_1}^b f(x) dx + \lim_{N_2 \rightarrow +\infty} \int_a^{N_2} f(x) dx.$$

1-м и с о л. $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx$ хосмас интегрални ҳисобланг (бунда α —

узгармас мусбат сон).

Е ч и ш. Таърифга кўра:

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^N e^{-\alpha x} dx = \lim_{N \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha x} \right) \Big|_0^N =$$

$$= \lim_{N \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha N} + \frac{1}{\alpha} \right) = \frac{1}{\alpha} \lim_{N \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{e^{\alpha N}} \right) = \frac{1}{\alpha}.$$

Демак, берилган интеграл яқинлашувчи.

2- мисол. $\alpha > 0$ нинг қандай қийматларида

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$$

интеграл яқинлашувчи, қандай қийматларида узоклашувчи эканини аниқланг.

Ечиш. $\alpha = 1$ деб фарз қиламиз, у ҳолда:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_1^N \frac{dx}{x} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_1^N = \lim_{N \rightarrow +\infty} \ln N = \infty.$$

Демак, берилган интеграл узоклашувчи. Энди $\alpha \neq 1$ деб фарз қиламиз, у ҳолда:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_1^N \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha} \Big|_1^N =$$

$$= \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-\alpha} (N^{1-\alpha} - 1).$$

Демак, $\alpha > 1$ да

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{\alpha-1},$$

яъни берилган интеграл яқинлашувчи, $0 < \alpha < 1$ да эса

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = +\infty, \text{ яъни берилган интеграл узоклашувчи. Шундай}$$

килиб, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ хосмас интеграл $\alpha > 1$ да яқинлашувчи ва

$0 < \alpha \leq 1$ да узоклашувчи.

6.11.2. 2- мисолдаги интеграл интегралнинг яқинлашувчи ёки узоклашувчи эканини таққослаш аломатларидан фойдаланишда қўлланилади.

1. Агар $f(x)$ ва $\varphi(x)$ функциялар барча $x \geq a$ лар учун аниқланган ва $[a, +\infty)$ да интегралланувчи ҳамда барча $x \geq a$ лар учун $0 \leq f(x) \leq \varphi(x)$ бўлса, у ҳолда

$$а) \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx \text{ интегралнинг яқинлашувчанлигидан } \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

интегралнинг яқинлашувчи экани келиб чиқади, шу билан бирга

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \leq \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx;$$

$$б) \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ интегралнинг узоклашувчанлигидан } \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$$

интегралнинг узоклашувчи экани келиб чиқади.

2. Агар $f(x)$ функция барча x лар учун аниқланган ва $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ интеграл яқинлашувчи бўлса, у ҳолда $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ ин-

теграл ҳам яқинлашади; бу ҳолда у *абсолют яқинлашувчи интеграл* дейилади, бунда

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)| dx.$$

3. Агар $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ интеграл яқинлашувчи, $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ узокла-

шувчи бўлса, у ҳолда $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ интегрални *шартли яқинлашувчи интеграл* дейилади.

3- м и с о л. $\int \frac{dx}{3x^4 + 2x^2 + 1}$ интегралнинг яқинлашувчанлигини

текширинг.

Е ч и ш. $f(x) = \frac{1}{3x^4 + 2x^2 + 1} < \frac{1}{3x^4} < \frac{1}{x^4} = \varphi(x)$ ($x \geq 1$ да) ва

$\int \frac{dx}{x^4}$ интеграл яқинлашувчи (2- мисол $\alpha = 4 > 1$) бўлгани учун

берилган интеграл ҳам яқинлашувчи (такқослаш аломати асосида).

4- м и с о л. $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ интегралнинг яқинлашувчанлигини тек-

ширинг.

Ечиш. $x \geq 1$ да $f(x) = e^{-x} < e^{-x} = \varphi(x)$ ва $\int_1^{\infty} e^{-x} dx$ интеграл яқинлашувчи (1- мисол, $\alpha = 1$) бўлгани сабабли берилган интеграл яқинлашувчи.

5- мисол. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x - \sin^2 x}$ интегралнинг яқинлашувчанлигини текширинг.

Ечиш. $x \geq 1$ да $f(x) = \frac{1}{x - \sin^2 x} > \frac{1}{x} = \varphi(x)$ ва $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ интеграл узоклашувчи (2- мисол, $\alpha = 1$), шунга кўра $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x - \sin^2 x}$ интеграл узоклашувчи.

6.11.3. $[a, b]$ ораликда узлуксиз, b нуктада узилишга эга $f(x)$ функциядан олинган хосмас интеграл

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$$

тенглик билан аниқланади.

Агар бу лимит мавжуд бўлиб, у чекли бўлса хосмас интеграл яқинлашувчи, акс ҳолда хосмас интеграл узоклашувчи дейилади.

Агар $F(x)$ функция $f(x)$ учун бошланғич функция бўлса, у ҳолда

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

бунда $F(b) = \lim_{x \rightarrow b} F(x)$.

Агар функция a нуктада ёки $[a, b]$ ораликнинг бирор ички c нуктасида узилишга эга бўлса ҳам интеграл юқоридагига ўхшаш аниқланади:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

ва

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow +0} \int_a^{c-\varepsilon_1} f(x) dx + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow +0} \int_{c+\varepsilon_2}^b f(x) dx.$$

6 мисол. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$ хосмас интегрални ҳисобланг:

Е ч и ш. Интеграл остидаги функция $x=1$ нуктада узилишга эга. Демак, таърифга кўра,

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} (-2\sqrt{1-x}) \Big|_0^{1-\varepsilon} =$$

$$= -2 \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} (\sqrt{1-1+\varepsilon} - \sqrt{1-0}) = -2 \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} (\sqrt{\varepsilon} - 1) = 2,$$

демак, берилган интеграл яқинлашувчи.

7-ми с о л. $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ (α — ўзгармас мусбат сон) хосмас интеграл-

нинг яқинлашиш ва узоклашиш шартларини топинг.

Е ч и ш. Интеграл остидаги функция $x=0$ нуктада узилишга эга. Агар $\alpha=1$ бўлса, у ҳолда ушбуга эгамиз:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_\varepsilon^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \ln x \Big|_\varepsilon^1 = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} (\ln 1 - \ln \varepsilon) = \infty,$$

яъни интеграл узоклашувчи.

Агар $\alpha \neq 1$ бўлса, у ҳолда:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_\varepsilon^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_\varepsilon^1 = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \frac{1}{1-\alpha} (1 - \varepsilon^{1-\alpha})$$

Демак, $0 < \alpha < 1$ да қуйидагиларга эгамиз: $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}$, яъни

интеграл яқинлашувчи; $\alpha > 1$ да эса $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \infty$, яъни интеграл узоклашувчи.

Шундай қилиб, $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ хосмас интеграл $0 < \alpha < 1$ да яқинла-

шувчи, $\alpha \geq 1$ да узоклашувчи.

6.11.4. Охириги мисол натижасидан таққослаш аломатларида фойдаланилади:

1. Агар $f(x)$ ва $\varphi(x)$ функциялар $a \leq x < b$ ораликда аниқланган ҳамда $[a, b-\varepsilon]$ ($0 < \varepsilon < b-a$) кесмада интеграллашувчи ва агар $0 \leq f(x) \leq \varphi(x)$ бўлса, у ҳолда:

а) $\int_a^b \varphi(x) dx$ интегралнинг яқинлашувчанлигидан $\int_a^b f(x) dx$ интег-

ралнинг яқинлашувчанлиги келиб чиқади. Бунда $\int_a^b f(x) dx \leq$

$$\leq \int_a^b \varphi(x) dx,$$

б) $\int_a^b f(x) dx$ интегралнинг узоклашувчанлигидан $\int_a^b \varphi(x) dx$ интегралнинг узоклашувчи эканлиги келиб чиқади.

2. Агар $f(x)$ функция $[a, b)$ оралиқда аниқланган ва $[a, b - \varepsilon]$ кесмада интегралланувчи бўлса, $\int_a^b |f(x)| dx$ интегралнинг яқинлашувчанлигидан $\int_a^b f(x) dx$ интегралнинг яқинлашувчанлиги келиб чиқади. Бу ҳолда $\int_a^b f(x) dx$ интеграл *абсолют яқинлашувчи интеграл* дейилади.

3. Агар $\int_a^b f(x) dx$ интеграл яқинлашувчи, $\int_a^b |f(x)| dx$ интеграл узоклашувчи бўлса, у ҳолда $\int_a^b f(x) dx$ интеграл *шартли яқинлашувчи интеграл* дейилади.

8- м и с о л. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x} + 2x^3}$ интегралнинг яқинлашувчанлигини текширинг.

Е ч и ш. Интеграл остидаги функция $x=0$ нуктада узилишга эга.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x} + 2x^3} < \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}} = \varphi(x)$$

ва $\int_0^1 \frac{dx}{x^{\frac{1}{3}}}$ интеграл яқинлашади (7- мисол, $\alpha = \frac{1}{3} < 1$), демак, берилган интеграл ҳам яқинлашади.

11- дарсхона топшириғи

1. Хосмас интегралларни ҳисобланг ёки уларнинг узоклашувчи эканини аниқланг.

1. $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} dx$ Ж: $\frac{\pi^2}{8}$

2. $\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{4+x^2}$ Ж: $\frac{\pi}{4}$

$$3. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)} \quad \text{Ж: } \frac{\pi}{6}$$

$$4. \int_0^1 \frac{dx}{x(\ln x)^2} \quad \text{Ж: } 1.$$

$$5. \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} \quad \text{Ж: узоқлашади.}$$

$$6. \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2-3}} \quad \text{Ж: л.}$$

II. Интегралларнинг яқинлашувчанлигини текширинг:

$$7. \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x} dx \quad \text{Ж: узоқлашувчи.}$$

$$8. \int_1^{+\infty} \left(1 - \cos \frac{2}{x}\right) dx \quad \text{Ж: яқинлашувчи.}$$

$$9. \int_0^1 \frac{e^x dx}{\sqrt{1-\cos x}} \quad \text{Ж: узоқлашувчи.}$$

$$10. \int_0^1 \frac{\cos^2 x}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad \text{Ж: яқинлашувчи.}$$

11- мустақил иш

I. Хосмас интегралларни ҳисобланг ёки уларнинг узоқлашувчанлигини аниқланг:

$$a) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(x+1)} \quad \text{Ж: } 1 - \ln 2.$$

$$б) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xdx}{1+x^2} \quad \text{Ж: узоқлашувчи.}$$

$$в) \int_1^{+\infty} \frac{\arctg x}{x^2} dx \quad \text{Ж: } \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2.$$

$$г) \int_1^2 \frac{xdx}{\sqrt{x-1}} \quad \text{Ж: } \frac{8}{3}.$$

$$д) \int_{-1}^0 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^3} dx \quad \text{Ж: } -\frac{2}{e}$$

$$е) \int_{-1}^1 \frac{x-1}{\sqrt{x^5}} dx \quad \text{Ж: узоклашувчи}$$

2. Интегралларнинг яқинлашувчанлигини текширинг:

$$а) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x \ln(\ln x)} \quad \text{Ж: узоклашувчи.}$$

$$б) \int_0^1 \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt{1-x^4}} \quad \text{Ж: яқинлашувчи.}$$

7- назорат иши

1. Аниқмас интегрални тоинг:

$$1.1. \int x^{-1} \ln x dx$$

$$1.2. \int \frac{x dx}{\cos^2 x}$$

$$1.3. \int x \arctg x dx$$

$$1.4. \int \sqrt{x} \ln x dx$$

$$1.5. \int x^2 e^{-2x} dx$$

$$1.6. \int \frac{\ln x}{x^2} dx$$

$$1.7. \int x^2 \cos 5x dx$$

$$1.8. \int \ln^2 x dx$$

$$1.9. \int x \arcsin x dx$$

$$1.10. \int \arctg \sqrt{4x-1} dx$$

$$1.11. \int \ln(4x^2+1) dx$$

$$1.12. \int \frac{x \cos x}{\sin^4 x} dx$$

$$1.13. \int x \sin^2 x dx$$

$$1.14. \int x \cdot \operatorname{tg}^2 x dx$$

$$1.15. \int \frac{x dx}{\sin^4 x}$$

$$1.16. \int \frac{x \sin x dx}{\cos^2 x}$$

$$1.17. \int \sqrt{x} \ln^2 x dx$$

$$1.18. \int \frac{\ln^2 x dx}{\sqrt{x^2}}$$

$$1.19. \int x \cdot \ln^2 x dx$$

$$1.20. \int x^3 \ln^2 x dx$$

$$1.21. \int \frac{\ln^2 x}{\sqrt{x}} dx$$

$$1.22. \int (x^2+2) e^{\frac{x}{2}} dx$$

$$1.23. \int (x+3)^2 \sin 2x dx$$

$$1.24. \int \ln(x^2+4) dx$$

$$1.25. \int \arctg \frac{1}{x} dx$$

$$1.26. \int x \cdot \arcsin \frac{1}{x} dx$$

1.27. $\int x \cdot 3^x dx$

1.28. $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{x-1}} dx$

1.29. $\int x^3 \cdot \arctg x dx$

1.30. $\int \frac{\ln \cos x}{\sin^2 x} dx$

2. Аниқмас интегрални тошинг:

2.1. $\int \frac{2x-1}{\sqrt{x^2-4x+1}} dx$

2.2. $\int \frac{x+2}{x^2+2x+2} dx$

2.3. $\int \frac{x+3}{\sqrt{4x^2+4x+5}} dx$

2.4. $\int \frac{x+5}{2x^2+2x+3} dx$

2.5. $\int \frac{x+4}{\sqrt{x^2+x-2}} dx$

2.6. $\int \frac{x+1}{3+4x-x^2} dx$

2.7. $\int \frac{2x-3}{\sqrt{8-2x-x^2}} dx$

2.8. $\int \frac{x-2}{x^2+x+1} dx$

2.9. $\int \frac{8x+3}{\sqrt{5+2x-x^2}} dx$

2.10. $\int \frac{x-7}{x^2+4x+13} dx$

2.11. $\int \frac{3x-1}{x^2-6x+10} dx$

2.12. $\int \frac{x+5}{\sqrt{3x^2+6x+1}} dx$

2.13. $\int \frac{x+1}{4x^2-12x+13} dx$

2.14. $\int \frac{x+2}{\sqrt{3-x^2+2x}} dx$

2.15. $\int \frac{3x-2}{5x^2-3x+2} dx$

2.16. $\int \frac{2x+3}{\sqrt{15-4x^2+4x}} dx$

2.17. $\int \frac{4x-3}{5x^2+6x+18} dx$

2.18. $\int \frac{3x-1}{\sqrt{x^2+2x+2}} dx$

2.19. $\int \frac{2x-1}{5x^2-x+2} dx$

2.20. $\int \frac{x-3}{\sqrt{3-2x-x^2}} dx$

2.21. $\int \frac{x-8}{5-4x+4x^2} dx$

2.22. $\int \frac{x-2}{\sqrt{4-2x-x^2}} dx$

2.23. $\int \frac{5x+3}{x^2+10x+29} dx$

2.24. $\int \frac{x-2}{\sqrt{x^2-2x+1}} dx$

2.25. $\int \frac{x+1}{5x^2+2x+1} dx$

2.26. $\int \frac{2x-1}{\sqrt{x^2-4x+1}} dx$

2.27. $\int \frac{2x-5}{x^2+6x+13} dx$

2.28. $\int \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+4x+2}} dx$

2.29. $\int \frac{2x+3}{15-4x^2+4x} dx$

2.30. $\int \frac{x-5}{\sqrt{6+4x-x^2}} dx$

3. Аниқмас интегрални топинг:

$$3.1. \int \frac{dx}{4x^3 + x}$$

$$3.3. \int \frac{x dx}{x^3 - 3x + 2}$$

$$3.5. \int \frac{x^2 dx}{x^4 - 16}$$

$$3.7. \int \frac{x-2}{x^4 + 4x^2} dx$$

$$3.9. \int \frac{x^4 dx}{x^4 + 6x^2 + 8}$$

$$3.11. \int \frac{x-1}{2x^3 + 3x^2 + x} dx$$

$$3.13. \int \frac{x^2 + x - 1}{x^3 + x^2 - 6x} dx$$

$$3.15. \int \frac{x^3 - 6}{x^4 + 6x + 8} dx$$

$$3.17. \int \frac{x^2 dx}{x^4 + x^2 - 2}$$

$$3.19. \int \frac{dx}{x^4 - x^3 + x^2 - x}$$

$$3.21. \int \frac{x+2}{x^3 - 2x^2 + 2x} dx$$

$$3.23. \int \frac{x dx}{x^3 - 1}$$

$$3.25. \int \frac{x^4 dx}{x^4 + 5x^2 + 4}$$

$$3.27. \int \frac{dx}{4x^3 - x}$$

$$3.29. \int \frac{dx}{x^3 - 8}$$

$$3.2. \int \frac{x-1}{x^3 + 1} dx$$

$$3.4. \int \frac{x^2 - 3}{x^4 + 5x^2 + 6} dx$$

$$3.6. \int \frac{x+3}{x^3 + x^2 - 2x} dx$$

$$3.8. \int \frac{2x^2 - 3x - 12}{x^3 + x^2 - 6x} dx$$

$$3.10. \int \frac{6x^4 - 1}{2x^3 - x + 1} dx$$

$$3.12. \int \frac{x+4}{x^3 + 6x^2 + 9x} dx$$

$$3.14. \int \frac{dx}{x^4 + x^3 + x^2 + x}$$

$$3.16. \int \frac{dx}{x^4 + 5x^2 + 4}$$

$$3.18. \int \frac{2x^2 - 3x - 3}{(x-1)(x^2 - 2x + 5)} dx$$

$$3.20. \int \frac{(3x-7)dx}{x^3 + x^2 + 4x + 4}$$

$$3.22. \int \frac{x-1}{x^3 + x} dx$$

$$3.24. \int \frac{x^3 - 6}{x^4 + 6x + 8} dx$$

$$3.26. \int \frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x} dx$$

$$3.28. \int \frac{x^3 dx}{(x+2)^2(x+4)^2}$$

$$3.30. \int \frac{x+5}{x^4 + 2x^3 + x^2} dx$$

4. Аниқмас интегрални топинг:

$$4.1. \int \frac{dx}{x(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})}$$

$$4.3. \int \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt[4]{x^3 - 1}} dx$$

$$4.2. \int \frac{\sqrt[5]{x} - 1}{1 + \sqrt{x}} dx$$

$$4.4. \int \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x+1} + 1} dx$$

$$4.5. \int \frac{\sqrt{x} dx}{1 + \sqrt[3]{x^2}}$$

$$4.7. \int \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt[4]{x} + 2}$$

$$4.9. \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$$

$$4.11. \int \frac{xdx}{\sqrt[4]{1+x}}$$

$$4.13. \int \frac{xdx}{(2+5x)\sqrt{2+5x}}$$

$$4.15. \int \frac{dx}{\sqrt{1-2x} - \sqrt[4]{1-2x}}$$

$$4.17. \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x^3} - 2\sqrt{x^2}}$$

$$4.19. \int \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt[4]{x^3} - 1)}$$

$$4.21. \int \frac{\sqrt{x+3}}{1 + \sqrt[3]{x+3}} dx$$

$$4.23. \int \frac{x+1}{\sqrt[3]{2x+1}} dx$$

$$4.25. \int \frac{xdx}{2 + \sqrt{2x+1}}$$

$$4.27. \int \frac{dx}{\sqrt{x+3}(1 + \sqrt[4]{x+3})}$$

$$4.29. \int \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt[3]{x-1} + 1} dx$$

$$4.6. \int \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt[3]{x} + 1} dx$$

$$4.8. \int \frac{\sqrt[3]{x}}{1 + \sqrt{x}} dx$$

$$4.10. \int \frac{1 + \sqrt[4]{x-1}}{\sqrt{x-1}} dx$$

$$4.12. \int \frac{dx}{x\sqrt{x+1}}$$

$$4.14. \int \frac{xdx}{\sqrt[3]{5x-1}}$$

$$4.16. \int \frac{\sqrt[6]{x} dx}{1 + \sqrt[3]{x}}$$

$$4.18. \int \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x}(\sqrt[4]{x} + 1)} dx$$

$$4.20. \int \frac{dx}{\sqrt{x-2}(1 + \sqrt[4]{x-2})}$$

$$4.22. \int \frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} - 1} dx$$

$$4.24. \int \frac{\sqrt[4]{x+1}}{(\sqrt[4]{x} + 4)\sqrt{x^3}} dx$$

$$4.26. \int \frac{1 - \sqrt[4]{x} + 2\sqrt[3]{x}}{x + 2\sqrt{x^3} + \sqrt{x^4}} dx$$

$$4.28. \int \frac{1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x^5}(1 + \sqrt[4]{x})} dx$$

$$4.30. \int \frac{2\sqrt[4]{x} + 1}{\sqrt{x^3}(\sqrt{x} + 4)} dx$$

5. Ашиглас интегрални тошинг:

$$5.1. \int \frac{\sin x dx}{5 + 3\sin x}$$

$$5.3. \int \frac{\sin^2 x dx}{(1 + \cos x + \sin x)^2}$$

$$5.5. \int \frac{\cos x dx}{1 + \cos x + \sin x}$$

$$5.2. \int \frac{dx}{\cos x(1 + \cos x)}$$

$$5.4. \int \frac{1 - \sin x}{\cos x(1 + \cos x)} dx$$

$$5.6. \int \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x + \sin x} dx$$

- 5.7. $\int \frac{\cos x - \sin x}{(1 + \sin x)^2} dx$.
- 5.8. $\int \frac{8 + \operatorname{tg} x}{18 \sin^2 x + 2 \cos^2 x} dx$.
- 5.9. $\int \frac{1 + \operatorname{ctg} x}{(\sin x + 2 \cos x)^2} dx$.
- 5.10. $\int \frac{6 + \operatorname{tg} x}{9 \sin^2 x + 4 \cos^2 x} dx$.
- 5.11. $\int \frac{5 \operatorname{tg} x + 2}{2 \sin 2x + 5} dx$.
- 5.12. $\int \frac{36 dx}{(6 - \operatorname{tg} x) \sin 2x}$.
- 5.13. $\int \frac{\operatorname{tg}^2 x}{4 + 3 \cos 2x} dx$.
- 5.14. $\int \frac{\sin^3 x}{\sqrt{\sin x}} dx$.
- 5.15. $\int \frac{\sin^4 x}{\cos^4 x} dx$.
- 5.16. $\int \frac{\sin 2x}{\cos^4 x} dx$.
- 5.17. $\int \frac{dx}{\sin^3 x}$.
- 5.18. $\int \sin^4 \frac{x}{2} dx$.
- 5.19. $\int \cos^5 x dx$.
- 5.20. $\int \cos^2 x \sin^4 x dx$.
- 5.21. $\int \operatorname{ctg}^3 x dx$.
- 5.22. $\int \operatorname{tg}^4 x dx$.
- 5.23. $\int \cos^4 x \sin^2 x dx$.
- 5.24. $\int \frac{dx}{\sin^6 x}$.
- 5.25. $\int \sin^5 x dx$.
- 5.26. $\int \sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x dx$.
- 5.27. $\int \frac{\operatorname{tg} x + 2}{\sin^2 x + 2 \cos^2 x - 3} dx$.
- 5.28. $\int \frac{dx}{\sin x (1 - \sin x)}$.
- 5.29. $\int \frac{dx}{(3 \operatorname{tg} x + 5) \sin 2x}$.
- 5.30. $\int \frac{\cos x dx}{(1 - \cos x)^3}$.

7- намунавий ҳисоб топшириқлари

1. Аниқ интегрални ҳисобланг:

- 1.1. $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{(\arccos x)^3 - 1}{\sqrt{1-x^2}} dx$.
- 1.2. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{8x - \arctg 2x}{1+4x^2} dx$.
- 1.3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} x \cdot \ln \cos x dx$.
- 1.4. $\int_1^e \frac{x^2 + \ln x^2}{x} dx$.
- 1.5. $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{(x^2+1)^2}$.
- 1.6. $\int_0^{\sin 1} \frac{(\arcsin x)^2 + 1}{\sqrt{1-x^2}} dx$.
- 1.7. $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2+1}$.
- 1.8. $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x - (\arctg x)^4}{1+x^2} dx$.

- 1.9. $\int \frac{x dx}{x^4 + 1}$
- 1.11. $\int_{e^{-1}}^{e^2+1} \frac{1 + \ln(x-1)}{x-1} dx$
- 1.13. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} e^{3 \sin^2 x} \sin 2x dx$
- 1.15. $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{2^{\arctg 2v} dv}{1+4v^2}$
- 1.17. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{\sqrt{\cos^2 x + 2}}$
- 1.19. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\cos^2 x (2 \lg x + 1)}$
- 1.21. $\int \frac{\sqrt{5+3 \ln x}}{x} dx$
- 1.23. $\int_0^1 x^2 e^{-2x^3} dx$
- 1.25. $\int_0^1 \frac{2^x dx}{\sqrt{4+4^x}}$
- 1.27. $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{\cos^2 x^4}$
- 1.29. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$
- 1.10. $\int_{-1}^0 \frac{\lg(x+1)}{\cos^2(x+1)} dx$
- 1.12. $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{\sqrt{4-x^8}}$
- 1.14. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^3 x \sqrt{\sin x} dx$
- 1.16. $\int_e^2 \frac{\ln^4 x + 3}{x \ln x} dx$
- 1.18. $\int_0^1 \frac{x^4 dx}{1+x^8}$
- 1.20. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin 2x}{\sqrt{1+\cos^2 x}} dx$
- 1.22. $\int_0^1 \frac{e^{3x} dx}{16+e^{6x}}$
- 1.24. $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x dx}{\sqrt{9-x^4}}$
- 1.26. $\int_0^1 \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}}$
- 1.28. $\int \frac{\sin \ln x}{x} dx$
- 1.30. $\int_{\sqrt{\frac{\pi}{6}}}^{\sqrt{\frac{\pi}{4}}} \frac{x dx}{\sin^2 x^2}$

2. Аниқ интегрални ҳисобланг:

2.1. $\int_0^{\pi} (x^2 - 3x + 2) \sin x dx$

2.2. $\int_{-1}^0 (x^2 + 7x + 12) \cos x dx$

$$2.3. \int_2^8 (x-1) \ln^2(x-1) dx.$$

$$2.4. \int_0^2 (x^2-5x+6) \sin 3x dx.$$

$$2.5. \int_0^\pi (2x^2+4x+7) \cos 2x dx.$$

$$2.6. \int_{-1}^1 x^2 e^{-\frac{x}{2}} dx.$$

$$2.7. \int_{-3}^0 (x^2+6x+9) \sin 2x dx.$$

$$2.8. \int_0^\pi (9x^2+9x+11) \cos 3x dx.$$

$$2.9. \int_1^2 x \ln^2 x dx.$$

$$2.10. \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-5x^2) \sin x dx.$$

$$2.11. \int_0^\pi (8x^2+16x+17) \cos 4x dx.$$

$$2.12. \int_0^1 x^2 e^{3x} dx.$$

$$2.13. \int_{\frac{\pi}{4}}^3 (3x-x^2) \sin 2x dx.$$

$$2.14. \int_0^{2\pi} (3x^2+5) \cos 2x dx.$$

$$2.15. \int_{-1}^0 (x+2)^3 \ln^2(x+2) dx.$$

$$2.16. \int_0^1 x \arctg x dx.$$

$$2.17. \int_0^{2\pi} (1-8x^2) \cos 4x dx.$$

$$2.18. \int_{-2}^0 (x^2+2) e^{\frac{x}{2}} dx.$$

$$2.19. \int_0^{\frac{\pi}{8}} x^2 \sin 4x dx.$$

$$2.20. \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x \cos x dx.$$

$$2.21. \int_1^3 \arctg \frac{1}{x} dx.$$

$$2.22. \int_{-1}^0 (x+1) \ln^2(x+1) dx.$$

$$2.23. \int_0^3 (x^2-3x) \sin 2x dx.$$

$$2.24. \int_{-2}^0 (x+2)' \cos 3x dx.$$

$$2.25. \int_1^e \sqrt{x} \cdot \ln^2 x dx.$$

$$2.26. \int_1^e \arcsin(1-x) dx.$$

$$2.27. \int_{-1}^0 (x^2+2x+1) \sin 3x dx.$$

$$2.28. \int_{-2}^0 (x^2+5x+6) \cos 2x dx.$$

$$2.29. \int_1^8 \frac{\ln^2 x dx}{\sqrt{x}}.$$

$$2.30. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x dx}{\cos^2 3x}.$$

3. Аниқ интегрални ҳисобланг:

$$3.1. \int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctg 3} \frac{1+\operatorname{ctg} x}{(\sin x+2\cos x)^2} dx.$$

$$3.2. \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos x dx}{2+\cos x}.$$

$$3.3. \int_0^{2\pi} \sin^8 x dx.$$

$$3.4. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{6\sin^2 x}{3\cos 2x-4} dx.$$

$$3.5. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{(1+\sin x)^2} dx.$$

$$3.6. \int_0^{2\pi} \sin^{\frac{6x}{4}} \cos^{\frac{x}{4}} dx.$$

$$3.7. \int_0^{\arctg 2} \frac{12+\operatorname{tg} x}{3\sin^2 x+12\cos^2 x} dx.$$

$$3.8. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{5+4\cos x}.$$

$$3.9. \int_0^{2\pi} \sin^2 x \cos^3 x dx.$$

$$3.10. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(7+3\operatorname{tg} x) dx}{(\sin x+2\cos x)^2}.$$

$$3.11. \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \frac{1+\sin x}{1+\cos x+\sin x} dx.$$

$$3.12. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x dx.$$

$$3.13. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{5\operatorname{tg} x+2}{2\sin 2x+5} dx.$$

$$3.14. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{1+\sin x-\cos x}.$$

$$3.15. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{4-7\operatorname{tg} x}{2+3\operatorname{tg} x} dx.$$

$$3.16. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4 2x dx.$$

$$3.17. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos x}{1+\cos x+\sin x} dx.$$

$$3.18. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{ctg}^3 x dx.$$

$$3.19. \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\operatorname{tg}^2 x}{4+3\cos 2x} dx.$$

$$3.20. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{5+3\sin x}.$$

$$3.21. \int_0^{2\pi} \cos^8 \frac{x}{4} dx.$$

$$3.23. \int \frac{dx}{\cos x (1 + \cos x)}.$$

$$3.25. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2 \operatorname{tg}^2 x - 11 \operatorname{tg} x - 22}{4 - \operatorname{tg} x} dx.$$

$$3.27. \int \operatorname{tg}^4 x dx.$$

$$3.29. \int \frac{\sin x dx}{(1 + \sin x + \cos x)^2}.$$

$$3.22. \int_{\frac{\pi}{4}}^{\operatorname{arctg} 3} \frac{4 \operatorname{tg} x - 5}{1 - \sin 2x + 4 \cos^2 x} dx.$$

$$3.24. \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{x}{4} \cos^6 \frac{x}{4} dx.$$

$$3.26. \int_{\frac{\pi}{2}}^{2 \operatorname{arctg} 2} \frac{dx}{\sin x (1 + \sin x)}.$$

$$3.28. \int_0^{\operatorname{arctg} \frac{3}{4}} \frac{8 + \operatorname{tg} x}{18 \sin^2 x + 2 \cos^2 x} dx.$$

$$3.30. \int_0^{2\pi} \sin^3 3x \cos^4 3x dx.$$

4. Аниқ интегрални ҳисобланг:

$$4.1. \int_{\frac{1}{5}}^1 \frac{\sqrt[3]{3x+5} + 2}{1 + \sqrt[3]{3x+5}} dx.$$

$$4.3. \int_{\sqrt{2}}^{2\sqrt{5}} \frac{\sqrt{x^2-2}}{x^4} dx.$$

$$4.5. \int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx.$$

$$4.7. \int_1^{64} \frac{1 - \sqrt[6]{x} + 2\sqrt[3]{x}}{x + 2\sqrt{x^3} + \sqrt{x^4}} dx.$$

$$4.9. \int_{-1}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^3}}.$$

$$4.11. \int_{\ln 2}^{\ln 5} \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}.$$

$$4.13. \int_{\frac{1}{3}}^{29} \frac{\sqrt{(x-2)^2}}{3 + \sqrt{(x-2)^4}} dx.$$

$$4.2. \int_0^{\ln 5} \frac{e^x \sqrt{e^x - 1}}{e^x + 3} dx.$$

$$4.4. \int_1^2 \frac{x + \sqrt{3x-2} - 10}{\sqrt{3x-2} + 7} dx.$$

$$4.6. \int_0^2 \frac{dx}{(4+x^2) \sqrt{4+x^2}}.$$

$$4.8. \int_0^{\ln 2} \frac{dx}{e^x \sqrt{1-e^{-2x}}}.$$

$$4.10. \int_1^{64} \frac{(2 + \sqrt[3]{x}) dx}{(\sqrt[6]{x} + 2\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}) \sqrt{x}}.$$

$$4.12. \int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4} dx.$$

$$4.14. \int_{\ln 5}^{\ln 12} \frac{dx}{\sqrt{e^x + 4}}.$$

$$4.15. \int_0^2 \frac{x^2 dx}{\sqrt{16-x^2}}$$

$$4.17. \int_{\ln 3}^{\ln 4} \frac{1-e^x}{1+e^x} dx$$

$$4.19. \int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{2x+1}}$$

$$4.21. \int_0^1 \frac{x^2 dx}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$4.23. \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{dx}{e^x - e^{-x}}$$

$$4.25. \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt{(x+1)^3}}$$

$$4.27. \int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{(16+x^2)^3}}$$

$$4.29. \int_0^{\ln 2} \frac{dx}{e^x(3+e^{-x})}$$

$$4.16. \int_1^4 \frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} - 1} dx$$

$$4.18. \int_{-3}^3 x^2 \sqrt{9-x^2} dx$$

$$4.20. \int_0^{\frac{1}{\ln 2}} \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}}$$

$$4.22. \int_{-1}^0 \frac{dx}{1+\sqrt{x+1}}$$

$$4.24. \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{(16-x^2)^3}}$$

$$4.26. \int_{\ln 2}^{2\ln 2} \frac{dx}{e^x - 1}$$

$$4.28. \int_0^5 \frac{dx}{2x + \sqrt{3x+1}}$$

$$4.30. \int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx$$

5. Хосмас интегралларни ҳисобланг ёки уларнинг узоқлашувчи эканини исботланг:

$$5.1. \text{ а) } \int_1^{\infty} \frac{x dx}{x^2 + 4x + 5}$$

$$\text{ б) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{2x}}{\cos^2 x} dx$$

$$5.3. \text{ а) } \int_0^{\infty} \frac{\arctg 2x}{1+4x^2} dx$$

$$\text{ б) } \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}-4}$$

$$5.2. \text{ а) } \int_0^{\infty} \frac{3-x^2}{x^2+4} dx$$

$$\text{ б) } \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos 3x dx}{\sqrt{(1-\sin 3x)^5}}$$

$$5.4. \text{ а) } \int_0^{\infty} \frac{(x+2) dx}{\sqrt{(x^2+4x+1)^4}}$$

$$\text{ б) } \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin x dx}{\sqrt{\cos^4 x}}$$

- 5.5. а) $\int_{-1}^{\infty} \frac{dx}{4x^2+4x+5}$;
- б) $\int_{-1}^0 \frac{dx}{\sqrt[3]{1+3x}}$.
- 5.7. а) $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{\operatorname{arctg} 2x}}{1+4x^2} dx$;
- б) $\int_{\frac{5}{3}}^1 \frac{dx}{\sqrt[5]{3-4x}}$.
- 5.9. а) $\int_0^{\infty} x \sin x dx$;
- б) $\int_{\frac{9}{7}}^1 \frac{dx}{\sqrt[9]{1-2x}}$.
- 5.11. а) $\int_{\frac{1}{3}}^{\infty} \frac{dx}{(1+9x^2) \operatorname{arctg}^2 3x}$;
- б) $\int_0^1 \frac{x^4 dx}{\sqrt[3]{1-x^5}}$.
- 5.13. а) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2+2x}$;
- б) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x dx}{\sqrt{\cos x}}$.
- 5.15. а) $\int_{e^2}^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x - 1)^2}$;
- б) $\int_0^{\frac{1}{4}} \frac{dx}{\sqrt[3]{1-4x}}$.
- 5.17. а) $\int_{-1}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4x+5}$;
- 5.6. а) $\int_0^{\infty} \frac{xdx}{4x^2+4x+5}$;
- б) $\int_0^1 \frac{2xdx}{\sqrt{1-x^4}}$.
- 5.8. а) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)}$;
- б) $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[5]{4x-x^2-4}}$.
- 5.10. а) $\int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{x^2-4x}$;
- б) $\int_0^2 \frac{x^2 dx}{\sqrt{64-x^6}}$.
- 5.12. а) $\int_2^{\infty} \frac{dx}{(4+x^2) \sqrt{\operatorname{arctg} \frac{x}{2}}}$;
- б) $\int_0^3 \frac{\sqrt[3]{9} x dx}{\sqrt[3]{9-x^2}}$.
- 5.14. а) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3+x^2}$;
- б) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{(2x-1)^2}$;
- 5.16. а) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{6x^2-5x+1}$;
- б) $\int_0^2 \frac{xdx}{\sqrt[4]{(4-x^2)^3}}$.
- 5.18. а) $\int_1^{\infty} \frac{xdx}{\sqrt{16x^4-1}}$;

- б) $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt[3]{(3-x)^5}}$
- 5.19. а) $\int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{\sqrt{16x^4+1}}$;
 б) $\int_0^1 \frac{xdx}{1-x^4}$
- 5.21. а) $\int_1^{\infty} \frac{xdx}{16x^4-1}$;
 б) $\int_0^{\frac{2}{3}} \frac{\sqrt{\ln(2-3x)}}{2-3x} dx$
- 5.23. а) $\int_0^{\infty} \frac{x^2 dx}{\sqrt[3]{(x^3+8)^4}}$;
 б) $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{(1-x)\ln^2(1-x)}$
- 5.25. а) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{9x^2-9x+2}$;
 б) $\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{dx}{\sqrt[4]{1-3x}}$
- 5.27. а) $\int_1^{\infty} \frac{xdx}{x^2-4x+5}$;
 б) $\int_0^2 \frac{xdx}{\sqrt[4]{4-x^2}}$
- 5.29. а) $\int_0^{\infty} \frac{xdx}{16x^4+1}$;
 б) $\int_0^1 x^2 \ln x dx$
- б) $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x^2-6x+9}}$
- 5.20. а) $\int_1^{\infty} \frac{xdx}{\sqrt{x^2-4x+1}}$;
 б) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{e^{\frac{1}{x+1}}}{x^2} dx$
- 5.22. а) $\int_0^{\infty} \frac{xdx}{\sqrt{(x^2+4)^3}}$;
 б) $\int_{\frac{1}{3}}^1 \frac{\ln(3x-1)}{3x-1} dx$
- 5.24. а) $\int_0^{\infty} \frac{xdx}{\sqrt[4]{(16+x^2)^5}}$;
 б) $\int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{dx}{20x^2-9x+1}$
- 5.26. а) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2-3x+2}$;
 б) $\int_0^{\frac{1}{5}} \frac{dx}{(5x-1)^2}$
- 5.28. а) $\int_{\frac{1}{4}}^{\infty} e^{-3x} x dx$;
 б) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt[3]{2-4x}}$
- 5.30. а) $\int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{16x^4+1}$;
 б) $\int_0^2 \frac{dx}{x^2-5x+6}$

6. Берилган чизиклар билан чегараланган фигуранинг юзини хисобланг:

6.1. $x = 4 - (y - 1)^2$, $x = y^2 - 4y - 3$.

6.2. $x = 2\sqrt{2} \cos t$, $y = 3\sqrt{2} \sin t$ ($y \geq 3$).

6.3. $r = 6 \cos 3\varphi$, $r \geq 3$.

6.4. $x = (y - 2)^3$, $x = 4y - 8$.

6.5. $x = 8 \cos^3 t$, $y = 4 \sin^3 t$ ($x \geq 3\sqrt{3}$).

6.6. $r = \cos \varphi$, $r = \sin \varphi$ ($0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$).

6.7. $y = (x + 1)^2$, $y^2 = x + 1$.

6.8. $x = 4(t - \sin t)$, $y = 4(1 - \cos t)$ ($0 < x < 8\pi$, $y \geq 4$).

6.9. $r = 4 \cos 3\varphi$.

6.10. $y = (x - 2)^3$, $y = 4x - 8$.

6.11. $x = \sqrt{2} \cos t$, $y = 4\sqrt{2} \sin t$ ($y \geq 4$).

6.12. $r = 2(1 - \cos \varphi)$.

6.13. $y = (x - 1)^2$, $y^2 = x - 1$.

6.14. $x = 24 \cos^3 t$, $y = 2 \sin^3 t$ ($x \geq 9\sqrt{3}$).

6.15. $r^2 = 2 \sin 2\varphi$.

6.16. $y = 4 - x^2$, $y = x^2 - 2x$.

6.17. $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$ ($0 < x < 2\pi$, $y \geq 1$).

6.18. $r = 3 \sin 4\varphi$.

6.19. $xy = 4$, $x - y = 5$.

6.20. $x = 6 \cos t$, $y = 4 \sin t$.

6.21. $r = 2(1 + \cos \varphi)$.

6.22. $y^2 = 16 - 8x$, $y^2 = 24x + 48$.

6.23. $x = 32 \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$ ($x \geq 4$).

6.24. $r = 2 \sin 3\varphi$.

6.25. $y = x^2 - 3x$, $3x + y - 4 = 0$.

6.26. $x = 6(t - \sin t)$, $y = 6(1 - \cos t)$ ($0 < x < 12\pi$, $y \geq 9$).

6.27. $r = 4 \sin 3\varphi$ ($r \geq 2$).

6.28. $y = \frac{1}{1+x^2}$, $y = \frac{x^2}{2}$.

6.29. $x = 4 \cos^3 t$, $y = 4 \sin^3 t$.

6.30. $r = \cos 2\varphi$.

7. Берилган чизик ёйининг узунлигини хисобланг:

7.1. $y = \sqrt{1-x^2} + \arcsin x$, $0 \leq x \leq \frac{7}{9}$.

- 7.2. $x=2\cos^3 t, y=2\sin^3 t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}$
- 7.3. $r=1-\sin\varphi, -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq -\frac{\pi}{6}$
- 7.4. $y=1-\ln \cos x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$
- 7.5. $x=2(t-\sin t), y=2(1-\cos t), 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
- 7.6. $r=8(1-\cos\varphi), -\frac{2\pi}{3} \leq \varphi \leq 0$
- 7.7. $x=e^t(\cos t + \sin t), y=e^t(\cos t - \sin t), 0 \leq t \leq \frac{3\pi}{2}$
- 7.8. $y=e^x + 13, \ln \sqrt{15} \leq x \leq \ln \sqrt{24}$
- 7.9. $r=3e^{\frac{\pi}{4}}, -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$
- 7.10. $x=4(t-\sin t), y=4(1-\cos t), \frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{2\pi}{3}$
- 7.11. $y=\ln \sin x, \frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$
- 7.12. $r=8\sin\varphi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$
- 7.13. $x=10\cos^3 t, y=10\sin^3 t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
- 7.14. $y=\frac{1}{2}(1-e^x-e^{-x}), 0 \leq x \leq 3$
- 7.15. $r=4\varphi, 0 \leq \varphi \leq \frac{3}{4}$
- 7.16. $x=5\cos^2 t, y=5\sin^2 t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
- 7.17. $y=\ln x, \sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{15}$
- 7.18. $r=7(1-\sin\varphi), -\frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6}$
- 7.19. $x=3(t-\sin t), y=3(1-\cos t), \pi \leq t \leq 2\pi$
- 7.20. $y=-\ln \cos x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$
- 7.21. $r=2(1-\cos\varphi), -\pi \leq \varphi \leq -\frac{\pi}{2}$
- 7.22. $x=3(2\cos t - \cos 2t), y=3(2\sin t - \sin 2t), 0 \leq t \leq 2\pi$
- 7.23. $y=2-e^x, \ln \sqrt{3} \leq x \leq \ln \sqrt{8}$
- 7.24. $r=4e^{\frac{\pi}{4}}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}$
- 7.25. $x=8\cos^3 t, y=8\sin^3 t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{6}$
- 7.26. $y=1-\ln(x^2-1), 3 \leq x \leq 4$

$$7.27. r=6(1+\sin\varphi), -\frac{\pi}{2}\leq\varphi\leq 0.$$

$$7.28. x=(t^2-2)\sin t+2t\cos t, y=(2-t^2)\cos t+2t\sin t, 0\leq t\leq\frac{\pi}{3}.$$

$$7.29. y=e^{\frac{x}{2}}+e^{-\frac{x}{2}}, 0\leq x\leq 2.$$

$$7.30. r=3e^{\frac{3\varphi}{4}}, 0\leq\varphi\leq\frac{\pi}{3}.$$

8. Функциялар графиклари билан чегараланган фигурини берилган координата ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил булган жисм ҳажмини ҳисобланг:

$$8.1. y=(x-1)^2, x=0, x=2, y=0 (Oy).$$

$$8.2. y=-x^2+5x-6, y=0 (Ox).$$

$$8.3. x=3\cos^2 t, y=4\sin^2 t, \left(0\leq t\leq\frac{\pi}{2}\right) (Oy).$$

$$8.4. y^2=(x-1)^3, x=2 (Ox).$$

$$8.5. y=x^3, y=x (Oy).$$

$$8.6. x=6(t-\sin t), y=6(1-\cos t) (Ox).$$

$$8.7. y=x^2-2x+1, x=2, y=0 (Oy).$$

$$8.8. y=2x-x^2, y=0, 2x^2-4x+y=0 (Ox)$$

$$8.9. x=2\cos t, y=5\sin t (Oy).$$

$$8.10. y=3\sin x, y=\sin x (0\leq x\leq\pi) (Ox).$$

$$8.11. y=\arcsin x, y=\arccos x, y=0 (Oy).$$

$$8.12. x=7\cos^3 t, y=7\sin^3 t (Ox).$$

$$8.13. y=(x-1)^2, y=1 (Oy).$$

$$8.14. x=\sqrt[3]{y-2}, x=1, y=1 (Ox).$$

$$8.15. x=\sqrt{3}\cos t, y=2\sin t (Oy).$$

$$8.16. y=2x-x^2, y=-x+2 (Ox).$$

$$8.17. y=\sqrt{x-1}, y=0, y=1, x=0,5 (Oy)$$

$$8.18. x=2(t-\sin t), y=2(1-\cos t) (Ox).$$

$$8.19. y=x^2+1, y=x, x=0, x=1 (Oy).$$

$$8.20. y=e^{1-x}, y=0, x=0, x=1 (Ox).$$

$$8.21. x=2\cos t, y=6\sin t (Oy).$$

$$8.22. y^2=4x, x^2=4y (Ox).$$

$$8.23. y=2-\frac{x^2}{2}, x+y=2 (Oy).$$

- 8.24. $y = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$ (Ox).
- 8.25. $y = 5\cos x$, $y = \cos x$, $x \geq 0$ (Ox).
- 8.26. $y = \ln x$, $x = 2$, $y = 0$ (Oy).
- 8.27. $x = 3\cos t$, $y = 8\sin t$ (Oy).
- 8.28. $y = x^2$, $y^2 - x = 0$ (Ox).
- 8.29. $y = \arccos \frac{x}{5}$, $y = \arccos \frac{x}{3}$, $y = 0$ (Oy).
- 8.30. $y = e^x$, $x = 0$, $y = 0$, $x = 1$ (Ox).

Худди шундай, y ўзгарувчи Δy орттирма олиб, x ўзгаринсиз қолса, z функциянинг y ўзгарувчи бўйича ҳусусий орттирмаси қуйидагича ёзилади:

$$\Delta_y z = f(x, y + \Delta y) - f(x, y).$$

Агар $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x}$ чекли лимит мавжуд бўлса, $z = f(x, y)$ функциянинг эркин ўзгарувчи x бўйича ҳусусий ҳосиласи дейилади ва $\frac{\partial z}{\partial x}$ ёки $f'_x(x, y)$ билан белгиланади. Демак,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial x} = f'_x(x, y).$$

Агар $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y}$ чекли лимит мавжуд бўлса, $z = f(x, y)$ функциянинг эркин ўзгарувчи y бўйича ҳусусий ҳосиласи дейилади ва $\frac{\partial z}{\partial y}$ ёки $f'_y(x, y)$ билан белгиланади.

Ҳусусий ҳосилалар учун бир ўзгарувчи функциясини дифференциаллашнинг қоида ва формуллари сақланади.

Исталган чекли сондаги эркин ўзгарувчи функциясининг ҳусусий ҳосилалари ҳам юқоридагидек аниқланади.

3-ми с о л. $z = \arcsin \frac{x}{y}$ функциянинг ҳусусий ҳосилаларини тошинг.

Е ч и ш. y ни ўзгармас деб, x бўйича ҳусусий ҳосилани тошамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{y}\right)^2}} \cdot \left(\frac{1}{y}\right) = \frac{1}{y \sqrt{y^2 - x^2}}$$

Энди x ни ўзгармас деб ҳисоблаб, y ўзгарувчи бўйича ҳусусий ҳосилани тошамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{y}\right)^2}} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x}{y \sqrt{y^2 - x^2}}$$

4-ми с о л. $u = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$ функциянинг ҳусусий ҳосилаларини тошинг.

Е ч и ш. $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2 \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}} (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}}$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2 \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}} (-2y) = -\frac{y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}};$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2-y^2-z^2}} (-2z) = -\frac{z}{\sqrt{1-x^2-y^2-z^2}}$$

7.1.3. Агар x ва y ўзгарувчилар мос равишда Δx ва Δy орттирмалар оlsa, z холда $z=f(x, y)$ функция $\Delta z=f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x, y)$ тўлик орттирма олади. Бу тўлик орттирманинг Δx ва Δy ларга нисбатан чизикли бўлган бош қисми функциянинг тўлик дифференциали дейилади ва dz орқали белгиланади.

$z=f(x, y)$ функциянинг тўлик дифференциали куйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy,$$

бу ерда $dx=\Delta x$, $dy=\Delta y$.

Тўлик дифференциалдан кўпинча функциянинг тақрибий қийматларини ҳисоблаш учун фойдаланилади, чунки $\Delta z \approx dz$, яъни

$$f(x+\Delta x, y+\Delta y) \approx f(x, y) + \Delta z.$$

5- мисол. $z = \arctg \frac{y}{x}$ функциянинг тўлик дифференциалини топинг.

Ечиш. Дастлаб хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2+y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2+y^2}$$

Тўлик дифференциал формуласига кўра:

$$dz = \frac{-ydx}{x^2+y^2} + \frac{xdy}{x^2+y^2} = \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$$

6- мисол. $u = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ функциянинг тўлик дифференциалини топинг.

Ечиш. Хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{2z}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

Демак, тўлик дифференциал:

$$dz = \frac{xdx}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} + \frac{ydy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} + \frac{zdz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{xdx+ydy+zdz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

7- мисол. $1,02^{3,01}$ ни тақрибий ҳисобланг.

Ечиш. $z = x^y$ функцияни қараймиз. Унинг $x=1$ ва $y=3$ лаги қиймати $z=1^3=1$ га тенг.

$z = x^y$ функциянинг тулик дифференциални топамиз:

$$dz = yx^{y-1} \Delta x + x^y \ln x \Delta y.$$

$x=1$, $y=3$, $\Delta x=0,02$ ва $\Delta y=0,01$. Шунинг учун $dz = 3 \cdot 1^2 \cdot 0,02 + 1^3 \ln 1 \cdot 0,01 = 0,06$ бўлади. У ҳолда изланаётган қиймат:

$$(1,02)^{3,01} \approx f(x, y) + dz = 1 + 0,06 = 1,06.$$

1- дарсхона топшириғи

1. Функцияларнинг аниқланиш соҳасини топинг:

а) $z = \sqrt{x^2 + y^2 - 9}$; б) $z = \arcsin(x + y)$;

в) $z = \ln(y^2 - 2x + 4)$; г) $u = \frac{1}{\ln(1 - x^2 - y^2 - z^2)}$.

2. Қуйидаги функцияларнинг хусусий ҳосилаларини топинг:

а) $z = x^3 + y^3 - 3axy$; б) $z = \frac{x-y}{x+y}$;

в) $z = e^{\frac{y^2}{x}}$; г) $z = \arcsin \sqrt{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}}$;

д) $z = \ln|x + \sqrt{x^2 + y^2}|$; е) $z = \ln \sin \frac{x+1}{\sqrt{y}}$;

ж) $u = z^{xy}$; з) $u = (xy)^z$.

3. Қуйидаги функцияларнинг тулик дифференциални топинг:

а) $z = \ln \operatorname{tg} \frac{y}{x}$; б) $z = \ln(x^2 + y^2)$;

в) $z = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$; г) $u = \arcsin \operatorname{tg} \frac{xy}{z^2}$.

4. Тақрибий ҳисобланг:

а) $\ln(0,09^4 + 0,99^3)$; б) $\sqrt{(4,05)^2 + (2,93)^2}$

Ж: а) $-0,03$; б) $4,998$.

1- мустақил иш

1. Функцияларнинг аниқланиш соҳасини топинг.

а) $z = \ln(y - x)$; б) $z = \sqrt{\cos(x^y + y^x)}$;

$$в) r = \ln \sqrt{\frac{y}{x}}; \quad г) u = \sqrt{x+y+z}.$$

2. Қуйидаги функцияларнинг хусусий ҳосилаларини топинг:

$$а) z = e^{\cos(x^2+y^2)}; \quad б) z = \arctg \frac{y}{1+x^2};$$

$$в) z = y \cdot x^y; \quad г) z = \arctg \frac{y}{x} + \arctg \frac{x}{y};$$

$$д) u = x + \frac{x-y}{y-z}.$$

3. Функцияларнинг тулик дифференциалини топинг:

$$а) z = \ln \cos \frac{x}{y}; \quad б) z = \ln(y + \sqrt{x^2+y^2}); \quad в) u = \frac{z}{x^2+y^2}.$$

4. Тақрибий ҳисобланг:

$$а) \sqrt{(1,02)^3 + (1,97)^3}; \quad б) \sin 28^\circ \cdot \cos 61^\circ.$$

Ж: а) 2,95; б) 0,227.

2-§. Мураккаб функциянинг ҳосилалари. Ошқормас функциянинг ҳосилалари

7.2.1. Агар $z = f(x, y)$, $x = x(t)$, $y = y(t)$ функциялар дифференциалланувчи бўлса, у ҳолда $z = f(x(t), y(t))$ мураккаб функциянинг ҳосиласи ушбу формула бўйича топилади:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}.$$

Агар $z = f(x, y)$, $y = y(x)$ бўлса, у ҳолда $z = f(x, y(x))$ дан x бўйича тулик ҳосила қуйидаги формула бўйича топилади:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}.$$

Худди шунингдек, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ бўлса, у ҳолда $z = f(x, y)$ нинг хусусий ҳосилалари қуйидаги формулалар бўйича топилади:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v}.$$

1-мисол. Агар $x = e^t$ ва $y = \ln t$ бўлса, $z = \frac{x}{y}$ функциянинг ҳосиласини топинг.

Ечиш.

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \frac{1}{y} e^t - \frac{x}{y^2} \cdot \frac{1}{t} = \frac{t y e^t - x}{y^2 \cdot t}.$$

2- мисол. Агар $y = x^2$ бўлса, $z = \arctg \frac{y}{x}$ функциянинг тулик ҳосиласини топинг.

Ечиш. Тулик ҳосила формуласига кўра:

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dx} &= \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{1}{x} \cdot 2x = \\ &= \frac{-y}{x^2 + y^2} + \frac{2x}{x^2 + y^2} = \frac{2x^2 - y}{x^2 + y^2} = \frac{2x^2 - x^2}{x^2 + x^4} = \frac{1}{1 + x^2} \end{aligned}$$

Хусусий ҳосила: $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2}$.

3- мисол. Агар $x = uv$, $y = \frac{u}{v}$ бўлса, $z = \ln(x^2 + y^2)$ функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг.

$$\begin{aligned} \text{Ечиш. } \frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{2x}{x^2 + y^2} \cdot v + \frac{2y}{x^2 + y^2} \cdot \frac{1}{v} = \\ &= \frac{2}{x^2 + y^2} \left(x \cdot v + \frac{y}{v}\right) = \frac{2}{u}; \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} = \\ &= \frac{2x}{x^2 + y^2} \cdot u + \frac{2y}{x^2 + y^2} \cdot \left(-\frac{u}{v^2}\right) = \frac{2}{x^2 + y^2} \left(xu - \frac{yu}{v^2}\right) = \frac{2(v^4 - 1)}{(v^4 + 1)v} \end{aligned}$$

7.2.2. Агар $F(x, y) = 0$ тенглама бирор $y(x)$ функцияни ошқормас кўринишда аниқласа ва $F'_y(x, y) \neq 0$ бўлса, у ҳолда қуйидаги формула ўринлидир:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$$

Агар $F(x, y, z) = 0$ тенглама икки ўзгарувчи $z(x, y)$ функцияни ошқормас кўринишда аниқласа ва $F'_z(x, y, z) \neq 0$ бўлса, у ҳолда қуйидаги формулалар ўринлидир:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}$$

4- мисол. Ошқормас кўринишда

$$(x^2 + y^2)^3 - 3(x^2 + y^2) + 1 = 0$$

тенглама билан берилган $y(x)$ функциянинг ҳосиласини топинг.

Ечиш. Тенгламанинг чап томонини $F(x, y)$ орқали белгилаймиз ва хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$F'_x(x, y) = 3(x^2 + y^2)^2 2x - 6x = ((x^2 + y^2)^2 - 1) \cdot 6x;$$

$$F'_y(x, y) = 3(x^2 + y^2)^2 2y - 6y = ((x^2 + y^2)^2 - 1) \cdot 6y.$$

$$\text{Демак, } \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)} = -\frac{6x((x^2+y^2)^2-1)}{6y((x^2+y^2)^2-1)} = -\frac{x}{y}.$$

5- ми с ол. Ошкормас кўринишда $x^2 - 2y^2 + 3z^2 - yz + y = 0$ тенглама билан берилган $z(x, y)$ функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг.

Е чи ш. Тенгламанинг чап томонини $F(x, y, z)$ орқали белгилаб, хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$F'_x = (x, y, z) = 2x; F'_y(x, y, z) = -4y - z + 1; F'_z(x, y, z) = 6z - y.$$

Демак,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)} = -\frac{2x}{6z - y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)} = -\frac{1 - 4y - z}{6z - y}.$$

2- дарсхона топшириғи

1. Агар $z = \ln \frac{u}{v}$, бу ерда $u = \operatorname{tg}^2 x$, $v = \operatorname{ctg}^2 x$ бўлса, $\frac{dz}{dx}$ ни топинг.

2. Агар $z = \frac{x^2 - y}{x^2 + y}$, бу ерда $y = 3x + 1$ бўлса, $\frac{dz}{dx}$ ни топинг.

3. Агар $z = x^2 y$, бу ерда $y = \cos x$ бўлса, $\frac{\partial z}{\partial x}$ ва $\frac{dz}{dx}$ ни топинг.

4. Агар $z = u^2 \ln v$, бу ерда $u = \frac{y}{x}$, $v = x^2 + y^2$ бўлса, $\frac{\partial z}{\partial x}$ ва $\frac{\partial z}{\partial y}$ ни топинг.

5. Агар $z = x^2 y - y^2 x$, бу ерда $x = u \cos v$ ва $y = u \sin v$ бўлса, $\frac{\partial z}{\partial u}$ ва $\frac{\partial z}{\partial v}$ ни топинг.

6. Агар $w = \ln(x^3 + y^3 - z^3)$, бу ерда $x = uv$, $y = \frac{u}{v}$, $z = e^{u \cdot v}$ бўлса, $\frac{\partial w}{\partial u}$ ва $\frac{\partial w}{\partial v}$ ни топинг.

7. Ошкормас кўринишда

а) $\sin xy - e^{xy} - x^2 y = 0$; б) $y^x = x^y$ тенглама билан берилган $y(x)$ функциянинг ҳосиласини топинг:

8. Ошкормас кўринишда

а) $e^z = xyz$; б) $z^3 + 3xyz = u^4$

тенглама билан берилган $z(x, y)$ функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг.

2- мустақил иш

1. Агар $z = \operatorname{arcsin}(x - y)$, бу ерда $x = 3t$, $y = 4t^3$ бўлса, $\frac{dz}{dt}$ ни топинг.

2. Агар $z = \arctg xy$, бу ерда $y = e^x$ бўлса, $\frac{dz}{dx}$ ни топинг.

3. Агар $z = u^2 + v^2$, бу ерда $u = x + y$, $v = x - y$ бўлса, $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$

ларни топинг.

4. Агар $z = u^2v - v^2u$, бу ерда $u = x \sin y$, $v = y \cos x$ бўлса, $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ ларни топинг.

5. Ошқормас кўринишда

а) $1 + xy - \ln(e^{xy} + e^{-xy}) = 0$; б) $y \sin x - \cos(x - y) = 0$

тенглама билан берилган $y(x)$ функциянинг ҳосиласини топинг.

6. Ошқормас кўринишда

а) $x^3 + 2y^3 + z^3 - 3xyz - 2y + 3 = 0$; б) $z \ln(x + z) - \frac{xy}{z} = 0$

тенглама билан берилган $z(x, y)$ функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг.

3-§. Уринма текислик ва сиртга нормал. Юқори тартибли ҳосилалар. Тейлор формуласи

7.3.1. Сиртга M_0 нуктада ўтказилган уринма текислик деб сиртда M_0 нукта орқали ўтказилган барча эгри чизикларга ўтказилган уринмалар жойлашган текисликка айтилади.

Сиртга M_0 нуктадаги нормал деб M_0 нуктадан ўтувчи ва бу нуктада ўтказилган уринма текисликка перпендикуляр бўлган тўғри чизикка айтилади.

Агар сирт $z = f(x, y)$ тенглама билан берилган бўлса, у ҳолда $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктада бу сиртга ўтказилган уринма текислик тенгламаси:

$$z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ нукта орқали сиртга ўтказилган нормалнинг каноник тенгламаси қуйидагича бўлади:

$$\frac{x - x_0}{f'_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

Агар сирт $F(x, y, z) = 0$ тенглама билан ошқормас кўринишда берилган бўлса, сиртнинг $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктасида ўтказилган уринма текислик тенгламаси

$F'_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F'_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$ кўринишда, нормал тенгламаси эса

$$\frac{x - x_0}{F'_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F'_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F'_z(x_0, y_0, z_0)}$$

кўринишда бўлади.

1- мисол. $z = x^2 - 2xy + y^2 - x + 2y$ сиртга $M_0(1, 1, 1)$ нуктада ўтказилган уринма текислик ва нормал тенгламаларини тузинг.

Ечиш. Хусусий ҳосилаларни тошамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x - 2y - 1 \quad \text{ва} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -2x + 2y + 2$$

Бу ҳосилаларнинг $M_0(1, 1, 1)$ нуктадаги қийматларини ҳисоблаймиз:

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = 2 - 2 - 1 = -1 \quad \text{ва} \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -2 + 2 + 2 = 2.$$

Шундай қилиб, $f'_x(1, 1) = -1$, $f'_y(1, 1) = 2$. Демак, уринма текислик тенгламаси:

$$z - 1 = -(x - 1) + 2(y - 1) \quad \text{ёки} \quad x - 2y + z = 0,$$

нормал тенгламаси:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{1}$$

2- мисол. $x^3 + y^3 + z^3 + xyz - 6 = 0$ сиртга $M_0(1, 2, -1)$ нуктада ўтказилган уринма текислик ва нормалнинг тенгламасини тузинг.

Ечиш. Тенгламанинг чап томонини $F(x, y, z)$ орқали белгилаб, хусусий ҳосилаларни тошамиз:

$$F'_x(x, y, z) = 3x^2 + yz; \quad F'_y(x, y, z) = 3y^2 + xz;$$

$$F'_z(x, y, z) = 3z^2 + xy.$$

Ҳосилаларнинг $M_0(1, 2, -1)$ нуктадаги қийматларини ҳисоблаймиз:

$$F'_x(1, 2, -1) = 3 - 2 = 1; \quad F'_y(1, 2, -1) = 12 - 1 = 11;$$

$$F'_z(1, 2, -1) = 3 + 2 = 5.$$

Шундай қилиб, уринма текислик тенгламаси:

$$1(x - 1) + 11(y - 2) + 5(z + 1) = 0 \quad \text{ёки} \quad x + 11y + 5z - 18 = 0,$$

нормал тенгламаси:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{11} = \frac{z+1}{5}$$

7.3.2. $z = f(x, y)$ функциянинг иккинчи тартибли хусусий ҳосилалари деб биринчи тартибли хусусий ҳосилалардан олинган хусусий ҳосилаларга айтилади. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилалар қуйидагича белгиланади:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = z''_{xx} = f''_{xx}(x, y),$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = z''_{xy} = f''_{xy}(x, y);$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = z_{yx} = f_{yx}(x, y);$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = z_{yy} = f_{yy}(x, y).$$

$f'_{xy}(x, y)$ ва $f'_{yx}(x, y)$ хусусий ҳосилалар *аралаш ҳосилалар* дейилади. Аралаш ҳосилалар узлуксиз бўлган нукталарда уларнинг қийматлари тенг бўлади.

Учинчи ва ундан юқори тартибли хусусий ҳосилалар ҳам шундай аниқланади.

Ушбу $\frac{\partial^n z}{\partial x^m \partial y^{n-m}}$ ёзув z функцияни m марта x ўзгарувчи бўйича ва $(n-m)$ марта y ўзгарувчи бўйича дифференциалланганини билдиради.

3-ми с. о. л. $z = \operatorname{arctg} \frac{x}{y}$ функциянинг иккинчи тартибли хусусий ҳосилаларини топиш.

Ечиш. Дастлаб биринчи тартибли хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \cdot \frac{1}{y} = \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x}{x^2 + y^2}.$$

Иккинчи марта дифференциаллаймиз:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = -\frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Қўйинги иккита ифодани такқослаб, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ эканлигига ишонч ҳосил қиламиз.

7.3.3. Агар $z = f(x, y)$ функция $P_0(x_0, y_0)$ нукта атрофида $(n+1)$ -тартиблигача $(n+1)$ -тартиблиси ҳам) узлуксиз хусусий

хосилаларга эга бўлса, у ҳолда каралаётган нукта атрофида ушбу Тейлор формуласи ўринлидир:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{1}{1!} [f'_x(x_0, y_0) (x - x_0) + f'_y(x_0, y_0) (y - y_0)] + \\ + \frac{1}{2!} [f''_{xx}(x_0, y_0) (x - x_0)^2 + 2f''_{xy}(x_0, y_0) (x - x_0)(y - y_0) + \\ + f''_{yy}(x_0, y_0) (y - y_0)^2] + \dots + \frac{1}{n!} \left[(x - x_0) \frac{\partial}{\partial x} + (y - y_0) \frac{\partial}{\partial y} \right]^n f(x_0, y_0) + \\ + R_n(x, y),$$

бу ерда $R_n(x, y) = \frac{1}{(n+1)!} \left[(x - x_0) \frac{\partial}{\partial x} + (y - y_0) \frac{\partial}{\partial y} \right]^{n+1} f(x_0 + \theta(x - x_0), y_0 + \theta(y - y_0))$, $0 < \theta < 1$.

Тейлор формуласининг $x_0 = y_0 = 0$ бўлгандаги хусусий ҳоли *Маклорен формуласи* дейилади.

4-мисол. $z = x^3 - 5x^2 - xy + y^2 + 10x + 5y - 4$ функцияни $P_0(2, -1)$ нукта атрофида Тейлор формуласи бўйича ёйинг.

Ечиш. Берилган функциянинг хусусий хосилаларини ва уларнинг $P_0(2, -1)$ нуктадаги қийматларини бирин-кетин ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^3 - 5x^2 + y^2 + 10x + 5y - 4 - xy, & f(2, -1) &= 2; \\ f'_x(x, y) &= 3x^2 - 10x - y + 10, & f'_x(2, -1) &= 3; \\ f'_y(x, y) &= -x + 2y + 5, & f'_y(2, -1) &= 1; \\ f''_{xx}(x, y) &= 6x - 10, & f''_{xx}(2, -1) &= 2; \\ f''_{xy}(x, y) &= -1, & f''_{xy}(2, -1) &= -1; \\ f''_{yy}(x, y) &= 2, & f''_{yy}(2, -1) &= 2; \\ f''_{xxx}(x, y) &= 6, & f''_{xxx}(2, -1) &= 6. \end{aligned}$$

Кейинги барча хосилалар айнан нолга тенг. Топилганларни Тейлор формуласига қўйиб, изланаётган ёйилмани ҳосил қиламиз:

$$z = f(x, y) = 2 + 3(x - 2) + (y + 1) + (x - 2)^2 - (x - 2)(y + 1) + \\ + (y + 1)^2 + (x - 2)^3.$$

3-дарсхона топшириғи

1. Берилган сиртга берилган $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктада ўтказилган уринма текислик ва нормал тенгламаларини тузинг:

$$\begin{aligned} \text{а) } z &= 1 + x^2 + y^2, & M_0(1, 1, 3); \\ \text{б) } x^2 + y^2 - z^2 &= -1, & M_0(2, 2, 3); \\ \text{в) } z &= \ln(x^2 + y^2), & M_0(1, 0, 0); \\ \text{г) } x^2 + z^2 - 5yz + 3y &= 46, & M_0(1, 2, -3). \end{aligned}$$

2. Берилган функцияларнинг иккинчи тартибли хусусий хосилаларини топинг ва аралаш хусусий хосилалари тенг ёки тенг эмаслигини текширинг:

а) $z = xy + \frac{y}{x}$;

в) $z = xe^{-xy}$;

д) $z = \ln(x^2 + y^2)$;

ж) $u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$;

б) $z = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$;

г) $z = y^x$;

е) $z = \arcsin \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$;

з) $u = \left(\frac{y}{x}\right)^x$.

3. $z = e^{xy}$ функция

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} - z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2z$$

тенгламани каноатлантиришини текширинг.

4. $z = x^y$ функция

$$y \frac{\partial^2 y}{\partial x \partial y} = (1 + y \ln x) \frac{\partial z}{\partial x}$$

тенгламани каноатлантиришини текширинг.

5. $z = e^x(x \cos y - y \sin y)$ функция $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ тенгламани каноатлантиришини текширинг.

6. $f(x, y) = -x^2 + 2xy + 3y^2 - 6x - 2y - 4$ функция $P_0(-2, 1)$ нукта атрофида Тейлор формуласи буйича ёйинг.

7. $f(x, y) = e^x \sin y$ функцияни учинчи тартибли хадларгача (улар хам кирди) Маклорен формуласи буйича ёйинг.

3- мустақил иш

1. Берилган сиртга берилган $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктада утказилган уринма текислик ва нормал тенгламаларини тузинг:

а) $z = 1 + x^2 + y^2$, $M_0(2, -1, 6)$;

б) $x^2 - y^2 - z^2 + xz + 4x + 5 = 0$, $M_0(-2, 1, 0)$.

2. Берилган функцияларнинг иккинчи тартибли хусусий ҳосилаларини топинг ва аралаш хусусий ҳосилалар тенг ёки тенг эмаслигини текширинг:

а) $z = \operatorname{tg} \sqrt{xy}$;

б) $z = \ln(3xy - 4)$;

в) $z = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$;

г) $z = \operatorname{arctg}(2x - y)$.

3. Берилган функциялар кўрсатилган тенгламаларни каноатлантиришини текширинг:

а) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = 0$, $z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + t^2}}$.

б) $x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - xy \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + y^2 = 0$, $z = \frac{y^2}{3x} + \arcsin(xy)$.

4. $f(x, y) = x^3 - 2y^3 + 3xy$ функцияни $P_0(1, 2)$ нукта атрофида Тейлор формуласи бўйича ёйинг.

5. $f(x, y) = e^{x+y}$ функцияни $P_0(1, -1)$ нукта атрофида учинчи тартибли хадлар (улар ҳам кирди)гача Тейлор формуласи бўйича ёйинг.

4-§. Бир неча ўзгарувчи функциясининг экстремумлари

7.4.1. Агар $z = f(x, y)$ функциянинг $P_0(x_0, y_0)$ нуктадаги киймати унинг бу нуктанинг бирор атрофидаги исталган $P(x, y)$ нуктасидаги кийматидан катта, яъни $f(x_0, y_0) > f(x, y)$ бўлса, $z = f(x, y)$ функция $P_0(x_0, y_0)$ нуктада *максимумга* эга дейилади.

Агар $z = f(x, y)$ функциянинг $P_0(x_0, y_0)$ нуктадаги киймати унинг бу нуктанинг бирорта атрофидаги исталган $P(x, y)$ нуктасидаги кийматидан кичик бўлса, яъни $f(x_0, y_0) < f(x, y)$ бўлса, $z = f(x, y)$ функция $P_0(x_0, y_0)$ нуктада *минимумга* эга дейилади.

Функциянинг максимуми ёки минимуми унинг *экстремуми* дейилади. Функция экстремумга эга бўлган нукта унинг *экстремум нуктаси* дейилади.

7.4.2. Экстремумнинг зарурий шартлари: агар $P_0(x_0, y_0)$ нукта узлуксиз $z = f(x, y)$ функциянинг экстремум нуктаси бўлса, у ҳолда $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$ бўлади ёки бу ҳосилаларнинг акалли биттаси мавжуд бўлмайди.

Бу шартлар бажариладиган нукталар *критик нуқталар* дейилади. Ҳар қандай критик нукта ҳам экстремум нуктаси бўлавермайди.

7.4.3. Иккинчи тартибли ҳосилаларнинг $P_0(x_0, y_0)$ критик нуктадаги кийматлариши

$$A = f''_{xx}(x_0, y_0); B = f''_{yy}(x_0, y_0); C = f''_{yy}(x_0, y_0)$$

орқали белгилаймиз ва $\Delta = AC - B^2$ дискриминантни тузамиз.

Экстремумнинг етарли шарти.

а) агар $\Delta > 0$ бўлса, $z = f(x, y)$ функция $P_0(x_0, y_0)$ нуктада экстремумга эга бўлиб, бунда $A < 0$ (ёки $C < 0$) бўлганда P_0 нукта максимум нуктаси, $A > 0$ (ёки $C > 0$) бўлганда минимум нуктаси бўлади;

б) агар $\Delta < 0$ бўлса, P_0 нуктада экстремум мавжуд эмас;

в) агар $\Delta = 0$ бўлса, экстремум мавжуд бўлиши ҳам, мавжуд бўлмаслиги ҳам мумкин.

1-мисол. $z = xy(x + y - 2)$ функциянинг экстремумларини топинг.

Ечиш. Функция бутун Oxy текисликда аниқланган.

Критик нукталарни қуйидаги тенгламалардан топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy + y^2 - 2y = 0,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 + 2xy - 2x = 0.$$

Бу системани ечиб, тўртта критик нуктани топамиз: $P_1(0, 0)$, $P_2(2, 0)$, $P_3(0, 2)$, $P_4\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилалар.

$$f_x(x, y) = 2y; \quad f_y(x, y) = 2x + 2y - 2; \quad f''_{xx}(x, y) = 2x.$$

Ҳар бир критик нуктадаги дискриминантни ҳисоблаймиз:

а) $P_1(0, 0)$ нуктада: $\Delta = AC - B^2 = (2 \cdot 0) \cdot (2 \cdot 0) - (2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 - 2)^2 = -4 < 0$, демак экстремум йўқ (экстремумнинг етарли шартига мувофиқ);

б) $P_2(2, 0)$ нуктада: $\Delta = -4 < 0$, демак экстремум мавжуд эмас;

в) $P_3(0, 2)$ нуктада: $\Delta = -4 < 0$, демак экстремум мавжуд эмас;

г) $P_4\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ нуктада: $\Delta = \frac{12}{9} > 0$, $A = \frac{4}{3} > 0$, демак функциянинг

минимум нуктасига эгамиз, бу нуктада $z_{\min} = f\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = -\frac{8}{27}$.

7.4.4. Чегараланган ёниқ \bar{D} соҳада дифференциалланувчи функция ўзининг энг катта ва энг кичик кийматига ё D соҳа ичида ётувчи критик нуктада, ё бу соҳа чегарасида эришади.

Ёниқ D соҳада функциянинг энг катта ва энг кичик кийматини топиш учун: а) соҳа ичида ва унинг чегарасида ётган барча критик нукталар топилади; б) функциянинг бу нукталардаги ва чегарадаги кийматлари ҳисобланади; в) топилган кийматлар орасидан энг катта ва энг кичик кийматлар топилади.

2-мисол. $z = x^2 + y^2 - xy + x + y$ функциянинг $x \leq 0$, $y \leq 0$, $x + y \geq -3$ соҳадаги энг катта ва энг кичик кийматларини топинг.

Ёчиш. D соҳа AOB учбурчакдан иборат (41-шакл).

а) Ушбу системадан соҳа ичидаги критик нукталарни топамиз:


$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x - y + 1 = 0; \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2y - x + 1 = 0. \end{cases}$$

Бу ердан: $x = -1$, $y = -1$, демак, $P_0(-1, -1)$ нуктага эгамиз.

б) Функцияни соҳа чегарасида текшираемиз. Тенгламаси $y = 0$ бўлган AO чегарада $z = x^2 + x$ функцияга эгамиз; критик нукталарнинг абсциссаларини $z'_x = 2x + 1 = 0$ тенгламадан аннқлаймиз:

$x = -\frac{1}{2}$. Демак критик нукта: $P_1\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ Тенгламаси $x = 0$

бўлган BO чегарада $z = y^2 + y$ функцияга эгамиз; критик нукталарнинг ординаталарини $z'_y = 2y + 1 = 0$ тенгламадан топамиз: $y = -\frac{1}{2}$. Демак, критик нукта $P_2\left(0, -\frac{1}{2}\right)$ Тенгламаси $y = -3 - x$



41-шакл

булган AB чегарада $z=3x^2+9x+6$ функцияга эгамиз; критик нукталарнинг абсциссларини $z'_x=6x+9=0$ тенгламадан топамиз: $x=-\frac{3}{2}$. AB тенгламасидан $y=-\frac{3}{2}$. Демак, критик нукта:

$$P_3\left(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right).$$

в) Берилган функциянинг P_0, P_1, P_2, P_3 критик нукталардаги ҳамда чегаралар туташадиган A, B ва O нукталардаги кийматларини хисоблаймиз:

$$z_0=f(P_0)=f(-1, 1)=-1;$$

$$z_1=f(P_1)=f\left(-\frac{1}{2}, 0\right)=-\frac{1}{4};$$

$$z_2=f(P_2)=f\left(0, -\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4};$$

$$z_3=f(P_3)=f\left(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right)=-\frac{3}{4};$$

$$z_4=f(O)=f(0, 0)=0;$$

$$z_5=f(A)=f(-3, 0)=6;$$

$$z_6=f(B)=f(0, -3)=6.$$

г) Функциянинг топилган барча кийматларини таққослаб, $z_{\text{энг кат.}}=f(A)=f(B)=6$ ва $z_{\text{энг кич.}}=f(P_0)=-1$ деган хулосага келамиз.

4- дарсхона топшириги

1. Функцияларни экстремумга текшириш:

а) $z=x^2+xy+y^2-3x-6y$;

б) $z=\frac{1}{2}xy+(47-x-y)\left(\frac{x}{3}+\frac{y}{4}\right)$;

в) $z=xy^2(1-x-y)$;

г) $z=x^3+y^3-15xy$.

Ж: а) $z_{\text{мин}}=-9$; в) $z_{\text{мак}}=\frac{1}{64}$;

б) $z_{\text{мак}}=282$; г) $z_{\text{мин}}=-125$.

2. Функцияларнинг кўрсатилган соҳадаги энг катта ва энг кичик кийматларини топинг:

а) $z=x^2-xy+y^2-4x$; $x\geq 0, y\geq 0, 2x+3y\leq 12$;

б) $z=x^2+3y^2+x-y$; $x\leq 1, y\leq 1, x+y\geq 1$.

Ж: а) $z_{\text{энг кич}}=-\frac{16}{3}$; $z_{\text{энг кат}}=16$,

б) $z_{\text{энг кич}}=1$; $z_{\text{энг кат}}=4$.

4- мустақил иш

1. Функцияларни экстремумга текширинг:

а) $z = (x-1)^2 + 2y^2$;

б) $z = x^2 + xy + y^2 - 2x - y$;

в) $z = e^{x-y}(x^2 - 2y^2)$.

Ж: а) $z_{\min} = 0$; б) $z_{\min} = -1$; в) $z_{\max} = 8e^{-2}$;

2. Функциянинг кўрсатилган соҳадаги энг катта ва энг кичик қийматларини топинг:

а) $z = x^2 + 2xy - 4x + 8y$; $x \geq 0, y \geq 0, x \leq 1, y \leq 2$;

б) $z = x^2 - 2y^2 + 4xy - 6x + 5$; $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 3$.

Ж: а) $z_{\text{энг кич}} = -3, z_{\text{энг кат}} = 17$,

б) $z_{\text{энг кич}} = -9, z_{\text{энг кат}} = 5$.

5- §. Шартли экстремум

$z = f(x, y)$ функциянинг *шартли экстремуми* деб бу функциянинг x ва y ўзгарувчиларнинг *боғлиниш тенгламаси* деб аталувчи $\varphi(x, y) = 0$ тенглама билан боғланганлик шартида эришадиган экстремумига айтилади.

Ушбу $\Phi(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$ функция *Лагранж функцияси* дейилади, бу ерда λ — бирор ўзгармас кўпайтувчи. Шартли экстремумни топиш $\Phi(x, y, \lambda)$ функциясининг оддий экстремумини излашга келтирилади. Лагранж функцияси экстремумининг зарур шартни қуйидаги кўринишга эга:

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} = 0 \end{cases} \text{ ёки } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0, \\ \varphi(x, y) = 0. \end{cases}$$

Агар $P_0(x_0, y_0), \lambda_0$ — бу системанинг исалган ечими ва

$$\Delta = - \begin{vmatrix} 0 & \varphi_x(x_0, y_0) & \varphi_y(x_0, y_0) \\ \varphi_x(x_0, y_0) & \Phi''_{xx}(x_0, y_0, \lambda_0) & \Phi''_{xy}(x_0, y_0, \lambda_0) \\ \varphi_y(x_0, y_0) & \Phi''_{xy}(x_0, y_0, \lambda_0) & \Phi''_{yy}(x_0, y_0, \lambda_0) \end{vmatrix}$$

бўлса, $\Delta < 0$ да $z = f(x, y)$ функция $P_0(x_0, y_0)$ нуктада шартли максимумга, $\Delta > 0$ да шартли минимумга эга бўлади.

Мисол. $z = x + 2y$ функциянинг x ва y ўзгарувчилар $x^2 + y^2 = 5$ тенглама билан боғланган шартдаги экстремумини топинг.

Ечиш. Лагранж функциясини тузамиз:

$$\Phi(x, y, \lambda) = x + 2y + \lambda(x^2 + y^2 - 5).$$

Куйндагига эгамиз:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 1 + 2x\lambda, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 2 + 2y\lambda, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 5.$$

$\Phi(x, y, \lambda)$ функция учун экстремумнинг зарурий шартлари ушбу тенгламалар системасини беради:

$$\begin{cases} 1 + 2\lambda x = 0, \\ 2 + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 = 5. \end{cases}$$

Бу системани ечиб, иккита:

$$x_1 = -1, \quad y_1 = -2, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}$$

ва

$$x_2 = 1, \quad y_2 = 2, \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2}$$

ечимларни тошамиз.

Энди

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 2y,$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = 2\lambda; \quad \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 2\lambda; \quad \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = 0$$

эканлигини эътиборга олсак, у холда

$$1) \lambda_1 = \frac{1}{2}, \quad x_1 = -1, \quad y_1 = -2 \text{ да}$$

$$\Delta_1 = - \begin{vmatrix} 0 & -2 & -4 \\ -2 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 20 > 0.$$

яъни функция $P_1(-1, -2)$ нуктада шартли минимумга эга:
 $z_{\min} = -1 - 4 = -5.$

$$2) \lambda_2 = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = 1, \quad y_2 = 2 \text{ да}$$

$$\Delta_2 = - \begin{vmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -20 < 0,$$

яъни функция $P_2(1, 2)$ нуктада шартли максимумга эга:
 $z_{\max} = 1 + 2 \cdot 2 = 5.$

5- дарсхона топшириги

Функциянинг шартли экстремумини тоинг:

1. $z = x^2 + y^2 - xy + x + y - 4$; $x + y + 3 = 0$ шартда.

Ж: $x = y = -\frac{3}{2}$ да $z_{\min} = -\frac{19}{4}$.

2. $z = xy$; $2x + 3y - 5 = 0$ шартда.

Ж: $x = \frac{5}{4}$, $y = \frac{5}{6}$ да $z_{\max} = \frac{25}{24}$.

3. $z = x^2 + y^2$; $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$ шартда.

Ж: $x = \frac{36}{25}$, $y = \frac{48}{25}$ да $z_{\min} = \frac{144}{25}$.

4. $z = 6 - 4x - 3y$; $x^2 + y^2 = 1$ шартда.

Ж: $x = -\frac{4}{5}$, $y = -\frac{3}{5}$ да $z_{\max} = 11$; $x = \frac{4}{5}$, $y = \frac{3}{5}$ да $z_{\min} = 1$.

5. $z = \cos^2 x + \cos^2 y$; $y - x = \frac{\pi}{4}$ шартда.

Ж: $x = \frac{7\pi}{8} + \pi k$, $y = \frac{9\pi}{8} + \pi k$ да $z_{\max} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}$,

$x = \frac{3\pi}{8} + \pi k$, $y = \frac{5\pi}{8} + \pi k$ да $z_{\min} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}$.

6. $z = x + y$; $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{2}$ шартда.

Ж: $x = y = -2$ да $z_{\max} = -4$;

$x = y = 2$ да $z_{\min} = 4$.

5- мустақил иш

Функциянинг шартли экстремумини тоинг:

1. $z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$; $x + y = 2$ шартда.

Ж: $x = y = 1$ да $z_{\min} = 2$.

2. $z = \frac{x - y - 4}{\sqrt{2}}$; $x^2 + y^2 = 1$ шартда.

Ж: $x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, $y = \frac{1}{\sqrt{2}}$ да $z_{\min} = -1 - 2\sqrt{2}$;

$x = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $y = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ да $z_{\max} = 1 - 2\sqrt{2}$;

3. $z = xy^2$; $x + 2y = 1$ шартда.

Ж: $x = y = 1$ да $z_{\min} = 0$; $x = y = \frac{1}{3}$ да $z_{\max} = \frac{1}{27}$.

4. $z = 2x + y$; $x^2 + y^2 = 1$ шартда.

Ж: $x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$, $y = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ да $z_{\min} = -\sqrt{5}$;

$$x = \frac{2}{\sqrt{5}}, y = \frac{1}{\sqrt{5}} \text{ да } z_{\max} = \sqrt{5}.$$

5. $z = xy$; $x + y = 1$ шартда.

$$\text{Ж: } x = y = \frac{1}{2} \text{ да } z_{\max} = \frac{1}{4}.$$

8- назорат иши

1. Берилган функциянинг аниқланиш соҳасини топинг:

$$1.1. z = \ln(-x - y).$$

$$1.2. z = \arccos \frac{y+1}{x}.$$

$$1.3. z = \sqrt{x^2 + y^2} - 2x.$$

$$1.4. z = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 4x + 8}}.$$

$$1.5. z = \frac{1}{\sqrt{y - \sqrt{x}}}.$$

$$1.6. z = \arcsin \frac{x}{y^2}.$$

$$1.7. z = \ln(y - x^2).$$

$$1.8. z = \frac{1}{\sqrt{4x - y^2}}.$$

$$1.9. z = \ln(x^2 + y).$$

$$1.11. z = \frac{3xy}{2x - 5y}.$$

$$1.10. z = \sqrt{x^2 + 2y + y^2}.$$

$$1.13. z = \sqrt{y^2 - x^2}.$$

$$1.12. z = \arcsin(x - y).$$

$$1.15. z = \frac{3x}{6 - x^2 - y^2}.$$

$$1.14. z = \ln(4 - x^2 - y^2).$$

$$1.17. z = \frac{4xy}{x^2 - y^2}.$$

$$1.16. z = \sqrt{x^2 + y^2} - 8.$$

$$1.19. z = \arccos(x + y).$$

$$1.18. z = e^{\sqrt{x^2 + y^2} - 5}.$$

$$1.21. z = \ln(y^2 - x^2).$$

$$1.20. z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}.$$

$$1.23. z = \frac{3}{6 - x^2 - y^2}.$$

$$1.22. z = \arcsin \frac{x}{y}.$$

$$1.25. z = \sqrt{3 - x^2 - y^2}.$$

$$1.24. z = \arccos(x + 2y).$$

$$1.27. z = \ln(2x - y).$$

$$1.26. z = \sqrt{1 - x - y}.$$

$$1.29. z = \frac{4xy}{x - 3y + 1}.$$

$$1.28. z = \arcsin(2x - y).$$

$$1.30. z = \frac{\sqrt{3x - 2y}}{x^2 + y^2 + 2}.$$

2. Берилган функциянинг иккинчи тартибли ҳосилаларини топинг ва $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ эканини текширинг:

$$2.1. z = x \cdot e^x.$$

$$2.2. z = \ln(x + e^{-y}).$$

$$2.3. z = \operatorname{arctg} \frac{x}{y}.$$

$$2.4. z = e^{xy}.$$

$$2.5. z = e^{-x - 3y} \cdot \sin(x + 3y).$$

$$2.6. z = \frac{\sin(x - y)}{x}.$$

$$2.7. z = e^y.$$

$$2.8. z = e^{\frac{x^2 + y^2}{2}}.$$

2.9. $z = \sqrt{\frac{x}{y}}$.

2.11. $z = \operatorname{ctg}(x+y)$.

2.13. $z = \operatorname{arc} \sin(x-y)$.

2.15. $z = \operatorname{tg}xy^2$.

2.17. $z = \operatorname{arcc} \operatorname{tg}(x-4y)$.

2.19. $z = \cos(3x^2 - y^2)$.

2.21. $z = \operatorname{arcc} \cos(x-5y)$.

2.23. $z = \operatorname{arcsin}(4x+y)$.

2.25. $z = \operatorname{arctg}(2x-y)$.

2.27. $z = e^{\sqrt{x+y}}$.

2.29. $z = \operatorname{tg} \sqrt{xy}$.

2.10. $z = \operatorname{tg} \frac{x}{y}$.

2.12. $z = \sin(x^2 - y)$.

2.14. $z = \ln(3x^2 - 2y^2)$.

2.16. $z = \ln(3xy - 4)$.

2.18. $z = \ln(5x^2 - 3y^2)$.

2.20. $z = \sin \sqrt{xy}$.

2.22. $z = e^{x^2 - y^2}$.

2.24. $z = \ln(4x^2 - 5y^2)$.

2.26. $z = \cos(x^2 y^2 - 5)$.

2.28. $z = \operatorname{ctg} \frac{y}{x}$.

2.30. $z = e^{2x^2 + y^2}$.

3. Берилган $z=f(x, y)$ мураккаб функциянинг кўрсатилган ҳосиласини тошнг:

3.1. $z = e^{y-2x}$, $y = \ln \sin t$, $x = \cos t$. $\frac{dz}{dt} = ?$

3.2. $r = \operatorname{arcc} \cos(3x-y)$, $x = 4t$, $y = 3t^2$. $\frac{dz}{dt} = ?$

3.3. $z = u^3 \ln v$, $u = \frac{x}{y}$, $v = 2x - 3y$. $\frac{\partial z}{\partial x} = ?$

3.4. $z = \operatorname{arctg} xy$, $y = e^{\cos^3 x}$. $\frac{dz}{dx} = ?$

3.5. $z = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$, $y = x^2$. $\frac{dz}{dx} = ?$

3.6. $z = e^{x-2y}$, $x = \sin t$, $y = t^3$. $\frac{dz}{dt} = ?$

3.7. $z = \ln(e^x - e^{-y})$, $x = t^2$, $y = t^3$. $\frac{dz}{dt} = ?$

3.8. $z = u^2 \ln v$, $u = \frac{y}{x}$, $v = x^2 + y^2$. $\frac{\partial z}{\partial y} = ?$

3.9. $z = x^y$, $y = \ln \sin x$. $\frac{dz}{dx} = ?$

3.10. $z = \ln(e^x + e^y)$, $y = \frac{1}{3}x^3 + x$. $\frac{dz}{dx} = ?$

3.11. $z = \frac{x^2}{y+1}$, $x = 1 - 2t$, $y = \operatorname{arctg} t$. $\frac{dz}{dt} = ?$

3.12. $z = \sqrt{x+y^2+3}$, $x = \ln t$, $y = t^3$. $\frac{dz}{dt} = ?$

3.13. $z = u^v - v^2 u$, $u = x \sin y$, $v = y \cos x$. $\frac{\partial z}{\partial y} = ?$

3.14. $z = \operatorname{arctg} \frac{x+1}{y}$, $y = e^{(x+1)^2}$. $\frac{dz}{dx} = ?$

- 3.15. $z = \frac{x^2 - y}{x^2 + y}$, $y = 3x + 1$. $\frac{dz}{dx} = ?$
- 3.16. $z = \arcsin \frac{x^2}{y}$, $x = \sin t$, $y = \cos t$. $\frac{dz}{dt} = ?$
- 3.17. $z = u^2 + v^2$, $u = x - y^2$, $v = x^2 + y$. $\frac{\partial z}{\partial x} = ?$
- 3.18. $z = \operatorname{arctg} xy$, $y = e^{2x}$. $\frac{dz}{dx} = ?$
- 3.19. $z = \arcsin \frac{x}{y}$, $y = \sqrt{x^2 + 1}$. $\frac{dz}{dx} = ?$
- 3.20. $z = x^2 e^{xy}$, $x = \cos t$, $y = \sin t$. $\frac{dz}{dt} = ?$
- 3.21. $z = x^y$, $x = e^t$, $y = \ln t$. $\frac{dz}{dt} = ?$
- 3.22. $z = \ln(u^2 - v^2)$, $u = xy$, $v = \frac{x}{y}$. $\frac{\partial z}{\partial y} = ?$
- 3.23. $z = \ln(e^x - e^y)$, $y = x^3 + 1$. $\frac{dz}{dx} = ?$
- 3.24. $z = e^{y - 2x}$, $x = \sin t$, $y = t^2$. $\frac{dz}{dt} = ?$
- 3.25. $z = \ln(e^{-x} + e^y)$, $x = t^2$, $y = t^3$. $\frac{dz}{dt} = ?$
- 3.26. $z = \arcsin \frac{x}{y}$, $x = \sin t$, $y = \cos t$. $\frac{dz}{dt} = ?$
- 3.27. $z = u^2 \ln v$, $u = \frac{x}{y}$, $v = 3y - 2x$. $\frac{\partial z}{\partial y} = ?$
- 3.28. $z = xy^2$, $y = \sin x$. $\frac{\partial z}{\partial x} = ?$
- 3.29. $z = \arccos \frac{2x}{y}$, $x = \sin t$, $y = \cos t$. $\frac{dz}{dt} = ?$
- 3.30. $z = \frac{x^2}{y + 1}$, $x = 1 - 2t$, $y = \operatorname{arctg} t$. $\frac{dz}{dt} = ?$

4. Ошқормас кўринишда берилган $z(x, y)$ функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг:

- 4.1. $z^2 = xy - z + x^2 - 1$
- 4.2. $x^2 + y^2 - xz + yz - 3x = 11$.
- 4.3. $x^2 + y^2 - 2z^2 - 2y = 0$.
- 4.4. $2x^2 + 2y^2 + z^2 - 8xz - z + 6 = 0$.
- 4.5. $\ln z = x + 2y - z + \ln 3$.
- 4.6. $x^3 + 3xyz - z^3 = 27$.
- 4.7. $x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz = 17$.
- 4.8. $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 59$.
- 4.9. $\sqrt{x^2 + y^2} + z^2 - 3z = 3$.
- 4.10. $x^2 - y^2 - z^2 + 6z + 2x - 1y + 12 = 0$.

- 4.11. $x^2 + y^2 + z^2 + 6z - 4x + 9 = 0$
 4.12. $x^2 + y^2 - xz - yz = 0$
 4.13. $x^3 + 2y^3 + z^3 - 3xyz - 2y = 15$
 4.14. $e^z - xyz - x + 1 = 0$
 4.15. $3x^2y^2 + 2xyz^2 - 2x^3z + 4y^3z = 4$
 4.16. $z^3 + 3yzx + 3y = 7$
 4.17. $e^z + x + 2y + z = 4$
 4.18. $x^2 + y^2 + z^2 - 2xz = 2$
 4.19. $x + y + z + 2 = xyz$

4.20. $x \cos y + y \cos z + z \cos x = \frac{\pi}{2}$

4.21. $x^2 + y^2 + z^2 + 2xz = 5$

4.22. $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = \frac{3}{2}$

4.23. $y^2 - z^2 + x^2 - 2xz + 2x = z$

4.24. $x + y + z = e^z$

4.25. $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$

4.26. $x - z \ln \frac{z}{y} = 0$

4.27. $xy + yz + xz = 1$

4.28. $e^z - xyz = 0$

4.29. $x^2 - 2y^2 + z^2 - 4x + 2z - 5 = 0$

4.30. $2x^2 - y^2 + z^2 - 4z + y = 13$

5. Қуйындағы функцияларни экстремумга текшириңг:

- 5.1. $z = 2(x + y) - x^2 - y^2$
 5.2. $z = xy(12 - x - y)$
 5.3. $z = (x - 5)^2 + y^2 + 1$
 5.4. $z = x^2 - xy + y^2 + x - y + 1$
 5.5. $z = x^2 + 3(y + 2)^2$
 5.6. $z = x^2 - xy + y^2 + 3x - 6y + 20$
 5.7. $z = (x - 2)^2 + 2y^2 - 10$
 5.8. $z = 3x^3 + 3y^2 - 9xy + 10$
 5.9. $z = 1 + 6x - x^2 - xy - y^2$
 5.10. $z = xy - 3x^2 - 2y^2$
 5.11. $z = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$
 5.12. $z = 2xy - 5x^2 - 3y^2 + 2$
 5.13. $z = 2x^3 + 2y^3 - 6xy + 5$
 5.14. $z = y\sqrt{x} - 2y^2 - x + 14y$
 5.15. $z = (x - 1)^2 + 2y^2$
 5.16. $z = x^3 + 8y^3 - 6xy + 1$
 5.17. $z = x\sqrt{y} - x^2 - y + 6x + 3$
 5.18. $z = x^2 + xy + y^2 - 6x - 9y$
 5.19. $z = x^3 + y^3 - 6xy - 39x + 18y + 20$
 5.20. $z = x^2 + xy + y^2 - 2x - y$
 5.21. $z = 2xy - 3x^2 - 2y^2 + 10$
 5.22. $z = 2xy - 2x^2 - 4y^2$

$$5.23. z = 6(x-y) - 3x^2 - 3y^2$$

$$5.24. z = 1 + 15x - 2x^2 - xy - 2y^2$$

$$5.25. z = x^2 + y^2 - xy + x + y$$

$$5.26. z = xy - x^2 - y^2 + 9$$

$$5.27. z = x^3 + y^3 - 3xy$$

$$5.28. z = 4(x-y) - x^2 - y^2$$

$$5.29. z = x^3 + 8y^3 - 6xy + 5$$

$$5.30. z = xy(6 - x - y)$$

6. Куйидаги чизиклар билан чегараланган ёпик соҳада $z = f(x, y)$ функциянинг энг кичик ва энг катта кийматларини топинг:

$$6.1. z = x^2 - y^2 - x + y;$$

$$x = 0, x = 2, y = 0, y = 1.$$

$$6.3. z = x^2 + 2xy - 4x + 8y;$$

$$x = 0, y = 0, 5x - 3y + 45 = 0.$$

$$6.5. z = 2xy - 3x^2 - 2y^2 + 5;$$

$$x + y = 5, x = -1, y = -1.$$

$$6.7. z = 3y - 2x - xy;$$

$$x = 0, y = 0, 3x - 4y = 12.$$

$$6.9. z = x^2 - 2xy + \frac{5}{2}y^2 - 2x;$$

$$x = 0, x = 2, y = 0, y = 2.$$

$$6.11. z = x^2 + 6xy - x + 3y;$$

$$x = 0, x = 3, y = 0, y = 3.$$

$$6.13. z = x^2 + 2xy - 10;$$

$$y = 0, y = x^2 - 4.$$

$$6.15. z = x^2 - 2xy - y^2 + 4x + 1;$$

$$x = -3, y = 0, x + y + 1 = 0.$$

$$6.17. z = xy - 2x - y;$$

$$x = 0, x = 3, y = 0, y = 4.$$

$$6.19. z = x^3 + y^3 - 3xy;$$

$$x = 0, x = 2, y = 0, y = 3.$$

$$6.21. z = 5x^2 - 3xy + y^2 + 4;$$

$$x = -1, x = 1, y = -1, y = 1$$

$$6.23. z = 6xy - 9x^2 - 9y^2 + 4x + 4y;$$

$$x = 0, x = 1, y = 0, y = 2.$$

$$6.25. z = 4 - 2x^2 - y^2;$$

$$x^2 + y^2 \leq 1.$$

$$6.27. z = x^2 + xy;$$

$$x = -1, x = 1, y = 0, y = 3.$$

$$6.29. z = x^2 + 2xy - y^2 - 4x;$$

$$x = 3, y = 0, x - y + 1 = 0.$$

$$6.2. z = -3x^2 + 2y^2 + 12x - 4y;$$

$$y = 0, x = 0, 3x + 4y = 12.$$

$$6.4. z = x^2 + 2xy - y^2 - 4x;$$

$$x = 3, y = 0, y = x + 1.$$

$$6.6. z = x^2 - xy + 5;$$

$$y = 0, x^2 + y = 1.$$

$$6.8. z = x^2 - 4xy + y^2 + 6y;$$

$$y = x, y = 0, x = 4.$$

$$6.10. z = 3xy - 6x^2 - 6y^2 + 15x;$$

$$x = 0, x = 2, y = 0, y = 1.$$

$$6.12. z = 5xy - y^2;$$

$$x = 4, y^2 = 5x + 5.$$

$$6.14. z = x^2 y;$$

$$y = 0, y = 1 - x^2.$$

$$6.16. z = x^2 + 2xy + 4x - y^2;$$

$$x = 0, y = 0, x + y + 2 = 0.$$

$$6.18. z = x^2 + 2xy + y^2 - 2x + 2y;$$

$$x = 2, y = 0, y = x + 2.$$

$$6.20. z = x^2 + xy - 2;$$

$$y = 0, y = 4x^2 - 4.$$

$$6.22. z = \frac{1}{2}x^2 - xy;$$

$$y = 3, y = \frac{x^2}{3}.$$

$$6.24. z = 1 + xy^2;$$

$$x = 0, x = 1, y = -1, y = 2.$$

$$6.26. z = 2x^2 + 2xy - \frac{1}{2}y^2 - 4x;$$

$$x = 0, y = 2, y = 2x.$$

$$6.28. z = 2x + y - xy;$$

$$x = 0, x = 4, y = 0, y = 4.$$

$$6.30. z = 4(x - y) - x^2 - y^2;$$

$$x = 0, x + 2y = 4, x - 2y = 4.$$

ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАЛАР

1- §. Умумий тушунчалар. Ўзгарувчилари ажраладиган ва бир жинсли биринчи тартибли дифференциал тенгламалар

8.1.1. Эркин ўзгарувчи, номаълум функция ва унинг ҳосила (дифференциал)ларини боғловчи

$$f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

муносабат *оддий дифференциал тенглама* дейилади.

Дифференциал тенгламага кирувчи ҳосила (дифференциал)ларнинг энг юқори тартиби дифференциал тенгламанинг тартиби дейилади.

Дифференциал тенгламанинг ечими деб, тенгламага куйганда уни айниятга айлантирадиган дифференциалланувчи $y = \varphi(x)$ функцияга айтилади.

Бундай тенглама учун Коши масаласи бошланғич шартлар деб аталувчи ушбу

$$y|_{x=x_0} = y_0, y'|_{x=x_0} = y'_0, \dots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_0^{(n-1)}$$

шартларни қаноатлантирувчи ечимини топишдан иборатдир.

n -тартибли оддий дифференциал тенгламанинг *умумий ечими* деб, тенгламанинг тартиби канча бўлса, шунча ихтиёрий ўзгармасларга боғлиқ бўлган шундай $y = \varphi(x, c_1, \dots, c_n)$ функцияга айтилади-ки, бу функция учун куйидаги шартлар бажарилади:

а) y функция c_1, c_2, \dots, c_n ихтиёрий ўзгармасларнинг исталган қийматларида берилган тенгламани қаноатлантиради;

б) бошланғич шартлар ҳар қандай бўлганда ҳам, ихтиёрий ўзгармасларнинг шундай қийматини топиш мумкинки, бу қийматларда $y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$ ечим бошланғич шартларни қаноатлантиради.

8.1.2. Ушбу

$$M(x)dx + N(y)dy = 0$$

кўринишдаги тенглама ўзгарувчилари *ажралган дифференциал тенглама* дейилади. Унинг ўзига хос томони шундаки, dx олдида фақат x га боғлиқ кўпайтувчи, dy олдида эса фақат y га боғлиқ кўпайтувчи туради. Бу тенгламанинг ечими уни ҳадма-ҳад интеграллаш йўли билан аниқланади:

$$\int M(x)dx + \int N(y)dy = C.$$

Дифференциал тенгламанинг ошкормас ҳолда ифодаланган ечимни бу тенгламанинг *интеграл* дейилади.

Интеграллаш доимийси C ни ечим учун қулай кўринишда танлаш мумкин.

1-мисол. $\text{tg}x dx - \text{ctg}y dy = 0$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Бу ерда ўзгарувчилари ажралган тенгламага эгамиз. Уни ҳадма-ҳад интеграллаймиз:

$$\int \text{tg}x dx - \int \text{ctg}y dy = C$$

ёки

$$-\ln|\cos x| - \ln|\sin y| = -\ln C,$$

бу ерда интеграллаш доимийси C ни $-\ln C$, яъни $C = -\ln C$ орқали белгилаш қулайдир, бу ердан $\ln \sin y \cdot \cos x = \ln C$ ёки $\sin y \times \cos x = C$ — умумий интеграл.

8.1.3. Ушбу

$$M_1(x) \cdot M_2(y) dx + N_1(x) \cdot N_2(y) dy = 0$$

тенглама *ўзгарувчилари ажраладиган дифференциал тенглама* дейилади. Бу кўринишдаги тенглама $M_2(y) \cdot N_1(x) \neq 0$ га бўлиш натижасида ўзгарувчилари ажралган дифференциал тенгламага келтирилади.

2-мисол. Ушбу

$$(1+x^2) dy + y dx = 0$$

тенгламанинг $y|_{x=1} = 1$ бошланғич шартни қамоатлантирувчи ечимини топинг.

Ечиш. Бу ерда ўзгарувчилари ажраладиган тенгламага эгамиз. Тенгламани

$$\frac{dy}{y} + \frac{dx}{1+x^2} = 0$$

кўринишга келтириб, интеграллаймиз:

$$\int \frac{dy}{y} + \int \frac{dx}{1+x^2} = C \text{ ёки } \ln|y| + \arctg x = C.$$

Тенгламанинг интегралини ҳосил қилдик. Берилган $y|_{x=1} = 1$ бошланғич шартдан фойдаланиб, ихтиёрий ўзгармас C ни топамиз:

$$\ln 1 + \arctg 1 = C$$

яъни $C = \frac{\pi}{4}$. Демак, $\ln y + \arctg x = \frac{\pi}{4}$, бу ердан изланаётган ечимни ҳосил қиламиз:

$$y = e^{\frac{\pi}{4} - \arctg x}$$

8.1.4. Агар $f(x, y)$ функцияда x ва y ўзгарувчилар мос равишда tx ва ty га аямаштирилганда (t — ихтиёрий параметр)

$$f(tx, ty) = f(x, y)$$

шарт бажарилса, у ҳолда $f(x, y)$ функция бир жинсли функция деб аталади.

Бир жинсли функция $f(x, y)$ ни

$$f(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

кўринишда ёзиш мумкин.

Агар $y' = f(x, y)$ дифференциал тенгламада $f(x, y)$ бир жинсли функция бўлса, бундай тенглама бир жинсли дифференциал тенглама дейилади. Бир жинсли дифференциал тенгламалар

$$y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

кўринишга келтирилади ва $y = u \cdot x$ ўрнига қўйиш ёрдамида ўзгарувчилари ажраладиган дифференциал тенгламага келтирилади ($u = u(x)$ номаълум функция):

$$xdu = (\varphi(u) - u)dx.$$

3-мисол. Ушбу

$$(x^2 + 2xy)dx + xydy = 0$$

тенгламанинг ечимини топинг.

Ечиш. Берилган тенгламани $\mu' = -\frac{x^2 + 2xy}{xy}$ кўринишга келтирамиз. $f(x, y) = \frac{x^2 + 2xy}{xy}$ бир жинсли функция. $y = ux$, $y' = u'x + u$ ўрнига қўйишни бажарамиз. У ҳолда берилган тенглама

$$u'x + u = -\frac{x^2 + 2ux^2}{ux^2} \text{ ёки } u'x + u = -\frac{1 + 2u}{u}$$

кўринишга келади, бу ердан

$$u'x = -\frac{1 + 2u + u^2}{u} \text{ ёки } u'x = -\frac{(1 + u)^2}{u}.$$

Ўзгарувчилари ажратамиз: $\frac{udu}{(1+u)^2} = -\frac{dx}{x}$. Интеграллаб, топамиз:

$$\int \frac{udu}{(1+u)^2} = C - \int \frac{dx}{x} \text{ ёки } \int \frac{(u+1)-1}{(1+u)^2} du = C - \ln|x|.$$

Натижада қуйидагига эга бўламиз:

$$\ln|1+u| + \frac{1}{1+u} = \ln C - \ln x \text{ ёки } \frac{1}{1+u} = \ln \frac{C}{x(1+u)}$$

$u = \frac{y}{x}$ эканлигини ҳисобга олиб, $\frac{x}{x+y} = \ln \frac{C}{x+y}$ ни ҳосил қиламиз.

8.1.5. Ушбу

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

кўринишдаги тенглама $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ бўлганда

$$x = x_1 + \alpha, \quad y = y_1 + \beta$$

ўрнига қўйиш ёрдамида бир жинсли тенглама кўринишига келтирилади, бу ерда $\alpha, \beta - a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ва $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ тўғри чизикларнинг кесишиш нуқтасининг координаталари. Агар $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ бўлса, у ҳолда $a_1x + b_1y = t$ ўрнига қўйиш ёрдамида ўзгарувчилар ажратилади.

4- м и с о л. $(2x + y + 1)dx + (x + 2y - 1)dy = 0$ тенгламанинг умумий интегралини топинг.

Е ч и ш. Тенгламани қуйидаги кўринишга келтирамыз:

$$y' = -\frac{2x + y + 1}{x + 2y - 1}$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \text{ бўлгани учун бу тенглама бир}$$

жинсли тенгламага келтирилиши мумкин. Ушбу

$$\begin{cases} 2x + y = -1 \\ x + 2y = 1 \end{cases}$$

тўғри чизикларнинг кесишиш нуқтасини топамиз: $x = \alpha = -1$; $y = \beta = 1$. Энди

$$\begin{aligned} x &= x_1 - 1, & dx &= dx_1, \\ y &= y_1 + 1, & dy &= dy_1, \end{aligned}$$

деб, тенгламада ўзгарувчиларни алмаштирамыз:

$$\frac{dy_1}{dx_1} = -\frac{2x_1 + y_1}{x_1 + 2y_1}$$

Ҳосил қилинган бу бир жинсли тенгламада $y_1 = ux_1$ белгилаш киритсак, $y'_1 = u'x_1 + u$ бўлади. У ҳолда

$$u'x_1 + u = -\frac{2x_1 + ux_1}{x_1 + 2ux_1} \text{ ёки } u'x_1 + u = -\frac{2 + u}{1 + 2u}$$

Натижада ўзгарувчилари ажраладиган тенгламага эга бўламиз:

$$u'x_1 = -\frac{2(u^2 + u + 1)}{1 + 2u} \text{ ёки } \frac{(2u + 1)du}{u^2 + u + 1} = -\frac{2dx_1}{x_1}$$

Интеграллаб, топамиз:

$$\ln|u^2 + u + 1| = -2\ln|x_1| + \ln C$$

ёки

$$u^2 + u + 1 = \frac{C}{x_1^2}$$

x_1 ва y_1 ўзгарувчиларга кайтсак,

$$\left(\frac{y_1}{x_1}\right)^2 + \frac{y_1}{x_1} + 1 = \frac{C}{x_1^2} \text{ ёки } y_1^2 + x_1 y_1 + x_1^2 = C.$$

$x_1 = x + 1$, $y_1 = y - 1$ алмаштиришларни ҳисобга олиб, ечимни x ва y ўзгарувчиларга нисбатан ёзамиз:

$$(y - 1)^2 + (y - 1)(x + 1) + (x + 1)^2 = C$$

ёки оддий шакл алмаштиришлардан сўнг

$$x^2 + xy + y^2 + x - y = \bar{C}$$

кўринишдаги умумий ечимга эга бўламиз.

1- дарсхона топшириғи

1. Келтирилган $y(x, C)$ функциялар (C — ихтиёрий ўзгармас) мос равишда берилган дифференциал тенгламаларнинг ечими бўлади:

а) $y = x^2(1 + Ce^x)$, $x^2 y' + (1 - 2x)y = x^2$;

б) $y = Ce^x - e^{-x}$, $xy'' + 2y' - xy = 0$;

в) $x^2 + y^4 = Cy^2$, $xy dx = (x^2 - y^4) dy$;

Жавоб: а) ҳа; б) йўқ; в) ҳа.

2. Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

а) $(1 + x^2)y' + 1 + y^2 = 0$;

б) $(x^2 + x)y' = 2y + 1$;

в) $xy + y^2 = (2x^2 + xy)y'$;

г) $xy' + 2\sqrt{xy} = y$;

д) $(x - 2y - 3)y' + (2x + y - 1) = 0$;

е) $(x - y + 4)dy + (x + y - 2)dx = 0$.

Ж: а) $y = \frac{C-x}{1+Cx}$, б) $2y + 1 = \frac{Cx^2}{(1+x)^2}$,

в) $y^2 = Cxe^{-\frac{y}{x}}$; г) $\begin{cases} \sqrt{\frac{y}{x}} = \ln \frac{C}{x}, x > 0 \text{ да,} \\ \sqrt{\frac{y}{x}} = \ln Cx, x < 0 \text{ да;} \end{cases}$

д) $x^2 + xy - y^2 - x + 3y = C$; е) $x^2 + 2xy - y^2 - 4x + 8y = C$.

3. Коши масаласини ечинг:

а) $\sec^2 x \operatorname{tg} y dx + \sec^2 y \operatorname{tg} x dy = 0$; $y|_{x=\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4}$;

б) $xy' - y = x \operatorname{tg} \frac{y}{x}$; $y|_{x=1} = \frac{\pi}{2}$;

в) $2(x+y)y' + (3x+3y-1) = 0$; $y|_{x=0} = 2$.

Ж: а) $\operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 1$, б) $y = x \arcsin x$;

в) $3x + 2y - 4 + 2 \ln|x + y - 1| = 0$

1- мустақил иш

1. Келтирилган $y(x, C)$ функциялар (C — ихтиёрий ўзгармас) мос равишда берилган дифференциал тенгламаларнинг ечими бўлади-ми:

а) $e^x = Cy$; $xyy' - y^2 = x^2y'$;

б) $y = Cx + \frac{1}{C}$; $xy' - y + \frac{1}{y} = 0$?

Жавоб: а) ҳа; б) йўқ.

2. Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

а) $(\sqrt{xy} - \sqrt{x})dx + (\sqrt{xy} + \sqrt{y})dy = 0$;

б) $xy \cdot y' = y^2 + 2x^2$; в) $y' = \frac{2x - y + 1}{x - 2y + 1}$.

Ж: а) $x + y - 2\sqrt{x} + 2\sqrt{y} + 2 \ln |(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{y} - 1)| = C$;

б) $y^2 = 4x^2 \ln Cx$; в) $x^2 - xy + y^2 + x - y = C$.

3. Коши масаласини ечинг:

а) $\sqrt{\frac{1 + \cos 2x}{1 + \sin y}} + y' = 0$; $y|_{x=\frac{\pi}{4}} = 0$;

б) $xy' = xe^{\frac{y}{x}} + y$; $y|_{x=1} = 0$;

в) $(2x - y + 4)dy + (x - 2y + 5)dx = 0$.

Ж: а) $\sqrt{2} \sin x + \sin y - \cos y = 0$;

б) $y = -x \ln |1 - \ln x|$; в) $(x + y - 1)^2 = C(x - y + 3)$.

2- §. Чизиқли, Бернулли, тўлик дифференциалли биринчи тартибли дифференциал тенгламалар

8.2.1. Ушбу

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

кўринишдаги тенглама *чизиқли дифференциал тенглама* дейилади. Бу ерда $P(x)$ ва $Q(x)$ лар x нинг маълум узлуксиз функциялари. Агар $Q(x) \neq 0$ бўлса, тенглама *чизиқли бир жинсли бўлмаган тенглама*, агар $Q(x) = 0$ бўлса, *чизиқли бир жинсли тенглама* дейилади.

$y = u(x)v(x)$ ўрнига қўйиш (бу ерда u ва v номаълум функциялар) ёрдамида тенглама

$$u'v + uv' + P(x)uv = Q(x)$$

ёки

$$u'v + u[v' + P(x)v] = Q(x)$$

кўринишга келтирилади.

u ва v функциялардан бири (масалан, v) ихтиёрий танлаб олинishi мумкинлигидан фойдаланиб, v функцияни охириги тенгла-

мада кавс ичида турган ($v' + Pv$) ифода нолга тенг бўладиган қилиб олинади. У ҳолда иккинчи номаълум функция u ни топиш учун $u'v = Q(x)$ тенгламани ечиш kifоя.

Шундай қилиб, берилган тенглама $y = uv$ ўрнига қўйиш ёрдамида ўзгарувчилари ажраладиган ушбу иккита тенгламага келтирилади:

$$v' + P(x)v = 0,$$

$$u'v = Q(x).$$

Буларни интеграллаб берилган тенгламанинг умумий ечими топилади:

$$y = e^{-\int p dx} (C + \int Q e^{\int p dx} dx).$$

Баъзан дифференциал тенглама y нинг функцияси x га нисбатан чизикли бўлган, яъни

$$x' + p(y)x = q(y)$$

кўринишга келтирилиши мумкин. Бу тенглама $x = uv$ ўрнига қўйиш орқали юқоридагидек ечилади.

1- м и с о л. Ушбу

$$(x^2 - x)y' + y = x^2(2x - 1)$$

тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. Тенгламани $(x^2 - x) \neq 0$ га бўлиб, ушбу кўринишга келтираемиз:

$$y' + \frac{y}{x^2 - x} = \frac{x^2(2x - 1)}{x^2 - x}$$

ёки

$$y' + \frac{y}{x(x-1)} = \frac{x(2x-1)}{x-1}.$$

Тенглама чизикли бўлиб, бу ерда $P(x) = \frac{1}{x(x-1)}$, $Q(x) = \frac{x(2x-1)}{x-1}$.

$y = uv$, $y' = u'v + uv'$ ўрнига қўйиш натижасида берилган тенглама қуйидаги кўринишга келади:

$$u'v + u\left(v' + \frac{v}{x(x-1)}\right) = \frac{x(2x-1)}{x-1}$$

u нинг олдидаги кўпайтувчини нолга тенглаб

$$\begin{cases} v' + \frac{v}{x(x-1)} = 0, \\ u'v = \frac{x(2x-1)}{x-1} \end{cases}$$

тенгламаларни ҳосил қилаемиз. Дастлаб биринчи тенгламанинг исталган хусусий ечимини топамиз:

$$\frac{dv}{v} = -\frac{dx}{x(x-1)} \quad \text{ёки} \quad \int \frac{dv}{v} = -\int \frac{x-(x-1)}{x(x-1)} dx$$

Бундан

$$\ln|v| = -\ln|x-1| + \ln x$$

ёки

$$v = \frac{x}{x-1}.$$

Топилган v функцияни системанинг иккинчи тенгласига кўямиз:

$$u' \frac{x}{x-1} = \frac{x(2x-1)}{x-1},$$

бу ердан $u' = 2x - 1$. Интегралласак:

$$u = x^2 - x + C.$$

Берилган тенгламанинг умумий ечими:

$$y = uv = \frac{x(x^2 - x + C)}{x-1}.$$

2- мисол. $(2x - y^2)y' = 2y$ тенгламанинг $y|_{x=1} = 1$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топинг.

Ечиш. Берилган тенглама x га нисбатан чизиқлидир. Ҳақиқатан ҳам,

$(2x - y^2)\frac{1}{x^2} = 2y$, ёки $2x - y^2 = 2x'y$, ёки $x' - \frac{x}{y} = -\frac{y}{2}$ (бу ерда

$$p(y) = -\frac{1}{y}, \quad q(y) = -\frac{y}{2}.$$

$x = uv$, $x' = u'v + uv'$ ўрнига қўйиш натижасида берилган тенглама қуйидаги кўрнишга келади:

$$u'v + u\left(v' - \frac{v}{y}\right) = -\frac{y}{2},$$

бу ердан ушбу иккита тенгламага эга бўламиз:

$$v' - \frac{v}{y} = 0 \quad \text{ва} \quad u'v = -\frac{y}{2}.$$

Биринчи тенгламани ечиб, топамиз:

$$\frac{dv}{v} = \frac{dy}{y} \quad \text{ёки} \quad v = y.$$

Иккинчи тенгламага $v = y$ ни кўямиз:

$$u'y = -\frac{y}{2}, \quad \text{ёки} \quad u' = -\frac{1}{2}, \quad \text{ёки} \quad u = C - \frac{y}{2}.$$

Берилган тенгламанинг умумий ечими:

$$x = uv = y\left(C - \frac{y}{2}\right).$$

$y|_{x=1} = 1$ бошланғич шартдан

$$1 = C - \frac{1}{2} \text{ ёки } C = \frac{3}{2}.$$

Шундай қилиб, берилган тенгламанинг хусусий ечими
 $x = \frac{1}{2} y (3 - y)$.

8.2.2. Ушбу

$$y' + P(x)y = y^\alpha Q(x)$$

кўринишдаги дифференциал тенглама *Бернулли тенгламаси* дейилади. Бу тенгламада $\alpha = \text{const}$, $\alpha \neq 0$, $\alpha \neq 1$, $P(x)$ ва $Q(x)$ функциялар x нинг узлуксиз функциялари. Янги $z = y^{1-\alpha}$ функция киритилиб, Бернулли тенгламаси 8.2.1 бандда кўриб чиқилган

$$z' + (1-\alpha)zP(x) = (1-\alpha)Q(x)$$

чизикли тенгламага келтирилади.

Бернулли тенгламасини янги z ўзгарувчи киритмай, чизикли тенглама сифатида $y = uv$ ўрнига кўйишдан фойдаланиб ҳам ечиш мумкин.

3- мисол. $y' + \frac{y}{x} = y^2 \frac{\ln x}{x}$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. Берилган тенглама Бернулли тенгламаси бўлиб, бу ерда $\alpha = 2$. $y = uv$, $y' = u'v + uv'$ ўрнига кўйишни бажарамиз, натижада:

$$u'v + u\left(v' + \frac{v}{x}\right) = u^2v^2 \frac{\ln x}{x}.$$

u , v функцияларни топиш учун ушбу системани тузамиз:

$$\begin{cases} v' + \frac{v}{x} = 0, \\ u'v = u^2v^2 \frac{\ln x}{x}. \end{cases}$$

Биринчи тенгламани интеграллаб, $v = \frac{1}{x}$ хусусий ечимни оламиз, уни иккинчи тенгламага қўйсак,

$$u' = \frac{1}{x} \cdot \frac{\ln x}{x} u^2$$

га эга бўламиз. Ўзгарувчиларни ажратамиз ва интеграллаймиз:

$$\frac{du}{u^2} = \frac{\ln x}{x^2}$$

ёки

$$-\frac{1}{u} = \int \frac{\ln x}{x^2} dx,$$

бу ерда

$$\int \frac{\ln x}{x^2} dx = \left\{ \begin{array}{l} s = \ln x, ds = \frac{dx}{x} \\ dt = \frac{1}{x^2}, t = -\frac{1}{x} \end{array} \right\} = -\frac{\ln x}{x} + \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C.$$

Демак, $-\frac{1}{u} = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C$, бу ердан $u = \frac{x}{Cx + 1 + \ln x}$.

Берилган Бернулли тенгламасининг умумий ечими:

$$y = uv = \frac{1}{Cx + 1 + \ln x}.$$

8.2.3. Агар

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

кўринишдаги тенгламанинг чап қисми бирор $u(x, y)$ функциянинг тўлиқ дифференциали, яъни

$$du = M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

бўлса, у ҳолда бундай тенглама *тўлиқ дифференциалли тенглама* дейилади.

Юқоридаги тенглама тўлиқ дифференциалли тенглама бўлиши учун

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

шарт бажарилиши керак.

Тўлиқ дифференциалли тенглама таърифидан $du = 0$, бундан $u(x, y) = C$ эканлиги келиб чиқади (C — ихтиёрий ўзгармас).

$u(x, y)$ ни топиш учун y ни ўзгармас деб ҳисоблаймиз, у ҳолда $dy = 0$ эканидан $du = M(x, y)dx$ бўлади. Бу тенгликни x бўйича интегралласак,

$$u = \int M(x, y)dx + \varphi(y).$$

Охириги тенгликни y бўйича дифференциаллаймиз ва натижани $N(x, y)$ га тенглаймиз, чунки $\frac{\partial u}{\partial y} = N(x, y)$.

$$\int \frac{\partial M}{\partial y} dx + \varphi'(y) = N(x, y)$$

ёки

$$\varphi'(y) = N(x, y) - \int \frac{\partial M}{\partial y} dx.$$

Бу ифодани y бўйича интеграллаб, $\varphi(y)$ ни топамиз:

$$\varphi(y) = \int \left(N(x, y) - \int \frac{\partial M}{\partial y} dx \right) dy + C.$$

Демак,

$$u(x, y) = \int M(x, y) dx + \int (N(x, y) - \int \frac{\partial M}{\partial y} dx) dy + C.$$

Бу ифодани ихтиёрый ўзгармасга тенглаб, тенгламанинг умумий интегралини ҳосил қиламиз.

4- м и с о л. $(3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y + 4y^3)dy = 0$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. Бу ерда $M(x, y) = 3x^2 + 6xy^2$, $N(x, y) = 6x^2y + 4y^3$.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 12xy, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 12xy, \quad \text{яъни} \quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

$\frac{\partial u}{\partial x} = M(x, y)$ бўлганлиги сабабли

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + 6xy^2.$$

Бу тенгликни x бўйича интеграллаймиз:

$$u = x^3 + 3x^2y^2 + \varphi(y).$$

Бундан

$$\varphi'(y) = \frac{\partial u}{\partial y} - 6x^2y.$$

$\frac{\partial u}{\partial y} = N(x, y)$ эканлигини ҳисобга олсак,

$$\varphi'(y) = 6x^2y + 4y^3 - 6x^2y = 4y^3.$$

Бундан

$$\varphi(y) = y^4 + C.$$

Демак,

$$u = x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C.$$

ёки

$$x^2 + 3x^2y^2 + y^4 = C.$$

2- дарсхона топшириғи

1. Тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

а) $y' - \frac{1-2x}{x^2}y = 1$;

б) $(1+x^2)y' - 2xy = (1+x^2)^2$;

в) $y' = \frac{1}{2x-y^2}$;

г) $y' = \frac{y}{2y \ln y + y - x}$;

д) $y' - y \lg x + y^2 \cos x = 0$;

е) $y' + \frac{2y}{x} = \frac{2\sqrt{y}}{\cos^2 x}$;

ж) $(x + \sin y)dx + (x \cos y + \sin y)dy = 0$;

з) $(y + e^x \sin y)dx + (x + e^x \cos y)dy = 0$.

Ж: а) $y = Cx^2 e^{\frac{1}{x}} + x^2$;

б) $y = (x + C)(1 + x^2)$;

в) $x = Ce^2 y + \frac{y^2}{2} + \frac{y}{2} + \frac{1}{4}$;

г) $x = y \ln y + \frac{C}{y}$;

д) $y(x + C) = \sec x$;

е) $y = \left(\frac{C + \ln|\cos x|}{x} + \operatorname{tg} x \right)^2$;

ж) $\frac{1}{2}x^2 + x \sin y - \cos y = C$;

з) $xy + e^x \sin y = C$.

2. Коши масаласини ечинг:

а) $y' - y \operatorname{tg} x = \sec x$; $y|_{x=0} = 0$;

б) $2xy dx + (y - x^2) dy = 0$; $y|_{x=-2} = 4$;

в) $(y^2 + 2y + x^2)y' + 2x = 0$; $y|_{x=1} = 0$;

г) $x + ye^x + (y + e^x)y' = 0$; $y|_{x=0} = 4$.

Ж: а) $y = \frac{x}{\cos x}$; б) $x^2 - y \ln \frac{4e}{y}$;

в) $x^2 + y^2 = e^{-y}$; г) $x^2 + y^2 + 2ye^x = 24$.

2- мустақил иш

1. Тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

а) $y' = e^{2x} - e^{xy}$;

б) $y' = \frac{1}{x \cos y + \sin 2y}$;

в) $y' + \frac{y}{x+1} + y^2 = 0$;

Ж: а) $y = Ce^{-e^x} + e^x - 1$;

б) $y = Ce^{-\sin x} + \sin x - 1$;

в) $y = \frac{1}{(1+x)(C + \ln|1+x|)}$;

г) $x^2 + y^2(C - y^2)$;

д) $x + \operatorname{arctg} \frac{y}{x} = C$.

2. Коши масаласини ечинг:

а) $y' = 2y - x + e^x$; $y|_{x=0} = -1$;

б) $y^2 dx = (x + ye^{-\frac{1}{y}}) dy$; $y|_{x=0} = -3$;

в) $y' - 7y = e^{3x} y^2$; $y|_{x=0} = 2$;

г) $x dx + y dy = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$; $y|_{x=1} = 1$.

$$\text{Ж: а) } y = \frac{1}{2}x - e^x + \frac{1}{4}(1 - e^{2x});$$

$$\text{б) } x = e^{-\frac{1}{y}}(3 + y); \quad \text{в) } y = \frac{10e^{2x}}{e^{10x} - 6};$$

$$\text{г) } \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \operatorname{arctg} \frac{x}{y} = 1 + \frac{\pi}{4}.$$

3-§. Юкори тартибли дифференциал тенгламалар

8.3.1. $y^{(n)} = f(x)$ кўринишдаги тенглама ўнг томонни кетма-кет n марта интеграллаш ёрдамида ечилади.

1- м и с о л. $y'' = xe^{-x}$ тенгламанинг $y|_{x=0} = 1$, $y'|_{x=0} = 0$ бошланғич шартларни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топинг.

Е ч и ш. Берилган тенгламани кетма-кет интеграллаб, умумий ечимини топамиз:

$$y' = \int xe^{-x} dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x, \quad du = dx, \\ dv = e^{-x} dx, \quad v = -e^{-x} \end{array} \right\} = -xe^{-x} - e^{-x} + C_1,$$

$$y = \int (C_1 - xe^{-x} - e^{-x}) dx = C_1x - (-xe^{-x} - e^{-x}) + e^{-x} + C_2$$

ёки $y = xe^{-x} + 2e^{-x} + C_1x + C_2$.

Бошланғич шартлардан

$$\begin{cases} 1 = 2 + C_2, \\ 0 = -1 + C_1, \end{cases}$$

бу системанинг ечимлари $C_1 = 1$ ва $C_2 = -1$. Шундай қилиб, берилган бошланғич шартларни қаноатлантирувчи хусусий ечим:

$$y = xe^{-x} + 2e^{-x} + x - 1.$$

8.3.2. $y^{(n)} = f(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n-1)})$ кўринишдаги тенгламада номаълум функция ва унинг $(k-1)$ -тартибгача ҳосиллари катнашмайди. Бундай тенгламанинг тартибини $y^{(k)} = p(x)$ ўрнига қуйиш ёрдамида пасайтириш мумкин.

2- м и с о л. $y'' = \frac{y'}{x} \ln \frac{y'}{x}$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. $y' = p(x)$, $y'' = p'(x)$ деб, берилган тенгламани

$$p' = \frac{p}{x} \ln \frac{p}{x}$$

кўринишга келтираемиз. Биринчи тартибли бир жинсли тенгламани ҳосил қилдик. Энди $p = ux$, $p' = u'x + u$ деб, қуйидаги тенгламани ҳосил қилаемиз:

$$u'x + u = u \ln u \quad \text{ёки} \quad \frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}.$$

Унинг ечими

$$\ln|\ln u - 1| = \ln x + \ln C_1 \text{ ёки } \ln u - 1 = Cx,$$

бу ердан $u = e^{C_1 x + 1}$. Дастлабки y ўзгарувчига кайтиб,

$$y' = p = ux = xe^{C_1 x + 1} \text{ ёки } y' = xe^{C_1 x + 1}$$

тенгламани оламиз. Бу тенгламани интеграллаб, умумий ечимни топамиз:

$$y = \int x e^{C_1 x + 1} dx = \left\{ \begin{array}{l} s = x, \quad ds = dx, \\ dt = e^{C_1 s + 1} dt, \quad t = \frac{1}{C_1} e^{C_1 s + 1} \end{array} \right\} = \\ = \frac{x}{C_1} e^{C_1 x + 1} - \frac{1}{C_1^2} e^{C_1 x + 1} + C_2.$$

8.3.3. $y^{(n)} = f(y, y', \dots, y^{(n-1)})$ кўринишдаги тенгламада x эркин ўзгарувчи катнашмайди. Бундай тенгламанинг тартибини $y' = p(y)$ ўрнига қўйиш орқали пасайтириш мумкин.

3- мисол. $y'' = \frac{1+y'^2}{y}$ тенгламани ечинг.

Ечиш. $y' = p(y)$, $y'' = p'p$ ўрнига қўйишни амалга оширсак, тенглама

$$p'p = \frac{1+p^2}{y}$$

кўринишга келади. Бу — ўзгарувчилари ажраладиган тенгламадир. Ўзгарувчиларни ажратиб ва интеграллаб, топамиз:

$$\frac{pdp}{1+p^2} = \frac{dy}{y} \text{ ёки } \frac{1}{2} \ln|1+p^2| = \ln|y| + \ln C_1,$$

бу ердан

$$1+p^2 = C_1^2 y^2 \text{ ёки } p = \pm \sqrt{C_1^2 y^2 - 1}.$$

y ўзгарувчига кайтсак

$$y' = \pm \sqrt{C_1^2 y^2 - 1} \text{ ёки } \frac{dy}{\sqrt{C_1^2 y^2 - 1}} = \pm dx.$$

бундан,

$$\frac{1}{C_1} \ln|C_1 y + \sqrt{C_1^2 y^2 - 1}| = \pm (x + C_2).$$

3- дарсхона топшириги

1- Қуйидаги тенгламаларни ечинг:

а) $y''' \sin^4 x = \sin 2x$;

б) $y'' = \ln x$;

$$\begin{array}{ll} \text{в)} (1-x^2)y'' - xy' = 2; & \text{г)} (1+x^2)y'' + 1 + y'^2 = 0; \\ \text{д)} y''(2y+3) - 2y'^2 = 0; & \text{е)} yy'' - y'^2 = y^2 \ln y. \end{array}$$

Ж: а) $y = \ln \sin x + C_1 x^2 + C_2 x + C_3;$

б) $y = \frac{x^2}{2} (\ln x - \frac{3}{2}) + C_1 x + C_2;$

в) $y = (\arcsin x)^2 + C_1 \arcsin x + C_2;$

г) $y = (1 + C_1^{-2}) \ln(C_1 x + 1) - C_1^{-1} x + C_2;$

д) $0,5 \ln(2y+3) = C_1 x + C_2;$

е) $\ln y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$

2. Коши масаласини ечинг:

а) $y''' = xe^{-x}; y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 2, y''|_{x=0} = 2;$

б) $y'' - \frac{y'}{x-1} = x(x-1); y|_{x=2} = 1, y'|_{x=2} = -1;$

в) $yy'' - y'^2 = 0; y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2.$

Ж: а) $y = -(x+3) \cdot e^{-x} + \frac{3}{2} x^2 + 3;$

б) $y = (3x^4 - 4x^3 - 36x^2 + 72x + 8) \cdot \frac{1}{24};$

в) $y = e^{2x}.$

3- мустақил иш

1. Қуйидаги тенгламаларни ечинг:

а) $y'' = \frac{y'}{x} + x;$

г) $y'' = 2 \sin x \cos^2 x - \sin^3 x;$

б) $y'' = \operatorname{arctg} x;$

д) $y'' - 2 \operatorname{ctg} x \cdot y' = \sin^3 x;$

в) $yy'' = (y')^2;$

е) $2yy'' - 3(y')^2 = 4y^2.$

Ж: а) $y = \frac{x^4}{3} + C_1 x^2 + C_2;$

б) $y = \frac{\operatorname{arctg} x}{2} (x^2 - 1) - \frac{x}{2} \ln(1 + x^2) + C_1 x + C_2;$

в) $y = C_1 e^{3x};$ г) $y = \frac{1}{3} \sin^3 x + C_1 x + C_2;$

д) $y = -\frac{1}{3} \sin^3 x + C_1 \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} \right) + C_2;$

е) $y \cos^2(x + C_1) = C_2.$

2. Коши масаласини ечинг:

а) $y''' = x \sin x; y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 0; y''|_{x=0} = 2;$

б) $xy'' + x(y')^2 - y' = 0; y|_{x=2} = 2, y'|_{x=2} = 1;$

в) $yy'' = (y')^2 - (y')^3; y|_{x=1} = 1; y'|_{x=1} = -1.$

Ж: а) $y = x \cos x - 3 \sin x + x^2 + 2x;$

б) $y = 2 + \ln \frac{x^2}{4};$ в) $y - x = 2 \ln |y|$

4-§. Ўзгармас коэффициентли бир жинсли чизикли тенгламалар

8.4.1. Ушбу

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + a_2(x)y^{(n-2)} + \dots + a_n(x)y = 0$$

кўринишдаги тенглама n -тартибли бир жинсли чизикли дифференциал тенглама дейилади. Бу ерда $a_1(x)$, $a_2(x)$, ..., $a_n(x)$ бирор $[a, b]$ ораликда аниқланган ва узлуксиз функциялар бўлиб, улар тенгламанинг коэффициентлари дейилади.

Агар y_1, y_2, \dots, y_n функциялар n -тартибли бир жинсли чизикли дифференциал тенгламанинг $[a, b]$ ораликда аниқланган чизикли эрки ечимлари бўлса, у ҳолда унинг умумий ечими

$$y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + \dots + C_ny_n(x)$$

кўринишда ёзилади.

Чизикли эрки ечимлар *ечимларнинг фундаментал системаси* дейилади.

8.4.2. Агар n -тартибли чизикли бир жинсли дифференциал тенгламанинг a_1, a_2, \dots, a_n коэффициентлари ўзгармас сонлар бўлса, у ҳолда хусусий ечимлар $y = e^{kx}$ кўринишда изланади. Бу ердаги k n -тартибли чизикли бир жинсли дифференциал тенгламанинг характеристик тенгламаси деб аталувчи ушбу

$$k^n + a_1k^{n-1} + a_2k^{n-2} + \dots + a_n = 0$$

тенгламанинг илдизлари бўлади.

Характеристик тенглама n та k_1, k_2, \dots, k_n илдизларга эга. Бу илдизларнинг характериға кўра уларға мос хусусий ечимлар куйидагича бўлади:

а) характеристик тенгламанинг ҳар бир ҳақиқий содда k илдизига e^{kx} хусусий ечим мос келади;

б) ҳар бир m каррали ҳақиқий илдизға m та чизикли эрки e^{kx} , xe^{kx} , ..., $x^{m-1}e^{kx}$ ечимлар мос келади;

в) комплекс қўшма содда илдизларнинг ҳар бир $k_1 = \alpha + i\beta$ ва $k_2 = \alpha - i\beta$ жуфтиға иккита чизикли эрки $e^{\alpha x} \cos \beta x$ ва $e^{\alpha x} \sin \beta x$ хусусий ечим мос келади;

г) карралиги r га тенг бўлган комплекс қўшма илдизларнинг ҳар бир $k_1 = \alpha + i\beta$, $k_2 = \alpha - i\beta$ жуфтиға $2r$ та ушбу чизикли эрки хусусий ечимлар мос келади;

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, xe^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{r-1} e^{\alpha x} \cos \beta x,$$

$$e^{\alpha x} \sin \beta x, xe^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{r-1} e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Олинган хусусий ечимлар — ечимларнинг фундаментал системасининг чизикли комбинацияси

$$y = C_1y_1 + C_2y_2 + \dots + C_ny_n$$

ни тузиб, ўзгармас коэффициентли чизикли бир жинсли дифференциал тенгламанинг умумий ечими ҳосил қилинади.

1- мисол. $y'' - 7y' + 6y = 0$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Характеристик тенгламани тузамиз:

$$k^2 - 7k + 6 = 0,$$

унинг илдизлари $k_1 = 1$ ва $k_2 = 6$ — хақиқий ва оддий, демак, берилган тенгламанинг хусусий чизикли эрки ечимлари (фундаментал ечимлар системаси): $y_1 = e^x$ ва $y_2 = e^{6x}$; тенгламанинг умумий ечими эса

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{6x}$$

бўлади.

2- мисол. $y^{IV} - 13y'' + 36y = 0$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Характеристик тенгламани тузамиз:

$$k^4 - 13k^2 + 36 = 0$$

унинг илдизлари $k_{1,2} = \pm 3$, $k_{3,4} = \pm 2$ — хақиқий ва оддий. Бу илдизларга ушбу хусусий чизикли эрки ечимлар мос келади:

$$y_1 = e^{3x}, y_2 = e^{-3x}, y_3 = e^{2x}, y_4 = e^{-2x}.$$

Умумий ечим куйидаги кўринишда бўлади:

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-3x} + C_3 e^{2x} + C_4 e^{-2x}.$$

3- мисол. $y^V - 16y' = 0$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Характеристик тенгламани тузамиз:

$$k^5 - 16k = 0,$$

унинг ечимлари: $k_1 = 0$, $k_{2,3} = \pm 2$ — хақиқий, $k_{4,5} = \pm 2i$ — комплекс кўшма ($\alpha = 0$, $\beta = 2$). Фундаментал ечимлар системасини ёзамиз:

$$y_1 = e^{0x} = 1, y_2 = e^{2x}, y_3 = e^{-2x}, y_4 = e^{0x} \cos 2x = \cos 2x, y_5 = \sin 2x.$$

Умумий ечим:

$$y = C_1 + C_2 e^{2x} + C_3 e^{-2x} + C_4 \cos 2x + C_5 \sin 2x.$$

4- мисол. $y'' - y' - 2x = 0$ тенгламанинг $y|_{x=0} = 0$, $y'|_{x=0} = 3$ бошланғич шартларни канаотлантирувчи ечимини топинг.

Ечиш. Бу тенгламанинг характеристик тенгламаси $k^2 - k - 2 = 0$ куйидаги илдизларга эга: $k_1 = 2$, $k_2 = -1$. Демак, умумий ечим

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$$

кўринишда бўлади. Унинг ҳосиласи:

$$y' = 2C_1 e^{2x} - C_2 e^{-x}.$$

Бошланғич шартларни умумий ечимга ва унинг хосиласига қўйиб, C_1 ва C_2 га nisbatan ушбу тенгламалар системасини ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} 0 = C_1 + C_2, \\ 3 = 2C_1 - C_2, \end{cases}$$

бу ердан $C_1 = 1$, $C_2 = -1$. Демак, берилган бошланғич шартларни қаноатлантирувчи хусусий ечим қуйидагича бўлади:

$$y = e^{2x} - e^{-x}.$$

5-мисол. $y'' - 4y' + 5y = 0$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. $k^2 - 4k + 5 = 0$ характеристик тенглама $k_{1,2} = 2 \pm i$ қўшма-комплекс илдишларга эга. Буларга мос фундаментал ечимлар системаси қуйидагича бўлади:

$$y_1 = e^{2x} \cos x, \quad y_2 = e^{2x} \sin x.$$

Умумий ечим:

$$y = C_1 e^{2x} \cos x + C_2 e^{2x} \sin x \quad \text{ёки} \quad y = e^{2x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x).$$

6-мисол. $y^{IV} + 2y''' + y'' = 0$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Характеристик тенгламани тузамиз:

$k^4 + 2k^3 + k^2 = 0$, бу тенглама $k_{1,2} = 0$ ($m=2$); $k_{3,4} = -1$ ($m=2$) қаррали илдишларга эга. Буларга мос фундаментал ечимлар системаси

$$y_1 = e^{0x} = 1; \quad y_2 = x \cdot 1 = x; \quad y_3 = e^{-x}, \quad y_4 = x e^{-x}$$

қўринишга эга бўлади. Демак, умумий ечим

$$y = C_1 + C_2 x + C_3 e^{-x} + C_4 x e^{-x}$$

ёки

$$y = C_1 + C_2 x + e^{-x} (C_3 + C_4 x).$$

4-дарсхона топшириғи

1. Тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

а) $y'' + 4y' + 3y = 0$; б) $y'' - 4y' + 4y = 0$; в) $y'' + 4y' + 8y = 0$.

Ж: а) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x}$;

б) $y = e^{2x} (C_1 + C_2 x)$;

в) $y = e^{-2x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$.

2. Тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

а) $y^{VI} - 13y^{IV} + 36y'' = 0$; б) $y^{IV} - 8y'' + 16y = 0$;

в) $y^V - 6y^{IV} + 9y''' = 0$; г) $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$;

д) $64y^{VIII} + 48y^{VI} + 12y^{IV} + y'' = 0$.

Ж: а) $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-3x} + C_3 e^{2x} + C_4 e^{-2x} + C_5 + C_6 x$;

б) $y = e^{2x}(C_1 + C_2 x) + e^{-2x}(C_3 + C_4 x)$;

в) $y = e^{3x}(C_1 + C_2 x) + C_3 + C_4 x + C_5 x^2$;

г) $y = e^x(C_1 + C_2 x + C_3 x^2)$;

д) $y = \cos \frac{x}{2}(C_1 + C_2 x + C_3 x^2) + \sin \frac{x}{2}(C_4 + C_5 x + C_6 x^2) + C_7 + C_8 x$.

3. Коши масаласини ечинг.

а) $y'' + 4y' + 29y = 0$; $y|_{x=0} = 0$, $y'|_{x=0} = 15$;

б) $y^V = y'$; $y|_{x=0} = 0$; $y'|_{x=0} = 1$; $y''|_{x=0} = 0$; $y'''|_{x=0} = 1$;

$y^{IV}|_{x=0} = 2$.

Ж: а) $y = 3e^{-2x} \sin 5x$;

б) $y = e^x + \cos x - 2$.

4- мустақил иш

1. Тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

а) $4y''' - 8y' + 5y = 0$; в) $y^{IV} - 6y'' + 9y = 0$;

б) $3y'' - 2y' - 8y = 0$; г) $y^{IV} + y'' = 0$.

Ж: а) $y = e^x \left(C_1 \cos \frac{x}{2} + C_2 \sin \frac{x}{2} \right)$;

б) $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-\frac{4x}{3}}$;

в) $y = e^{\sqrt{3}x}(C_1 + C_2 x) + e^{-\sqrt{3}x}(C_3 + C_4 x)$;

г) $y = C_1 + C_2 x + C_3 \cos x + C_4 \sin x$.

2. Коши масаласини ечинг.

а) $y'' - 2y' + y = 0$; $y|_{x=2} = 1$, $y'|_{x=2} = -2$;

б) $y''' - y' = 0$; $y|_{x=0} = 3$, $y'|_{x=0} = -1$; $y''|_{x=0} = 1$.

Ж: а) $y = (7 - 3x)e^{x-2}$; б) $y = 2 + e^{-x}$.

5- §. Ўзгармас коэффициентли бир жинсли бўлмаган чизикли дифференциал тенгламалар

Ушбу

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_n y = f(x),$$

бу ерда $f(x) \neq 0$, a_1, \dots, a_n — ўзгармас сонлар, кўринишдаги тенглама n - тартибли ўзгармас коэффициентли бир жинсли бўлмаган чизикли дифференциал тенглама дейилади.

Берилган бир жинсли бўлмаган чизикли дифференциал тенгламанинг умумий ечими $y = Y + \bar{y}$ формулага кўра аниқланади, бу ерда Y — мос бир жинсли тенгламанинг умумий ечими, \bar{y} — берилган бир жинсли бўлмаган тенгламанинг бирорта хусусий ечими.

Бу тенгламанинг \bar{y} хусусий ечимлари тенгламанинг ўнг томони ушбу

$$f(x) = e^{\gamma x} [P_n(x) \cos \delta x + Q_m(x) \sin \delta x]$$

махсус кўринишга эга бўлганда аниқмас коэффициентлар усули билан топилади. Бу ерда γ ва δ — берилган сонлар, $P_n(x)$ ва $Q_m(x)$ — мос равишда n - ва m - даражали маълум кўпхадлар. Бу ҳолда берилган тенгламанинг хусусий ечими \bar{y} куйидаги кўринишда изланади:

$$\bar{y} = x^r e^{\gamma x} [u_l(x) \cos \delta x + v_l(x) \sin \delta x],$$

бу ерда r

$$k^n + p_1 k^{n-1} + p_2 k^{n-2} + \dots + p_n = 0$$

характеристик тенгламанинг $\gamma + \delta i$ илдизининг карралиги (агар характеристик тенглама бундай илдизга эга бўлмаса, $r=0$); $u_l(x)$ ва $v_l(x)$ — l - даражали кўпхадлар, шу билан бирга l сони m ва n ларнинг каттасига тенг.

$u_l(x)$ ва $v_l(x)$ кўпхадларнинг коэффициентлари берилган тенгламада y ўрнига \bar{y} ни қўйгандан сўнг унинг чап ва ўнг томонларидаги ўхшаш хадлар коэффициентларини бир-бирига тенглаш натижасида ҳосил бўлган алгебраик тенгламалар системасидан топилади.

Агар берилган бир жинсли бўлмаган чизикли тенгламада $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ бўлса, унинг хусусий ечими $\bar{y} = \bar{y}_1 + \bar{y}_2$ бўлади, бу ерда \bar{y}_1 — ўнг томони $f_1(x)$ бўлган берилган тенгламанинг хусусий ечими, \bar{y}_2 эса ўнг томони $f_2(x)$ бўлган бу тенгламанинг хусусий ечими.

1- м и с о л. Ушбу

$$y^{IV} - 3y'' = 9x^2$$

чизикли тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. $k^4 - 3k^2 = 0$ характеристик тенглама $k_1 = k_2 = 0$, $k_{3,4} = \pm \sqrt{3}$ илдизларга эга, буларга ушбу $y_1 = 1$, $y_2 = x$, $y_3 = e^{\sqrt{3}x}$, $y_4 = e^{-\sqrt{3}x}$ фундаментал ечимлар системаси мос келади, бу ердан мос бир жинсли тенгламанинг умумий ечимини ҳосил қиламиз:

$$Y = C_1 + C_2 x + C_3 e^{\sqrt{3}x} + C_4 e^{-\sqrt{3}x}.$$

Берилган тенгламада $f(x) = 9x^2$, $\gamma = 0$, $\delta = 0$, шунинг учун $\gamma + i\delta = 0$. Бу сон характеристик тенгламанинг иккала $k_1 = k_2 = 0$ илдизлари билан бир хилдир, шунинг учун $r = 2$ ва хусусий ечим \bar{y} ни

$$\bar{y} = (Ax^2 + Bx + C)x^2 = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2$$

кўринишда излаймиз.

\bar{y}' , \bar{y}'' , \bar{y}''' , \bar{y}^{IV} ҳосилаларни топамиз ва уларни куйидаги схема бўйича жойлаштирамиз (тик чизикнинг чап томонига тенгламада булар олдида турган коэффициентларни ёзиб чиқамиз):

$$\begin{array}{l|l} 0 & \bar{y} = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2, \\ 0 & \bar{y}' = 4Ax^3 + 3Bx^2 + 2Cx, \\ -3 & \bar{y}'' = 12Ax^2 + 6Bx + 2C, \\ 0 & \bar{y}''' = 24Ax + 6B, \\ 1 & \bar{y}^{IV} = 24A \end{array}$$

Топилганларни тенгламага кўямиз:

$$\bar{y}^{IV} - 3\bar{y}'' = -36Ax^2 - 18Bx - 6C + 24A = 9x^2.$$

Бу ерда чап ва ўнг томонда x нинг бир хил даражалари олдидаги коэффициентларни тенглаб, A , B , C ларни топиш учун алгебраик тенгламалар системасини ҳосил киламиз:

$$\begin{array}{l|l} x^2 & -36A = 9, \\ x & -18B = 0, \\ x^0 & 6C + 24A = 0, \end{array}$$

бу ердан $A = -\frac{1}{4}$, $B = 0$, $C = -1$.

Демак, \bar{y} хусусий ечим куйидаги кўринишда бўлади:

$$\bar{y} = -\frac{1}{4}x^4 - Cx^2.$$

Берилган тенгламанинг умумий ечими

$$y = Y + \bar{y} = C_1 + C_2x + C_3e^{\sqrt{3}x} + C_4e^{-\sqrt{3}x} - \frac{1}{4}x^4 - Cx^2.$$

2- мисол. Ушбу

$$y'' - 7y' + 6y = xe^x; \quad y|_{x=0} = 1, \quad y'|_{x=0} = 3.$$

Қоши масаласини ечинг.

Е ч и ш. $k^2 - 7k + 6 = 0$ характеристик тенглама $k_1 = 1$, $k_2 = 6$ ил-дизларга эга, шунинг учун мос бир жинсли тенглама $y'' - 7y' + 6y = 0$ нинг умумий ечими $Y = C_1e^x + C_2e^{6x}$ функциядан иборат.

Тенгламанинг ўнг томони $f(x) = xe^x$, $\gamma = 1$, $\delta = 0$, $\gamma + i\delta = 1 = k$, шунинг учун $r = 1$; $P_1(x) = x$, демак, хусусий ечим y ни

$$\bar{y} = xe^x(Ax + B) \quad \text{ёки} \quad \bar{y} = e^x(Ax^2 + Bx)$$

кўринишда излаймиз.

1- мисолдаги каби топамиз:

$$\begin{array}{l|l} 6 & y = e^x(Ax^2 + Bx), \\ -7 & y' = e^x(4x^2 + Bx + 2Ax + B), \\ 1 & y'' = e^x(Ax^2 + Bx + 2Ax + B + 2Ax + B + 2A). \end{array}$$

Тенгламага кўямиз:

$$\bar{y}'' - 7\bar{y}' + 6\bar{y} = e^x(6A - 7A + A)x^2 + e^x(6B + 7B - 14A + B + 4A)x + e^x(-7B + 2B + 2A) = xe^x.$$

Бу айниятнинг иккала томонини $e^x \neq 0$ га бўлиб ва чап ҳамда ўнг томонда x ning бир хил даражалари олдидаги коэффициентларни тенглаб, қуйидагини ҳосил қиламиз:

$$\begin{array}{l|l} x^2 & 0 = 0, \\ x & -10A = 1, \quad \text{бу ердан } A = -\frac{1}{10}, \quad B = -\frac{1}{25}. \\ x^0 & 2A - 5B = 0, \end{array}$$

Демак, хусусий ечим: $\bar{y} = e^x\left(-\frac{x^2}{10} - \frac{x}{25}\right)$.

Умумий ечим: $y = C_1 e^x + C_2 e^{6x} - e^x\left(\frac{x^2}{10} + \frac{x}{25}\right)$.

Коши масаласини ечиш учун y' ни топамиз:

$$y' = C_1 e^x + 6C_2 e^{6x} - e^x\left(\frac{x^2}{10} + \frac{x}{25} + \frac{x}{5} + \frac{1}{25}\right)$$

Бошлангич шартлардан фойдаланиб, ихтиёрий ўзгармаслар C_1 ва C_2 ларни топиш учун чизиқли алгебраик тенгламалар системасини ҳосил қиламиз:

$$\begin{aligned} 1 &= C_1 + C_2, & 1 &= C_1 + C_2, \\ 3 &= C_1 + 6C_2 - \frac{1}{25} & \text{ёки} & \frac{76}{25} = C_1 + 6C_2. \end{aligned}$$

бу ердан $C_1 = \frac{74}{125}$, $C_2 = \frac{51}{125}$.

Демак, берилган бошлангич шартларни қаноатлантирувчи хусусий ечим қуйидаги кўринишда бўлади:

$$y = \frac{74}{125} e^x + \frac{51}{125} e^{6x} - e^x\left(\frac{x^2}{10} + \frac{x}{25}\right)$$

3- мисол. Ушбу

$$y'' + y = (x^2 - 1)e^{-x} + \sin x$$

тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. $k^2 + 1 = 0$ характеристик тенглама $k_{1,2} = \pm i$ ($\alpha = 0$, $\beta = 1$) мавҳум илдишларга эга, демак, мос бир жинсли тенгламанинг

У умумий ечимни $Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ функция кўринишида бўлади. Тенгламанинг ўнг томони ушбу $f_1(x)$ ва $f_2(x)$ функцияларнинг йиғиндисидан иборат:

$$f_1(x) = (x^2 - 1)e^{-x}; \quad f_2(x) = \sin x,$$

шунинг учун тенгламанинг \bar{y} хусусий ечимини $\bar{y} = \bar{y}_1 + \bar{y}_2$ кўринишида излаймиз.

\bar{y}_1 учун:

$$f_1(x) = (x^2 - 1)e^{-x}, \quad \gamma = -1, \quad \delta = 0; \quad \gamma + i\delta = -1 \neq k_1, k_2,$$

демак, $r = 0$ ва $\bar{y}_1 = (Ax^2 + Bx + C)e^{-x}$.

\bar{y}_2 учун:

$$f_2(x) = \sin x, \quad \gamma = 0, \quad \delta = 1; \quad \gamma + i\delta = i = k_1 \neq k_2,$$

демак, $r = 1$ ва $\bar{y}_2 = (D \sin x + E \cos x)x$.

Шундай қилиб,

$$\begin{array}{l|l} 1 & \bar{y} = e^{-x}(Ax^2 + Bx + C) + (Dx \sin x + Ex \cos x), \\ 0 & \bar{y}' = e^{-x}(-Ax^2 - Bx - C + 2Ax + B) + \sin x(D - Ex) + \cos x(E + Dx), \\ 1 & \bar{y}'' = e^{-x}(Ax^2 + Bx + C - 2Ax - B - 2Ax - B + 2A) + \\ & + \sin x(-E - E - Dx) + \cos x(D - Ex + D). \end{array}$$

Топилганларни тенгламага қўямиз:

$$\begin{aligned} \bar{y}'' + \bar{y}' &= e^{-x}(A + A)x^2 + e^{-x}(B + B - 2A - 2A)x + e^{-x}(C + C - \\ &- B - B + 2A) + \sin x(Dx - 2E - Dx) + \cos x(Ex + 2D - Ex) = \\ &= (x^2 - 1)e^{-x} + \sin x. \end{aligned}$$

Охириги айниятнинг чап ва ўнг томонларидаги бир хил ҳадлар олдидagi коэффициентларни тенглаб, A, B, C, D, E ларни топамиз:

$$\begin{array}{l|l} x^2 e^{-x} & 1 = 2A, \\ x e^{-x} & 0 = 2B - 4A, \\ x^0 e^{-x} & -1 = 2C - 2B + 2A, \\ \sin x & 1 = -2E, \\ \cos x & 0 = 2D, \end{array}$$

бу ердан $A = \frac{1}{2}, B = 1, C = 0, D = 0, E = -\frac{1}{2}$. Бинобарин \bar{y} хусу-

сий ечим $\bar{y} = e^{-x}\left(\frac{x^2}{2} + x\right) - \frac{x}{2} \cos x$ функциядан, умумий ечим эса

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^{-x}\left(\frac{x^2}{2} + x\right) - \frac{x}{2} \cos x$$

функциядан иборат бўлади.

5- дарсхона топшириги

1. Тенгламанинг умумий ечимини топинг:

а) $y'' - 6y' + 8y = 3x^2 + 2x + 1$;

б) $y'' - 6y' + 25y = 2\sin x + 3\cos x$;

в) $y'' + 3y' - 10y = xe^{-2x}$;

г) $y'' - 2y' + 2y = e^x \sin x$,

д) $y^{IV} - y = xe^x + \cos x$;

е) $y'' - 3y' + 2y = 3x + 5\sin 2x$;

ж) $y'' - 4y' + 4y = 8(x^2 + e^{2x} + \sin 2x)$.

Ж: а) $y = C_1 e^{4x} + C_2 e^{2x} + \frac{1}{64}(24x^3 + 52x + 41)$;

б) $y = e^{3x}(C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x) + \frac{1}{102}(14 \cos x + 5 \sin x)$;

в) $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-5x} + \frac{1}{144}(1 - 12x)e^{-2x}$;

г) $y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x) - \frac{1}{2}xe^x \cos x$;

д) $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \sin x + C_4 \cos x + \frac{x^2 - 3x}{8}e^x - \frac{x}{4} \sin x$;

е) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{3}{2}x + \frac{1}{4}(9 + 3\cos 2x - \sin 2x)$;

ж) $y = e^{2x}(C_1 + C_2 x) + 2x^2 + 4x + 3 + 4xe^{2x} + \cos 2x$.

2. Коши масаласини ечинг:

а) $y''' - y' = 3(2 - x^2)$; $y|_{x=0} = y'|_{x=0} = y''|_{x=0} = 1$;

б) $y'' + y = -\sin 2x$; $y|_{x=\pi} = y'|_{x=\pi} = 1$.

Ж: а) $y = e^x + x^3$; б) $y = \frac{1}{3}\sin 2x - \frac{1}{3}\sin x - \cos x$.

5- мустақил иш

1. Тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

а) $y'' - 3y' + 2y = x - e^{-2x} + 1$;

б) $2y'' + 5y' = 29x \sin x$;

в) $y'' - 4y' + 4y = \sin x \cdot \cos 2x$.

Ж: а) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2}x + \frac{5}{4} - \frac{1}{12}e^{-2x}$;

б) $y = C_1 + C_2 e^{-\frac{5x}{2}} + \left(-5x - \frac{16}{29}\right) \cos x - \left(2x - \frac{185}{29}\right) \sin x$;

в) $y = e^{2x}(C_1 + C_2 x) + \frac{1}{169} \left(-\frac{5}{2} \sin 3x + 6 \cos 3x\right) - \frac{1}{50}(3 \sin x + 4 \cos x)$.

қўринишда излаймиз, бу ерда $C_1(x)$ ва $C_2(x)$ функциялар

$$\begin{cases} C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x = 0, \\ -C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x = \operatorname{tg} x \end{cases}$$

системадан топилади. Системани ечсак:

$$C_1(x) = -\frac{\sin^2 x}{\cos x}, \quad C_2(x) = \sin x$$

Интеграллашдан сўнг куйидагиларни ҳосил қиламиз:

$$\begin{aligned} C_1(x) &= -\int \frac{\sin^2 x}{\cos x} dx = -\int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} dx = \\ &= \sin x - \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + \bar{C}_1, \\ C_2(x) &= \int \sin x dx = -\cos x + \bar{C}_2, \end{aligned}$$

бу ерда \bar{C}_1 ва \bar{C}_2 — ихтиёрий интеграллаш ўзгармаслари.

Шундай қилиб, берилган тенгламанинг умумий ечими

$$y = (\bar{C}_1 + \sin x + \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|) \cos x + (\bar{C}_2 - \cos x) \sin x$$

ёки

$$y = \bar{C}_1 \cos x + \bar{C}_2 \sin x - \cos x \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|.$$

6-дарсхона топшириғи

1. Куйидаги тенгламаларнинг умумий ечимини ихтиёрий ўзгармасларни вариациялаш усули ёрдамида топинг:

а) $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{2}$; б) $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}$;

в) $y'' + y' = \frac{1}{\cos x}$; г) $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x} \ln x$.

Ж: а) $y = (C_1 + C_2 x) e^x + x e^x \ln |x|$;

б) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + (e^{-x} + e^{-2x}) \ln(e^x + 1)$;

в) $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x \sin x + \cos x \cdot \ln |\cos x|$;

г) $y = (C_1 + C_2 x + \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{3}{4} x^2) e^{-2x}$.

2. Коши масаласини ечинг:

$$y'' + y' = \frac{1}{\sin x}, \quad y \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = 1, \quad y' \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = 0.$$

Ж: $y = \frac{\pi}{2} \cos x + \sin x - x \cos x + \sin x \ln |\sin x|$.

I. Тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

$$1. y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$\text{Ж: } y = (C_1 + \sqrt{4-x^2} + \arcsin \frac{x}{2} + C_2 x) e^x.$$

$$2. y'' + y = \frac{1}{\sqrt{\cos 2x}}$$

$$\text{Ж: } y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x \ln |\cos x + \sqrt{\cos^2 x - \frac{1}{2}}| + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x \cdot \arcsin(\sqrt{2} \sin x)$$

$$3. y'' - y' = -e^{2x} \sqrt{1-e^{2x}}$$

$$\text{Ж: } y = C_1 + C_2 e^x + \frac{1}{2} e^x (\arcsin e^x + e^x \sqrt{1-e^{2x}}) + \frac{1}{3} \sqrt{(1-e^{2x})^3}.$$

II. Коши масаласини ечинг:

$$y'' + 4y = \frac{1}{\sin^2 x}; \quad y \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = 0; \quad y' \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = \pi.$$

$$\text{Ж: } y = -\cos 2x \ln |\sin x| - x \sin 2x - \cos^2 x.$$

8- намунавий ҳисоб топшириқлари

I Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

$$1.1. 3(x^2 y + y) dy + \sqrt{2+y^2} dx = 0.$$

$$1.2. (3+e^x) y y' = e^x.$$

$$1.3. y \ln y + x y' = 0$$

$$1.4. 2x dx - 2y dy = x^2 y dy - 2x y^2 dx.$$

$$1.5. y' y \sqrt{\frac{1-x^2}{1-y^2}} + 1 = 0.$$

$$1.6. \sqrt{4+y^2} dx - y dy = x^2 y dy.$$

$$1.7. 2x + 2x y^2 + \sqrt{2-x^2} y' = 0.$$

$$1.8. x dx - y dy = y x^2 dy - x y^2 dx.$$

$$1.9. \sqrt{1-x^2} y' + x y^2 + x = 0.$$

$$1.10. (e^x + 8) dy - y e^x dx = 0.$$

$$1.11. x \sqrt{5+y^2} dx + y \sqrt{4+x^2} dy = 0$$

$$1.12. 6x dx - 6y dy = 2x^2 y dy - 3x y^2 dx.$$

- 1.13. $4xdx - 3ydy = 3x^2ydy - 2xy^2dx$.
 1.14. $x\sqrt{3+y^2}dx + y\sqrt{2+x^2}dy = 0$.
 1.15. $y(4+e^x)dy - e^xdx = 0$.
 1.16. $\sqrt{5+y^2} + y'y\sqrt{1-x^2} = 0$.
 1.17. $6xdx - 2ydy = 2yx^2dy - 3xy^2dx$.
 1.18. $\sqrt{5+y^2}dx + 4(x^2y+y)dy = 0$.
 1.19. $x\sqrt{1+y^2} + yy'\sqrt{1+x^2} = 0$.
 1.20. $(e^{2x}+5)dy + ye^{2x}dx = 0$.
 1.21. $\sqrt{4-x^2}y' + xy^2 + x = 0$.
 1.22. $6xdx - ydy = yx^2dy - 3xy^2dx$.
 1.23. $y(1+\ln y) + xy' = 0$.
 1.24. $(1+e^x)yy' = e^x$.
 1.25. $\sqrt{3+y^2}dx - ydy = x^2ydy$.
 1.26. $6xdx - 6ydy = 3x^2ydy - 2xy^2dx$.
 1.27. $x\sqrt{4+y^2}dx + y\sqrt{1+x^2}dy = 0$.
 1.28. $(1+e^x)y' = ye^x$.
 1.29. $\sqrt{3+y^2} + \sqrt{1-x^2}yy' = 0$.
 1.30. $2xdx - ydy = yx^2dy - xy^2dx$.

2. Дифференциал тэнгламинг умумий ечимини топинг:

- 2.1. $(2x-y)dx + (x+y)dy = 0$. 2.2. $(x^2+y^2)dx + 2xydy = 0$.
 2.3. $xdy - ydx = \sqrt{x^2+y^2}dx$. 2.4. $y' = \frac{x+y}{x-y}$.
 2.5. $(y^2 - xy)dx + (x^2 - y)dy = 0$. 2.6. $x \ln \frac{x}{y} dy - ydx = 0$.
 2.7. $(xye^{\frac{x}{y}} + y^2)dx = x^2e^{\frac{x}{y}}dy$. 2.8. $(x-y)ydx - x^2dy = 0$.
 2.9. $xy^2dy = (x^3 + y^3)dx$. 2.10. $(x^2 - y^2)dx = 2xydy$.
 2.11. $y^2dx = (xy - x^2)dy$. 2.12. $(y^2 - 2xy)dx + x^2dy = 0$.
 2.13. $xy + y^2(2x^2 + xy)y'$. 2.14. $xyy' = y^2 + 2x^2$.
 2.15. $2xy' \cdot y = x^2 + y^2$. 2.16. $(5xy - x^2)y' - 5y^2 = 0$.
 2.17. $xy' = 4\sqrt{2x^2 + y^2} + y$. 2.18. $4y' = \frac{y^2}{x^2} + 10\frac{y}{x} + 5$.
 2.19. $xy' = 3\sqrt{2x^2 + y^2} + y$. 2.20. $y'(2x^2 + 2xy) = x^2 + 2xy - y^2$.
 2.21. $xy' = \frac{3y^3 + 6yx^2}{2y^2 + 3x^2}$. 2.22. $y' = \frac{x+2y}{2x-y}$.
 2.23. $xy' = y(\ln \frac{y}{x} - 1)$. 2.24. $xy' - y = (x+y) \ln \frac{x+y}{x}$.

2.25. $xy' = y - xe^{\frac{y}{x}}$.

2.26. $xy' - y = x \operatorname{tg} \frac{y}{x}$.

2.27. $xy' = y - \sec^{\frac{y}{x}}$.

2.28. $xy' = y \cos \left(\ln \frac{y}{x} \right)$.

2.29. $y' = \frac{x^2 + xy - 3y^2}{3x^2 - 2xy}$.

2.30. $xy' = \sqrt{x^2 + y^2} + y$.

3 Коши масаласини ечинг:

3.1. $xy' - y = x^2 \cos x; y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

3.2. $xy' + y = x^3; y(1) = 0$.

3.3. $y' \cos x + y \sin x = 1; y(0) = 1$.

3.4. $y' + 2xy = xe^{-x^2}; y(0) = -1$.

3.5. $y' - \frac{y}{x} = -\frac{2}{x^2}; y(1) = 1$.

3.6. $y' - y \cos x = \sin 2x; y(0) = -1$.

3.7. $y' - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^3; y(0) = \frac{1}{2}$.

3.8. $y' + 2xy = -2x^3; y(1) = e^{-1}$.

3.9. $y' + \frac{2y}{x} = x^3; y(1) = -\frac{5}{6}$.

3.10. $y' - \frac{y}{x} = x^2; y(1) = 0$.

3.11. $y' - \frac{y}{x} = -\frac{2 \ln x}{x}; y(1) = 1$.

3.12. $y' + \frac{y}{x} = \sin x; y(\pi) = \frac{1}{\pi}$.

3.13. $y' - \frac{y}{x} = x \sin x; y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

3.14. $y' - \frac{y}{x+2} = x^2 + 2x; y(-1) = \frac{3}{2}$.

3.15. $y' - \frac{y}{x+1} = e^x(x+1); y(0) = 1$.

3.16. $y' + \frac{xy}{2(1-x^2)} = \frac{x}{2}; y(0) = \frac{2}{3}$.

3.17. $y' - \frac{2y}{x+1} = e^x(x+1)^2; y(0) = 1$.

3.18. $y' + y \operatorname{tg} x = \cos^2 x; y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$.

3.19. $y' + y \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x; y(0) = 0$.

3.20. $y' - \frac{2xy}{1+x^2} = 1 + x^2; y(1) = 3$.

3.21. $y' + \frac{y}{x} - \frac{\sin x}{x}; y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}$.

3.22. $xy' + y = \ln x + 1; y(1) = 0$.

- 3.23. $y' \operatorname{ctg} x - y = 2 \cos^2 x \operatorname{ctg} x$; $y(0) = 0$.
 3.24. $xy' + (x+1)y = 3x^2 e^{-x}$; $y(1) = 0$.
 3.25. $(xy' - 1) \ln x = 2y$; $y(e) = 0$.
 3.26. $y = x(y' - x \cos x)$; $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.
 3.27. $xy' - 2y = 2x^3$; $y(1) = 0$.
 3.28. $y' + y \operatorname{tg} x + \sin x$; $y(0) = 0$.
 3.29. $(x^2 + 1)y' + 4xy = 3$; $y(0) = 0$.
 3.30. $y' + \frac{1-x}{1+x} y = \frac{e^{-x}}{1-x}$; $y(0) = \ln 5$.

4. Коши масаласининг ечимини топинг:

- 4.1. $y' - y \operatorname{tg} x = -\frac{2}{3} y^4 \sin x$; $y(0) = 1$.
 4.2. $y' - y = xy^2$; $y(0) = 1$.
 4.3. $4y' + x^3 y = (x^3 + 8)e^{-2xy^2}$; $y(0) = 1$.
 4.4. $y' - y = 2xy^2$; $y(0) = \frac{1}{2}$.
 4.5. $3y' + 2xy = 2xy^{-2} \cdot e^{-2x^2}$; $y(0) = -1$.
 4.6. $xy' - y = -y^2(\ln x + 2) \ln x$; $y(1) = 1$.
 4.7. $y' + 4x^3 y = 4(x^3 + 1)e^{-4xy^2}$; $y(0) = 1$.
 4.8. $y' x + y = \frac{xy^2}{3}$; $y(1) = 3$.
 4.9. $2y' + 3y \cos x = (8 + 12 \cos x)e^{2x} y^{-1}$; $y(0) = 2$.
 4.10. $y' + 4x^2 y = 4y^2 e^{4x}(1 - x^2)$; $y(0) = -1$.
 4.11. $2(y' + xy) = (x-1)e^x - y^2$; $y(0) = 2$.
 4.12. $2y' - 3y \cos x = -e^{-2x}(2 + 3 \cos x)y^{-1}$; $y(0) = 1$.
 4.13. $y' + xy = (x-1)e^x y^2$; $y(0) = 1$.
 4.14. $xy' + y = y^2 \ln x$; $y(1) = 1$.
 4.15. $2y' + 3y \cos x = e^{2x}(2 + 3 \cos x)y^{-1}$; $y(0) = 1$.
 4.16. $2y' + y \cos x = y^{-1} \cos x(1 + \sin x)$; $y(0) = 1$.
 4.17. $2(xy' + y) = xy^2$; $y(1) = 2$.
 4.18. $xy' + y = 2y^2 \ln x$; $y(1) = \frac{1}{2}$.
 4.19. $3(xy' + y) = y^2 \ln x$; $y(1) = 3$.
 4.20. $3xy' + 5y = (4x - 5)y^4$; $y(1) = 1$.
 4.21. $y' + 2xy = 2x^3 y^4$; $y(0) = \sqrt{2}$.

- 4.22. $2(y' + y) = xy^2$; $y(0) = 2$.
 4.23. $y' + y = xy^2$; $y(0) = 1$.
 4.24. $y' + xy = (1+x)e^{-xy^2}$; $y(0) = 1$.
 4.25. $2(y' + xy) = (1+x)e^{-xy^2}$; $y(0) = 2$.
 4.26. $2xy' - 3y = -(5x^2 + 3)y^3$; $y(1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.
 4.27. $2xy' - 3y = -(20x^2 + 12)y^3$; $y(1) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.
 4.28. $8xy' - 12y = -(5x^2 + 3)y^3$; $y(1) = \sqrt{2}$.
 4.29. $2(xy' + y) = y^2 \ln x$; $y(1) = 2$.
 4.30. $xy' + y = xy^2$; $y(1) = 1$.

5. Дифференциал тенгламанинг умумий интегралини топинг:

- 5.1. $(y^2 + y \sec^2 x) dx + (2xy + \operatorname{tg} x) dy = 0$.
 5.2. $\left(\frac{1}{x^2} + \frac{3y^2}{x^4}\right) dx - \frac{2y}{x^3} dy = 0$.
 5.3. $\frac{y}{x^2} dx - \frac{xy+1}{x} dy = 0$.
 5.4. $(y^3 + \cos x) dx + (3xy^2 + e^y) dy = 0$.
 5.5. $(\sin y + y \sin x + \frac{1}{x}) dx + (x \cos y - \cos x + \frac{1}{y}) dy = 0$.
 5.6. $xy^2 dx + y(x^2 + y^2) dy = 0$.
 5.7. $(3x^3 + 6x^2 y + 3xy^2) dx + (2x^3 + 3x^2 y) dy = 0$.
 5.8. $(x^2 - 4xy - 2y^2) dx + (y^2 - 4xy - 2x^2) dy = 0$.
 5.9. $e^y dx + (\cos y + xe^y) dy = 0$.
 5.10. $\frac{dx}{y} - \frac{x+y^2}{y^2} dy = 0$.
 5.11. $\left(xy^2 + \frac{x}{y^2}\right) dx + \left(x^2 y - \frac{x^2}{y^3}\right) dy = 0$.
 5.12. $\left(2x - 1 - \frac{y}{x^2}\right) dx - \left(2y - \frac{1}{x}\right) dy = 0$.
 5.13. $(3x^2 + 4y^2) dx + (8xy + e^y) dy = 0$.
 5.14. $(\sin 2x - 2 \cos(x+y)) dx - 2 \cos(x+y) dy = 0$.
 5.15. $\frac{1+xy}{x^2 y} dx + \frac{1-xy}{xy^2} dy = 0$.
 5.16. $\left(\frac{y}{x^2 + y^2} + e^x\right) dx - \frac{xy dy}{x^2 + y^2} = 0$.

- 5.17. $(\cos(x+y^2) + \sin x)dx + 2y\cos(x+y^2)dy = 0$.
- 5.18. $(6xy^2 + 4x^3)dx + (6x^2y + y)^2dy = 0$.
- 5.19. $\left(3x^2 + \frac{2}{y}\cos\frac{2x}{y}\right)dx - \frac{2x}{y^2}\cos\frac{2x}{y}dy = 0$.
- 5.20. $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)dx + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}\right)dy = 0$.
- 5.21. $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + y\right)dx + \left(x + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)dy = 0$.
- 5.22. $\left(10xy - \frac{1}{\sin y}\right)dx + \left(5x^2 + \frac{x\cos y}{\sin^2 y} - y^2\sin y\right)dy = 0$.
- 5.23. $(5xy^2 - x^3)dx + (5x^2y - y)dy = 0$.
- 5.24. $\frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2+y^2} = 0$.
- 5.25. $3x^2e^y dx + (x^3e^y - 1)dy = 0$.
- 5.26. $(3x^2y + 2y + 3)dx + (x^3 + 2x + 3y^2)dy = 0$.
- 5.27. $\frac{y}{x^2}\cos\frac{y}{x}dx - \left(\frac{1}{x}\cos\frac{y}{x} + 2y\right)dy = 0$.
- 5.28. $\left(xe^x + \frac{y}{x^2}\right)dx - \frac{1}{x}dy = 0$.
- 5.29. $xe^{y^2}dx + (x^2ye^{y^2} + \operatorname{tg}^2y)dy = 0$.
- 5.30. $\left(1 + \frac{1}{y}e^{\frac{1}{y}}\right)dx + \left(1 - \frac{x}{y^2}e^{\frac{x}{y}}\right)dy = 0$.

6. Дифференциал тенгламининг умумий ечимини топинг:

- 6.1. $y''' + y''\operatorname{tg}x = 0$.
- 6.2. $y'''x \ln x = y''$.
- 6.3. $y'' = -\frac{x}{y}$.
- 6.4. $x^2y'' + xy' = 1$.
- 6.5. $y'' - \frac{y'}{x-1} = x(x-1)$.
- 6.6. $y''\operatorname{ctg}x + y' = 2$.
- 6.7. $xy''' + y'' = \frac{1}{\sqrt{x}}$.
- 6.8. $xy''' - 2y'' = \frac{2}{x^2}$.
- 6.9. $x^4y'' + x^3y' = 4$.
- 6.10. $y'' + \frac{2x}{x^2+1}y' = 2x$.
- 6.11. $\operatorname{tg}x \cdot y'' - y' + \frac{1}{\sin x} = 0$.
- 6.12. $(1+x^2)y'' + 2xy' = x^3$.
- 6.13. $y''' \cdot \operatorname{ctg}2x + 2y'' = 0$.
- 6.14. $\operatorname{tg}x \cdot y''' = 2y''$.
- 6.15. $x^2y'' + xy' = 1$.
- 6.16. $y'' + 2xy'^2 = 0$.
- 6.17. $xy'' = y' + x^2$.
- 6.18. $xy''' - y'' = \frac{1}{x}$.

- 6.19. $xy''' + y'' = 1$. 6.25. $x^3y' + x^2y = \sqrt{x}$
 6.20. $(x+1)y''' + y'' = x+1$. 6.26. $y''''\text{tg}x = y'' + 1$.
 6.21. $xy''' + 2y'' = 0$. 6.27. $x^5y''' + x^4y'' = 1$.
 6.22. $xy''' + y'' + x = 0$. 6.28. $xy'' + y' = \ln x$.
 6.23. $y''''\text{tg}5x = 5y''$. 6.29. $xy'' - y' = 2x^2e^x$.
 6.24. $(1 + \sin x)y''' = y''\cos x$. 6.30. $xy'' = y'\ln\frac{y}{x}$.

7. Коши масаласини ечинг:

- 7.1. $y''y^3 + 1 = 0$; $y(1) = -1$, $y'(1) = -1$.
 7.2. $1 + y'^2 = yy''$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
 7.3. $y''y^3 + 36 = 0$; $y(0) = 3$, $y'(0) = 2$.
 7.4. $4y^3y'' = y^4 - 1$; $y(0) = \sqrt{2}$, $y'(0) = \frac{\sqrt{2}}{4}$.
 7.5. $y'' = 18y^3$; $y(1) = 1$, $y'(1) = 3$.
 7.6. $y'' = 2 - y$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$.
 7.7. $y^{12} + 2yy'' = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.
 7.8. $y''y^3 + 9 = 0$; $y(1) = 1$, $y'(1) = 3$.
 7.9. $4y^3y'' = y^4 - 16$; $y(0) = 2\sqrt{2}$; $y'(0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
 7.10. $yy'' + y^{12} = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.
 7.11. $y^3y'' = 4(y^4 - 1)$; $y(0) = \sqrt{2}$, $y'(0) = \sqrt{2}$.
 7.12. $yy'' - 2y^{12} = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.
 7.13. $y'' + 2yy^{12} = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.
 7.14. $y''\text{tgy} = 2y^{12}$; $y(1) = \frac{\pi}{2}$, $y'(1) = 2$.
 7.15. $y''y^3 + 25 = 0$; $y(2) = -5$, $y'(2) = -1$.
 7.16. $y(1 - \ln y)y'' + (1 + \ln y)y^{12} = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.
 7.17. $y''(1 + y) = y^{12} + y'$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$.
 7.18. $y'' + 18\sin y \cos^3 y = 0$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$.
 7.19. $2yy'' = y^{12}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.
 7.20. $y''y^3 + 4 = 0$; $y(0) = -1$, $y'(0) = -2$.
 7.21. $y''(1 + y) = 5y^{12}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
 7.22. $yy'' - y^{12} = y^3$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.
 7.23. $y'' = y'e^y$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
 7.24. $y'' = 32y^3$; $y(4) = 1$, $y'(4) = 4$.
 7.25. $y' = -\frac{1}{2y^3}$; $y(0) = \frac{1}{2}$, $y'(0) = \sqrt{2}$.
 7.26. $y^3y'' = y^4 - 16$; $y(0) = 2\sqrt{2}$, $y'(0) = \sqrt{2}$.
 7.27. $4y'^2 = 1 + y^{12}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
 7.28. $y'' = 1 - y^{12}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
 7.29. $y''(2y + 3) = 2y^{12}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$.
 7.30. $yy'' - 2yy'\ln y = y^{12}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.

8. Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

- 8.1. $y^{IV} + y''' = 12x + 6$;
- 8.2. $y^{IV} + 2y''' + y'' = 2 - 3x^2$;
- 8.3. $y^{IV} + 2y''' + y'' = 4x^2$;
- 8.4. $y''' + 3y'' - 2y' = 1 - x^2$;
- 8.5. $y''' + y'' = x^2 - 1$;
- 8.6. $y''' + y'' = x^2 - 24x^2$;
- 8.7. $y''' - 5y'' + 6y' = 6x^2 + 2x - 5$;
- 8.8. $y''' - y'' = 6x^2 + 3x$;
- 8.9. $y^{IV} + 4y''' + y'' = x - x^2$;
- 8.10. $y''' - 2y'' = 3x^2 - x - 4$;
- 8.11. $y''' - y'' = x^2 + 1$;
- 8.12. $7y''' - y'' = 12x$;
- 8.13. $y''' - 13y'' + 12y' = x - 1$;
- 8.14. $y^{IV} - 3y''' + 3y'' - y' = 2x$;
- 8.15. $y''' + 3y'' + 2y' = x^2 + 2x$;
- 8.16. $y^{IV} + y''' = x$;
- 8.17. $y^{IV} - y''' = 5(x + 1)^2$;
- 8.18. $y''' - y'' = 3x^2 - 2x + 1$;
- 8.19. $y''' - y'' = 6x + 5$;
- 8.20. $y^{IV} - 2y''' + y'' = 2x(1 - x)$;
- 8.21. $y''' - y'' = 4x^2 - 3x + 2$;
- 8.22. $y''' + 3y'' + 2y' = x^2 + 2x + 3$;
- 8.23. $y^{IV} + 2y''' + y'' = x^2 + x + 1$;
- 8.24. $y^{IV} - 3y''' + 3y'' - y' = x - 3$;
- 8.25. $y''' - 5y'' + 6y' = (x - 1)^2$;
- 8.26. $y^{IV} - y^{IV} = 2x + 3$;
- 8.27. $y^{IV} + 2y''' + y'' = 12x^2 - 6x$;
- 8.28. $y^{IV} + 6y''' + 9y'' = 3x - 1$;
- 8.29. $3y^{IV} + y''' = 6x - 1$;
- 8.30. $y''' - 13y'' + 12y' = 18x^2 - 39$.

9. Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

- 9.1. $y'' + 4y' + 3y = 4(1 - x)e^{-x}$;
- 9.2. $y''' - 4y'' - 3y = -4xe^x$;
- 9.3. $y''' - 3y'' - 2y' = -4xe^x$;

- 9.4. $y'' - y' - 9y + 9y = (12 - 16x)e^x$.
- 9.5. $y'' - 5y' + 7y - 3y = (20 - 16x)e^{-x}$.
- 9.6. $y'' + y'' - y' - y = (x + 4)e^x$.
- 9.7. $y'' + 6y' + 9y = (16x + 24)e^x$.
- 9.8. $y'' + 3y' + 2y = (1 - 2x)e^{-x}$.
- 9.9. $y''' + 6y'' - 3y' = (4x + 2)e^x$.
- 9.10. $y''' + 2y'' + y = (18x + 21)e^{2x}$.
- 9.11. $y''' + 2y'' - 3y' = (8x + 6)e^{-x}$.
- 9.12. $y''' - y'' - 4y' + 4y = (7 - 6x)e^x$.
- 9.13. $y''' - 4y'' + 4y' = (x - 1)e^x$.
- 9.14. $y''' - 2y'' - 3y' = (8x - 14)e^{-x}$.
- 9.15. $y''' - 3y'' - y' + 3y = (4 - 8x)e^x$.
- 9.16. $y''' - 5y'' + 5y' - 4y = (2x - 5)e^x$.
- 9.17. $y''' + 5y'' + 7y' + 3y = (16x + 20)e^x$.
- 9.18. $y''' + 4y'' + 4y' = (9x + 15)e^x$.
- 9.19. $y''' - 3y'' + 4y' = (18x - 21)e^{-x}$.
- 9.20. $y''' - y'' - 5y' - 3y = -(8x + 4)e^x$.
- 9.21. $y''' + y'' - 2y' = (6x + 5)e^x$.
- 9.22. $y''' - 2y'' + y' = (2x + 5)e^{2x}$.
- 9.23. $y''' - 7y'' + 15y' - 9y = (8x - 12)e^x$.
- 9.24. $y''' - y'' - 2y' = (6x - 11)e^{-x}$.
- 9.25. $y''' - y'' - y' + y = (3x + 7)e^{2x}$.
- 9.26. $y''' - 6y'' + 9y' = 4xe^x$.
- 9.27. $y''' + 4y'' + 5y' + 2y = (12x + 16)e^x$.
- 9.28. $y''' - 3y'' + 2y' = (1 - 2x)e^x$.
- 9.29. $y''' - 5y'' + 3y' + 9y = e^{-x}(32x - 32)$.
- 9.30. $y''' - 3y'' + 2y' = (4x + 9)e^{2x}$.

10. Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

- 10.1. $y'' + y = 2\cos 3x - 3\sin 3x$.
- 10.2. $y'' - 4y' + 4y = -e^{2x} \cdot \sin 4x$.
- 10.3. $y'' - 4y' + 8y = e^x(-\sin x + 2\cos x)$.
- 10.4. $y'' + 2y' = 1e^x(\sin x + \cos x)$.
- 10.5. $y'' + 2y' + 5y = -2\sin x$.
- 10.6. $y'' + 6y' + 13y = e^{-3x} \cdot \cos 5x$.
- 10.7. $y'' - 4y' + 4y = -e^{2x} \cdot \sin 6x$.
- 10.8. $y'' - 4y' + 8y = e^x \cdot (-3\sin x + 4\cos x)$.

- 10.9. $y'' + y = 2\cos 7x - 3\sin 7x$.
 10.10. $y'' + 2y' = -2e^x \cdot (\sin x + \cos x)$.
 10.11. $y'' + 2y' = 10e^x \cdot (\sin x + \cos x)$.
 10.12. $y'' + 2y' + 5y = -\cos x$.
 10.13. $y'' + y = 2\cos 7x + 3\sin 7x$.
 10.14. $y'' - 4y' + 4y = e^{2x} \cdot \sin 5x$.
 10.15. $y'' + 4y = e^{2x} \cos 3x$.
 10.16. $y'' - 4y' + 8y = e^x \cdot (2\sin x - \cos x)$.
 10.17. $y'' + 2y' + 5y = -\sin 2x$.
 10.18. $y'' + y = 2\cos 5x + 3\sin 5x$.
 10.19. $y'' + 2y' = 3e^x \cdot (\sin x + \cos x)$.
 10.20. $y'' - 4y' + 8y = e^x \cdot (5\sin x - 3\cos x)$.
 10.21. $y'' + 2y' + 5y = -17\sin 2x$.
 10.22. $y'' + 2y' = e^x (\sin x + \cos x)$.
 10.23. $y'' + 6y' + 13y = e^{-3x} \cdot \cos x$.
 10.24. $y'' + 6y' + 13y = e^{-3x} \cdot \cos 8x$.
 10.25. $y'' - 4y' + 4y = e^{2x} \cdot \sin 3x$.
 10.26. $y'' - 4y' + 8y = e^x \cdot (3\sin x + 5\cos x)$.
 10.27. $y'' + 2y' + 5y = 10\cos x$.
 10.28. $y'' + 6y' + 13y = e^{-3x} \cdot \cos 4x$.
 10.29. $y'' + 2y' = 6e^x (\sin x + \cos x)$.
 10.30. $y'' + y = 2\cos 4x + 3\sin 4x$.

11. Коши масаласини ечинг:

- 11.1. $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$; $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$.
 11.2. $y'' - 2y' = \frac{4e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}$; $y(0) = \ln 4$, $y'(0) = \ln 4 - 2$.
 11.3. $y'' - 6y' + 8y = \frac{4}{2 + e^{-2x}}$; $y(0) = 1 + 3 \ln 3$, $y'(0) = 10 \ln 3$.
 11.4. $y'' - 3y' + 2y = \frac{e^x}{1 + e^{-x}}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
 11.5. $y'' + 16y = \frac{16}{\cos 4x}$; $y(0) = 3$, $y'(0) = 0$.
 11.6. $y'' + y = 4\operatorname{ctg} x$; $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4$, $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4$.
 11.7. $y'' + \pi^2 y = \frac{\pi^2}{\cos \pi x}$; $y(0) = +3$, $y'(0) = 0$.
 11.8. $y'' + 6y' + 8y = \frac{4e^{-2x}}{2 + e^{2x}}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
 11.9. $y'' + \frac{y}{4} = \frac{1}{4} \operatorname{ctg} \frac{x}{2}$; $y(\pi) = 2$, $y'(\pi) = \frac{1}{2}$.

- 11.10. $y'' + y = \frac{1}{\cos x}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
 11.11. $y'' + 3y' = \frac{9e^{3x}}{1 + e^{3x}}$; $y(0) = \ln 4$, $y'(0) = 3(1 - \ln 2)$.
 11.12. $y'' + 9y = \frac{9}{\sin 3x}$; $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 4$, $y'\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3\pi}{2}$.
 11.13. $y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{2 + e^{-x}}$; $y(0) = 1 + 3 \ln 3$, $y'(0) = 5 \ln 3$.
 11.14. $y'' + 4y = 8\operatorname{ctg} 2x$; $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 5$, $y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4$.
 11.15. $y'' + 9y = \frac{9}{\cos 3x}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
 11.16. $y'' + 3y' + 2y = \frac{e^{-x}}{2 + e^x}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
 11.17. $y'' - 6y' + 8y = \frac{4}{1 + e^{-2x}}$; $y(0) = 1 + 2 \ln 2$, $y'(0) = 6 \ln 2$.
 11.18. $y'' - y' = \frac{e^{-x}}{2 + e^{-x}}$; $y(0) = \ln 27$, $y'(0) = \ln 9 - 1$.
 11.19. $y'' + 4y = \frac{4}{\sin 2x}$; $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$, $y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \pi$.
 11.20. $y'' - 9y' + 18y = \frac{9e^{3x}}{1 + e^{-3x}}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
 11.21. $y'' + 4y = 4\operatorname{ctg} 2x$; $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3$, $y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$.
 11.22. $y'' + 4y = \frac{4}{\cos 2x}$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$.
 11.23. $y'' + \pi^2 y = \frac{\pi^2}{\sin \pi x}$; $y\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, $y'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi^2}{2}$.
 11.24. $y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{3 + e^{-x}}$; $y(0) = 1 + 8 \ln 2$, $y'(0) = 14 \ln 2$.
 11.25. $y'' + y' = \frac{e^x}{2 + e^x}$; $y(0) = \ln 27$, $y'(0) = 1 - \ln 9$.
 11.26. $y'' - 6y' + 8y = \frac{4e^{2x}}{1 + e^{-2x}}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
 11.27. $y'' + y = 2\operatorname{ctg} x$; $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$.
 11.28. $y'' - 3y' = \frac{9e^{-3x}}{3 + e^{-3x}}$; $y(0) = 4 \ln 4$; $y'(0) = 3(3 \ln 4 - 1)$.
 11.29. $y'' + 16y = \frac{16}{\sin 4x}$; $y\left(\frac{\pi}{8}\right) = 3$, $y'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2\pi$.
 11.30. $y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{1 + e^{-x}}$; $y(0) = 1 + 2 \ln 2$, $y'(0) = 3 \ln 2$.

7-§. Дифференциал тенгламалар системаларни ечиш

8.7.1. Ушбу

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ y_2 = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ y_n = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases}$$

дифференциал тенгламалар системаси *нормал система* дейилади, бу ерда y_1, y_2, \dots, y_n — эркин ўзгарувчи x нинг номаълум функциялари.

Бу системани каноатлантирувчи $y_1 = \varphi_1(x), y_2 = \varphi_2(x), \dots, y_n = \varphi_n(x)$ функциялар системаси бу *системанинг ечими* дейилади.

Берилган дифференциал тенгламалар системаси учун Коши масаласи шундай ечимни топишдан иборатки, бу ечим $x = x_0$ да берилган $y_1|_{x=x_0} = y_{10}, y_2|_{x=x_0} = y_{20}, \dots, y_n|_{x=x_0} = y_{n0}$ бошланғич шартларни каноатлантирсин.

Нормал системанинг *умумий ечими* деб n та C_1, C_2, \dots, C_n ихтиёрий ўзгармасларга боғлиқ бўлган

$$\begin{cases} y_1 = \varphi_1(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \\ y_2 = \varphi_2(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \\ y_n = \varphi_n(x, C_1, C_2, \dots, C_n) \end{cases}$$

функциялар системасига айтилади. Бу ечим берилган тенгламани ихтиёрий ўзгармасларнинг ҳар қандай мумкин бўлган қийматларида айниятга айлантиради ва берилган бошланғич шартларни каноатлантирадиган қилиб танланса, Коши масаласининг ечими бўлади.

Умумий ечимдан ихтиёрий ўзгармасларнинг мумкин бўлган баъзи қийматларида ҳосил бўладиган ечимлар *хусусий ечимлар* дейилади.

8.7.2. Нормал системани ечишнинг усулларида бири номаълум функцияларни йўқотиш усули бўлиб, y n та дифференциал тенгламалар системасини бир номаълум функцияли битта n -тартибли дифференциал тенгламага келтиради.

1- м и с о л. Ушбу

$$\begin{cases} y' = y + z, \\ z' = y - z \end{cases}$$

дифференциал тенгламалар системасини $y|_{x=0} = 2, z|_{x=0} = 0$ бошланғич шартларда ечинг.

Ечиш. Номаълум функция z ни йўқотиш учун биринчи тенгламани x бўйича дифференциаллаймиз:

$$y'' = y' + z',$$

бу ерда z' ўрнига унинг иккинчи тенгламадан аниқланган ифодасини кўямиз:

$$y'' = y' + y - z$$

Энди z ўрнига унинг биринчи тенгламадан олинган ифодасини кўйсак,

$$y'' - 2y = 0$$

тенглама ҳосил бўлади. Бу тенгламанинг $k^2 - 2 = 0$ характеристик тенгламаси $k_{1,2} = \pm \sqrt{2}$ илдизларга эга.

Демак, умумий ечим қуйидагича ёзилади:

$$y = C_1 e^{\sqrt{2}x} + C_2 e^{-\sqrt{2}x}.$$

z учун умумий ечимни системанинг биринчи тенгламасидан топамиз:

$$z = y' - y = C_1(\sqrt{2} - 1)e^{\sqrt{2}x} - C_2(\sqrt{2} + 1)e^{-\sqrt{2}x}.$$

Ихтиёрий ўзгармасларни топиш учун бошланғич шартлардан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned} C_1 + C_2 &= 2, \\ C_1(\sqrt{2} - 1) - C_2(\sqrt{2} + 1) &= 0. \end{aligned}$$

Бу ердан:

$$C_1 = \frac{\sqrt{2} + 2}{2}, \quad C_2 = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}.$$

Шундай қилиб, биз излаётган хусусий ечим қуйидагича бўлади:

$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\right)e^{\sqrt{2}x} + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)e^{-\sqrt{2}x}, \\ z &= \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\sqrt{2}x} - \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\sqrt{2}x}. \end{aligned}$$

8.7.3. Агар дифференциал тенгламалар нормал системасининг унг томонлари номаълум y_1, y_2, \dots, y_n функцияларга нисбатан чизиқли функциялар бўлса, у ҳолда тенгламалар системаси *чизиқли система* дейилади. n та номаълум y_1, y_2, \dots, y_n функциялар катнашган коэффициентлари ўзгармас бўлган, n та чизиқли бир жинсли тенгламалар системаси қуйидаги кўринишга эга:

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{2n}y_n \\ \dots \\ y_n' = a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \dots + a_{nn}y_n \end{cases}$$

Бу системанинг ечими

$$y_1 = \alpha_1 e^{kx}, y_2 = \alpha_2 e^{kx}, \dots, y_n = \alpha_n e^{kx}$$

кўринишда изланади. y_1, y_2, \dots, y_n ларни берилган дифференциал тенгламалар системасига қўйиб, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ларга нисбатан чизикли алгебраик тенгламалар системасини ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} (a_{11} - k)\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \dots + a_{1n}\alpha_n = 0, \\ a_{21}\alpha_1 + (a_{22} - k)\alpha_2 + \dots + a_{2n}\alpha_n = 0, \\ \dots \\ a_{n1}\alpha_1 + a_{n2}\alpha_2 + \dots + (a_{nn} - k)\alpha_n = 0. \end{cases}$$

k қуйидаги n -даражали тенгламадан топилади:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - k & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - k & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - k \end{vmatrix} = 0$$

Бу тенглама берилган дифференциал тенгламалар системасининг характеристик тенгламаси дейилади. k нинг турли қийматларига $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ларнинг маълум тўплами мос келади. Характеристик тенгламанинг илдизлари турлича бўлсин: k_1, k_2, \dots, k_n .

У ҳолда k_1 илдизга бирорта $\alpha_{11}, \alpha_{21}, \alpha_{31}, \dots, \alpha_{n1}$ тўпلام мос келиб, унга биринчи ечим тўғри келади:

$$y_{11} = \alpha_{11} e^{k_1 x}, y_{21} = \alpha_{21} e^{k_1 x}, \dots, y_{n1} = \alpha_{n1} e^{k_1 x}.$$

Шунга ўхшаш k_2 илдизга $\alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2n}$ тўпلام мос келади, унга ўз навбатида иккинчи ечим тўғри келади:

$$y_{12} = \alpha_{12} e^{k_2 x}, y_{22} = \alpha_{22} e^{k_2 x}, \dots, y_{n2} = \alpha_{n2} e^{k_2 x}$$

k_n илдизга $\alpha_{n1}, \alpha_{n2}, \dots, \alpha_{nn}$ тўпلام мос келади ва унга n -ечим тўғри келади:

$$y_{1n} = \alpha_{1n} e^{k_n x}, y_{2n} = \alpha_{2n} e^{k_n x}, \dots, y_{nn} = \alpha_{nn} e^{k_n x}$$

Фундаментал ечимлар системасини ҳосил қилдик. Умумий ечим қуйидаги кўринишда ёзилади:

Умумий ечим:

$$\begin{aligned} y &= C_1 y_1 + C_2 y_2, & \text{ёки} & & y &= C_1 e^x + C_2 e^{10x}, \\ z &= C_1 z_1 + C_2 z_2, & & & z &= -2C_1 e^x + C_2 e^{10x}. \end{aligned}$$

3- мисол. Ушбу

$$\begin{cases} y' = -7y + z, \\ z' = -2y - 5z \end{cases}$$

системанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Ечимни қуйидаги кўринишда излаймиз:

$$y = \alpha e^{kx}, \quad z = \beta e^{kx}.$$

Характеристик тенгламани тузамиз:

$$\begin{vmatrix} -7-k & 1 \\ -2 & -5-k \end{vmatrix} = 0 \quad \text{ёки} \quad k^2 + 12k + 37 = 0.$$

Унинг илдизлари: $k_{1,2} = -6 \pm i$ — комплекс сонлар. $k_1 = -6 + i$ учун α ва β лар қуйидаги системадан топилади:

$$\begin{cases} (-7+6-i)\alpha + \beta = 0, \\ -2\alpha + (-5+6-i)\beta = 0 \end{cases} \quad \text{ёки} \quad \begin{cases} (-1-i)\alpha + \beta = 0, \\ -2\alpha + (1-i)\beta = 0. \end{cases}$$

Система $\beta = (1+i)\alpha$ тенгламага келтирилади. Бу ердан $\alpha_1 = 1$ десак, $\beta_1 = 1+i$. $k_1 = -6+i$, $\alpha = 1$, $\beta = 1+i$ сонларга мос хусусий ечим:

$$\begin{aligned} y_1 &= e^{(-6+i)x} = e^{-6x+ix} = e^{-6x}(\cos x + i\sin x) = e^{-6x}\cos x + ie^{-6x}\sin x; \\ z_1 &= (1+i)e^{(-6+i)x} = (1+i)e^{-6x}(\cos x + i\sin x) = e^{-6x}(\cos x - \sin x + \\ &+ i(\cos x + \sin x)) = e^{-6x}(\cos x - \sin x) + ie^{-6x}(\cos x + \sin x). \end{aligned}$$

Юқорида топилган хусусий ечимда унинг хақиқий ва мавҳум қисмларини алоҳида-алоҳида олиб, иккита ечимни ҳосил қиламиз, улар берилган дифференциал тенгламалар системасининг фундаментал ечимлари системасини ҳосил қилади:

$$\begin{aligned} \bar{y}_1 &= e^{-6x} \cdot \cos x, & \bar{y}_2 &= e^{-6x} \cdot \sin x, \\ \bar{z}_1 &= e^{-6x}(\cos x - \sin x), & \bar{z}_2 &= e^{-6x}(\cos x + \sin x). \end{aligned}$$

У ҳолда берилган системанинг умумий ечими қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\begin{aligned} y &= C_1 \bar{y}_1 + C_2 \bar{y}_2, & \text{ёки} & & y &= e^{-6x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x), \\ z &= C_1 \bar{z}_1 + C_2 \bar{z}_2, & & & z &= e^{-6x}(C_1(\cos x - \sin x) + C_2(\cos x + \sin x)). \end{aligned}$$

Характеристик тенгламанинг иккинчи: $k_2 = -6 - i$ илдиздан фойдалансак, яна шу ечимларни ҳосил қиламиз.

4- мисол. Ушбу

$$\begin{cases} y' = 5y - z, \\ z' = y + 3z \end{cases}$$

тенгламалар системасининг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Системанинг характеристик тенгламаси

$$\begin{vmatrix} 5-k & -1 \\ 1 & 3-k \end{vmatrix} = 0 \text{ ёки } k^2 - 8k + 16 = 0$$

каррала илдизларга эга: $k_1 = k_2 = 4$.

$k=4$ икки каррала илдизга мос хусусий ечим қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$\begin{aligned} y &= e^{4x}(\alpha_1 x + \alpha_2), \\ z &= e^{4x}(\beta_1 x + \beta_2). \end{aligned}$$

α ва β ларни топиш учун y, z, y', z' ларни берилган системага қўямиз:

$$\begin{aligned} \alpha_1 + 4(\alpha_1 x + \alpha_2) &= 5(\alpha_1 x + \alpha_2) - (\beta_1 x + \beta_2), \\ \beta_1 + 4(\beta_1 x + \beta_2) &= (\alpha_1 x + \alpha_2) + 3(\beta_1 x + \beta_2). \end{aligned}$$

x нинг олдидаги коэффициентларни ва озод ҳадларни тенглаб, қуйидаги алгебраик тенгламалар системасини ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} 4\alpha_1 = 5\alpha_1 - \beta_1 \\ 4\beta_1 = \alpha_1 + 3\beta_1 \end{cases} \text{ ва } \begin{cases} \alpha_1 + 4\alpha_2 = 5\alpha_2 - \beta_2 \\ \beta_1 + 4\beta_2 = \alpha_2 + 3\beta_2 \end{cases}$$

Бу ердан:

$\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 - \beta_2 = \alpha_1 = \beta_1$. Энди $\alpha_1 = C_1, \alpha_2 = C_2$ (C_1 ва C_2 — ихтиёрий ўзгармаслар) деб, $\beta_1 = C_1, \beta_2 = C_2 - C_1$ ни топамиз. Демак, система-нинг умумий ечими

$$\begin{aligned} y &= e^{4x}(C_1 x + C_2), \\ z &= e^{4x}(C_1 x + C_2 - C_1) \end{aligned}$$

кўринишда бўлади.

7- дарсхона топшириги

1. Қуйидаги бир жинсли системаларнинг умумий ечимини помаълумларни йўқотиш усулидан фойдаланмай топинг:

$$\begin{array}{l} \text{a)} \begin{cases} y' = -7y + z, \\ z' = -2y - 5z, \end{cases} \quad \text{в)} \begin{cases} y' = y - z + w \\ z' = y + z - w \\ w' = 2y - z. \end{cases} \\ \text{б)} \begin{cases} y' = y - 3z, \\ z' = 3y + z; \end{cases} \end{array}$$

$$\text{Ж: а) } y = e^{-6x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x), \\ z = e^{-6x}((C_1 + C_2) \cos x - (C_1 - C_2) \sin x);$$

$$\text{б) } y = e^x(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x), \\ z = e^x(C_1 \sin 3x - C_2 \cos 3x);$$

$$\text{в) } y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 e^{-x}, \\ z = C_1 e^x - 3C_3 e^{-x}, \\ w = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - 5C_3 e^{-x}$$

2. Тенгламалар системасининг умумий ечимини номаълумларни йўқотиш усули билан топинг:

$$\begin{array}{l} \text{а) } \begin{cases} y' = -5y + 2z + e^x, \\ z' = y + 6z + e^{-2x}; \end{cases} \quad \text{в) } \begin{cases} y = 5y + 2z - 3w, \\ z = 4y + 5z - 4w, \\ w = 6y + 4z - 4w. \end{cases} \\ \text{б) } \begin{cases} y' = 3y - 2z + x, \\ z' = 3y - 4z; \end{cases} \end{array}$$

$$\text{Ж: а) } y = C_1 e^{-4x} + C_2 e^{-7x} + \frac{7}{40} e^x + \frac{1}{5} e^{-2x}, \\ z = \frac{1}{2} C_1 e^{-4x} - C_2 e^{-7x} + \frac{1}{40} e^x + \frac{3}{10} e^{-2x};$$

$$\text{б) } y = 2C_1 e^{2x} + C_2 e^{-3x} - \frac{2}{3} x - \frac{5}{18}, \\ z = C_1 e^{2x} + 3C_2 e^{-3x} - \frac{1}{2} x - \frac{1}{12};$$

$$\text{в) } y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 e^{3x}, \\ z = C_1 e^x + 2C_3 e^{3x}, \\ w = 2C_1 e^x + C_2 e^{2x} + 2C_3 e^{3x}.$$

3. Берилган дифференциал тенгламалар системаси учун Коши масаласини ечинг:

$$\text{а) } \begin{cases} y' = w + z - y, \\ z' = w + y - z, \\ w' = y + z + w, \end{cases} \quad y|_{x=0} = 1, \quad z|_{x=0} = w|_{x=0} = 0;$$

$$6) \begin{cases} y' = z + \omega, \\ z' = \omega + y, \quad y|_{x=0} = -1, \quad z|_{x=0} = 1, \quad \omega|_{x=0} = 0. \\ \omega' = y + z. \end{cases}$$

$$\text{Ж: а) } \begin{aligned} y &= \frac{1}{3}e^{-x} + \frac{1}{6}e^{2x} + \frac{1}{2}e^{-2x}, \\ z &= \frac{1}{3}e^{-x} + \frac{1}{6}e^{2x} - \frac{1}{2}e^{-2x}, \\ \omega &= -\frac{1}{3}e^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x}; \end{aligned}$$

$$\text{б) } y = -e^{-x}, \quad z = e^{-x}, \quad \omega = 0.$$

7- мустақил иш

1. Дифференциал тенгламалар системасининг умумий ечимини тоинг:

$$\text{а) } \begin{cases} y' = z + \operatorname{tg}^2 x - 1, \\ z' = -y + \operatorname{tg} x; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} y' = y + z - \cos x, \\ z' = -2y - z + \sin x + \cos x. \end{cases}$$

$$\text{Ж: а) } \begin{aligned} y &= C_1 \cos x + C_2 \sin x + \operatorname{tg} x, \\ z &= -C_1 \sin x + C_2 \cos x + 2; \end{aligned}$$

$$\text{б) } \begin{aligned} y &= C_1 \cos x + C_2 \sin x - x \cos x, \\ z &= (C_2 - C_1) \cos x - (C_1 + C_2) \sin x + x(\cos x + \sin x). \end{aligned}$$

2. Қоши масаласини ечинг:

$$\text{а) } \begin{cases} y' = -2y - z + \sin x, \\ z' = 4y + 2z + \cos x; \end{cases} \quad y|_{x=0} = -1, \quad z|_{x=0} = 0.$$

$$\text{б) } \begin{aligned} y' &= 4y + z + 36x; \\ z' &= -2y + z + 2e^x; \quad y|_{x=0} = 0, \quad z|_{x=0} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{Ж: а) } \begin{aligned} y &= 2 \sin x - 1, \\ z &= 2 - 3 \sin x - 2 \cos x; \end{aligned} \quad \text{б) } \begin{aligned} y &= 10e^{2x} - 8e^{3x} - e^x + 6x - 1, \\ z &= -20e^{2x} + 8e^{3x} + 3e^x + 12x + 10 \end{aligned}$$

ҚАТОРЛАР. ФУРЬЕ АЛМАШТИРИШЛАРИ

1-§. Сонли қаторлар

9.1.1. Сонли $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ кетма-кетлик берилган бўлсин. Ушбу

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

кўринишдаги йиғинди *сонли қатор* дейилади, $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ сонлар *қаторнинг ҳадлари*, қаторнинг n - ҳади u_n эса қаторнинг *умумий ҳади* деб аталади.

Сонли қаторнинг дастлабки n та ҳадининг йиғиндиси S_n орқали белгиланади ва қаторнинг *n - хусусий йиғиндиси* дейилади:

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n.$$

Агар $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ — чекли лимит мавжуд бўлса, қатор *яқинлашувчи*, S — унинг *йиғиндиси* дейилади. Агар $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$ бўлса, ёки мавжуд бўлмаса, қатор *узоклашувчи* дейилади.

Қуйидаги

$$R_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+m} + \dots$$

ифода *қаторнинг n -қолдиги* дейилади.

Геометрик прогрессиянинг ҳадларидан тузилган

$$a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$$

қатор $|q| \geq 1$ бўлганда *узоклашувчи*, $|q| < 1$ бўлганда *яқинлашувчидир* (бунда у $S = \frac{a}{1-q}$ йиғиндига эга).

Ушбу

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

қатор *гармоник қатор* деб аталади, у *узоклашувчидир*.

Умумлашган гармоник қатор (ёки Дирихле қатори) деб аталавчи

$$1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

қатор $p \leq 1$ да узоқлашувчи, $p > 1$ да яқинлашувчидир.

Қаторнинг яқинлашувчи бўлишининг зарурий шarti: Агар $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ қатор яқинлашса, у ҳолда $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

Қатор узоқлашувчи бўлишининг (қатор узоқлашишининг) етарли шarti: Агар $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ бўлса, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ қатор узоқлашади.

Мисол. Ушбу қаторнинг йиғиндисини топинг:

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} + \dots$$

Ечиш. Қаторнинг умумий хади $u_n = \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ ни содда касрлар йиғиндиси кўринишида ифодаalaymиз:

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} + \frac{C}{n+2}$$

Бундан

$$1 = A(n+1)(n+2) + Bn(n+2) + Cn(n+1)$$

Бу ерда кетма-кет $n=1$, $n=2$, $n=3$ кийматларни бериб, ҳосил бўлган чизикли тенгламалар системасини ечиб, $A = \frac{1}{2}$, $B = -1$, $C = \frac{1}{2}$ ни ҳосил қиламиз.

Шундай қилиб,

$$u_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n+2}$$

ёки

$$u_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{2}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right)$$

Бу ердан:

$$u_1 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{2} + \frac{1}{3} \right);$$

$$u_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \right);$$

$$u_3 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{4} + \frac{1}{5} \right);$$

$$u_4 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{5} + \frac{1}{6} \right);$$

$$\dots$$

$$u_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{2}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right)$$

Чап ва ўнг томонларни жамлаймиз:

$$S_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right).$$

Шундай қилиб, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{4}$. Демак, қатор яқинлашувчи ва унинг йиғиндиси $S = \frac{1}{4}$ га тенг.

9.1.2. Яқинлашувчи қаторларнинг хоссалари:

а) Агар $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ қатор яқинлашувчи бўлиб, унинг йиғиндиси

S га тенг бўлса, у ҳолда $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda u_n$ (λ —ўзгармас сон) қатор ҳам яқинлашувчи бўлади ва унинг йиғиндиси $\lambda \cdot S$ га тенг бўлади;

б) агар $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ва $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ қаторлар яқинлашувчи бўлиб, йиғиндилари мос равишда S ҳамда δ га тенг бўлса, у ҳолда $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$

қатор ҳам яқинлашувчи бўлиб, йиғиндиси $(S \pm \delta)$ га тенг бўлади;

в) агар қатор яқинлашувчи бўлса, у ҳолда унда исталган чекли сондаги ҳадларни ташлаб юбориш ёки унга чекли сондаги ҳадларни қўшиш натижасида ҳосил бўлган қатор ҳам яқинлашувчи бўлади.

1- дарсхона топшириғи

Қаторларнинг яқинлашувчи эканини исбот қилинг ва уларнинг йиғиндисини топинг.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$ Ж: $S = \frac{1}{2}$.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$ Ж: $S = \frac{1}{3}$.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 2^n}{6^n}$ Ж: $S = \frac{3}{2}$.

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$ Ж: $S = \frac{1}{8}$.

Қаторларнинг яқинлашувчи эканини исбот қилинг ва йигиндисини топинг.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+3)}. \quad \text{Ж: } S = \frac{11}{18}.$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)(3n+2)}. \quad \text{Ж: } S = \frac{1}{6}.$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n + 2^n}{10^n}. \quad \text{Ж: } S = \frac{5}{4}.$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}. \quad \text{Ж: } S = 1.$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+5)}. \quad \text{Ж: } S = \frac{23}{90}.$$

2- §. Мусбат ҳадли қаторларнинг яқинлашиш ва узоқлашиш аломатлари

9.2.1. Такқослаш аломати. Агар мусбат ҳадли иккита

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ва $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ қатор берилган бўлиб, бирор N номердан бошлаб

$u_n \leq v_n$ тенгсизлик бажарилса, у ҳолда:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ қаторнинг яқинлашишидан $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ қаторнинг ҳам яқин-

лашиши келиб чиқади;

б) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ қаторнинг узоқлашишидан $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ қаторнинг ҳам узоқ-

лашиши келиб чиқади.

1- м и с о л. Ушбу

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 2^2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \dots + \frac{1}{n \cdot 2^n} + \dots$$

қаторнинг яқинлашувчи ёки узоқлашувчи эканини текширинг.

Е ч и ш. $u_n = \frac{1}{n \cdot 2^n} \leq \frac{1}{2^n} = v_n$ эканлиги равшан. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ қатор мах-

ражи $q = \frac{1}{2} < 1$ бўлган геометрик прогрессия хадлари йиғиндисидан иборат ва у яқинлашувчи. Такқослаш аломатига кўра берилган қатор ҳам яқинлашувчидир.

2- м и с о л. Ушбу

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n} = \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \dots + \frac{\ln n}{n} + \dots$$

қаторнинг яқинлашувчи ёки узоқлашувчи эканини текширинг.

Е ч и ш. Барча $n \geq 3$ учун $u_n = \frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n} = v_n$. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ — гармоник

қаторнинг узоқлашувчанлигидан ва такқослаш аломатидан берилган қаторнинг ҳам узоқлашувчи бўлиши келиб чиқади.

9.2.2. Такқослашнинг лимит аломати. Агар хадлари мусбат иккита $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ва $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ қатор берилган бўлиб, чекли ва

мусбат $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = A$ лимит мавжуд бўлса, у ҳолда иккала қатор бир вақтда яқинлашади ёки бир вақтда узоқлашади.

3- м и с о л. Ушбу

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} = \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1} + \dots$$

қаторнинг яқинлашувчи ёки узоқлашувчи эканини текширинг.

Е ч и ш. Берилган қаторни гармоник $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ қатор билан такқослаймиз:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n-1}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2} > 0.$$

Гармоник қатор узоқлашувчи эканидан берилган қаторнинг ҳам узоқлашувчи экани келиб чиқади.

4- м и с о л. Ушбу

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n+1} = \frac{1}{2+1} + \frac{1}{2^2+1} + \dots + \frac{1}{2^n+1} + \dots$$

қаторнинг яқинлашувчи ёки узоқлашувчи эканини текширинг.

Ечиш. Такқослашнинг лимит аломатини қўлашда махра-
жи $\frac{1}{2}$ га тенг бўлган геометрик прогрессиядан фойдаланамиз.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^n + 1}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{2^n}} = 1 > 0$$

ва $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ катор яқинлашувчи бўлгани учун ($q = \frac{1}{2} < 1$) берилган катор ҳам яқинлашади.

9.2.3. Даламбер аломати. Агар мусбат хадли $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ка-

тор учун $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = d$ мавжуд бўлса, у ҳолда бу катор $d < 1$ да яқинлашади, $d > 1$ бўлганда узоклашади.

5-мисол. Ушбу

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \dots + \frac{2n-1}{2^n} + \dots$$

каторнинг яқинлашувчи ёки узоклашувчи эканини текширинг.

Ечиш. Бу ерда $u_n = \frac{2n-1}{2^n}$ ва $u_{n+1} = \frac{2n+1}{2^{n+1}}$,

шунинг учун

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1) \cdot 2^n}{2^{n+1} (2n-1)} = \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n-1} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2n}}{1 - \frac{1}{2n}} = \frac{1}{2} < 1. \end{aligned}$$

Демак, берилган катор яқинлашади.

9.2.4. Коши аломати. Агар мусбат хадли $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ катор

учун $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = C$ мавжуд бўлса, бу катор $C < 1$ бўлганда яқинла-
шади, $C > 1$ да узоклашади.

6-мисол. Ушбу

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

каторнинг яқинлашувчи ёки узоклашувчи эканини текширинг

Ечиш. $u_n = \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ бўлгани учун

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{e}{2} > 1.$$

Демак, берилган қатор узоклашади.

9.2.5. Кошининг интеграл аломати. Агар $\sum_{n=1}^{\infty} u$

қаторнинг ҳадлари мусбат ва ўсмайдиган бўлиб, $x > 1$ да аниқланган, узулуксиз, мусбат ва манотон камаювчи $f(x)$ функция учун $f(1) = u_1$, $f(2) = u_2, \dots$, $f(n) = u_n, \dots$ тенгламалар ўринли бўлса, у ҳолда

$$\int_1^{\infty} f(x) dx$$

хосмас интеграл яқинлашса, берилган қатор ҳам яқинлашади ва аксинча, хосмас интеграл узоклашса, қатор ҳам узоклашади.

7-мисол. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{(n^2+1)^2}$ қаторнинг яқинлашувчи ёки узоклашувчи эканини текширинг.

Ечиш. $f(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$ деб олайлик. Бу функция Кошининг интеграл аломатининг барча талабларини қондиради.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{2x dx}{(x^2+1)^2} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_1^N \frac{d(1+x^2)}{(x^2+1)^2} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{x^2+1} \right) \Big|_1^N = \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{N^2+1} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Демак, хосмас интеграл яқинлашади, шунинг учун берилган қатор ҳам яқинлашади.

2-дарсхона топшириги

1. Қуйидаги қаторларнинг яқинлашувчи ёки узоклашувчи эканини текширинг:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2^n}$. Ж: яқинлашади

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{\pi}{4n}$. Ж: узоклашади.

в) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$ Ж: узоқлашади.

г) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{(\sqrt{2})^n}$ Ж: яқинлашади.

д) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!}$ Ж: яқинлашади.

е) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ Ж: узоқлашади.

ж) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$ Ж: яқинлашади.

з) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln^2(n+1)}$ Ж: яқинлашади.

2. Исробот қилинг:

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n!)^2} = 0$.

2-мустақил иш

Қуйидаги қаторларнинг яқинлашувчи ёки узоқлашувчи эканини текширинг.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n-1}$ Ж: узоқлашади.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$ Ж: яқинлашади.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg}^n \frac{1}{n}$ Ж: яқинлашади.

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2n}$ Ж: узоқлашади.

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+2n+5}$ Ж: яқинлашади.

3- §. Ўзгарувчи ишорали қаторлар

9.3.1. Хадларининг ишоралари гурлича бўлган қатор *ўзгарувчи ишорали қатор* дейилади. Қаторнинг ҳар бир манфий хадидан кейин манфий хад ва ҳар бир манфий хадидан кейин мусбат хад келса, бундай қатор *ишоралари навбатланувчи қатор* дейилади. Ишораси навбатланувчи қаторни бундай ёзиш мумкин.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - \dots + (-1)^{n+1} u_n + \dots \quad (u_n > 0).$$

Лейбниц аломати. Агар ишоралари навбатланувчи қаторда қатор хадларининг абсолют қийматлари камаювчи, яъни

$$u_1 > u_2 > u_3 > \dots > u_n > \dots$$

бўлиб, унинг умумий ҳади u_n нолга интилса: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, у ҳолда бу қатор яқинлашувчи бўлади ва унинг йиғиндиси S ушбу $0 < S < u_1$ шартни қаноатлантиради.

Ишораси навбатланувчи қатор қолдиғи $|R_n| < u_{n+1}$ тенгсизлик билан баҳоланади.

1- мисол. Ушбу

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \dots$$

қаторнинг яқинлашувчанлигини текширинг.

Ечиш. Берилган қатор учун Лейбниц аломатининг шартлари бажарилаяпти, яъни

$$1 > \frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \dots > \frac{1}{n} > \dots$$

ва

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Шу сабабли қатор яқинлашади.

9.3.2. Абсолют ва шартли яқинлашувчи қаторлар. Ўзгарувчи ишорали $u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots$ қатор берилган бўлиб, унинг хадларининг абсолют қийматларидан тузилган

$$|u_1| + |u_2| + |u_3| + \dots + |u_n| + \dots$$

қатор яқинлашувчи бўлса, берилган қатор *абсолют яқинлашувчи қатор* дейилади.

Агар ўзгарувчи ишорали қатор яқинлашувчи бўлиб, бу қатор хадларининг абсолют қийматларидан тузилган қатор узоқлашувчи

бўлса, у ҳолда берилган ўзгарувчи ишорали қатор *шартли яқинлашувчи қатор* дейилади.

$$2\text{- м и с о л. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^3} = \frac{\sin\alpha}{1^3} + \frac{\sin 2\alpha}{2^3} + \dots + \frac{\sin n\alpha}{n^3} + \dots$$

қаторнинг яқинлашувчанлигини текширинг.

Е ч и ш. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n\alpha|}{n^3}$ қаторни қараймиз. $|\sin n\alpha| \leq 1$ бўлганлиги учун

$$u_n = \frac{|\sin n\alpha|}{n^3} \leq \frac{1}{n^3} = v_n$$

ни ҳосил қиламиз. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ қатор яқинлашувчидир, чунки у умумлашган гармоник қатор бўлиб, $p=3 > 1$. Таққослаш аломатига кўра, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n\alpha|}{n^3}$ қатор ҳам яқинлашувчи. Демак, берилган

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^3}$ қатор абсолют яқинлашувчидир.

3- дарсхона топшириғи

Қуйидаги қаторларнинг шартли ёки абсолют яқинлашишини текширинг:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^2+1}$. Ж: шартли яқинлашувчи.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3n-2}{3n-1}$. Ж: узоклашувчи.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln(n+1)}$. Ж: шартли яқинлашувчи.

4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \cdot 2^n}$. Ж: абсолют яқинлашувчи.

5. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^3}{2^n}$. Ж: абсолют яқинлашувчи.

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$. Ж: шартли яқинлашувчи.

7. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{6n+5}$. Ж: узоклашувчи.

Каторларнинг шартли ва абсолют яқинлашишини текширинг:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n\alpha}{n^2+1}$. Ж: абсолют яқинлашувчи.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$. Ж: шартли яқинлашувчи.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^n}{n^2}$. Ж: узоклашувчи.

4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n+1}{n^2+n+1}$. Ж: шартли яқинлашувчи.

5. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2+4}$. Ж: абсолют яқинлашувчи.

4- §. Функционал каторлар, уларнинг яқинлашиш соҳаси

9.4.1. Ҳадлари x нинг функцияларидан иборат бўлган

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

катор *функционал қатор* дейилади.

Агар $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ сонли катор яқинлашса, функционал катор $x = x_0$

нуқтада яқинлашувчи дейилади. x нинг $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ катор яқинлашув-

чи бўладиган барча қийматлари тўплами функционал каторнинг *яқинлашиш соҳаси* дейилади.

$S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x)$ йиғинди функционал каторнинг n - қисмий *йиғиндиси* дейилади. $S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$ функция функционал каторнинг *йиғиндиси* деб, $R_n(x) = S(x) - S_n(x)$ айирма эса *қатор қолдиги* деб аталади.

1- м и с о л. Ушбу

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+x^{2n}} = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^4} + \dots + \frac{1}{1+x^{2x}} + \dots$$

функционал каторнинг яқинлашиш соҳасини топинг.

Е ч и ш. Каторнинг умумий хади: $u_n(x) = \frac{1}{1+x^{2n}}$. Агар $|x| < 1$ бўлса, у холда $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^{2n}} = 1$, бироқ, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ бўлган учун, катор узоклашувчидир.

Агар $|x| = 1$ бўлса, яна узоклашувчи

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots$$

каторни ҳосил қиламиз.

Агар $|x| > 1$ бўлса, у холда берилган каторнинг хадлари ушбу

$$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4} + \dots + \frac{1}{x^{2n}} + \dots$$

чексиз камаювчи геометрик прогрессия хадларидан кичик бўлади, демак такқослаш аломатига кўра, катор яқинлашади.

Шундай қилиб, берилган функционал каторнинг яқинлашиш соҳаси $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ дан иборат бўлади.

9.4.2. Агар яқинлашувчи $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ функционал катор учун ҳар

қандай $\epsilon > 0$ берилганда ҳам шундай $N(\epsilon)$ номер топиш мумкин бўлсаки, $n \geq N$ бўлганда $[a, b]$ кесмадаги исталган x учун $|R_n(x)| < \epsilon$ тенгсизлик бажарилса, берилган функционал катор $[a, b]$ да *текис яқинлашувчи* дейилади.

Функционал каторнинг текис яқинлашувчи бўлишининг Вейерштрасс аломати: агар $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$

функционал катор учун хадлари мусбат сонли шундай $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ катор

мавжуд бўлиб, $x \in [a, b]$ да $|u_n(x)| \leq c_n$ бўлса, у холда функционал катор бу $[a, b]$ кесмада текис яқинлашади.

2-мисол. Ушбу

$$\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^4+2} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{x^{2n}+n} + \dots$$

катор x нинг барча қийматларида текис яқинлашишини исбот қилинг.

Е ч и ш. Лейбниц аломатига кўра берилган ишораси навбатлашувчи катор x нинг исталган қийматларида яқинлашади, шунинг учун бу каторнинг колдиги $|R_n(x)| < u_{n+1}(x)$, яъни $|R_n(x)| < \frac{1}{x^{2n+2}+n+1} < \frac{1}{n+1}$ тенгсизлик ёрдамида баҳоланади.

Равшанки, исталган $\epsilon > 0$ учун шундай N номер танлаш мумкинки, барча $n > N$ ва исталган x учун $|R_n(x)| < \epsilon$ тенгсизлик бажарилади.

Шундай қилиб, берилган қатор текис яқинлашади.

3- м и с о л. Вейерштрасс аломати ёрдамида

$\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 2x}{2^2} + \dots + \frac{\cos nx}{n^2} + \dots$ қатор барча x лар учун текис яқинла-
шишини исбот қилинг.

Е ч и ш.

$|u_n(x)| = \left| \frac{\cos nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ ва $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots$ қатор яқинла-
шувчи бўлгани учун берилган қатор барча x лар учун текис яқинла-
нади.

9.4.3. Текис яқинлашувчи функционал қаторларнинг хоссалари:

а) агар текис яқинлашувчи функционал қаторнинг ҳадлари $[a, b]$ кесмада узлуксиз бўлса, унинг йиғиндиси $S(x)$ ҳам бу кесмада узлуксиз бўлади;

б) агар $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ функционал қаторнинг ҳадлари $[a, b]$ кесмада узлуксиз бўлиб, қатор бу кесмада текис яқинлашувчи бўлса, у ҳолда

$$\int_a^b S(x) dx = \int_a^b u_1(x) dx + \int_a^b u_2(x) dx + \dots + \int_a^b u_n(x) dx + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx,$$

бу ерда $S(x)$ — қатор йиғиндиси;

в) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ функционал қаторнинг ҳадлари $[a, b]$ кесмада аниқланган ва бу кесмада $u'_n(x)$ узлуксиз ҳосилаларга эга бўлсин. Агар бу кесмада берилган қатор яқинлашувчи ва унинг ҳадлари ҳосилаларидан тузилган

$$\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) = u'_1(x) + u'_2(x) + \dots + u'_n(x)$$

қатор текис яқинлашувчи бўлса, у ҳолда функционал қаторнинг йиғиндиси $S(x)$ ҳам $[a, b]$ кесмада ҳосиллага эга бўлади ва

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x).$$

4- м и с о л. Ушбу

$$\arctg x + \arctg \frac{x}{2\sqrt{2}} + \arctg \frac{x}{3\sqrt{3}} + \dots + \arctg \frac{x}{n\sqrt{n}} + \dots$$

қаторга қаторларни ҳадма-ҳад дифференциаллаш тўғрисидаги хоссани татбиқ қилиш мумкинми?

Ечиш. Берилган каторни яқинлашувчи

$$x + \frac{x}{2^{3/2}} + \frac{x}{3^{3/2}} + \dots + \frac{x}{n^{3/2}} + \dots$$

катор билан таккослаймиз (исталган тайин x да).

Етарлича катта n ларда $\operatorname{arctg} \frac{x}{n^{3/2}} \sim \frac{x}{n^{3/2}}$ бўлгани учун ва таккослашнинг лимит аломатига кўра берилган катор ҳам яқинлашади. Берилган катор умумий ҳадининг ҳосиласини топамиз:

$$u_n'(x) = \frac{n^{3/2}}{x^2 + n^3}$$

Ҳосилалардан тузилган катор қуйидаги кўринишга эга:

$$\frac{1}{x^2 + 1^3} + \frac{2\sqrt{2}}{x^2 + 3^3} + \frac{3\sqrt{3}}{x^2 + 3^3} + \dots + \frac{n\sqrt{n}}{x^2 + n^3} + \dots$$

Бу каторнинг ҳадлари яқинлашувчи

$$1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{n\sqrt{n}} + \dots \text{ каторнинг мос ҳадларидан кичик}$$

эканини кўраимиз. Демак, Вейерштрасс аломатига кўра ҳосилалардан тузилган катор $(-\infty, +\infty)$ ораликда текис яқинлашади, бинобарин, каторларни дифференциаллаш ҳосиласини берилган каторга қўллаш мумкин.

4-дарсхона топшириги

1. Каторларнинг яқинлашиш соҳасини топинг:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$; б) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln^n x$; в) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}}$,

г) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{x}{2^n}$; д) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(2n-1)4^n}$; е) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-(n-1)x}$.

Ж: а) $-1 < x < 1$; б) $\frac{1}{e} < x < e$; в) $x \neq \pm 1$; г) $-\infty < x < +\infty$;

д) $-8 \leq x < 2$; е) $0 < x < +\infty$.

2. Ушбу

$$\frac{2x+1}{x+2} + \frac{1}{2} \left(\frac{2x+1}{x+2} \right)^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{2x+1}{x+2} \right)^3 + \frac{1}{8} \left(\frac{2x+1}{x+2} \right)^4 + \dots$$

катор $[-1, 1]$ кесмада текис яқинлашишини кўрсатинг.

3. Қаторларнинг текис яқинлашиш соҳасини топинг:

$$а) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^1}; \quad б) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{2^n}$$

Ж: а) $-\infty < x < +\infty$; б) $-\infty < x < +\infty$.

4-мустақил иш

1. Функционал қаторнинг яқинлашиш соҳасини топинг:

$$а) 1 + \frac{1}{2^x} + \frac{1}{3^x} + \frac{1}{4^x} + \dots + \frac{1}{n^x} + \dots;$$

$$б) \frac{1}{x^2+1} + \frac{1}{2^2(x^2+1)^2} + \frac{1}{3^2(x^2+1)^3} + \dots + \frac{1}{n^2(x^2+1)^n} + \dots;$$

$$в) x \operatorname{tg} \frac{x}{2} + x^2 \operatorname{tg} \frac{x}{4} + \dots + x^n \operatorname{tg} \frac{x}{2^n} + \dots$$

Ж: а) $1 < x < +\infty$;

б) $-\infty < x < +\infty$;

в) $-2 < x < 2$.

2. Ушбу

$$x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{4} + \frac{x^4}{8} + \dots + \frac{x^n}{2^{n-1}} + \dots$$

қаторнинг $(-2, 2)$ оралиқда текис яқинлашишини текширинг.

3. Ушбу

$$\cos x + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2^2} \cos 3x + \frac{1}{2^3} \cos 4x + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \cos nx + \dots$$

қаторни $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3} \right]$ кесмада ҳадма-ҳад интеграллаш мумкинми?

Ж: Мумкин, чунки берилган қатор $(-\infty, +\infty)$ да текис яқинлашувчидир.

5-§. Даражали қаторлар

9.5.1. Ушбу

$$a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots + a_n(x-x_0)^n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$$

кўринишдаги функционал қатор *даражали қатор* дейилади. Бу ерда $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ — узгармас сонлар даражали қаторнинг *коэффициентлари* дейилади.

Хусусий ҳолда, $x_0 = 0$ да ушбу даражали қаторга эътибор бўламиз:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n.$$

Абель теоремаси. а) Агар $\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$ даражали қатор бирорта $x = x_1 \neq 0$ нуктада яқинлашса, у ҳолда у x нинг $|x| < |x_1|$ тенгсизликни қаноатлантирувчи ҳар қандай қийматида абсолют яқинлашади;

б) агар $\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$ даражали қатор бирорта $x = x_1$ қийматда узоклашса, у ҳолда у x нинг $|x| > |x_1|$ шартни қаноатлантирувчи исталган қийматларида узоклашади.

$\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$ даражали қатор учун шундай $(-R, R)$ оралик мавжудки, у мазкур оралик ичида абсолют яқинлашиб, ундаи ташқарида эса узоклашади; бу оралик қаторнинг яқинлашиш оралиғи дейилади. R сони яқинлашиш радиуси дейилади, у хусусий ҳолларда 0 ёки ∞ га тенг бўлиши ҳам мумкин. Яқинлашиш оралигининг четки нукталари $x = \pm R$ да даражали қаторнинг яқинлашиши ёки узоклашиши масаласи алоҳида ҳал қилинади.

9.5.2. Агар қаторнинг барча $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ коэффициентлари нолга тенг бўлмаса, $\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$ даражали қаторнинг яқинлашиш радиуси ушбу формула орқали аниқланади:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \text{ ёки } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$$

Агар қатор фақат жуфт ёки тоқ даражаларни ўз ичига олса ёки даражалари қаррали бўлса, ва ҳ.к., у ҳолда яқинлашиш оралиғи бевосита Даламбер ёки Коши аломатларидан фойдаланиб топилади.

$\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^{np}$ қатор учун яқинлашиш радиуси қуйидагича топилади:

$$R = \sqrt[p]{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|} \text{ ёки } R = \sqrt[p]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}}$$

1-мисол. Қуйидаги қаторнинг яқинлашишини текширинг:

$$1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \dots + \frac{1}{n}x^n + \dots$$

Ечиш. Бу ерда $a_n = \frac{1}{n}$, $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}$. Қаторнинг яқинлашиш радиусини топамиз:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1.$$

Демак, берилган даражали қатор $(-1, 1)$ ораликда абсолют яқинлашади, $(-\infty; -1) \cup (1, +\infty)$ да эса узоклашади. Берилган қаторнинг бу ораликнинг чекка нукталарида яқинлашувчи ёки узоклашувчи эканлигини аниқлаймиз. $x=1$ бўлганда берилган қатор $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ кўринишдаги гармоник узоклашувчи қатор бўлади.

$x=-1$ да эса $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ қаторни ҳосил қиламиз, бу қатор яқинлашади, чунки у Лейбниц аломати шартларини қаноатлантиради.

Шундай қилиб, берилган даражали қаторнинг яқинлашиш соҳаси $[-1, 1)$.

2-мисол. Ушбу

$$1 + \frac{x^3}{10} + \frac{x^6}{10^2} + \frac{x^9}{10^3} + \dots + \frac{x^{3n}}{10^n} + \dots$$

қаторнинг яқинлашишини текширинг.

Ечиш. $a_n = \frac{1}{10^n}$, шунинг учун яқинлашиш радиусини

$$R = \sqrt[3]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \sqrt[3]{|a_n|}}} = \sqrt[3]{\lim_{n \rightarrow \infty} 10} = \sqrt[3]{10}$$

формуладан топамиз. Демак, берилган қаторнинг яқинлашиш оралиги $(-\sqrt[3]{10}, \sqrt[3]{10})$ бўлади. Қаторнинг яқинлашишини ораликнинг чекка нукталарида текшираемиз. Агар $x = \sqrt[3]{10}$ бўлса, қатор $1 + 1 + 1 + \dots$ кўринишга эга бўлиб, бу қатор узоклашади. Агар $x = -\sqrt[3]{10}$ бўлса, қатор $1 - 1 + 1 - \dots$ кўринишда бўлиб, у ҳам узоклашади.

Шундай қилиб, берилган қаторнинг яқинлашиш соҳаси $(-\sqrt[3]{10}, \sqrt[3]{10})$.

3-мисол. Қуйидаги

$$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

қаторнинг яқинлашиш соҳасини топинг.

Ечиш. $a_n = \frac{1}{n!}$, $a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!}$.

Қаторнинг яқинлашиш радиусини топамиз:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot (n+1)!}{n! \cdot 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty.$$

Демак, берилган қатор бутун сон ўқида яқинлашади.

9.5.3. Агар умумий кўринишдаги

$$a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots + a_n(x-x_0)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$$

қатор берилган бўлса, унинг яқинлашиш радиуси R олдинги формулалар билан аниқланаверади, яқинлашиш оралиғи эса маркази $x = x_0$ нуктада бўлган $(x_0 - R, x_0 + R)$ оралиқ бўлади.

4-мисол. Ушбу

$$\begin{aligned} 1 - \frac{x-2}{2\sqrt{2}} + \frac{(x-2)^2}{4\sqrt{3}} - \frac{(x-2)^3}{8\sqrt{4}} + \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^n \sqrt{n+1}} + \dots = \\ = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^n \sqrt{n+1}} \end{aligned}$$

қаторнинг яқинлашиш соҳасини топинг.

Ечиш. Қаторнинг яқинлашиш радиусини топамиз:

$$\begin{aligned} R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n \sqrt{n+1}} \cdot \frac{2^{n+1} \cdot \sqrt{n+2}}{1} = \\ &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n+2}{n+1}} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{1}{n+1}} = 2 \end{aligned}$$

Демак, қатор $(0; 4)$ оралиқда абсолют яқинлашади.

$x = 0$ да $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ қаторни ҳосил қиламиз, у узоклашади, чунки

унинг ҳадлари узоклашувчи гармоник қаторнинг ҳадларидан катта $(u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} > \frac{1}{n+1} = v_n)$.

$x = 4$ да $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ қаторни ҳосил қиламиз, у Лейбниц аломатига кўра яқинлашади

Шундай қилиб, берилган қаторнинг яқинлашиш соҳаси $(0, 4)$.

9.5.4. Даражали каторларнинг хоссалари:

а) яқинлашиш оралиғининг ичида ётувчи ҳар қандай $[a, b]$ кесмада даражали катор текис яқинлашади. Унинг йиғиндиси яқинлашиш оралиғида узлуксиз функция бўлади;

б) даражали каторларни уларнинг яқинлашиш оралиғида ҳадма-ҳад интеграллаш ва дифференциаллаш мумкин.

5- мисол. Ушбу

$$x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \dots$$

каторнинг йиғиндисини топинг.

Ечиш. Каторнинг яқинлашиш радиусини топамиз:

$$R = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot (2n+1)}{(2n-1) \cdot 1}} = 1.$$

Демак, $(-1, 1)$ оралиқда катор яқинлашади, шунинг учун уни яқинлашиш оралиғида ҳадма-ҳад дифференциаллаш мумкин. Берилган каторнинг йиғиндисини $S(x)$ орқали белгиласак,

$$S'(x) = 1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{2n-2} + \dots$$

Хосил қилинган катор — геометрик прогрессия ҳадлари йиғиндиси ва у $(-1, 1)$ оралиқда яқинлашади, унинг йиғиндиси:

$$S'(x) = \frac{1}{1-x^2}$$

Хосилалардан тузилган каторни интеграллаб, берилган каторнинг йиғиндисини топамиз:

$$S(x) = \int_0^x \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|, \quad (|x| < 1).$$

5- дарсхона топшириғи

1. Қуйидаги даражали каторларнинг яқинлашиш соҳасини топинг:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{(2n-1)!}$;

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n}$;

в) $\sum_{n=1}^{\infty} (nx)^n$;

г) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-3)^n}{2n-1}$;

д) $\sum_{n=1}^{\infty} n!x^{n-1}$;

е) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!x^n}{(n+1)^n}$;

ж) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}x^{2n-1}}{(4n-3)^2}$;

з) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^5x^{2n}}{2n+1}$

- Ж: а) $-\infty < x < +\infty$; б) $1 < x < 3$; в) $x=0$; г) $1 < x < 2$;
 д) $x=0$; е) $-e < x < e$; ж) $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$; з) $-1 < x < 1$.

2. Қатор йиғиндисини топинг.

а) $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n$; б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$; в) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$.

Ж: а) $\frac{1}{(x-1)^2}$, $|x| < 1$; б) $-\ln(1-x)$, $(-1 \leq x < 1)$;

в) $\arctg x$, $|x| \leq 1$.

5-мустақил иш

1. Даражали қаторнинг яқинлашиш соҳасини топинг.

а) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-5)^n}{n \cdot 3^n}$; б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^{2n}}{(n+1) \ln(n+1)}$;

в) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! x^n}{n^n}$; г) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^n}$.

Ж: а) $2 < x \leq 8$; б) $2 < x < 4$; в) $-e < x < e$;

г) $-\infty < x < +\infty$.

2. Қатор йиғиндисини топинг:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (2n-1)x^{2n-2}$; б) $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^{n-1}$.

Ж: а) $\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$, $|x| < 1$; б) $\frac{2}{(1-x)^2}$, $|x| < 1$.

6-§. Функцияларни Тейлор ва Маклорен қаторларига ёйиш

9.6.1. Агар $y=f(x)$ функция $x=x_0$ нукта атрофида $(n+1)$ - тартибгача ҳосилаларга эга бўлса, y ҳолда куйидаги Тейлор формуласи ўринлидир.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^n(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + R_n(x),$$

бу ерда $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$ ($0 < \theta < 1$). $R_n(x)$ — Тейлор формуласининг Лагранж шаклидаги (3-боб, 16-§) қолдиқ ҳади дейилади.

$$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

кўпхад $y=f(x)$ функциянинг n -даражали Тейлор кўпҳади дейилади.

$x=0$ да Тейлор формуласининг хусусий холи — Маклорен формуласи ҳосил бўлади:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x),$$

бу ерда $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^n$ ($0 < \theta < 1$).

9.6.2. Агар $y=f(x)$ функция x_0 нукта атрофида исталган марта дифференциалланувчи бўлса ва бу нуктанинг бирорта атрофида

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

бўлса, Тейлор ва Маклорен формулаларидан ушбу

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \dots$$

ва

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

чексиз қаторлар ҳосил бўлади. Буларнинг биринчиси *Тейлор қатори*, иккинчиси *Маклорен қатори* дейилади. Бу қаторлар x нинг $R_n(x) = 0$ бўладиган қийматларида $f(x)$ га яқинлашади.

1-мисол. $y=x^4-3x^2+2x+2$ функцияни $(x-1)$ иккиҳад даражалари бўйича ёйинг.

Ечиш. $x_0=1$ учун Тейлор формуласидан фойдаланамиз. Функциянинг ҳосилаларини ва уларнинг $x_0=1$ нуктадаги қийматларини топамиз:

$$y(1) = 2;$$

$$y'(1) = (4x^3 - 6x + 2)|_{x=1} = 0;$$

$$y''(1) = (12x^2 - 6)|_{x=1} = 6;$$

$$y'''(1) = 24x|_{x=1} = 24;$$

$$y^{IV} = 24;$$

$$y^V = 0 \text{ ва х. к.}$$

Демак,

$$y = x^4 - 3x^2 + 2x + 2 = 2 + \frac{6}{2!}(x-1)^2 + \frac{24}{3!}(x-1)^3 + \frac{24}{4!}(x-1)^4$$

ёки

$$y = x^4 - 3x^2 + 2x + 2 = 2 + 3(x-1)^2 + 4(x-1)^3 + (x-1)^4.$$

2-ми с о л. $y = \frac{1}{x}$ функция учун $x_0 = 1$ нуктада n - даражали Тейлор кўпҳадини ёзинг.

Е ч и ш. Функциянинг ҳосилаларини ва уларнинг $x_0 = 1$ нуктадаги қийматларини топамиз:

$$y(1) = 1;$$

$$y'(1) = -\frac{1}{x^2} \Big|_{x=1} = -1;$$

$$y''(1) = \frac{1 \cdot 2}{x^3} \Big|_{x=1} = \frac{1 \cdot 2}{1} = 2!$$

$$y'''(1) = -\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{x^4} \Big|_{x=1} = -3!$$

$$y^{IV}(1) = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{x^5} \Big|_{x=1} = 4!, \dots, y^{(n)}(1) = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}} \Big|_{x=1} = (-1)^n n!$$

Демак, Тейлор кўпҳади қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\begin{aligned} P_n(x) = & 1 - \frac{x-1}{1!} + \frac{2!}{2!}(x-1)^2 - \frac{3!}{3!}(x-1)^3 + \frac{4!}{4!}(x-1)^4 + \dots + \\ & + \frac{(-1)^n n!}{n!}(x-1)^n = 1 - (x-1) + \\ & + (x-1)^2 - (x-1)^3 + (x-1)^4 + \dots + (-1)^n (x-1)^n. \end{aligned}$$

Берилган функция учун қолдик ҳад

$$R_n(x) = (-1)^{n+1} \frac{1}{(1+\theta(x-1))^{n+2}} (x-1)^{n+1}, 0 < \theta < 1$$

кўринишда бўлади.

3-ми с о л. $y = 2^x$ функцияни Маклорен қаторига ёйинг.

Е ч и ш. Ҳосилаларнинг $x = 0$ нуктадаги қийматларини топамиз:

$$y(0) = 1; y'(0) = 2^x \ln 2 \Big|_{x=0} = \ln 2; y''(0) = 2^x \ln^2 2 \Big|_{x=0} = \ln^2 2;$$

$$y'''(0) = 2^x \ln^3 2 \Big|_{x=0} = \ln^3 2, \dots,$$

$$y^n(0) = 2^x \ln^n 2 \Big|_{x=0} = \ln^n 2.$$

Маклорен қаторини тузамиз:

$$y = 2^x = 1 + x \ln 2 + \frac{\ln^2 2}{2!} x^2 + \frac{\ln^3 2}{3!} x^3 + \dots + \frac{\ln^n 2}{n!} x^n + \dots$$

Топилган каторнинг яқинлашиш радиусини аниқлаймиз:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{\ln^n 2 \ln 2} \cdot \frac{\ln^2 2}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{\ln 2} = \infty.$$

Демак, катор сонлар ўқининг барча нукталарида абсолют яқинлашади.

$R_n(x)$ қолдиқ ҳад:

$$R_n(x) = \frac{\ln^{n+1} 2}{(n+1)!} \cdot 2^{nx} \cdot x^{n+1}, \quad 0 < 0 < 1.$$

$0 < \ln 2 < 1$ бўлгани учун тайин x учун ушбу тенгсизлик ўринлидир:

$$|R_n(x)| = \left| \frac{\ln^{n+1} 2 \cdot 2^{0x}}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \cdot 2^x.$$

Бирок исталган x учун $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ (5.2-§, 3-мисол), шунинг учун $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ (исталган x да). Бу — топилган катор йиғиндисини, исталган x ларда ҳақиқатан ҳам 2^x га тенглигини билдиради.

6- дарсхона топишириги

1. $f(x) = x^5 - 4x + 2x^3 + 2x + 1$ кўпҳадни $(x+1)$ иккиҳаднинг даражалари бўйича ёйинг.

2. $f(x) = x^4 - 5x^3 + x^2 - 3x + 4$ кўпҳадни $(x-4)$ иккиҳаднинг даражалари бўйича ёйинг.

3. $f(x) = \ln x$ функцияни $x_0 = 1$ нукта атрофида Тейлор каторига ёйинг.

4. $f(x) = \sqrt{x^3}$ функцияни $x_0 = 1$ нукта атрофида Тейлор каторига ёйинг.

5. $f(x) = \frac{1}{x+1}$ функцияни Маклорен каторига ёйинг.

6- мустақил иш

1. $f(x) = x^{10} - 3x^5 + 1$ функцияни $(x-1)$ иккиҳаднинг даражалари бўйича ёйинг.

2. $f(x) = \frac{1}{x}$ функцияни $x_0 = 3$ нукта атрофида Тейлор каторига ёйинг ва яқинлашиш соҳасини топинг.

3. $f(x) = x^2 e^x$ функцияни Маклорен каторига ёйинг ва яқинлашиш соҳасини топинг.

7- §. Баъзи функцияларнинг Тейлор ва Маклорен қаторлари

9.7.1. Баъзи функцияларнинг Маклорен қаторига ёйилмаларини келтирамиз:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots, \quad -1 < x \leq 1;$$

$$(1+x)^m = 1 - \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 - \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n + \dots, \quad -1 < x < 1.$$

Бу ерда ҳар қайси қатор учун соҳа кўрсатилган бўлиб, унда даражали қатор тегишли функцияга яқинлашади. Охириги қатор *биномиял қатор* дейилади.

9.7.2. Умумий ҳолда функцияларни даражали қаторга ёйиш бевосита Тейлор ва Маклорен қаторларидан фойдаланишга асосланган. Бирок, амалда купгина функцияларнинг даражали қаторларини олдини бандла келтирилган формулалардан ёки геометрик прогрессия ҳадлари йиғиндиси формуласидан фойдаланиб топниш мумкин. Баъзан қаторга ёйишда ҳадма-ҳад дифференциаллаш ёки интеграллашдан ҳам фойдаланиш мумкин.

1- мисол. $f(x) = e^{-x^2}$ функцияни x нинг даражалари бўйича қаторга ёйинг.

Ечиш. Юқорида e^x учун келтирилган қатор формуласида x ўрнига $-x^2$ ни қўйсақ,

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} + \dots$$

Топилган қатор иситилган x ларда яқинлашади.

2- мисол. $f(x) = \cos \sqrt{x}$ функцияни x нинг даражалари бўйича қаторга ёйинг.

Ечиш. Юқоридаги $\cos x$ учун келтирилган қаторда x ни \sqrt{x} билан алмаштирсак,

$$\cos \sqrt{x} = 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^n}{(2n)!} + \dots$$

Бу қатор исталган x ларда яқинлашувчидир, бироқ $\cos\sqrt{x}$ функция $x \leq 0$ да аниқланмаганлигини ҳисобга олсак, топилган қатор $\cos\sqrt{x}$ га фақат $0 \leq x < +\infty$ да яқинлашади.

3- мисол. $f(x) = \frac{3}{2-x-x^2}$ функцияни Маклорен қаторига ёйинг.

Ечиш. Берилган функцияни энг содда рационал қасрлар йиғиндисига ажратамиз:

$$\frac{3}{2-x-x^2} = \frac{3}{(2+x)(1-x)} = \frac{1}{2+x} + \frac{1}{1-x}.$$

Маълумки, $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ қатор $-1 < x < 1$ да яқинлашади.

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{2^n} \text{ қатор эса } -1 < \frac{x}{2} < 1 \quad \text{ёки}$$

$-2 < x < 2$ да яқинлашади. Шунинг учун янги

$$\frac{3}{2-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}\right) x^n$$

қатор берилган функцияга $-1 < x < 1$ да яқинлашади.

7- дарсхона топшириғи

Берилган функцияларни x нинг даражалари бўйича қаторга ёйинг.

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. $f(x) = e^{-2x}$; | 2. $f(x) = x \cos 3x$; |
| 3. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$; | 4. $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \text{ да,} \\ 1, & x = 0 \text{ да;} \end{cases}$ |
| 5. $f(x) = \ln(10+x)$; | 6. $f(x) = \frac{5}{6+x-x^2}$; |
| 7. $f(x) = \arcsin x$. | |

7- мустақил иш

Берилган функцияларни x нинг даражалари бўйича қаторга ёйинг:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1. $f(x) = \frac{1-e^{-x}}{x}$; | 2. $f(x) = \frac{6}{8+2x-x^2}$; |
| 3. $f(x) = \ln(1+x-12x^2)$; | 4. $f(x) = 2x \cos \frac{2x}{2} - x$; |
| 5. $f(x) = \sqrt[3]{8-x^3}$. | |

8- §. Даражали каторларнинг татбиқи

9.8.1. Функция кийматини тақрибий ҳисоблаш. Баъзи ҳолларда функциянинг тақрибий кийматини берилган аниқликда ҳисоблаш учун унинг даражали каторга ёйилмасидан фойдаланилади.

1- мисол. e сонини 0,00001 гача аниқлик билан топинг.

Ечиш. $x=1$ да e^x нинг каторга ёйилмасидан фойдаланамиз:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots$$

n сонни шундай аниқлаймизки,

$$e \approx 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

тақрибий тенгликнинг хатолиги 0,00001 дан ошмасин. Қолдикни баҳолаймиз:

$$\begin{aligned} R_n &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \dots = \frac{1}{n!} \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots \right] < \\ &< \frac{1}{n!} \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots \right] = \frac{1}{n!} \cdot \frac{\frac{n}{n+1}}{1 - \frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n!n} \end{aligned}$$

Энди

$$R < \frac{1}{n!n} < 0,00001$$

тенгсизликни ечиб, $n \geq 8$ ни топамиз. Демак,

$$e \approx 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} + \frac{1}{7!} + \frac{1}{8!}$$

Буни ҳисоблаб, талаб қилинган аниқликдаги жавобни оламиз:

$$e \approx 2,71828.$$

2- мисол. $\sqrt[3]{130}$ ни 0,001 гача аниқлик билан ҳисобланг.

Ечиш. Равшанки,

$$\sqrt[3]{130} = \sqrt[3]{5^3 + 5} = 5 \sqrt[3]{1 + \frac{1}{25}} = 5(1 + 0,04)^{\frac{1}{3}}$$

Аввал танишган биноминал катордан фойдаланамиз ($m = \frac{1}{3}$, $x = 0,04$):

$$\sqrt[3]{130} = 5 \left[1 + \frac{1}{3} \cdot 0,04 + \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} - 1 \right)}{2!} \cdot 0,04^2 + \dots \right]$$

$$+ \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \left(\frac{1}{3} - 2 \right) \frac{0,04^3 + \dots}{3!} \left. \right] = 5 \left[1 + \frac{1}{3} \cdot 0,04 - \frac{1 \cdot 2}{3^2 \cdot 2!} \cdot 0,04^2 + \right. \\ \left. + \frac{1 \cdot 2 \cdot 5}{3^3 \cdot 3!} \cdot 0,04^3 - \dots \right] = 5 + \frac{1}{3} \cdot 0,2 - \frac{1}{9} \cdot 0,008 + \frac{5}{81} \cdot 0,00032 - \dots$$

Бу ишоралари навбатланувчи катор Лейбниц атоматини каноатлантисради, шунинг учун қолдик: $|R_n| < u_{n+1}$. Мазкур ҳолда тўртинчи ҳад $\frac{5}{81} \cdot 0,00032 < 0,001$, демак, $\sqrt[3]{130} \approx 5 + 0,0667 - 0,0009$, яъни

$$\sqrt[3]{130} \approx 5,066.$$

9.8.2. Интегралларни каторлар ёрдамида ҳисоблаш. Интеграл остидаги $f(x)$ функцияни даражали каторга ёйиб, даражали каторларни интеграллаш тугрисидаги теоремани қўллаб,

$\int_0^1 f(x) dx$ интегрални даражали катор кўринишида тасвирлаш ҳамда унинг қиймати бу каторнинг яқинлашиш оралиғидаги x нинг ҳар қандай қийматида берилган аниқлик билан ҳисоблаш мумкин.

3-мисол. $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ интегрални топинг.

Ечиш. e^{-x^2} функцияни даражали каторга ёймиз.

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} + \dots$$

x бутун сонлар ўқида яқинлашади, демак, уни ҳадма-ҳад интеграллаш мумкин:

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5 \cdot 2!} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)n!} + \dots \right) \Big|_0^1$$

Даражали каторни интеграллашда унинг яқинлашиш оралиғи ўзгармагани сабабли, ҳосил қилинган катор ҳам бутун сонлар ўқида яқинлашади.

4-мисол. $\int_0^1 \sin x^2 dx$ ни 0,001 гача аниқлик билан ҳисобланг.

Ечиш. $\sin x$ функциянинг даражали каторга ёйилмасидан фойдаланамиз (y ерда x ни x^2 билан алмаштирамиз):

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{4n-2}}{(2n-1)!} + \dots$$

Катор бутун сонлар ўқида яқинлашади, шунинг учун уни ҳадма-ҳад интеграллаш мумкин, яъни

$$\int_0^1 \sin x^2 dx = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{4n-2}}{(2n-1)!} + \dots \right) dx =$$

$$= \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{4n-1}}{(4n-1)(2n-1)!} + \dots \right) \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{7 \cdot 3!} + \frac{1}{11 \cdot 5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(4n-1)(2n-1)!} + \dots$$

Ҳосил килинган ишоралари навбатланувчи қаторнинг учинчи хали 0.001 дан кичик, шунинг учун

$$\int_0^1 \ln x \, dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{7 \cdot 3!} = 0.295.$$

9.8.3. Дифференциал тенгламаларни тақрибий ечиш Агар дифференциал тенгламани элементар функциялар ёрдамида аниқ яна ёрдаб бўлмаса, унинг ечимини Тейлор ёки Маклореннинг даражаси катори кўринишида излаш қулайдир.

5-мисол. Ушбу

$$y' = y - x, \quad y|_{x=0} = 1$$

дифференциал тенгламани ечимининг даражаси каторга ёйилмасини тақриб дастлабки икки даража қаторнинг

Ечиш. Ечимни $y = y(x)$ катор кўринишида излаймиз:

$$y(x) = y(x_0) + \frac{y'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots +$$

$$+ \frac{y^n(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \dots$$

$x=0$ да қуйидагига эгамиз:

$$y(x) = y(0) + \frac{y'(0)}{1!} x + \frac{y''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{y^{(n)}(0)}{n!} x^n + \dots$$

Берилган $y' = y^3 - x$ дифференциал тенгламадан $y'(0) = 1^3 - 0 = 1$ ни тонамиз. Берилган тенгламани дифференциаллаймиз ва ҳосилаларнинг $x_0=0$ даги қийматини ҳисоблаймиз:

$$y'' = 3y^2 \cdot y' - 1, \quad y''(0) = 2;$$

$$y''' = 6y \cdot y'^2 + 3y^2 \cdot y'', \quad y'''(0) = 12;$$

$$y^{IV} = 6y'^3 + 18y \cdot y' \cdot y'' + 3y^2 \cdot y''', \quad y^{IV}(0) = 78 \text{ ва х.к.}$$

Топилган қийматларни каторга қуйиб, изланаётган ечимни ҳосил қиламиз:

$$y(x) = 1 + \frac{1}{1!} x + \frac{2}{2!} x^2 + \frac{12}{3!} x^3 + \frac{78}{4!} x^4 + \dots =$$

$$= 1 + x + x^2 + 2x^3 + \frac{13}{4} x^4 + \dots$$

8- дарсхона топшириги

1. Даражали каторлар ёрдамида куйидаги микдорларни 0,0001 гача аниқлик билан тақрибый ҳисобланг:

а) $\frac{1}{e}$; б) $\sin 12^\circ$; в) $\sqrt[3]{520}$; г) $\ln 1,1$.

Ж: а) 0,3679; б) 8,0411; в) 0,2094; г) 0,0953.

2. Куйидаги аниқ интегралларни даражали каторлар ёрдамида 0,01 гача аниқликда ҳисобланг:

а) $\int_0^{1/2} \frac{1-\cos x}{x^2} dx$; б) $\int_0^{0,1} \frac{\ln(1+x)}{x} dx$; в) $\int_0^{0,1} \frac{e^x-1}{x} dx$

Ж: а) 0,248; б) 0,098; в) 0,102.

3. Аниқмас интегралларни даражали катор кўринишида топинг ва ҳосил қилинган каторларнинг яқинлашиш соҳасини кўрсатинг:

а) $\int \frac{\sin x}{x} dx$; б) $\int \frac{e^x}{x^2} dx$.

Ж: а) $-\infty < x < +\infty$; б) $-\infty < x < 0$ ва $0 < x < +\infty$.

4. Берилган бошланғич шартларни каноатлантирувчи дифференциал тенгламалар ечимларининг даражали каторга ёйилмасининг дастлабки бешта ҳаддини ёзинг:

а) $y' = 2\cos x - xy^2$, $y(0) = 1$;
 б) $y'' = -2xy$, $y(0) = y'(0) = 1$;
 в) $y' = 2y + x - 1$, $y(1) = 1$.

8- мустақил иш

1. Даражали каторлар ёрдамида 0,001 гача аниқликда ҳисобланг:

а) $\sin 1^\circ$; б) $\sqrt[3]{70}$; в) $\cos 1^\circ$.

Ж: а) 0,841; б) 4,125; в) 1,000.

2. Куйидаги аниқ интегралларни 0,001 гача аниқликда ҳисобланг:

а) $\int_0^{1/2} \sqrt{1+x^3} dx$; б) $\int_0^4 e^{\frac{1}{x}} dx$.

Ж: а) 0,508; б) 2,835.

3. Дифференциал тенглама ечимининг даражали каторга ёйил-масининг дастлабки учта хадини топинг:

а) $y' = x^2 - y$, $y(1) = 1$; б) $y' = x^2y + y^3$, $y(0) = 1$.

9- §. Фурье каторлари

9.9.1. Агар $y = f(x)$ функция (a, b) ораликда чегараланган (яъни $a < x < b$ да $|f(x)| < M$, бу ерда M — узгармас) ва бўлакли — монотон (яъни (a, b) ораликни хар бирида бу функция монотон бўлган чекли сондаги ораликларга ажратиш мумкин) бўлса, у ҳолда бу функция (a, b) ораликда Дирихле шартларини каноатлантиради дейилади.

9.9.2. Агар $y = f(x)$ функция узунлиги 2π га тенг $(-\pi, \pi)$ ораликда Дирихле шартларини каноатлантирса, у ҳолда бу ораликнинг $f(x)$ узлуксиз бўлган хар кандай x нуктасида функцияни Фурье тригонометрик каторига ёйиш мумкин, яъни

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

бу ерда a_n , b_n — Фурье коэффициентлари бўлиб, улар қуйидаги формулалар бўйича ҳисобланади:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n=0, 1, 2, \dots),$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n=1, 2, \dots).$$

Агар $x \in (-\pi, \pi)$ нукта $f(x)$ функциянинг узилмиш нуктаси бўлса, Фурье катори йигиндиси $S(x)$ функциянинг чап ва ўнг лимитларининг ўрта арифметигига тенг:

$$S(x) = \frac{1}{2} [f(x-0) + f(x+0)].$$

Оралик охирлари $x = \pi$ ва $x = -\pi$ нукталарда:

$$S(\pi) = S(-\pi) = \frac{1}{2} [f(-\pi+0) + f(\pi-0)].$$

9.9.3. Агар $f(x)$ — жуфт (яъни $f(-x) = f(x)$) бўлса, у ҳолда Фурье каторида фақат косинуслар катнашади, чунки барча $b_n = 0$ бўлиб,

$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$ бўлади. Агар $f(x)$ функция ток (яъни

$f(-x) = -f(x)$) бўлса, Фурье каторида фақат синуслар катнашади,

чунки барча $a_n = 0$ бўлиб, $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$ бўлади.

9.9.4. $(0, \pi)$ ораликда берилган $f(x)$ функция $(-\pi, 0)$ ораликга ё жуфт, ё тоқ функция каби давом эттирилиши мумкин. Демак, уни зарур бўлса, $(0, \pi)$ ораликда косинуслар ёки синуслар бўйича тўлиқ бўлмаган Фурье қаторига ёйиш мумкин.

9.9.5. Даври 2π бўлган ҳар қандай даврий $f(x)$ функция ва инсталган $a \in \mathbb{R}$ учун

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \int_{a-\pi}^{a+\pi} f(x) dx.$$

бўлгани учун Фурье коэффициентларини қуйидаги формулалар бўйича ҳисоблаш мумкин:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx,$$


бу ерда $n=0, 1, 2, \dots$

1-мисол. Даври 2π бўлган ушбу

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } -\pi < x < 0 \text{ бўлса,} \\ x, & \text{агар } 0 \leq x \leq \pi \text{ бўлса} \end{cases}$$

функцияни Фурье қаторига ёйинг.

Ечиш. Берилган функция бўлакли узлуксиз ва чегараланган бўлгани учун уни Фурье қаторига ёйиш мумкин (42-шакл).



42-шакл

Фурье коэффициентларини топамиз:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{1}{\pi} \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^{\pi} = \frac{\pi}{2},$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \left. \begin{cases} u = x, du = dx \\ dv = \cos nx dx, \\ v = \frac{1}{n} \sin nx \end{cases} \right|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\left. \frac{x}{n} \sin nx \right|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) = \frac{1}{\pi n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi n^2} ((-1)^n - 1);$$

n — жуфт бўлганда, $a_n = 0$; n — тоқ бўлганда

$$a_n = -\frac{2}{\pi n},$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \left. \begin{array}{l} u = x, du = dx \\ dv = \sin nx dx, \\ v = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right\} =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi}{n} \cos \pi n + \frac{1}{n^2} \sin nx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} (-1)^{n+1}.$$

Топилган коэффициентлардан фойдаланиб, Фурье қаторини тузамиз:

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{\pi(2n-1)^2} \cos(2n-1)x + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \right)$$

Бу қатор берилган функцияга барча $x \neq (2n-1)\pi$ ларда яқинлашади. $x = (2n-1)\pi$ нукталарда қатор йиғиндиси

$$S((2n-1)\pi) = \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{0 + \pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

формула бунча ҳисобланади (42-шаклга қаранг.).

9.9.6. Агар $f(x)$ функция узунлиги $2l$ бўлган бирор $(-l, l)$ ораликда Дирихле шартларини қаноатлантирса, функциянинг бу ораликка тегишли узлуксизлик нукталарида функцияни Фурье қаторига ёйиш мумкин:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{\pi n x}{l} + b_n \sin \frac{\pi n x}{l} \right),$$

бу ерда

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{\pi n x}{l} dx \quad (n=0, 1, 2, \dots),$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{\pi n x}{l} dx \quad (n=1, 2, \dots).$$

$f(x)$ функциянинг узилиш нукталарида ва оралик охирилари $x = \pm l$ да Фурье қатори йиғиндиси $(-\pi, \pi)$ ораликда ёйиш ҳолидаги каби аниқланади.

9.9.7. $f(x)$ функцияни $2l$ узунликдаги ихтиёрый $(a, a+2l)$ ораликда Фурье каторига сйганда a_n ва b_n коэффициентлар учун формулаларда интеграллаш чегараларини мос равишда a ва $a+2l$ билан алмаштириш зарур.

9.9.8. Жуфт ёки тоқ функцияни $(-l, l)$ ораликда Фурье каторига ёйишда Фурье коэффициентлари $(-\pi, \pi)$ ораликда бўлгани каби содалашади.


9.9.9. $(0, l)$ да берилган $f(x)$ функцияни $(-l, l)$ да косинуслар ёки синуслар бўйича Фурье каторига ёйиш мумкин.

2- мис ол. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} -x, & \text{агар } -2 \leq x < 0 \text{ бўлса,} \\ x, & \text{агар } 0 \leq x \leq 2 \text{ бўлса} \end{cases}$$

функцияни Фурье каторига ёйинг.

Ечиш. Функция Дирихле шартларини қаноатлантиради (43- шакл).



43- шакл

Берилган функция жуфт, шунинг учун y фақат косинуслар бўйича Фурье каторига ёйилади, барча $b_n = 0$. a_n коэффициентларни топамиз ($l = 2$):

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{\pi n x}{l} dx = \int_0^2 x \cos \frac{\pi n x}{2} dx = \left. \begin{cases} u = x, du = dx \\ dv = \cos \frac{\pi n x}{2} dx, \\ v = \frac{2}{\pi n} \sin \frac{\pi n x}{2} \end{cases} \right\} =$$

$$= \frac{2x}{\pi n} \sin \frac{\pi n x}{2} \Big|_0^2 - \frac{2}{\pi n} \int_0^2 \sin \frac{\pi n x}{2} dx = \frac{4}{\pi^2 n^2} \cos \frac{\pi n x}{2} \Big|_0^2 = \frac{4}{\pi^2 n^2} ((-1)^n - 1);$$

n — жуфт бўлганда $a_n = 0$; n — тоқ бўлганда $a_n = \frac{-8}{\pi^2 n^2}$.

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx = \int_0^2 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 = 2$$

Берилган функциянинг Фурье катори қуйидаги кўринишда бўлади:


$$f(x) = 1 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{\pi(2n-1)x}{2}$$

3- мисол. $f(x) = 1 - x$ функцияни $[0, 1]$ кесмада синуслар буйича каторга ёйинг.

Ечиш. Берилган функцияни $[-1, 0)$ ораликда ток функция сифатида давом эттирамыз, яъни

$$f(x) = \begin{cases} -1 - x, & \text{агар } -1 \leq x < 0 \text{ бўлса,} \\ 1 - x, & \text{агар } 0 \leq x \leq 1 \text{ бўлса} \end{cases}$$

деймиз (44- шакл).



44- шакл

Ток функциялар учун барча $a_n = 0$. Энди b_n ($l = 1$) ларни толамиз:

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{\pi n x}{l} dx = 2 \int_0^1 (1 - x) \sin \frac{\pi n x}{1} dx =$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} u = 1 - x, \quad du = -dx, \\ dv = \sin \pi n x dx \quad v = -\frac{1}{\pi n} \cos \pi n x \end{array} \right\} = 2 \left(\frac{1}{\pi n} - \frac{1}{\pi^2 n^2} \sin \pi n x \Big|_0^1 \right) = \frac{2}{\pi n}$$

Топилган коэффициентларни Фурье каторига қўйиб, синуслар буйича ушбу каторни ҳосил қиламыз:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \pi n x.$$

9- дарсхона топшириғи

1. $-\pi \leq x \leq \pi$ ораликда $f(x) = x$ функцияни Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin n x}{n}$$

2. Ушбу функцияни Фурье каторига ёйинг:

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & \text{агар } -\pi \leq x < 0 \text{ бўлса,} \\ 3x, & \text{агар } 0 \leq x \leq \pi \text{ бўлса.} \end{cases}$$

$$\text{Ж: } f(x) = \frac{5\pi}{4} - \frac{10}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + (-1)^{n+1} \frac{\sin n x}{n} \right)$$

3. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & \text{агар } -2 < x \leq 0 \text{ бўлса,} \\ -1, & \text{агар } 0 < x \leq 2 \text{ бўлса} \end{cases}$$

Функцияни Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = -\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{\pi(2n-1)^2} \cos \frac{\pi(2n-1)}{2} x - \frac{1}{n} \sin \frac{\pi n x}{2} \right).$$

4. $f(x) = x^2$ функцияни $(0, \pi)$ ораликда синуслар бўйича Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left[\frac{\pi^2}{n} + \frac{2}{n^3} ((-1)^n - 1) \right] \sin nx.$$

5. $f(x) = 1 - 2x$ функцияни $[0, 1]$ да косинуслар бўйича Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \pi(2n-1)x}{(2n-1)^2}.$$

9- мустақил иш

1. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} -2, & \text{агар } -\pi < x \leq 0 \text{ бўлса,} \\ 1, & \text{агар } 0 < x \leq \pi \text{ бўлса} \end{cases}$$

Функцияни Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = -1 + \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}.$$

2. $f(x) = |x|$ функцияни $[-1, 1]$ да Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2}.$$

3. $f(x) = \sin x$ функцияни $[0, \pi]$ да косинуслар бўйича Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = \frac{2}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{1-(2n)^2}.$$

4. $f(x) = 1 - \frac{x}{2}$ функцияни $[0, 2]$ да синуслар бўйича Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{\pi n x}{2}.$$

10- §. Фурье интеграллари

9.10.1. Агар $y=f(x)$ функция Ox ўқининг исталган чекли оралигида Дирихле шартларини қаноатлантирса ва бутун ўқ бўйича абсолют интегралланувчи бўлса (яъни $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ интеграл яқинлашса), унинг учун Фурьенинг интеграл формуласи ўринлидир:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} dz \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) \cos z(u-x) du,$$

1 тур узилиш нукталарида $f(x)$ нинг қиймати учун аввалгидек,

$$\frac{1}{2} (f(x_0-0) + f(x_0+0))$$

қабул қилинади, бу ерда x_0 — узилиш нуктасининг абсциссаси. Фурье интеграллари комплекс шаклда ҳам ёзиш мумкин:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dz \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{iz(u-x)} du = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{izx} dz \int_{-\infty}^{+\infty} e^{izu} f(u) du.$$

Жуфт функция учун Фурье интеграллари қуйидагича бўлади:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos z dz \int_0^{+\infty} f(u) \cos zu du,$$

тоқ функциянинг Фурье интеграллари:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \sin z dz \int_0^{+\infty} f(u) \sin zu du.$$

9.10.2. Қуйидаги

$$F(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{izx} f(x) dx$$

муносабат билан аниқланган $F(z)$ функция $f(x)$ функциянинг Фурье алмаштириши дейилади.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-izx} F(z) dz$$

муносабат эса Фурьенинг тескари алмаштириш формуласи дейилади.

Хусусий ҳолда

а) $f(x)$ жуфт функция бўлса,

$$f_1(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \cos z x dx, \quad f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f_1(z) \cos z x dx$$

(бу формулалар Фурьенинг косинус-алмаштиришлари дейлади);

б) $f(x)$ функция тоқ бўлса,

$$f_1(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \sin z x dx,$$

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f_1(z) \sin z x dz$$

(бу формулалар Фурьенинг синус алмаштиришлари дейлади).

Фурьенинг синус ва косинус алмаштиришлари фақат Ox нинг мусбат ярим ўқида берилган, бу ярим ўқи бўйлаб абсолют интегралланувчи ва унинг исталган чекли кесмасида Дирихле шартларини қаноатлантирувчи функцияларгагина қўлланиши мумкин.

1- мисол. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} x < -1 \text{ да } 0, \\ -1 \leq x \leq -\frac{1}{2} \text{ да } x+1, \\ -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} \text{ да } 1, \\ \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \text{ да, } -x+1, \\ x > 1 \text{ да } 0 \end{cases}$$

функциянинг Фурье алмаштиришини топиш.

Ечиш. Ушбу

$$F(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{izu} du.$$

Фурье алмаштириши формуласига кўра

$$F(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\int_{-\infty}^{-1} 0 \cdot e^{izu} du + \int_{-1}^{-1/2} (u+1) e^{izu} du + \int_{-1/2}^{1/2} 1 \cdot e^{izu} du + \int_{1/2}^1 (-u+1) e^{izu} du + \int_1^{+\infty} 0 \cdot e^{izu} du \right]$$

Равшанки, биринчи ва охириги интеграллар нолга тенг. Қолган интегралларни мос равишда I_1 , I_2 ва I_3 орқали белгилаб, ҳисоблай- миз:

$$I_1 = \int_{-1}^{-1/2} (u+1)e^{izu} du = \left\{ \begin{array}{l} s = u+1, \quad ds = du, \\ dt = e^{izud}, \quad t = \frac{e^{izu}}{iz} \end{array} \right\} = \left(\frac{1}{iz}(u+1)e^{izu} - \frac{1}{i^2 z^2} e^{izu} \right) \Big|_{-1}^{-1/2} = \frac{1}{iz} \cdot \frac{1}{2} e^{-\frac{iz}{2}} + \frac{1}{z^2} e^{-\frac{1}{2}iz} - \frac{1}{z^2} e^{-iz} = \frac{1}{2iz} e^{-\frac{iz}{2}} + \frac{1}{z^2} e^{-\frac{1}{2}iz} - \frac{1}{z^2} e^{-iz}$$

$$I_2 = \int_{-1/2}^{1/2} e^{izu} du = \frac{1}{iz} e^{izu} \Big|_{-1/2}^{1/2} = \frac{1}{iz} (e^{1/2iz} - e^{-1/2iz}) = \frac{2\sin \frac{z}{2}}{z}$$

$$I_3 = \int_{1/2}^1 (-u+1)e^{izu} du = \left\{ \begin{array}{l} s = -u+1, \quad ds = -du, \\ dt = e^{izu} du, \quad t = \frac{1}{iz} e^{izu} \end{array} \right\} =$$

$$= \left(\frac{1}{iz} (-u+1)e^{izu} + \frac{1}{i^2 z^2} e^{izu} \right) \Big|_{1/2}^1 = \frac{1}{i^2 z^2} e^{iz} - \frac{1}{iz} \cdot \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}iz} - \frac{1}{i^2 z^2} e^{\frac{1}{2}iz} = -\frac{1}{z^2} e^{iz} - \frac{1}{2iz} e^{\frac{1}{2}iz} - \frac{1}{z^2} e^{\frac{1}{2}iz}$$

Шундай қилиб,

$$F(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{1}{2iz} e^{-\frac{iz}{2}} + \frac{1}{z^2} e^{-\frac{1}{2}iz} - \frac{1}{z^2} e^{-iz} + \frac{2\sin \frac{z}{2}}{z} - \frac{1}{z^2} e^{iz} - \frac{1}{2zi} e^{\frac{1}{2}iz} + \frac{1}{z^2} e^{\frac{1}{2}iz} \right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-\frac{2\cos z}{z^2} + \frac{\sin \frac{z}{2}}{z} + \frac{2\cos \frac{z}{2}}{z^2} \right]$$

2-мисол. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} 0 \leq x < a & \text{да } 1, \\ x = a & \text{да } \frac{1}{2}, \\ x > a & \text{да } 0 \end{cases}$$

функциянинг косинус ва синус алмаштиришларини топиш.

Ечиш. Берилган функциянинг косинус-алмаштиришини топиш:

$$f_c(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(u) \cos z u du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\int_0^a \cos z u du + \int_a^{+\infty} 0 \cdot \cos z u du \right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^a \cos z u du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin az}{z}$$

Энди синус алмаштиришини топамиз:

$$\begin{aligned} f_s(z) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(u) z u du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\int_0^a \sin z u du + \int_0^{+\infty} 0 \cdot \sin z u du \right) = \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^a \sin z u du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1 - \cos az}{z} \end{aligned}$$

Ўз навбатида $f_c(z)$ ва $f_s(z)$ функцияларга косинус- ва синус- алмаштиришларни қўллаб, $f(x)$ функциянинг ўзини топамиз, яъни

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin az}{z} \cos xz dz = \begin{cases} 0 \leq x < a \text{ да } 1; \\ x = a \text{ да } \frac{1}{2}; \\ x > a \text{ да } 0; \end{cases}$$

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos az}{z} \sin xz dz = \begin{cases} 0 \leq x < a \text{ да } 1; \\ x = a \text{ да } \frac{1}{2}; \\ x > a \text{ да } 0. \end{cases}$$

10- дарсхона топшириги

1. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} |x| \leq \pi \text{ да } \cos \frac{x}{2}, \\ |x| > \pi \text{ да } 0 \end{cases}$$

функциянинг Фурье алмаштиришини топинг.

$$\text{Ж: } F(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{4}{1-4z^2} \cdot \cos \pi z$$

2. $f(x) = e^{-x} (x \geq 0)$ функциянинг косинус ва синус алмаштиришларини топинг.

$$\text{Ж: } f_c(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{z^2+1}, \quad f_s(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{z}{z^2+1}$$

10- мустақил иш

1. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} -1 \leq x < 0 \text{ да } e^{-x}, \\ 0 \leq x \leq 1 \text{ да } e^x, \\ |x| > 1 \text{ да } 0 \end{cases}$$

функциянинг Фурье алмаштиришини топинг.

$$\text{Ж: } F(z) = \frac{2i}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{ze^z - \sin z - z \cos z}{e(1+z^2)}$$

2. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} -1 \leq x \leq -\frac{1}{2} & \text{да} & -1, \\ -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} & \text{да} & 0, \\ \frac{1}{2} \leq x \leq 1 & \text{да} & 1 \end{cases}$$

функциянинг Фурье синус ва косинус алмаштиришларини топинг.

$$\text{Ж } f_1(z) = \frac{\sin z - \sin \frac{z}{2}}{z} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}, \quad f_2(z) = \frac{\cos \frac{z}{2} - \cos z}{z} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

9- назорат иши

1 Қаторнинг яқинлашувчанлигини исбот қилинг ва йиғиндисини топинг.

1.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2n}$

1.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 11n + 30}$

1.3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{14}{49n^2 - 14n - 48}$

1.4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 5n + 6}$

1.5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{4n^2 - 9}$

1.6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2 + 3n - 2}$

1.7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{49n^2 + 7n - 12}$

1.8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{24}{9n^2 - 12n - 5}$

1.9. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4n^2 + 32n + 63}$

1.10. $\sum_{n=11}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n - 2}$

1.11. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 7n + 12}$

1.12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{9n^2 + 3n - 2}$

1.13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2 + 15n + 4}$

1.14. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4n^2 + 24n + 35}$

1.15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{49n^2 + 7n - 12}$

1.16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 15n + 56}$

1.17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{9n^2 + 6n - 8}$

1.18. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4n^2 + 16n + 15}$

$$1.19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{16n^2 - 8n - 15}$$

$$1.21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 13n + 42}$$

$$1.23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 9n + 20}$$

$$1.25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2 + 21n + 10}$$

$$1.27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n - 12}$$

$$1.29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4n}$$

$$1.20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{9n^2 + 21n - 8}$$

$$1.22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{49n^2 + 35n - 6}$$

$$1.24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{4n^2 + 4n - 3}$$

$$1.26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{9n^2 - 3n - 2}$$

$$1.28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4n + 3}$$

$$1.30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 6n + 5}$$

2. Каторнинг яқинлашишни текширинг:

$$2.1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{tg} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$2.3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 - \ln n}$$

$$2.5. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right)$$

$$2.7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n-1} + n - 1}$$

$$2.9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+3}} \left(e^{\frac{1}{\sqrt{n}}} - 1\right)$$

$$2.11. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$$

$$2.13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{1}{n}$$

$$2.15. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n+5}} \sin \frac{1}{n-1}$$

$$2.2. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt[4]{n^5+2}}$$

$$2.4. \sum_{n=1}^{\infty} \arcsin \frac{n}{(n^2+3)^{5/2}}$$

$$2.6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \operatorname{arctg} \frac{\pi}{4\sqrt{n}}$$

$$2.8. \sum_{n=2}^{\infty} \left(e^{\frac{\sqrt{n}}{n^3-1}} - 1\right)$$

$$2.10. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n^2+5}{n^2+4}$$

$$2.12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n+2}} \operatorname{arctg} \frac{n+3}{n^2+5}$$

$$2.14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2\pi}{2n+1}}{\sqrt{n}}$$

$$2.16. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt[3]{n-1}}$$

$$2.17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4+3n}{5^n+n}$$

$$2.18. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n^2+1}{n^2+n+2}$$

$$2.19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n^2+3)^2}{n^5+\ln^4 n}$$

$$2.20. \sum_{n=1}^{\infty} n(e^n-1)^2$$

$$2.21. \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[3]{n} \operatorname{arctg} \frac{1}{n^5}$$

$$2.22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3+2}{n^5+\sin 2^n}$$

$$2.23. \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \sin \frac{1}{\sqrt[3]{n^4}}$$

$$2.24. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n^3}{n^3+1}$$

$$2.25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + \cos n}{3^n + \sin n}$$

$$2.26. \sum_{n=2}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{(n-1)\sqrt[5]{n^2+1}}$$

$$2.27. \sum_{n=1}^{\infty} n^3 \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}$$

$$2.28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \cos^2 6n}$$

$$2.29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 \sqrt[3]{n} + 5}$$

$$2.30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n+1}} \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$$

3. Кагорнинг яқинлашишини текширинг:

$$3.1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n(n^2-1)}{n!}$$

$$3.2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{3^n \cdot (n+1)!}$$

$$3.3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{3n+5} \cdot \frac{1}{2^n}$$

$$3.4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \sqrt[3]{n^2}}{(n+1)!}$$

$$3.5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}{7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (2n+5)}$$

$$3.6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(2n+1)!}{(3n)!}$$

$$3.7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$$

$$3.8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)!}{n^n}$$

$$3.9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n+3)!}$$

$$3.10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}$$

$$3.11. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4n!}$$

$$3.12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{\sqrt{n} \cdot 2^n}$$

$$3.13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2n^2}$$

$$3.14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} \frac{5}{n}}{n!}$$

$$3.15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n!)^2}$$

$$3.16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(3^n + 1)(2n)!}$$

$$3.17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n (n+1)!}{(2n)!}$$

$$3.18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n+2)!}{10^n \cdot n^2}$$

$$3.19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n-1}{5^n (n+1)!}$$

$$3.20. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{9}{10}\right)^n n^7$$

$$3.21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!}$$

$$3.22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+3}{(n+1)!}$$

$$3.23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n!}$$

$$3.24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n+1)!}$$

$$3.25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{5^n (2n-1)}$$

$$3.26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n+1)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \dots (3n-1)}$$

$$3.27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(3n)!}$$

$$3.28. \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \lg \frac{\pi}{3^n}$$

$$3.29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n}{n!}$$

$$3.30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n)!} \lg \frac{1}{n}$$

4 Катординг якинлашинини текширинг:

$$4.1. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+2}{3n-1}\right)^{n^2}$$

$$4.2. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^n$$

$$4.3. \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n} \left(\frac{n-2}{2n+1}\right)^{3n}$$

$$4.4. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\arcsin \frac{n+2}{2n+3}\right)^n$$

$$4.5. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+3}{2n}\right)^{n^2}$$

$$4.6. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\lg \frac{\pi}{5^n}\right)^{3n}$$

$$4.7. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{4n+3}\right)^{n^2}$$

$$4.8. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^{2n+1}$$

$$4.9. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n-2}\right)^{n^2}$$

$$4.10. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\arcsin \frac{1}{2^n}\right)^{3n}$$

$$4.11. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{5n}\right)^{3n}$$

$$4.12. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2} \cdot \frac{1}{5^n}$$

$$4.13. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \cdot \frac{1}{4^n}.$$

$$4.15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5 \cdot 3^n}{(2n+1)^n}.$$

$$4.17. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n^2 + 4n + 5}{6n^2 - 3n - 1}\right)^n.$$

$$4.19. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\arcsin \frac{1}{3n}\right)^{2n}.$$

$$4.21. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{2n+1}\right)^n.$$

$$4.23. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+2}{4n-1}\right)^n (n-1)^2.$$

$$4.25. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{2n+1}\right)^n.$$

$$4.27. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2 + 5n + 8}{3n^2 - 1}\right)^n.$$

$$4.29. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n-1}{3n+1}\right)^{\frac{1}{n}}.$$

$$4.14. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{n+1}\right)^n.$$

$$4.16. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5n-1}{5n}\right)^n.$$

$$4.18. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^n.$$

$$4.20. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n-1}{2n}\right)^{n^2}.$$

$$4.22. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2+1}{n^2+1}\right)^{n^2}.$$

$$4.24. \sum_{n=1}^{\infty} 2^{(-1)^{n-1} \cdot n}.$$

$$4.26. \sum_{n=1}^{\infty} 4^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^n.$$

$$4.28. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+2}{n+1}\right)^n (n+1)^3.$$

$$4.30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+2}}{(2n^2+1)^{n/2}}.$$

5. Ишоралари навбатланувчи каторнинг шартли ва абсолют жакинлашишини текширинг:

$$5.1. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$5.2. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^{n+1}}{\sqrt{n^3}}.$$

$$5.3. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos \frac{\pi}{6n}.$$

$$5.4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \sqrt[3]{n}}.$$

$$5.5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 5^n}.$$

$$5.6. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n^2}\right).$$

$$5.7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 2n^2}{n^4 - n^2 + 1}.$$

$$5.8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)2^{2n}}.$$

$$5.9. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n \sin \frac{\pi}{2^n}.$$

$$5.10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)(n+4)}.$$

$$5.11. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{12^n}.$$

$$5.12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n}.$$

- 5.13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!}$.
- 5.14. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$.
- 5.15. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^3}{n^2+1}$.
- 5.16. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$.
- 5.17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(2n)}$.
- 5.18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)2^{2n+2}}$.
- 5.19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2+1}$.
- 5.20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \ln n}$.
- 5.21. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{8^n}$.
- 5.22. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\ln(n+1)}$.
- 5.23. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \lg \frac{1}{n}$.
- 5.24. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n \sqrt{n}}{n \sqrt{n}}$.
- 5.25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot 2}{n^4}$.
- 5.26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^{3/2}}$.
- 5.27. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{6n}$.
- 5.28. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1) \ln n}$.
- 5.29. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-1}{3n}$.
- 5.30. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$.

6. Қаторнинг яқинлашиш соҳасини топинг:

- 6.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^i}{n!} x^n$.
- 6.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!}$.
- 6.3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^i x^n}{n!}$.
- 6.4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$.
- 6.5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n(n+1)} x^n$.
- 6.6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)x^n}{2^n(n^2+1)}$.
- 6.7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+3}{n+6}\right)^n \cdot x^n$.
- 6.8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{\sqrt{n}} x^n$.
- 6.9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{8^n}$.
- 6.10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{(n+1)^n} x^n$.
- 6.11. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln^2 n}$.
- 6.12. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x^n$.

$$6.13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{(n+1)^n} x^n.$$

$$6.15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n} x^n.$$

$$6.17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1} x^n.$$

$$6.19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^3}.$$

$$6.21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5 x^n}{(n+1)^n}.$$

$$6.23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot x^n}{\sqrt[2]{n}}.$$

$$6.25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} x^n}{1}.$$

$$6.27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2 x^n}{2^n}.$$

$$6.29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 3^n}.$$

$$6.14. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n x^n.$$

$$6.16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{3n}.$$

$$6.18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n^n} x^n.$$

$$6.20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! x^n}{(n+1)^n}.$$

$$6.22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\frac{n}{2}}}{(n+1)!} x^n.$$

$$6.24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}.$$

$$6.26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot x^n}{\sqrt{(2n-1)3^n}}.$$

$$6.28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}.$$

$$6.30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

КАРРАЛИ ИНТЕГРАЛЛАР

1-§. Декарт координатларида икки ўлчовли интегралларни ҳисоблаш

10.1.1. $z=f(x, y)=f(P)$ функция I чизик билан чегараланган ёпик D соҳада аниқланган ва узлуксиз бўлиб, $\Delta s_1, \Delta s_2, \dots, \Delta s_n$ — D соҳани n та элементар бўлақларга бўлиш натижасида ҳосил бўлган юзчалар бўлсин. Ҳар қайси Δs_i элементар соҳада ихтиёрий $P_i(x_i, y_i)$ нуктани танлаймиз ва функциянинг P_i нуктадаги қийматини ҳисоблаб, ушбу кўпайтмани тузамиз:

$$f(P_i) \cdot \Delta s_i = f(x_i, y_i) \Delta s_i.$$

Шундай кўпайтмаларнинг барчасининг

$$\sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta s_i = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta s_i$$

йиғиндиси $z=f(x, y)=f(P)$ функция учун D соҳадаги интеграл йиғинди дейилади.

Δs_i элементар юзчалар сони чексиз орттирилса, u ҳолда улар диаметрларининг энг каттаси нолга интигандagi интеграл йиғиндининг limiti $z=f(x, y)$ функциядан D соҳа бўйича олинган икки ўлчовли интеграл дейилади ва бундай белгиланади:

$$\iint_D f(P) ds \text{ ёки } \iint_D f(x, y) dx dy$$

Шундай қилиб

$$\iint_D f(x, y) ds = \lim_{n \rightarrow \infty, \max \Delta s_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta s_i$$

Бунда D — интеграллаш соҳаси, $f(x, y)$ интеграл остидаги функция, ds — юз элементи дейилади. Декарт координатларида $ds = dx dy$ бўлганлиги учун икки ўлчовли интеграл:

$$\iint_D f(x, y) ds = \iint_D f(x, y) dx dy$$

бўлади.

Агар $f(x, y) \geq 0$ бўлиб, v — пастдан интеграллаш соҳаси D билан, юқоридан D га проекцияланувчи $z=f(x, y)$ сиртнинг бўлаги билан, ён томондан эса ясовчилари Oz ўқка параллел ва йўналтирувчиси D соҳа чегараси L дан иборат цилиндрик сирт билан чегараланган жисм ҳажми бўлсин. У ҳолда

$$v = \iint_D f(x, y) dx dy.$$


Агар $f(x, y) \equiv 1$ бўлса, у ҳолда икки ўлчовли интегралнинг қиймати сон жиҳатдан интеграллаш соҳаси D нинг s юзига тенг бўлади, яъни

$$\iint_D dx dy = \iint_D ds = s.$$


Агар $f(x, y)$ функция D соҳага жойлашган пластинка массаси тақсимланишининг зичлигини ифодаласа, у ҳолда икки ўлчовли интеграл шу пластинка моддасининг массаси M ни беради:

$$M = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(x, y) ds.$$

10.1.2. Икки ўлчовли интегрални ҳисоблаш иккита аниқ интегрални кетма-кет ҳисоблашга келтирилади.



45- шакл



46- шакл

Агар D соҳа $y=y_1(x)$, $y=y_2(x)$ функцияларнинг графиклари ҳамда $x=a$ ва $x=b$ тўғри чизиқлар билан чегараланган (45- шакл), яъни

$$\begin{cases} a \leq x \leq b \\ y_1(x) \leq y \leq y_2(x) \end{cases}$$

тенгсизликлар билан аниқланган бўлса, у ҳолда икки ўлчовли интеграл қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left[\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right] dx = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$

Бу ерда

$$\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

ички интеграл сб аталади ва уни ҳисоблашда x ни ўзгармас деб, интеграллаш y бўйича олиб борилади. Ички интегрални ҳисоблаш натижаси *ташқи интеграл* учун интеграл ости функцияси бўлади.

Агар D соҳа қуйидаги

$$\begin{cases} c \leq y \leq d \\ x_1(y) \leq x \leq x_2(y) \end{cases}$$

тенгсизликлар билан аниқланган бўлса (46- шакл) икки ўлчовли интеграл ушбу

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left[\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx \right] dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx.$$


формула ёрдамида иккита аниқ интегрални ҳисоблашга келтирилади.

Агар D соҳа 47- шаклда кўрсатилгандагидек $x=a$, $y=c$, $x=b$, $y=d$ чизиклар билан фақат битта нуқтада кесишса, y ҳолда икки ўлчовли интегрални ҳисоблашда юқорида келтирилган ҳар иккала формуладан ҳам фойдаланиш мумкин бўлиб,


$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$$

тенглик ўринли бўлади.

Агар интеграллаш соҳаси 48- шаклда кўрсатилгандагидек контурга эга бўлса, y ҳолда икки ўлчовли интегрални ҳисоблаш учун соҳа $x=x_0$ чизик билан бўлақларга бўлиниб, юқоридаги формулардан фойдаланилади.



47- шакл



48- шакл

1- м и с о л. Икки ўлчовли интегрални ҳисобланг:

$$\iint_D (x-y) dx dy.$$

бу ерда D соҳа $y=2-x^2$ ва $y=2x-1$ чизиклар билан чегараланган.

Е ч и ш. D соҳани чизамиз (49- шакл). Учи $A(0, 2)$ да бўлган $y=2-x^2$ парабола Oy ўқка нисбатан симметрик бўлиб, $y=2x-1$ тўғри чизик билан иккита: $B(1, 1)$ ва $C(-3, -7)$ нукталарда кесишади. Интеграллаш соҳаси D ушбу тенгсизликлар системаси билан аниқланади:

$$\begin{cases} -3 \leq x \leq 1 \\ 2x-1 \leq y \leq 2-x^2. \end{cases}$$

Икки ўлчовли интегрални ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} \iint_D (x-y) dx dy &= \int_{-3}^1 dx \int_{2x-1}^{2-x^2} (x-y) dy = \int_{-3}^1 \left[xy - \frac{1}{2}y^2 \right] \Big|_{2x-1}^{2-x^2} dx = \\ &= \int_{-3}^1 \left[x(2-x^2) - \frac{1}{2}(2-x^2)^2 - x(2x-1) + \frac{1}{2}(2x-1)^2 \right] dx = \\ &= \int_{-3}^1 \left(2x - x^3 - 2 + 2x^2 - \frac{x^4}{2} - 2x^2 + x + 2x^2 - 2x + \frac{1}{2} \right) dx = \\ &= \int_{-3}^1 \left(-\frac{1}{2}x^4 - x^3 + 2x^2 + x - \frac{3}{2} \right) dx = \\ &= \left[-\frac{1}{10}x^5 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x \right] \Big|_{-3}^1 = \frac{64}{15}. \end{aligned}$$

2- м и с о л. Ушбу


$$\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy$$

интегралда интеграллаш тартибини ўзгартиринг.


Е ч и ш. Интеграллаш соҳаси D ушбу тенгсизликлар системаси орқали аниқланади:

$$\begin{cases} -1 \leq x \leq 1, \\ -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq 1-x^2. \end{cases}$$

Бу соҳани чизамиз (50- шакл) ва уни D_1 ва D_2 соҳаларга ажратамиз. Бу соҳалар қуйидаги тенгсизликлар системалари билан аниқланадилар:



49- шакл



50- шакл

$$D_1: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1, \\ -\sqrt{1-y} \leq x \leq +\sqrt{1-y}; \end{cases} \quad D_2: \begin{cases} -1 \leq y \leq 0, \\ -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq +\sqrt{1-y^2} \end{cases}$$

У ҳолда

$$\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y}}^{+\sqrt{1-y}} f(x, y) dx + \int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$$

1- дарсхона топшириғи

1. Интегралларни ҳисобланг:

а) $\int_1^3 dx \int_{x^3}^x (x-y) dy$; б) $\int_0^1 dx \int_1^e x \ln y dy$;

в) $\int_{-3}^8 dy \int_{y^2-4}^5 (x+2y) dx$.

Ж: а) $112 \frac{8}{105}$; б) 8; в) $50 \frac{2}{5}$.

2. Икки ўлчовли $\iint_D f(x, y) dx dy$ интегралнинг интеграллаш соҳа-

си D :

а) $x=3$, $x=5$, $3x-2y+4=0$ ва $3x-2y+1=0$ тўғри чизиклар билан;

б) $x^2+y^2-4y=0$ чизик билан;

в) $y=x^2+1$, $x=0$, $x+y=4$ чизиклар билан чегараланган. Ички ва ташқи интегралларнинг интеграллаш чегараларини аниқланг.

3. Куйидаги икки ўлчовли интегралларда интеграллаш тартибини ўзгартиринг:

а) $\int_0^1 dy \int_y^{1-y} f(x, y) dx$; б) $\int_1^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy$;

в) $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx$.

4. Куйидаги интегралларни ҳисобланг:

а) $\iint_D (x^2 + y) dx dy$, бу ерда D соҳа $y = x^2$ ва $y^2 = x$ чизиклар билан

чегараланган.

б) $\iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy$, бу ерда D соҳа $x = 2$, $y = x$, $xy = 1$ чизиклар билан

чегараланган.

Ж: а) $\frac{33}{140}$; б) $\frac{9}{4}$.

5. $y = x^2 - 2x$, $y = x$ чизиклар билан чегараланган юзни ҳисобланг:

Ж: $9/2$ кв. бирл.

6. $z = x^2 + y^2$, $x + y = 1$, $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ сиртлар билан чегараланган жисм ҳажмини ҳисобланг.

Ж: $\frac{1}{6}$ куб бирл.

7. Агар $x = (y - 1)^2$, $y = x - 1$ чизиклар билан чегараланган моддий пластинка массаси тақсимланишининг зичлиги $\gamma = y$ бўлса, унинг массасини аниқланг.

Ж: $\frac{27}{4}$ масса бирл.

1-мустақил иш

1. Куйидаги икки ўлчовли интегралларни ҳисобланг:

а) $\iint_D (\cos 2x + \sin y) dx dy$, бу ерда D соҳа $x = 0$, $y = 0$

$4x + 4y - \pi = 0$, $y = 0$ чизиклар билан чегараланган;

б) $\iint_D y \ln x dx dy$, бу ерда D соҳа $xy = 1$, $y = \sqrt{x}$, $x = 2$ чизикла

билан чегараланган.

в) $\iint_D \sin(x + y) dx dy$, бу ерда D соҳа $x = 0$, $y = \frac{\pi}{2}$, $y = x$ чи

зиклар билан чегараланган.

г) $\iint_D x dx dy$, бу ерда D соҳа—учлари $A(2, 3)$, $B(2, 7)$, $C(4, 5)$ нук-

таларда бўлган учбурчак.

Ж: а) $\frac{1}{4}(\pi + 1 - 2\sqrt{2})$; б) $\frac{5}{8}(2\ln 2 - 1)$; в) 1; г) 26.

2. Интеграллаш тартибини ўзгартиринг:

а) $\int_{-6}^2 dx \int_{\frac{x^2}{4}-1}^{2-x} f(x, y) dy$; б) $\int_0^1 dx \int_{\frac{1-x^2}{2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$;

в) $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$;

г) $\int_{-\sqrt{2}}^{-1} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^2 f(x, y) dy$;

д) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_1^{\sqrt{2}} dy \int_0^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx$.

3. $y=2-x$, $y^2=4x+4$ чизиклар билан чегараланган юзни ҳисобланг.

Ж: $\frac{64}{3}$ кв. бирл.

4. $x^2+y^2=1$, $z=0$, $x+y+z=4$ сиртлар билан чегараланган жисм ҳажмини ҳисобланг.

Ж: 4π куб. бирл.

2-§. Декарт координаталарида уч ўлчовли интегралларни ҳисоблаш

10.2.1. $f(x, y, z) = f(P)$ функция о сирт билан чегараланган ёпик фазовий Ω соҳада аниқланган ва узлуксиз бўлсин; $\Delta v_1, \Delta v_2, \dots, \Delta v_n$ — Ω соҳани n та бўлақларга бўлиш натижасида ҳосил бўлган соҳаларнинг ҳажмлари бўлсин, ҳар қайси Δv_i соҳачада ихтиёрий $P_i(x_i, y_i, z_i)$ нуктани танлаймиз ва функциянинг P_i нуктадаги қийматини ҳисоблаб, ушбу кўпайтмани тузамиз:

$$f(P_i) \cdot \Delta v_i = f(x_i, y_i, z_i) \cdot \Delta v_i.$$

Қуйидаги

$$\sum_{i=1}^n f(P) \Delta v_i \text{ ёки } \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta v_i$$

йиғинди $f(x, y, z) = f(P)$ функция учун Ω соҳа бўйича *интеграл йиғинди* дейилади.

$f(x, y, z) = f(P)$ функциянинг Ω соҳа бўйича уч ўлчовли интеграл деб интеграл йиғиндининг элементар соҳалар диаметраларининг энг каттаси нолга интилади деган шартдаги лимитига айтилади:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \lim_{\max \Delta v_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta v_i$$

Декарт координаталарида уч ўлчовли интеграл $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ кўринишда ёзилади.

10.2.2. Уч ўлчовли интегрални ҳисоблаш учта аниқ интегрални ёки битта икки ўлчовли ва битта аниқ интегрални кетма-кет ҳисоблашга келтирилади.

Агар Ω соҳа, ушбу

$$\begin{cases} a \leq x \leq b, \\ y_1(x) \leq y \leq y_2(x), \\ z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y) \end{cases}$$

тенгсизликлар системаси билан аниқланган бўлса (51-шакл), у ҳолда уч ўлчовли интеграл қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$


ёки

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$


Мисол. Ушбу $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$ интегрални ҳисобланг, бу ерда Ω соҳа $x + y + z = 1$, $z = 0$, $y = 0$, $x = 0$ текисликлар билан чегараланган.

Ечиш. Интеграллаш соҳаси Ω ни чизамиз (52-шакл). Бу соҳа ушбу тенгсизликлар системаси орқали аниқланади:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1, \\ 0 \leq y \leq 1 - x, \\ 0 \leq z \leq 1 - x - y. \end{cases}$$



51- шакл



52- шакл

Берилган уч ўлчовли интеграл қуйидагича ҳисобланади:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dx dy dz &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} z dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left(\frac{z^2}{2} \Big|_0^{1-x-y} \right) dy = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1-x-y)^2 dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(-\frac{(1-x-y)^3}{3} \Big|_0^{1-x} \right) dx = \\ &= -\frac{1}{6} \int_0^1 (-(1-x)^3) dx = \frac{1}{6} \left(-\frac{(1-x)^4}{4} \Big|_0^1 \right) = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

2- дарсхона топшириғи

1. Уч қаррали интегралларни ҳисобланг:

$$1. \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} x^2 y^2 z dz.$$

Ж: $\frac{1}{110}$

$$2. \int_0^{e-1} dx \int_0^{e-x-1} dy \int_e^{x+y+e} \frac{\ln(z-x-y)}{(x-e)(x+y-e)} dz$$

3. $\iiint_{\Omega} xy dx dy dz$ — уч ўлчовли интегрални ҳисобланг. Бу ерда

Ω соҳа $z=xy$ гиперболоид параболоид ҳамда $x+y=1$ ва $z=0 (z \geq 0)$ текисликлар билан чегараланган.

Ж: $\frac{1}{180}$

4. $\iiint_{\Omega} y \cos(z+x) dx dy dz$ уч ўлчовли интегрални ҳисобланг. Бу

ерда Ω соҳа $y = \sqrt{x}$ цилиндр ва $y=0, z=0$ ҳамда $x+z = \frac{\pi}{2}$ те-
кисликлар билан чегараланган.

$$\text{Ж: } \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}.$$

2- мустақил иш

Уч қаррали интегралларни ҳисобланг:

$$1. \int_0^3 dx \int_0^{2x} dy \int_0^{\sqrt{xy}} z dz.$$

$$\text{Ж: } \frac{81}{4}.$$

2. $\iiint_{\Omega} xyz dx dy dz$ — уч ўлчовли интегрални ҳисобланг. Бу ерда

Ω соҳа $y=x^2, x=y^2, z=xy$ ва $z=0$ сиртлар билан чегараланган.

$$\text{Ж: } \frac{1}{96}.$$

3. $\iiint_{\Omega} (2x+y) dx dy dz$ — уч ўлчовли интегрални ҳисобланг. Бу ерда

Ω соҳа $y=x, x=1, z=1$, ва $z=1+x^2+y^2$ сиртлар билан чегара-
ланган.

$$\text{Ж: } \frac{41}{60}.$$

3- §. Икки ўлчовли интегралда ўзгарувчиларни алмаштириш

10.3.1. Икки қаррали интеграл $\iint_D f(x, y) dx dy$ да ўзгарувчи-
ларни алмаштириш куйидаги

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v)$$

муносабатлар ёрдамида амалга оширилади. Бу ерда $x(u, v)$ ва $y(u, v)$ D соҳада узлуксиз биринчи тартибли хусусий ҳосилаларга эга функциялар. Юқоридаги муносабатлардан u ва v ўзгарувчиларни ягона усул билан

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y)$$

кўринишда топиш мумкин бўлсин. U ҳолда Oxy координаталар текислигидаги D соҳанинг ҳар бир $P(x, y)$ нуктасига янги O_1uv тўғри бурчакли координаталар системасидаги бирор $\bar{P}(u, v)$ нукта мос келади. Ҳамма $\bar{P}(u, v)$ нукталар тўплами бирор ёпик \bar{D} соҳани ҳосил қилади.

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

булса, u ҳолда икки ўлчовли интеграл учун ушбу ўзгарувчиларни алмаштириш формуласи ўриналидир:

$$\iint_{\Pi} f(x, y) dx dy = \iint_{\Pi} f(x(u, v), y(u, v)) |J| du dv.$$

Ғ м и с о л. Ушбу икки ўлчовли интегрални ўзгарувчиларни алмаштириш усулидан фойдаланиб ҳисобланг:

$$\iint_{\Pi} (x+y) dx dy,$$

бу ерда $D: y=x-1$, $y=x+2$, $y=-x-2$ ва $y=-x+3$ чизиклар билан чегараланган соҳа.

Ғ ч и ш. Oxy текисликдаги D соҳани чизамиз (53-шакл) ва

$$\begin{cases} u=y-x, \\ v=y+x \end{cases}$$

янги ўзгарувчилар киритамиз. u ҳолда Oxy текисликнинг $y=x-1$ ва $y=x+2$ тўғри чизикларига O, uv текисликнинг мос ҳолда $u=-1$ ва $u=2$ тўғри чизиклари, $y=-x-2$ ва $y=-x+3$ тўғри чизикларига эса $v=-2$ ва $v=3$ тўғри чизиклар мос келадиган D соҳа акс танадиган янги \bar{D} соҳани чизамиз (54-шакл).

x ва y ўзгарувчиларни u ва v лар орқали ифодалаб,


$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}(v-u), \\ y = \frac{1}{2}(v+u) \end{cases}$$

Якобианни ҳисоблаймиз:


$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \neq 0.$$

яъни

$$|J| = \frac{1}{2}.$$



53- шакл



54- шакл

Интеграллаш соҳаси \bar{D} куйидаги тенгсизликлар системаси орқали аниқланади:

$$\begin{cases} -1 \leq u \leq 2, \\ -2 \leq v \leq 3. \end{cases}$$

Демак,

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) dx dy &= \iint_{\bar{D}} \frac{1}{2} v du dv = \frac{1}{2} \int_{-1}^2 du \int_{-2}^3 v dv = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^2 \left(\frac{1}{2} v^2 \Big|_{-2}^3 \right) du = \frac{1}{4} \int_{-1}^2 (9-4) du = \frac{5}{4} u \Big|_{-1}^2 = \frac{15}{4}. \end{aligned}$$

10.3.2. Маълумки, тўғри бурчакли x, y ва қутб r, φ координаталар узаро

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

муносабатлар билан боғланган. Бу ерда $r \geq 0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$.

Икки ушловли интегралда тўғри бурчакли координаталардан қутб координаталарга ўтиш куйидаги формула орқали амалга оширилади:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi.$$

Интеграллаш чегаралари O қутбнинг ва зиятига боғлиқ бўлади.

а) Агар O қутб $\varphi = \alpha$ ва $\varphi = \beta$ ($\alpha < \beta$) нуқталар ҳамда $r = r_1(\varphi)$ ва $r = r_2(\varphi)$ ($r_1(\varphi) < r_2(\varphi)$) чиқликлар билан чегараланган D соҳа ганжа-

рисиди ётса, икки ўлчовли интеграл куйидаги формула билан ҳисобланади:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr.$$

б) Агар O кутб D соҳа ичида жойлашган бўлса ва бу соҳа чегараси кутб координаталар системасида $r = r(\varphi)$ кўринишга эга бўлса, у ҳолда икки ўлчовли интеграл ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{r(\varphi)} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr.$$

в) Агар O кутб $\varphi = \alpha$ ва $\varphi = \beta$ ($\alpha < \beta$) нурлар билан чегараланган D соҳа чегарасида ётса, шу билан бирга, чегаранинг кутб координаталар системасида тенгнамаси $r = r(\varphi)$ кўринишда бўлса, икки ўлчовли интеграл ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_0^{r(\varphi)} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr.$$

2- м и с о л. Ушбу икки ўлчовли интегрални ҳисобланг:

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy,$$

бу ерда D соҳа $x^2 + y^2 \leq a^2$ доиранинг биринчи чораги.

Е ч и ш. Агар интеграллаш соҳаси D доира ёки унинг бўлаги бўлса, кўп интеграллар кутб координаталарида осон ҳисобланади. Бизнинг ҳолда O кутб D соҳа чегарасида жойлашган (б) ҳол. D соҳа кутб координаталар системасида ушбу тенгсизликлар системаси орқали аниқланади (55- шакл):


$$\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0 \leq r \leq a \end{cases}$$

Демак,


$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \iint_D \sqrt{r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi} r dr d\varphi = \iint_D r^2 dr d\varphi = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a r^2 dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{3} r^3 \Big|_0^a \right) d\varphi = \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} a^3 d\varphi = \frac{a^3}{3} \varphi \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi a^3}{6}. \end{aligned}$$

3- м и с о л. Ушбу интегрални ҳисобланг:

$$\iint_D \ln(x^2 + y^2) dx dy,$$



55- шакл



56- шакл

бу ерда D соҳа $x^2 + y^2 = e^2$ ва $x^2 + y^2 = e^4$ доиралар орасидаги ҳалқадан иборат.

Е ч и ш. D соҳани чизамиз (56- шакл). Қутб координаталарида D соҳа чегараси $r = e$ ва $r = e^2$ кўринишга эга. O қутб чегарадан ташқарида ётади (a) ҳол).

Интегралда қутб координаталарига ўтамыз:

$$\iint_D \ln(x^2 + y^2) dx dy = \iint_D \ln r^2 \cdot r dr d\varphi = 2 \iint_D r \ln r dr d\varphi = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_e^{e^2} \ln r dr.$$

Ички интегрални ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} \int_e^{e^2} r \ln r dr &= \left\{ \begin{array}{l} u = \ln r, du = \frac{1}{r} dr \\ dv = r dr, v = \frac{1}{2} r^2 \end{array} \right\} = \frac{1}{2} r^2 \ln r \Big|_e^{e^2} - \\ & \int_e^{e^2} \frac{1}{2} r^2 \frac{1}{r} dr = \frac{1}{2} (e^4 \ln e^2 - e^2 \ln e) - \frac{1}{2} \int_e^{e^2} r dr = \\ & = \frac{1}{2} (2e^4 - e^2) - \frac{1}{4} r^2 \Big|_e^{e^2} = \frac{1}{2} (2e^4 - e^2) - \\ & - \frac{1}{4} (e^4 - e^2) = \frac{3}{4} e^4 - \frac{1}{4} e^2 = \frac{e^2}{4} (3e^2 - 1). \end{aligned}$$

Шундай қилиб,

$$\begin{aligned} \iint_D \ln(x^2 + y^2) dx dy &= 2 \int_0^{2\pi} \frac{e^2}{4} (3e^2 - 1) d\varphi = \frac{1}{2} e^2 (3e^2 - 1) \int_0^{2\pi} d\varphi = \\ &= \frac{1}{2} e^2 (3e^2 - 1) \varphi \Big|_0^{2\pi} = \pi e^2 (3e^2 - 1). \end{aligned}$$

3- дарсхона топшириги

Куйидаги икки ўлчовли интегралларни қутб координаталар системасига ўтиб, ҳисобланг:

а) $\iint_D \left(1 - \frac{y^2}{x^2}\right) dx dy$, бу ерда D соҳа $x^2 + y^2 \leq \pi^2$ доира,

б) $\iint_D \frac{dx dy}{x^2 + y^2 + 1}$, бу ерда D соҳа $y = \sqrt{1 - x^2}$ ва $y = 0$ чизиклар билан чегараланган;

в) $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, бу ерда D соҳа $x^2 + y^2 = 2ax$ чизик билан чегараланган;

г) $\iint_D \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, бу ерда D соҳа $x^2 + y^2 = \frac{\pi^2}{9}$ ва $x^2 + y^2 = \pi^2$ чизиклар билан чегараланган.

Ж: а) $2\pi^3$; б) $\frac{1}{2} \pi \ln 2$; в) $\frac{3}{2} \pi a^4$; г) 3π .

2. Икки ўлчовли интегрални ҳисобланг:

$\iint_D (x+y) x dx dy$, бу ерда D соҳа $2x + y = 1$, $x - y = 2$, $2x + y = 3$, $x - y = -1$ тўғри чизиклар билан чегараланган.

Ж: 2,5.

3. $r = a \sin 2\varphi$, $a > 0$ чизик билан чегараланган шакл юзини ҳисобланг.

Ж: $\pi a^2 / 2$ кв. бирл.

3- мустақил иш

1. Куйидаги интегралларни қутб координаталарига ўтиб ҳисобланг:

а) $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, бу ерда D соҳа $x^2 + y^2 = a^2$ ва $x^2 + y^2 = 4a^2$ чизиклар билан чегараланган;

б) $\iint_D \arctg \frac{y}{x} dx dy$, бу ерда D соҳа $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 9$,

$y = \frac{1}{\sqrt{3}}x$, $y = \sqrt{3}x$ чизиклар билан чегараланган ҳалқанинг бир қисми.

Ж: а) $\frac{14}{3}\pi a^3$; б) $\frac{1}{6}\pi^2$.

2. Агар D соҳа $x + y = 1$, $x - y = 1$, $x + y = 3$, $x - y = -1$ тўғри чизиклар билан чегараланган квадрат бўлса,

$$\iint_D (x+y)^3 (x-y)^2 dx dy$$

интегрални ҳисобланг.

Ж: $\frac{20}{3}$.

ЭГРИ ЧИЗИҚЛИ ИНТЕГРАЛЛАР ВА СИРТ ИНТЕГРАЛЛАРИ

1-§. Биринчи ва иккинчи тур эгри чизикли интеграллар

11.1.1. $f(x, y) = f(P)$ функция AB ясси силлик эгри чизикнинг барча нукталарида аниқланган ва узлуксиз бўлсин; бу ёйни узунликлари $\Delta l_1, \Delta l_2, \dots, \Delta l_n$ бўлган n та элементар ёйчаларга бўламиз. Ҳар қайси i -бўлақда ихтиёрий $P_i(x_i, y_i)$ нуктани танлаб олиб, функциянинг P_i нуктадаги қийматини мос элементар ёйча узунлигига кўпайтирамиз. Бу кўпайтмаларнинг ушбу

$$\sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta l_i \text{ ёки } \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta l_i$$

кўринишидаги йиғиндиси $f(x, y) = f(P)$ функция учун AB ёй бўйича *интеграл йиғинди* дейилади.

Бу интеграл йиғиндининг элементар ёйчалар узунликларининг энг каттаси нолга интилгандаги лимити *биринчи тур эгри чизикли интеграл* ёки *ёй узунлиги бўйича эгри чизикли интеграл* дейилади:

$$\int_{AB} f(x, y) dl = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta l_i$$

ёки

$$\int_{AB} f(P) dl = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta l_i$$

Агар $\overset{\cup}{AB}$ эгри чизик фазода берилган бўлиб, бу эгри чизик бўйлаб узлуксиз $f(x, y, z) = f(P)$ функция берилган бўлса, у ҳолда:

$$\int_{AB} f(x, y, z) dl = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta l_i$$

ёки

$$\int_{AB} f(P) dl = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta l_i$$

Биринчи тур эгри чизикли интеграл AB ёй кайси йўналишда ўти-
лишига боғлиқ эмас, яъни

$$\int_{\overline{AB}} f(P) dl = \int_{\overline{BA}} f(P) dl.$$

11.1.2. Биринчи тур эгри чизикли интегрални ҳисоблаш аниқ
интегрални ҳисоблашга келтирилади:

а) Агар ясси AB эгри чизик

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

параметрик тенгламалар билан берилган бўлса, эгри чизикли
интеграл ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\int_{\overline{AB}} f(x, y) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt.$$

AB эгри чизик фазода $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$)
тенгламалар билан аниқланган бўлса, у ҳолда

$$\int_{\overline{AB}} f(x, y, z) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt.$$

б) Агар AB ясси эгри чизик $y = y(x)$ ($a \leq x \leq b$) тенглама билан
берилган бўлса, эгри чизикли интеграл қуйидаги формула бўйича
ҳисобланади:

$$\int_{\overline{AB}} f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

в) Агар AB ясси эгри чизик $x = x(y)$ ($c \leq y \leq d$) тенглама
билан берилган бўлса, эгри чизикли интеграл

$$\int_{\overline{AB}} f(x, y) dl = \int_c^d f(x(y), y) \sqrt{1 + x'^2} dy$$

формула бўйича ҳисобланади.

1- м и с ол. Ушбу эгри чизикли интегрални ҳисобланг:

$$\int_L (x - y) dl,$$

бу ерда L — тўғри чизикнинг $A(0, 0)$ дан $B(4, 3)$ гача бўлаги.

Ечиш. AB тўғри чизик $y = \frac{3}{4}x$ кўринишга эга. $y' = \frac{3}{4}$ ни топамиз. Демак,

$$\int_l (x-y) dl = \int_0^4 \left(x - \frac{3}{4}x\right) \sqrt{1 + \frac{9}{16}} dx = \int_0^4 \frac{1}{4}x \cdot \frac{5}{4} dx =$$

$$= \frac{5}{16} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^4 = \frac{5}{2}.$$

2-мисол. $\int_l (2z - \sqrt{x^2 + y^2}) dl$ интегрални ҳисобланг, бу ерда

$L: x = t \cos t, y = t \sin t, z = t, 0 \leq t \leq 2\pi$ винт чизигининг биринчи ўрами.

Ечиш. Ҳосилаларни ҳисоблаймиз: $\dot{x} = \cos t - t \sin t, \dot{y} = \sin t + t \cos t, \dot{z} = 1$. У ҳолда

$$\int_L (2z - \sqrt{x^2 + y^2}) dl = \int_0^{2\pi} (2t - \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t}) \times$$

$$\times \sqrt{(\cos t - t \sin t)^2 + (\sin t + t \cos t)^2 + 1} dt = \int_0^{2\pi} (2t - t) \sqrt{2 + t^2} dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} t \sqrt{2 + t^2} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(2 + t^2)^3} \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= \frac{1}{3} (\sqrt{(2 + 4\pi^2)^3} - \sqrt{2^3}) = \frac{\sqrt{2^3}}{3} (\sqrt{(1 + 2\pi^2)^3} - 1).$$

11.1.3. $P(x, y)$ ва $Q(x, y)$ функциялар бирор ясси силлик AB эгри чизикнинг барча нукталарида аниқланган ва узлуксиз бўлсин; $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$ ва $\Delta y_1, \Delta y_2, \dots, \Delta y_n$ элементар ёйчаларнинг (11.1.1. банд) Ox ва Oy ўқларга проекциялари бўлсин.

Ушбу

$$\sum_{i=1}^n [P(x_i, y_i) \Delta x_i + Q(x_i, y_i) \Delta y_i]$$

йигинди $P(x, y)$ ва $Q(x, y)$ функциялар учун координаталар бўйича интеграл йигинди дейилади.

Бу интеграл йигиндининг $\max \Delta x_i \rightarrow 0$ ва $\max \Delta y_i \rightarrow 0$ даги лимити AB ёй йўналиши бўйича иккинчи тур эгри чизикли интеграл ёки координаталар бўйича эгри чизикли интеграл дейилади:

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \lim_{\substack{\max \Delta x_i \rightarrow 0 \\ \max \Delta y_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n P(x_i, y_i) \Delta x_i + Q(x_i, y_i) \Delta y_i$$

Иккинчи тур эгри чизикли интеграл интеграллаш йўлининг йўналишига боғлиқ, яъни

$$\int_{BA} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = - \int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

Агар интеграллаш йўли ёпиқ эгри чизикдан иборат бўлса, у ҳолда ёпиқ контур бўйича эгри чизикли интеграл айланиб ўтиш йўналишини кўрсатиб

$$\oint P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

каби белгиланади.

Агар ёпиқ контурни айланиб ўтиш соат милл ҳаракатига қарама-қарши бўлса, у мусбат дейилади (бунда контур билан чегараланган соҳа чап томонда қолади). Бунга тесқари айланиб ўтиш манфий дейилади. Қелгусида, агар таъқидлаб ўтилмаган бўлса, контурни айланиб ўтиш йўналишини мусбат деб олаверамиз.

11.1.4. Иккинчи тур интегрални ҳисоблаш ҳам аниқ интегрални ҳисоблашга келтирилади:

а) Агар ясси AB эгри чизик $x=x(t)$, $y=y(t)$ параметрик тенгламалар билан берилган бўлиб, t параметр йўлнинг бошланиши A га мос t_A қийматдан, йўл охири B га мос t_B қийматгача ўзгарса, иккинчи тур эгри чизикли интеграл ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{t_A}^{t_B} [P(x(t), y(t)) \dot{x}(t) + Q(x(t), y(t)) \dot{y}(t)] dt.$$

AB эгри чизик фазода $x=x(t)$, $y=y(t)$, $z=z(t)$ параметрик тенгламалар билан берилган бўлса, у ҳолда

$$\begin{aligned} & \int_{AB} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz = \\ & = \int_{t_A}^{t_B} [P(x(t), y(t), z(t)) \dot{x}(t) + Q(x(t), y(t), z(t)) \dot{y}(t) + \\ & + R(x(t), y(t), z(t)) \dot{z}(t)] dt. \end{aligned}$$

б) Агар ясси AB эгри чизик $y=y(x)$ тенглама билан берилган бўлиб, x ўзгарувчи йўл бошланиши A га мос a қийматдан йўл охири B га мос b қийматгача ўзгарса, эгри чизикли интеграл қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_a^b [P(x, y(x)) + Q(x, y(x)) y'(x)] dx.$$

в) Агар ясси AB эгри чизик $x=x(y)$ тенглама билан берилган бўлиб, y ўзгарувчи йўл бошланиши A га мос c кийматдан йўл охири B га мос d кийматгача ўзгарса, эгри чизикли интеграл куйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$\int_{\overline{AB}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_c^d [P(x(y), y) x'(y) + Q(x(y), y)] dy.$$


3- м и с о л. Ушбу эгри чизикли интегрални ҳисобланг:

$$\int_L y^2 dx + x^2 dy,$$


бу ерда L контур $x = a \cos t$, $y = b \sin t$ эллипснинг соат мили ҳаракати бўйича айланиб ўтиладиган юкори ярми (57- шакл).

Е ч и ш. Йўлнинг бошланиши параметрнинг $t_A = \pi$ кийматига мос A нуқтада жойлашган; йўл охири параметрнинг $t_B = 0$ кийматига мос B нуқтада жойлашган. Шундай қилиб, куйидагига эгамиз:

$$\begin{aligned} \int_L y^2 dx + x^2 dy &= \int_{\overline{AB}} y^2 dx + x^2 dy = \int_{\pi}^0 [b^2 \sin^2 t (-a \sin t) + \\ &+ a^2 \cos^2 t \cdot b \cos t] dt = -ab^2 \int_{\pi}^0 \sin^3 t dt + a^2 b \int_{\pi}^0 \cos^3 t dt = \\ &= ab^2 \int_0^{\pi} \sin^3 t dt - a^2 b \int_0^{\pi} \cos^3 t dt = -ab^2 \int_0^{\pi} (1 - \cos^2 t) d(\cos t) - \\ &- a^2 b \int_0^{\pi} (1 - \sin^2 t) d(\sin t) = -ab^2 (\cos t - \frac{1}{3} \cos^3 t) \Big|_0^{\pi} - \\ &- a^2 b (\sin t - \frac{1}{3} \sin^3 t) \Big|_0^{\pi} = -ab^2 (-1 + \frac{1}{3} - 1 + \\ &+ \frac{1}{3}) = \frac{4}{3} ab^2. \end{aligned}$$



57- шакл



58- шакл

4- мисол. Ушбу эгри чизикли интегрални ҳисобланг:

$$\oint_L 2xdy - 3ydx,$$

бу ерда L — учлари $A(1, 2)$, $B(3, 1)$, $C(2, 5)$ нукталарда бўлган учбурчак контури (58- шакл).

Ечиш. Контур ушбу тенгламалар билан берилган кесмалардан тuzилган:

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2} \text{ — } AB \text{ нинг тенгламаси;}$$

$$y = -4x + 13 \text{ — } BC \text{ нинг тенгламаси;}$$

$$y = 3x - 1 \text{ — } AC \text{ нинг тенгламаси.}$$

Куйидагига эгамиз:

$$\begin{aligned} \oint (2xdy - 3ydx) &= \int_{AB} 2xdy - 3ydx + \\ &+ \int_{BC} 2xdy - 3ydx + \int_{CA} 2xdy - 3ydx. \end{aligned}$$

Хар қайси интегрални ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} \int_{AB} 2xdy - 3ydx &= \int_1^3 \left(2x \left(-\frac{1}{2} \right) - 3 \left(-\frac{1}{2}x + \frac{5}{2} \right) \right) dx = \\ &= \int_1^3 \left(-x + \frac{3}{2}x - \frac{15}{2} \right) dx = \frac{1}{2} \int_1^3 (x - 15) dx = \frac{1}{4} (x - 15)^2 \Big|_1^3 = \\ &= \frac{1}{4} (12^2 - 14^2) = \frac{1}{4} \cdot 26 \cdot (-2) = -13; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{BC} (2xdy - 3ydx) &= \int_3^2 (2x(-4) - 3 \cdot (-4x + 13)) dx = \\ &= \int_3^2 (-8x + 12x - 39) dx = \int_3^2 (4x - 39) dx = (2x^2 - 39x) \Big|_3^2 = \\ &= (8 - 78 - 18 + 117) = 29; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{CA} (2xdy - 3ydx) &= \int_2^1 (2x \cdot 3 - 3(3x - 1)) dx = \int_2^1 (6x - 9x + 3) dx = \\ &= 3 \int_2^1 (1 - x) dx = 3 \left(x + \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_2^1 = 3 \left(1 + \frac{1}{2} - 2 - 2 \right) = -\frac{15}{2}. \end{aligned}$$

Шундай қилиб,

$$\oint_L (2xdy - 3ydx) = \frac{17}{2}.$$

1- дарсхона топшириги

1. $\int_L \frac{dl}{x-y}$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L контур $y = \frac{1}{2}x - 2$

тўғри чизикнинг $A(0, -2)$ ва $B(4, 0)$ нукталар орасидаги кесмаси.

Ж: $\sqrt{5} \ln 2$.

2. $\int_L y^2 dl$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L контур $x = a(t - \sin t)$,
 $y = a(1 - \cos t)$ ($a > 0$) циклоиданинг биринчи арки. Ж: $\frac{256}{15}a^3$.

3. $\int_L xy dl$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L — учлари $A(0, 0)$,
 $B(4, 0)$, $C(4, 2)$, $D(0, 2)$ нукталарда бўлган тўғри тўртбурчак кон-
 тури. Ж: 24.

4. $\int_L xyz dl$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L контур тўғри
 чизикнинг $A(1, 0, 1)$ ва $B(2, 2, 3)$ нукталар орасидаги кесмаси.
 Ж: 12.

5. $\int_L (x^2 - 2xy) dx + (2xy + y^2) dy$ интегрални ҳисобланг, бу ерда
 L контур $y = x^2$ параболанинг $A(1, 1)$ нуктадан $B(2, 4)$ нуктагача
 ёйи. Ж: $40 \frac{19}{30}$.

6. $\oint_L y dx - x dy$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L контур мусбат
 йўналишда айланиб ўтиладиган $x = a \cos t$, $y = b \sin t$ эллипс.
 Ж: $-2\pi ab$.

7. Агар L $A(0, 0)$ ва $B(1, 1)$ нукталарни туташтирувчи чизик:
 а) $y = x$; б) $y = x^2$; в) $y^2 = x$; г) $y = x^3$
 тенгламалар билан берилган бўлса,

$\int_L xy dx + (y - x) dy$ интегрални ҳисобланг.

Ж.: а) $\frac{1}{3}$; б) $\frac{1}{12}$; в) $\frac{17}{30}$; г) $-\frac{1}{20}$.

8. $\int_L x dx + y dy + (x + y - 1) dz$ интегрални ҳисобланг, бу ерда
 L $A(1, 1, 1)$ ва $B(2, 3, 4)$ нукталарни туташтирувчи тўғри чизик
 кесмаси. Ж: 13.

1- мустақил иш

Эгри чизикли интегралларни ҳисобланг:

1. $\int_L x dl$, бу ерда L $O(0, 0)$ ва $A(1, 2)$ нукталарни туташтирувчи
 тўғри чизик кесмаси. Ж: $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

2. $\int x y dl$, бу ерда L $x^2 + y^2 = 9$ айлананинг биринчи квадрантда

ётувчи қисми. Ж: 27.

3. $\int \frac{dl}{x+y}$, бу ерда L $y = x + 2$ тўғри чизикнинг $A(2, 3)$ ва

$B(3, 5)$ нукталарини туташтирувчи кесмаси.

Ж: $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

4. $\int (x+y) dx + (x-y) dy$, бу ерда L $y = x^2$ параболанинг

$A(-1, 1)$ ва $B(1, 1)$ нукталар орасидаги бўлаги.

Ж: 2.

5. $\int (x-y)^2 dx + (x+y)^2 dy$, бу ерда L OAB синик чизик бўлиб,

$O(0, 0)$, $A(2, 0)$, $B(4, 2)$. Ж: $\frac{136}{3}$.

6. $\oint y dx + 2x dy$, бу ерда L томонлари $2x + 3y = \pm 6$,

$2x - 3y = \pm 6$ тўғри чизикларда ётувчи, соат илки ҳаракатига тескари йўналишда айланиб ўгиладиган ромб контури. Ж: 12.

2-§. Биринчи ва иккинчи тур эгри чизикли интегралларнинг татбиқи

11.2.1. Биринчи тур эгри чизикли интеграллар ёрдамида эгри чизик ёйининг узунлигини, моддий ёй массасини, цилиндрлик сирт юзини ҳисоблаш мумкин.

а) $\int_{AB} dl = l_{AB}$, бу ерда l_{AB} AB ёй узунлиги (биринчи тур эгри

чизикли интегралнинг геометрик маъноси);

б) $\int_{AB} f(x, y, z) dl = m$, бу ерда m — моддий AB ёй массаси, $f(x,$

$y, z) = \gamma$ — бу ёйнинг чизикли зичлиги (эгри чизикли интегралнинг механик маъноси);


в) $\int_{AB} f(x, y) dl = S$, бу ерда S — ясовчилари Oz ўққа параллел ва

AB ёй нукталаридан ўтувчи, пастан бу ёй билан, юқоридан цилиндрлик сиртнинг $z = f(x, y)$ ($f(x, y) > 0$) сирт билан кесилиш чизиги билан, ёй томонлардан эса A ва B нукталардан Oz


ўққа параллел ўтган чизиклар билан чегараланган цилиндрик сиртнинг юзи (59-шакл).

1-мисол. $x^2 + y^2 = 4$ цилиндрик сиртнинг Oxy текислик ва $z = 2 + \frac{x^2}{2}$ сирт орасидаги қисмининг юзини ҳисобланг.

Ечиш. Шаклни чизамиз (60-шакл).



59-шакл



60-шакл

Цилиндрик сиртнинг изланаётган юзи S ушбу интеграл билан ифодаланади:

$$S = \int_L \left(2 + \frac{x^2}{2}\right) dt.$$

бу ерда L Oxy текисликдаги айлана: $x^2 + y^2 = 4$, $z = 0$ ёки параметрик шаклда: $x = 2\cos t$, $y = 2\sin t$, $0 \leq t < 2\pi$.

$$У \text{ ҳолда } dl = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = \sqrt{(1 - 2\sin t)^2 + (2\cos t)^2} dt = 2dt$$

Демак,

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} \left(2 + \frac{1}{2} \cdot 4\cos^2 t\right) 2dt = 4 \int_0^{2\pi} (1 + \cos^2 t) dt = \\ &= 4 \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \cos 2t\right) dt = 4 \left(\frac{3}{2}t + \frac{1}{4}\sin 2t\right) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= 6 \cdot 2\pi = 12\pi \text{ кв. бирл.} \end{aligned}$$

11.2.2. Иккинчи тур эгри чизикли интеграллар ёрдамида шаклнинг юзини, қуч ишини, функцияни унинг маълум тулик дифференциали бўйича тошни мумкин.

а) $\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = A$, бу ерда $A = \vec{F} = P(x, y)\vec{i} + Q(x,$

$y)\vec{j}$ куч бажарган иш, бу куч таъсирида жисм AB йўл буйича кўчади (иккинчи тур эгри чизикли интегралнинг механик маъноси).

б) $\frac{1}{2} \oint_L (xdy - ydx) = S$, бу ерда S — ёпик L контур билан чегараланган фигура юзи.

2- м и с о л. $x = acost$, $y = bsint$, $0 \leq t \leq 2\pi$ эллипс билан чегараланган шакл юзини ҳисобланг.

Е ч и ш. $S = \frac{1}{2} \oint_L (xdy - ydx)$ формуладан фойдаланамиз.

$$dx = -asintdt, \quad dy = bcostdt$$

Демак, $S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (acost \cdot bcost - bsint(-asint)) dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab(\cos^2 t +$

$$+ \sin^2 t) dt = \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} dt = \pi ab \text{ кв. бирл.}$$

11.2.3. Агар L D соҳанинг чегараси бўлса ва $P(x, y)$, $Q(x, y)$ функциялар ёпик D соҳада ўзларининг хусусий ҳосилалари билан биргаликда узлуксиз бўлсалар, у ҳолда ушбу Грин формуласи ўринлидир:

$$\oint_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

бу ерда L контурни айланиб чиқиш шундай танланадики, D соҳа чап томонда қолади (мусбат йўналиш).

Агар бирор D соҳада Грин формуласи шартлари бажарилса, қуйидаги тасдиқлар тенг кучлидир:

а) $\oint_L Pdx + Qdy = 0$, бунда l D соҳада жойлашган исталган ёпик контур

б) $\int_{AB} Pdx + Qdy$ интеграл A ва B нукталарни туташтирувчи

интеграллаш йўлига боғлиқ эмас, бу ерда AB D соҳага тегишли.

в) $Pdx + Qdy = du(x, y)$, бу ерда $du(x, y)$ $u(x, y)$ функциянинг тулик дифференциали.

г) D соҳанинг ҳамма нуқталарида $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

Агар $du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ бўлса, $u(x, y)$ функция

$$u(x, y) = \int_x^1 P(x, y)dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy + C$$

ёки

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy + C$$

формула ёрдамида аниқланади, бу ерда $M_0(x_0, y_0)$ ва $M(x, y)$ нуқталар D соҳага тегишли, C — ихтиёрий ўзгармас.

3-миёс ол. Грин формуласидан фойдаланиб, $\oint_l y(1-x^2)dx + (1+y^2)xdy$ интегрални ҳисобланг, бу ерда l контур $x^2+y^2=4$ айланадан иборат бўлиб, у мусбат йўналишда айланиб ўтилади.

Еч и ш. Грин формуласи бўйича икки ўлчовли интегралга ўтамиз:

$$\begin{aligned} \oint_l y(1-x^2)dx + (1+y^2)dy &= \iint_D (1+y^2 - 1+x^2)dx dy = \\ &= \iint_D (x^2+y^2)dx dy, \end{aligned}$$

бу ерда D соҳа $x^2+y^2 \leq 4$ тенгсизлик билан аниқланадиган доира. Интегрални ҳисоблаш учун кутб координаталарига ўтамиз:

$$\begin{aligned} \iint_D (x^2+y^2)dx dy &= \iint_D (r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi) r dr d\varphi = \\ &= \iint_D r^3 dr d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 r^3 dr = \int_0^{2\pi} \frac{1}{4} (r^4|_0^2) d\varphi = \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} 16 d\varphi = 8\pi. \end{aligned}$$

4-миёс ол. Ушбу

$$\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)dx + \left(\frac{2}{y} - \frac{x}{y^2}\right)dy$$

дифференциал ифода бирор функциянинг тулик дифференциали эканини курсатинг ва бу функцияни топинг.

Еч и ш. Қуйидагиларга эгамиз:

$$P(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}; \quad Q(x, y) = \frac{2}{y} - \frac{x}{y^2};$$

$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{y^2} = -\frac{\partial Q}{\partial x}$, бинобарин, берилган нфода ҳақиқатан ҳам би

пор $u(x, y)$ функциянинг тўлиқ дифференциалидир.

Демак, $M_0(x_0, y_0)$ деб $M_0(1, 1)$ ни олиб, қуйидагини тонамиз:

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_1^x \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) dx + \int_1^y \left(\frac{2}{y} - \frac{1}{y^2}\right) dy = \\ &= \left(\ln|x| + \frac{x}{y}\right) \Big|_1^x + \left(2 \ln y + \frac{1}{y}\right) \Big|_1^y = \ln|x| + \frac{x}{y} - \frac{1}{y} + \\ &+ 2 \ln|y| + \frac{1}{y} - 1 + C = \ln|x| + 2 \ln|y| + \frac{x}{y} + \bar{C}. \end{aligned}$$

2-дарсхона топшириги

1. $x = \cos t$, $y = \sin t$ айлана ёйининг массасини аниқлаш. Унинг (x, y) нуқтадаги чизикли зичлиги y га тенг. Ж: 2 масса бирл.

2. R радиусли доиравий цилиндр билан худди шундай цилиндр тўғри бурчак остида (ўқлари тўғри бурчак остида) кесилди. Кесимда ҳосил бўлган сирт юзини ҳисоблаш. Ж: $8R^2$ кв. бирл.

3. а) $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ астронда билан;

б) $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ циклоиданинг биринчи аркаси ва Ox ўқи билан чегараланган шакл юзини ҳисоблаш.

Ж: а) $3\pi a^2$ кв. бирл.; б) $3\pi a^2$ кв. бирл.

4. Тўлиқ дифференциали бўйича $u(x, y)$ функцияни тонинг:

а) $du = (2x - 3xy^2 + 2y) dx + (2x - 3x^2y + 2y) dy$;

б) $du = (\arcsin x - x \ln y) dx - \left(\arcsin y + \frac{x^2}{2y}\right) dy$.

5. $\vec{F} = (x^2 + y^2 + 1)\vec{i} + 2xy\vec{j}$ кучнинг $y = x^2$ параболанинг $A(0, 0)$ ва $B(1, 1)$ нуқталар орасидаги ёйи бўйича бажарган ишнинг ҳисоблаш.

Ж: $\frac{196}{105}$ иш. бирл.

6. Грин формуласидан фойдаланиб, $\oint_L 2(x^2 + y^2) dx + (x + y)^2 dy$

интегрални ҳисоблаш, бу ерда L ўқлари $A(1, 1)$, $B(2, 2)$, $C(1, 3)$ бўлган учбурчак контури. Натижани бевосита интеграллаш билан текшириш. Ж: $-\frac{4}{3}$

2-мустақил иш

1. $x^2 + y^2 = R^2$ цилиндрик сиртнинг Oxy текислик ва $z = \frac{xy}{2R}$ сирт орасига жойлашган қисмининг юзини ҳисоблаш. Ж: R^2 кв. бирл.

2. $y = x^2$ ва $y = \sqrt{x}$ чизиклар билан чегараланган соҳанинг юзини ҳисоблаш. Ж: $\frac{1}{3}$ кв. бирл.

3. Берилган тўлиқ дифференциали

$$du = \frac{(x+2y)dx + ydy}{(x+y)^2}$$

бўйича $u(x, y)$ функцияни топинг.

4. $\vec{F} = 2xy\vec{i} + x^2\vec{j}$ кучнинг $A(0, 0)$ ва $B(2, 1)$ нукталарни туташтирувчи йўлда бажарган ишини ҳисобланг. Ж: 4 иш бирл.

5. Грин формуласидан фойдаланиб, $\oint_L y^2 dx + (x+y)^2 dy$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L — учлари $A(3, 0)$, $B(3, 3)$, $C(0, 3)$ нукталарда бўлган учбурчак контури. Ж: 18.

3-§. Сирт интеграллари

11.3.1. σ — бирорта силлик сирт ва $f(x, y, z) = f(M)$ функция σ сиртда узлуксиз бўлсин; $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$ лар σ сиртнинг элементар сиртларга бўлиниши бўлиб, уларнинг юзларини ҳам шу символлар билан белгилайлик; ҳар қайси элементар сиртда ихтиёрий $M_i(x_i, y_i, z_i)$ нукта танлаймиз ва ушбу $\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta\sigma_i$ интеграл йиғиндини тузамиз.

Элементар сиртларнинг диаметрининг энг каттаси нолга интилганда интеграл йиғинди интиладиган лимит *биринчи тур сирт интеграл* (ёки *сирт юзи бўйича интеграл*) дейилади:

$$\iint_{\sigma} f(x, y, z) d\sigma = \lim_{\max \text{diam} \Delta\sigma_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta\sigma_i$$

ёки

$$\iint_{\sigma} f(M) d\sigma = \lim_{\max \text{diam} \Delta\sigma_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta\sigma_i$$

Сирт интегралининг қиймати σ сиртнинг қайси томони танланишига боғлиқ эмас.

Аник интегралнинг барча хоссалари биринчи тур сирт интеграллари учун ўринлидир. Агар σ сиртнинг Oxy текисликка проекцияси σ_{xy} бир қийматли бўлса, яъни Oz ўқка параллел ҳар қандай тўғри чизик σ сиртни фақат битта нуктада кесса, мос биринчи тур сирт интегрални ҳисоблашни ушбу формула орқали икки ўлчовли интегрални ҳисоблашга келтириш мумкин:

$$\iint_{\sigma} f(x, y, z) d\sigma = \iint_{\sigma_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy,$$

бу ерда $z = z(x, y)$ — σ сиртнинг тенгнамаси. Равшанки, $\iint_{\sigma} d\sigma = S$,

бу ерда S — σ сиртнинг юзи, $\iint_{\sigma} f(x, y, z) d\sigma = M$, бу ерда M — σ сиртнинг массаси, $f(x, y, z) = \gamma$ — σ сиртнинг сиртий зичлиги.

1-мисол. $\iint_{\sigma} (x^2 + y^2) d\sigma$ интегрални ҳисобланг, бу ерда σ — $x^2 + y^2 = z^2$ конус сиртнинг $z=0$ ва $z=1$ текисликлар орасидаги қисми.

Ечиш. Берилган σ сирт тенгламасидан унинг қаралаётган қисми учун $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ эканини кўрамиз. Қуйидагиларга эгамиз:

$$z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Демак,

$$\begin{aligned} \iint_{\sigma} (x^2 + y^2) d\sigma &= \iint_{\sigma_{xy}} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} dx dy = \\ &= \sqrt{2} \iint_{\sigma_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy. \end{aligned}$$

Икки ўлчовли интегралнинг интеграллаш соҳаси σ_{xy} $x^2 + y^2 \leq 1$ доирадан иборат (конус сиртнинг Oxy текисликка проекцияси). Икки ўлчовли интегралда кутб координаталарига ўтамиз:

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \iint_{\sigma_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy &= \sqrt{2} \iint_{\sigma_{\varphi r}} r^3 dr d\varphi = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^3 dr = \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{4} r^4 \Big|_0^1 \right) d\varphi = \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

11.3.2. σ силлик сиртнинг ҳар бир нуктасидан \vec{n} нормал вектори ўтказилган томони *мусбат*, бошқа томони (агар у мавжуд бўлса) эса *манфий* томон дейилади.

Хусусан, агар σ сирт ёпик бўлса ва Ω фазонинг бирор соҳасини чегараласа, у ҳолда сиртнинг мусбат ёки *ташқи томони* деб унинг нормал векторлар Ω соҳадан йўналган томони, манфий ёки *ички томони* деб унинг нормал векторлари Ω соҳага йўналган томони айтилади. Мусбат (ташқи) ва манфий (ички) томонлари мавжуд бўлган сиртлар *икки томонлама сиртлар* дейилади. Улар учун қуйидаги хосса ўринлидир. Агар \vec{n} нормал векторнинг асосини бундай сиртда ётувчи исталган ёпик L контур бўйлаб узлуксиз кўчирилса, дастлабки нуктага қайтганда \vec{n} нинг йўналиши дастлабки йўналиш билан бир хил бўлади.

Бир томонлама сиртлар учун \vec{n} нормал векторнинг бундай кўчиши дастлабки нуктага қайтилганда ($-\vec{n}$) векторга олиб келади. Маълум томони танланган σ сирт *ориентацияланган* дейилади.

11.3.3. σ^+ — бирор силлик сирт бўлиб, унда $\vec{n} = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$ йўналиш билан характерланувчи мусбат томон танланган бўлсин; $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ узлуксиз функциялар бўлсин, у ҳолда мос иккинчи тур сирт интегралли қуйидагича ифодаланadi:

$$\iint_{\sigma^+} Pdydz + Qdzdx + Rxdy = \iint_{\sigma} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma) d\sigma.$$

Бу формула биринчи ва иккинчи тур сирт интегралларини ўзаро боғлайди. Сиртнинг бошқа σ^- томонига ўтилганда бу интеграл ишорасини карама-каршисига ўзгартиради. Агар σ сирт $z = z(x, y)$ тенглама билан ошкор ҳолда берилган бўлса, у ҳолда \vec{n} нормалнинг йўналтирувчи косинуслари қуйидаги формулалар бўйича аниқланади:

$$\cos\alpha = \frac{1}{\pm|\vec{n}|} \cdot \frac{\partial z}{\partial x}, \quad \cos\beta = \frac{1}{\pm|\vec{n}|} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}, \quad \cos\gamma = \frac{1}{\pm|\vec{n}|},$$

бу ерда $|\vec{n}| = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}$ ва ишора танлаш сирт томони

билан мувофиқлашган бўлиши керак.

Агар σ сирт тенгламаси $F(x, y, z) = 0$ ошкормас ҳолда берилган бўлса, бу сирт нормали \vec{n} нинг йўналтирувчи косинуслари қуйидаги формулалар бўйича аниқланади:

$$\cos\alpha = \frac{1}{D} \cdot \frac{\partial F}{\partial x}, \quad \cos\beta = \frac{1}{D} \cdot \frac{\partial F}{\partial y}, \quad \cos\gamma = \frac{1}{D} \cdot \frac{\partial F}{\partial z},$$

бу ерда $D = \pm \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^2}$ ва илдиз олдидаги ишорани танлаш сирт томони билан мувофиқлаштирилиши керак.

Иккинчи тур сирт интегралли, шунингдек, *координаталар бўйича сирт интегралли* деб ҳам аталади.

Иккинчи тур сирт интегралини ҳисоблашни бевосита икки ўлчовли интегрални ҳисоблашга келтириш мумкин.

Агар σ сирт $z = z(x, y)$ тенгламага эга бўлса, у ҳолда иккинчи тур сирт интегралли қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$\iint_{\sigma} R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_{\sigma_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy,$$

бу ерда σ_{xy} сирт σ нинг Oxy текисликка проекцияси.

\pm ишоралар сиртнинг иккита турли томонларига мос келади; бунда «+» ишора танланган томонда $\cos\gamma > 0$ бўлганда, «-» эса $\cos\gamma < 0$ бўлганда олинади.

σ сирт $y = y(x, z)$ ёки $x = x(y, z)$ тенгламалар билан берилган

ҳолларда қолган интеграллар ҳам худди юқоридагидек ҳисобланади:

$$\iint_{\sigma} Q(x, y, z) dz dx = \pm \iint_{\sigma_{xz}} Q(x, y(x, z), z) dz dx,$$

бу ерда σ_{xz} — сирт σ нинг Oxz текисликка проекцияси, «+» ишора танланган томонда $\cos\beta > 0$ бўлганда, «-» ишора эса $\cos\beta < 0$ бўлганда олинади;

$$\iint_{\sigma} P(x, y, z) dy dz = \pm \iint_{\sigma_{yz}} P(x(y, z), y, z) dy dz,$$

бу ерда σ_{yz} — сирт σ нинг Oyz текисликка проекцияси, «+» ишора танланган томонда $\cos\alpha > 0$ бўлганда, «-» ишора эса $\cos\alpha < 0$ бўлганда олинади.

2-мисол. Ушбу интегрални ҳисобланг:

$$I = \iint_{\sigma} z dx dy + x dx dz + y dy dz,$$

бу ерда σ $x + y + z = 1$ текисликнинг координата текисликлари билан кесишишидан ҳосил бўлган учбурчак; сиртнинг танланган томонида нормаль Oz ўқи билан ўткир бурчак ташкил этади.


Ечиш. Шаклни чизамиз ва интеграллаш томонини \vec{n} нормаль ёрдамида танлашни кўрсатамиз (61-шакл).

$z = 1 - x + y$ сирт тенгламасига эгамиз, $\frac{\partial z}{\partial x} = -1$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 1$, $\cos\gamma > 0$, шунинг учун

$$\begin{aligned} \cos\alpha &= \frac{-1}{\sqrt{1+1+1}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}}; \quad \cos\beta = \frac{1}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \end{aligned}$$

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Берилган интегрални ҳисоблаш учун қуйидаги формулани ҳосил қиламиз:



61-шакл

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\sigma^+} z dx dy + x dx dz + y dy dz = \iint_{\sigma} \left(y \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} - x \frac{1}{\sqrt{3}} + z \frac{1}{\sqrt{3}} \right) d\sigma = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\sigma} ((y-x) + z) d\sigma = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\sigma_{xy}} (y-x + (1-x+y)) \sqrt{1+1+1} dx dy = \\ &= \iint_{\sigma_{xy}} (2y - 2x + 1) dx dy, \text{ бу ерда } \sigma_{xy} \text{ сирт } (\sigma ABC) \text{ нинг } Oxy \end{aligned}$$

текисликка проекцияси (ΔAOC) - Икки ўлчовли интегралда чегараларни қўйиб чиқамиз:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\sigma_{xy}} (2y - 2x + 1) dx dy = \int_0^1 dx \int_{x-1}^0 (2y - 2x + 1) dy = \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 (2y - 2x + 1)^2 \Big|_{x-1}^0 dx = \frac{1}{4} \int_0^1 ((1 - 2x)^2 - 1) dx = \\ &= \left(-\frac{1}{8} \frac{(1 - 2x)^3}{3} - \frac{x}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{24} - \frac{1}{4} + \frac{1}{24} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

3-дасрхони топириги

1. $\iint_{\sigma} \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$ интегрални ҳисобланг, бу ерда σ сирт $9x^2 + 9y^2 = 16z^2$ конус сиртининг $z=0$ ва $z=3$ текисликлар орасидаги қисми. Ж: $\frac{160\pi}{3}$.

2. $\iint_{\sigma} xyz d\sigma$ интегрални ҳисобланг, бу ерда σ сирт $x + y + z = 1$ текисликнинг биринчи октантда жойлашган қисми. Ж: $\frac{\sqrt{3}}{120}$.

3. $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ яримсферанинг массасини ҳисобланг. Унинг ҳар бир нуктасидаги сиртий зичлиги $\gamma = x^2 y^2$ га тенг деб олинг. Ж: $\frac{128\pi}{15}$ масса бирл.

4. $\iint_{\sigma} yz dx dy + xz dy dz + xy dx dz$ интегрални ҳисобланг, бу ерда σ — биринчи октантда жойлашган ҳамда $x^2 + y^2 = R^2$ цилиндр ва $x=0$, $y=0$, $z=0$, $z=R$ текисликлардан тузилган сиртнинг ташки томони. Ж: $R^3 \left(\frac{2}{3} + \frac{\pi}{8} \right)$.

5. $\iint_{\sigma} x dy dz + z^3 dx dy$ интегрални ҳисобланг, бу ерда σ — $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ сферанинг ташки томони. Ж: $\frac{32\pi}{15}$.

3-мустақил иш

1. $\iint_{\sigma} (z + 2x + \frac{4}{3}y) d\sigma$ интегрални ҳисобланг, бу ерда σ — $6x + 4y + 3z - 12 = 0$ текисликнинг биринчи октантда ётувчи қисми. Ж: $\frac{4}{\sqrt{61}}$.

$$2. \iint_{\sigma} x^2 y^2 d\sigma \text{ интегрални хисобланг, бу ерда } \sigma \quad z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

яримсфера. Ж: $\frac{2\pi R}{15}$.

$$3. \iint_{\sigma} (y + 2z) dx dy \text{ интегрални хисобланг, бу ерда } \sigma \text{ — биринчи}$$

октантда жойлашган $6x + 3y + 2z = 6$ текисликнинг юқориги қисми.

Ж: $\frac{3}{8}$.

$$4. \iint_{\sigma} z dy dz + (3y - x) dx dz - z dx dy \text{ интегрални хисобланг, бу ер}$$

да σ — $z = 0$, $x^2 + y^2 = 1$, $z = x^2 + y^2 + 2$ сиртлар билан чегараланган жисм сиртининг ташқи томони. Ж: 5л.

10- назорат иши

1. Интеграллаш тартибини ўзгартиринг:

$$1.1. \int_0^2 dx \int_{4-2x^2}^{4-x^2} f(x, y) dy.$$

$$1.2. \int_0^2 dy \int_{y^2}^{y^2+2} f(x, y) dx.$$

$$1.3. \int_0^3 dx \int_{\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{25-x^2}} f(x, y) dy.$$

$$1.4. \int_0^4 dx \int_{1-\frac{1}{2}x}^{\frac{3-1}{2}x^2} f(x, y) dy.$$

$$1.5. \int_0^4 dy \int_{\frac{1}{2}y+1}^{\frac{3}{2}y+4} f(x, y) dx.$$

$$1.6. \int_0^1 dy \int_{2y+1}^{4-y^2} f(x, y) dx.$$

$$1.7. \int_0^4 dy \int_{\frac{3}{2}\sqrt{y}}^{\sqrt{25-y^2}} f(x, y) dx.$$

$$1.8. \int_0^2 dx \int_{\frac{1}{4}x^2}^{2\sqrt{x}} f(x, y) dy.$$

$$1.9. \int_0^4 dy \int_{\frac{1}{2}y+1}^{7-y} f(x, y) dx.$$

$$1.10. \int_0^4 dx \int_0^{\sqrt{25-x^2}} f(x, y) dy.$$

$$1.11. \int_0^1 dx \int_{2x^2}^{3-x} f(x, y) dy.$$

$$1.12. \int_0^{\frac{3}{2}} dy \int_{2y^2}^{y+3} f(x, y) dx.$$

$$1.13. \int_{-1}^0 dx \int_{2x^2}^{x+3} f(x, y) dy.$$

$$1.14. \int_0^1 dy \int_{2y^2}^{3-y} f(x, y) dx.$$

$$1.15. \int_{-\frac{1}{2}}^0 dx \int_{2x^2}^{3-x} f(x, y) dy.$$

$$1.16. \int_0^1 dy \int_{-\frac{1}{4}}^{\sqrt{1+y^2}} f(x, y) dx$$

$$1.17. \int_0^4 dx \int_{\frac{1}{x}}^{\sqrt{25-x^2}} f(x, y) dy.$$

$$1.18. \int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{9+y^2}}^{\frac{5}{1-y}} f(x, y) dx.$$

$$1.19. \int_0^1 dx \int_{-1}^{x^2+1} f(x, y) dy.$$

$$1.20. \int_0^4 dy \int_{\frac{3}{4}y}^{\sqrt{25-y^2}} f(x, y) dx.$$

$$1.21. \int_0^4 dx \int_0^{\sqrt{25-x^2}} f(x, y) dy.$$

$$1.22. \int_0^4 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy.$$

$$1.23. \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy.$$

$$1.24. \int_1^2 dy \int_0^{y^2} f(x, y) dx.$$

$$1.25. \int_1^2 dy \int_0^{2y} f(x, y) dx.$$

$$1.26. \int_0^1 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx.$$

$$1.27. \int_0^2 dx \int_0^{3-x} f(x, y) dy.$$

$$1.28. \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx.$$

$$1.29. \int_0^1 dx \int_0^{x^2+1} f(x, y) dy.$$

$$1.30. \int_0^1 dx \int_0^{4-x^2} f(x, y) dy.$$

2. Берилган чизиклар билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг:

$$2.1. \quad y = \frac{3}{x}, \quad y = 4e^x, \\ y = 3, \quad y = 4.$$

$$2.2. \quad x = 8 - y^2, \\ x = -2y.$$

$$2.3. \quad y^2 - 2y + x^2 = 0, \\ y^2 - 4y + x^2 = 0, \\ y = x, \quad x = 0.$$

$$2.4. \quad x^2 - 4x + y^2 = 0, \\ x^2 - 8x + y^2 = 0, \\ y = 0, \quad y = \frac{x}{\sqrt{3}}.$$

$$2.5. \quad y^2 - 6y + x^2 = 0,$$

$$2.6. \quad y = \frac{3}{x}, \quad y = 8e^x. \\ y = 3, \quad y = 8.$$

$$2.7. \begin{cases} y^2 - 8y + x^2 = 0, \\ y^2 - 10y + x^2 = 0, \\ y = \frac{x}{\sqrt{3}}, y = \sqrt{3}x. \end{cases}$$

$$2.9. \begin{cases} y^2 - 4y + x^2 = 0, \\ y^2 - 6y + x^2 = 0, \\ y = x, x = 0. \end{cases}$$

$$2.11. \begin{cases} y^2 - 6y + x^2 = 0, \\ y^2 - 10y + x^2 = 0, \\ y = x, x = 0. \end{cases}$$

$$2.13. \begin{cases} x^2 - 2x + y^2 = 0, \\ x^2 - 6x + y^2 = 0, \\ y = \frac{x}{\sqrt{3}}, y = \sqrt{3}x. \end{cases}$$

$$2.15. \begin{cases} x^2 - 2x + y^2 = 0, \\ x^2 - 8x + y^2 = 0, \\ y = \frac{x}{\sqrt{3}}, y = \sqrt{3}x. \end{cases}$$

$$2.17. \begin{cases} x^2 - 2x + y^2 = 0, \\ x^2 - 4x + y^2 = 0, \\ y = 0, y = \frac{x}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

$$2.19. \begin{cases} x^2 - 2x + y^2 = 0, \\ x^2 - 6x + y^2 = 0, \\ y = 0, y = \frac{x}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

$$2.21. \begin{cases} x^2 - 2x + y^2 = 0, \\ x^2 - 6x + y^2 = 0, \\ y = 0, y = x. \end{cases}$$

$$2.23. \begin{cases} y^2 - 6y + x^2 = 0, \\ y^2 - 8y + x^2 = 0, \\ y = x, x = 0. \end{cases}$$

$$2.25. \begin{cases} y^2 - 4y + x^2 = 0, \\ y^2 - 8y + x^2 = 0, \\ y = x, x = 0. \end{cases}$$

$$2.27. \begin{cases} y^2 - 4y + x^2 = 0, \\ y^2 - 8y + x^2 = 0, \\ y = \sqrt{3}x, x = 0. \end{cases}$$

$$2.29. \begin{cases} y^2 - 2y + x^2 = 0, \\ y^2 - 10y + x^2 = 0, \\ y = \frac{x}{\sqrt{3}}, x = 0. \end{cases}$$

$$2.8. \begin{cases} y = \frac{\sqrt{x}}{2}, y = \frac{1}{2x}, \\ x = 16. \end{cases}$$

$$2.10. \begin{cases} x = 5 - y^2, \\ x = -4y. \end{cases}$$

$$2.12. \begin{cases} y = \frac{3}{2} \sqrt{x}, \\ y = \frac{3}{2x}, x = 9. \end{cases}$$

$$2.14. \begin{cases} y = 3 \sqrt{x}, y = \frac{3}{x}, \\ x = 4. \end{cases}$$

$$2.16. \begin{cases} y = \frac{2}{x}, y = 5e^x, \\ y = 2, y = 5. \end{cases}$$

$$2.18. \begin{cases} y = 32 - x^2, \\ y = -4x. \end{cases}$$

$$2.20. \begin{cases} y = 20 - x^2, \\ y = -8x. \end{cases}$$

$$2.22. \begin{cases} y = \frac{25}{4} - x^2, \\ y = x - \frac{5}{2}. \end{cases}$$

$$2.24. \begin{cases} y = \sqrt{x}, y = \frac{1}{x}, \\ x = 16. \end{cases}$$

$$2.26. \begin{cases} y = \frac{2}{x}, y = 7e^x, \\ y = 2, y = 7. \end{cases}$$

$$2.28. \begin{cases} x = 27 - y^2, \\ x = -6y. \end{cases}$$

$$2.30. \begin{cases} y = 11 - x^2, \\ y = -10x. \end{cases}$$

3. Сиртий зичлиги γ маълум бўлса, берилган эгри чизиклар билан чегараланган D пластинканинг массасини топинг:

- 3.1. $x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 = 4,$
 $x = 0, y = 0 (x \geq 0, y \geq 0),$
 $\gamma = \frac{x+y}{x^2+y^2}.$
- 3.2. $x = 1, y = 0,$
 $y^2 = 4x (y \geq 0),$
 $\gamma = 7x^2 + y.$
- 3.3. $x^2 + y^2 = 9, x^2 + y^2 = 16,$
 $x = 0, y = 0 (x \geq 0, y \geq 0),$
 $\gamma = 2(x^2 + y^2).$
- 3.4. $y^2 = 4x, x = 1,$
 $y = 0 (y \geq 0),$
 $\gamma = \frac{7x^2}{2} + 5y.$
- 3.5. $x = 2, y = 0,$
 $y^2 = 2x (y \geq 0),$
 $\gamma = \frac{7x^2}{8} + 2y.$
- 3.6. $x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 = 16,$
 $x = 0, y = 0 (x \geq 0, y \geq 0),$
 $\gamma = \frac{x+y}{x^2+y^2}.$
- 3.7. $x = 2, y = 0,$
 $y^2 = \frac{x}{2} (y \geq 0),$
 $\gamma = \frac{7x^2}{2} + 6y.$
- 3.8. $x^2 + y^2 = 4, x^2 + y^2 = 25,$
 $x = 0, y = 0 (x \geq 0, y \leq 0),$
 $\gamma = \frac{2x-3y}{x^2+y^2}.$
- 3.9. $x = 1, y = 0,$
 $y^2 = 4x (y \geq 0),$
 $\gamma = x + 3y^2.$
- 3.10. $x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 = 9,$
 $x = 0, y = 0 (x \geq 0, y \leq 0)$
 $\gamma = \frac{x-y}{x^2+y^2}.$
- 3.11. $x = 1, y = 0, y^2 = x,$
 $(y \geq 0), \gamma = 3x + 6y^2.$
- 3.12. $x^2 + y^2 = 9, x^2 + y^2 = 25,$
 $x = 0, y = 0 (x \leq 0, y \leq 0),$
 $\gamma = \frac{2y-x}{x^2+y^2}.$
- 3.13. $x = 2, y = 0, y^2 = \frac{x}{2}$
 $(y \geq 0), \gamma = 2x + 3y^2.$
- 3.14. $x^2 + y^2 = 4, x^2 + y^2 = 16,$
 $x = 0, y = 0 (x \leq 0, y \geq 0),$
 $\gamma = \frac{2y-3x}{x^2+y^2}.$
- 3.15. $x = \frac{1}{2}, y = 0,$
 $y^2 = 8x (y \geq 0),$
 $\gamma = 7x + 3y^2.$
- 3.16. $x^2 + y^2 = 9, x^2 + y^2 = 16,$
 $x = 0, y = 0 (x \leq 0, y \geq 0),$
 $\gamma = \frac{2y-5x}{x^2+y^2}.$
- 3.17. $x = 1, y = 0,$
 $y^2 = 4x (y \geq 0),$
 $\gamma = 7x^2 + 2y.$
- 3.18. $x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 = 16,$
 $x = 0, y = 0 (x \geq 0, y \geq 0),$
 $\gamma = \frac{x+3y}{x^2+y^2}.$
- 3.19. $x = 2, y^2 = 2x,$
 $y = 0 (y \geq 0),$
 $\gamma = \frac{7x^2}{4} + \frac{y}{2}.$
- 3.20. $x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 = 4,$
 $x = 0, y = 0 (x \geq 0, y \geq 0),$
 $\gamma = \frac{x+2y}{x^2+y^2}.$

$$3.21. \quad x=2, y=0, \\ y^2=2x \quad (y \geq 0), \\ \gamma = \frac{7x^2}{4} + y.$$

$$3.23. \quad x=2, y=0, \\ y^2 = \frac{x}{2} \quad (y \geq 0), \\ \gamma = \frac{7x^2}{2} + 8y.$$

$$3.25. \quad x=1, y=0, \\ y^2=4x \quad (y \geq 0), \\ \gamma = 6x + 3y^2.$$

$$3.27. \quad x=2, y=0, \\ y^2 = \frac{x}{2} \quad (y \geq 0), \\ \gamma = 4x + 6y^2.$$

$$3.29. \quad x = \frac{1}{2}, y=0, \\ y^2 = 2x \quad (y \geq 0), \\ \gamma = 4x + 9y^2.$$

$$3.22. \quad x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y^2 = 9, \\ x=0, y=0 \quad (x \geq 0, y \leq 0), \\ \gamma = \frac{2x-y}{x^2+y^2}.$$

$$3.24. \quad x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y^2 = 25, \\ x=0, y=0 \quad (x \geq 0, y \leq 0), \\ \gamma = \frac{x-4y}{x^2+y^2}.$$

$$3.26. \quad x^2 + y^2 = 4, \quad x^2 + y^2 = 16, \\ x=0, y=0 \quad (x \geq 0, y \leq 0), \\ \gamma = \frac{3x-y}{x^2+y^2}.$$

$$3.28. \quad x^2 + y^2 = 4, \quad x^2 + y^2 = 9, \\ x=0, y=0 \quad (x \leq 0, y \geq 0), \\ \gamma = \frac{y-4x}{x^2+y^2}.$$

$$3.30. \quad x^2 + y^2 = 4, \quad x^2 + y^2 = 9, \\ x=0, y=0 \quad (x \leq 0, y \geq 0), \\ \gamma = \frac{y-2x}{x^2+y^2}.$$

4. Эгри чизикли интегралларни ҳисобланг:

$$4.1. \quad \int_L (x^2 + y^2) dl, \text{ бу ерда } L — x^2 + y^2 = 4x \text{ айлана}$$

$$4.2. \quad \int_L (4\sqrt[3]{x} - 3\sqrt[4]{y}) dl, \text{ бу ерда } L — x = \cos^4 t, y = \sin^4 t \text{ астроида}$$

нинг $A(1, 0)$ ва $B(0, 1)$ нукталар орасидаги ёйи.

$$4.3. \quad \int_L xy dl, \text{ бу ерда } L — \text{томонлари } x=1, x=-1, y=1, \\ y=-1 \text{ бўлган квадрат контури.}$$

$$4.4. \quad \int_L y^2 dl, \text{ бу ерда } L — x=t - \sin t, y=1 - \cos t \text{ циклоиданинг} \\ \text{биринчи арки.}$$

$$4.5. \quad \int_L xy dl, \text{ бу ерда } L — \text{учлари } A(2, 0), B(4, 0), C(4, 3), D(2,$$

3) дан иборат тугри тўртбурчак контури.

$$4.6. \quad \int_L y dl, \text{ бу ерда } L — y^2 = 2x \text{ параболанинг } x^2 = 2y \text{ парабола} \\ \text{кесган ёйи}$$

4.7. $\int_L \frac{dl}{x-y}$, бу ерда L — тўғри чизикнинг $A(4, 0)$, $B(6, 1)$

нукталар орасидаги кесмаси.

4.8. $\int_L (x^2 + y^2) 2dl$, бу ерда L — $r=2$ айлананинг биринчи

чораги.

4.9. $\int_L (x-y) dl$, бу ерда L — $x^2 + y^2 = 2x$ айлана.

4.10. $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dl$, бу ерда L — $x^2 + y^2 = 2x$ айлана.

4.11. $\int_L xy dl$, бу ерда L — учлари $O(0, 0)$, $A(3, 0)$, $B(3, 4)$, $D(0, 4) =$

бўлган тўғри тўртбурчак контури.

4.12. $\int_L (x^2 + y^2) dl$, бу ерда L — $x^2 + y^2 = 4$ айлана.

4.13. $\int_L \frac{dl}{\sqrt{8-x^2-y^2}}$, бу ерда L — $O(0, 0)$ ва $B(2, 2)$ нукталарни

туташирувчи тўғри чизик кесмаси.

4.14. $\int_L (4\sqrt[3]{x} - 3\sqrt{y}) dl$, бу ерда L — $A(-1, 0)$ ва $B(0, 1)$ нукта-

ларни туташирувчи тўғри чизик кесмаси.

4.15. $\int_L \frac{dl}{x-y}$, бу ерда L — $A(0, 4)$ ва $B(4, 0)$ нукталар орасида

жойлашган тўғри чизик кесмаси.

4.16. $\int_L \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} dl$, бу ерда L — $r = 2(1 + \cos\varphi)$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ кар-

дионда ёйи.

4.17. $\int_L y dl$, бу ерда L — $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$ астроиданинг $A(1, 0)$

ва $B(0, 1)$ нукталар орасидаги ёйи.

4.18. $\int_L y dl$, бу ерда L — $y^2 = \frac{2}{3}x$ параболанинг $O(0, 0)$ ва

$A\left(\frac{\sqrt{35}}{6}, \frac{\sqrt{35}}{3}\right)$ нукталар орасидаги ёйи.

4.19. $\int_L (4\sqrt[3]{x} - 3\sqrt{y}) dl$, бу ерда L — $A(1, 0)$ ва $B(0, 1)$ нукталар

орасидаги тўғри чизик кесмаси.

4.20. $\int_L \arctg \frac{y}{x} dl$, бу ерда L — $r = (1 + \cos\varphi)$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ кардио-

ида ёйи.

4.21. $\int_L xy dl$, бу ерда L — учлари $O(0, 0)$, $A(5, 0)$, $B(5, 3)$, $C(0, 3)$

бўлган тўғри тўртбурчак контури.

4.22. $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dl$, бу ерда L — $x^2 + y^2 = 2y$ айлана.

4.23. $\int_L (x + y) dl$, бу ерда L — $r^2 = \cos 2\varphi$, $-\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ Бернул-

ли лемнискатасининг ёйи.

4.24. $\int_L (x + y) dl$, бу ерда L — учлари $O(0, 0)$, $A(-1, 0)$,

$B(0, 1)$ бўлган учбурчак контури.

4.25. $\int_L (x^2 + y^2) dl$, бу ерда L — $r = 4$ айлананинг биринчи чораги.

4.26. $\int_L (x + y) dl$, бу ерда L — учлари $A(1, 0)$, $B(0, 1)$, $O(0, 0)$ бўл-

ган учбурчак контури.

4.27. $\int_L xy dl$, бу ерда L — учлари $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B(4, 2)$, $C(0, 2)$

бўлган тўғри тўртбурчак контури.

4.28. $\int_L \frac{(y^2 - x^2)xy}{(x^2 + y^2)} dl$, бу ерда L — $r = 9 \sin 2\varphi$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ эгри чи-

зик ёйи.

4.29. $\int_L \frac{dl}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4}}$, бу ерда L — $O(0, 0)$ ва $A(1, 2)$ нукталарни

туташирувчи тўғри чизик кесмаси.

4.30. $\int_L \sqrt{2y} dl$, бу ерда L — $x = 2(t - \sin t)$, $y = 2(1 - \cos t)$ циклои-

данинг биринчи арки.

5. Эгри чизикли интегрални ҳисобланг:

5.1. $\int_{AB} (x^2 - 2xy) dx + (y^2 - 2xy) dy$, бу ерда AB — $y = x^2$ парабо-

ланинг $A(-1, 1)$ дан $B(1, 1)$ гача ёйи.

5.2. $\int_{AB} \frac{x^2 dy - y^2 dx}{3\sqrt{x^5} + \sqrt[3]{y^5}}$, бу ерда AB — $x = 2\cos^3 t$, $y = 2\sin^3 t$ астрои-

данинг $A(2, 0)$ дан $B(0, 2)$ нуктагача ёйи.

5.3. $\int_{AB} (x^2 + y^2) dx + 2xy dy$, бу ерда AB — $y + x^3$ кубик парабола-

нинг $A(0, 0)$ дан $B(1, 1)$ нуктагача ёйи.

- 5.4. $\oint_L (x+2y)dx + (x-y)dy$, бу ерда $L - x=2\cos t, y=2\sin t$ айлана (айланиб ўтиш мусбат).
- 5.5. $\oint_L (x^2y-x)dx + (y^2x-2y)dy$, бу ерда $L - x=3\cos t, y=2\sin t$ эллипс ёйи (айланиб ўтиш мусбат).
- 5.6. $\int_L (xy-1)dx + x^2ydy$, бу ерда $L - x=\cos t, y=2\sin t$ эллипсининг $A(1, 0)$ нуктадан $B(0, 2)$ нуктагача ёйи.
- 5.7. $\int_{OBA} 2xydx - x^2dy$, бу ерда $OBA - O(0, 0), B(2, 0), A(2, 1)$ нукталарни туташтирувчи синик чизик.
- 5.8. $\int_{AB} (x^2-y^2)dx + xydy$, бу ерда $AB - A(1, 1), B(3, 4)$ нукталарни туташтирувчи тўғри чизик кесмаси.
- 5.9. $\int_L \cos y dx - \sin x dy$, бу ерда $L - AB$ тўғри чизик кесмаси $A(2\pi, -2\pi), B(-2\pi; 2\pi)$.
- 5.10. $\int_L \frac{ydx + xdy}{x^2 + y^2}$, бу ерда $L - AB$ тўғри чизик кесмаси $A(1, 2), B(3, 6)$.
- 5.11. $\int_L xydx + (y-x)dy$, бу ерда $L - y=x^3$ кубик параболанинг $A(0, 0)$ нуктадан $B(1, 1)$ нуктагача ёйи.
- 5.12. $\int_L (x^2+y^2)dx + (x+y^2)dy$, бу ерда $L - ABC$ синик чизик $A(1, 2), B(3, -2), C(3, 5)$.
- 5.13. $\int_L y^2dx + x^2dy$, бу ерда $L - x=acost, y=bsint$ эллипсининг соат мили бўйича айланиб ўтилган юкори ярми.
- 5.14. $\int_L (xy-y^2)dx + xdy$, бу ерда $L - y=2\sqrt{x}$ параболанинг $O(0, 0)$ нуктадан $B(1, 2)$ нуктагача ёйи.
- 5.15. $\int_L xdx + xydy$, бу ерда $L - x^2+y^2=2x$ айлананинг контурни мусбат айланиб чиқкандаги юкориги ярми.
- 5.16. $\int_L (x-y)dx + dy$, бу ерда $L - x^2+y^2=R^2$ айлананинг контурни мусбат йўналишда айланиб чиқкандаги юкориги ярми.
- 5.17. $\oint_L (x^2-y)dx$, бу ерда L контур $x=0, y=0, x=1, y=2$ тўғри чизиклар ҳосил қилган тўғри тўртбурчак (контурни айланиб ўтиш йўналиши мусбат).

5.18. $\int_L 4x \sin^2 y dx + y \cos 2x dy$, бу ерда L — $O(0, 0)$ ва $B(3, 6)$

нукталарни туташтирувчи тўғри чизик кесмаси.

5.19. $\oint_L y dx - x dy$, бу ерда L — $x = 6 \cos t$, $y = 4 \sin t$ эллипсининг контурни айланиб чиқиш йўналиши мусбат бўлгандаги ёйи.

5.20. $\int_L 2xy dx - x^2 dy$, бу ерда L — $x = 2y^2$ параболанинг $O(0, 0)$ нуктадан $A(2, 1)$ нуктагача ёйи.

5.21. $\int_L (x, y - x) dx + \frac{1}{2} x^2 dy$, бу ерда L — $y^2 = 4x$ параболанинг $A(0, 0)$ нуктадан $B(1, 2)$ нуктагача ёйи.

5.22. $\oint_L (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy$, бу ерда L — учлари $A(0, 0)$, $B(1, 0)$, $C(0, 1)$ бўлган учбурчак контури (контурни айланиб чиқиш йўналиши мусбат).

5.23. $\int_L (xy - x) dx + \frac{x^2}{2} dy$, бу ерда L — ABO синик чизик: $O(0, 0)$, $A(1, 2)$, $B(\frac{1}{2}, 3)$; контурни айланиб чиқиш йўналиши мусбат.

5.24. $\int_L (xy - y^2) dx + x dy$, бу ерда L — $O(0, 0)$ нуктадан $A(1, 2)$ нуктагача тўғри чизик кесмаси.

5.25. $\int_L x dy - y dx$, бу ерда L — $y = x^3$ кубик параболанинг $O(0, 0)$ нуктадан $A(2, 8)$ нуктагача ёйи.

5.26. $\int_L 2xy dx - x^2 dy$, бу ерда L — $y = \frac{x^2}{4}$ параболанинг $A(0, 0)$ нуктадан $B(2, 1)$ нуктагача ёйи (бўлаги).

5.27. $\int_L (xy - x) dx + \frac{x^2}{2} dy$, бу ерда L — $y = 4x^2$ параболанинг $O(0, 0)$ нуктадан $A(1, 4)$ нуктагача ёйи.

5.28. $\int_L (x + y) dx + (x - y) dy$, бу ерда L — $y = x^2$ параболанинг $A(-1, 1)$ нуктадан $B(1, 1)$ нуктагача ёйи.

5.29. $\oint_L x dy - y dx$, бу ерда L — учлари $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$, $C(0, 1)$ нукталарда бўлган учбурчак контури (контурни айланиб ўтиш йўналиши мусбат).

5.30. $\int_L (x^2 + y) dx + (x + y^2) dy$, бу ерда L — ABC синик чизик: $A(2, 0)$, $B(5, 3)$, $C(5, 0)$.

6. Берилган ифодалар $u(x, y)$ функциянинг тулик дифференциали эканлигини кўрсатинг. Эгри чизикли интеграл ёрдамида $u(x, y)$ функцияни топинг:

$$6.1. (10xy^3 + 12x^3 + 6) dx + (15x^2y - 5) y dy.$$

$$6.2. (y^2 e^{xy^2} + 6x - 8) dx + (2xy e^{xy^2} - 8y) dy.$$

$$6.3. (\cos x \cdot \cos y + 6x + 3) dx + (18y^2 - \sin x \cdot \sin y) dy.$$

$$6.4. \left(\sin x + \frac{\cos x \cos y}{\sin^2 x} \right) dx + \left(\frac{\sin y}{\sin x} - \cos y \right) dy.$$

$$6.5. \left(\frac{1}{y-1} - \frac{y}{(x-1)^2} - 1 \right) dx + \left(\frac{1}{x-1} - \frac{x}{(y-1)^2} + 2y \right) dy$$

$$6.6. \left(\frac{y}{1+x^2y^2} - 1 \right) dx + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} - 10 \right) dy.$$

$$6.7. \left(\frac{1}{x-1} + \frac{\cos x}{y-1} + 3x^2 \right) dx + \frac{1 - \sin x}{(y-1)^2} dy.$$

$$6.8. \left(2 \cos 2x \cos 3y - \frac{1}{x} \right) dx + \left(\frac{2}{y} - 3 \sin 2x \sin 3y \right) dy.$$

$$6.9. \left(e^{-x} - \frac{2}{x^3 y} \right) dx + \left(\sin 3y - \frac{1}{x^2 y^2} \right) dy.$$

$$6.10. (xy e^{x^2 y} + \cos 2x + x^2) dx + \left(\frac{x^2}{2} e^{x^2 y} + y \right) dy.$$

$$6.11. \left(\frac{1}{x+y} + 2 \right) dx + \left(\frac{1}{x+y} - 3 \right) dy.$$

$$6.12. (x + y \cdot \sin^2 y) dx + (1 + x \sin^2 y + xy \sin 2y) dy.$$

$$6.13. \frac{1-2y}{x^2 y} dx + \frac{1-x}{xy^2} dy.$$

$$6.14. \left(e^{-x} - \frac{2}{yx^3} \right) dx + \left(\sin 3y - \frac{1}{x^2 y^2} \right) dy.$$

$$6.15. \left(2xy - \frac{1}{x^2} \right) dx + \left(x^2 - \frac{2}{y^3} \right) dy.$$

$$6.16. \left(\frac{1}{x-1} + \frac{\cos x}{y-1} \right) dx + \frac{1 - \sin x}{(y-1)^2} dy.$$

$$6.17. \left(\ln y + \frac{y}{x} - x \right) dx + \left(\ln x + \frac{x}{y} + 1 \right) dy.$$

$$6.18. \left(2 \cos 2x \cdot \cos 3y - \frac{1}{x} \right) dx - \left(\frac{2}{y} - 3 \sin 2x \cdot \sin 3y \right) dy.$$

$$6.19. \left(\frac{2}{x^2} + \cos y \right) dx + (y - x \sin 2y) dy.$$

$$6.20. \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y} \right) dx + \frac{1-x}{y^2} dy = 0.$$

- 6.21. $(\sin^2 y - y \cdot \sin 2x) dx + (x \sin 2y + \cos^2 x + 1) dy$.
- 6.22. $\left(\frac{y}{x} + \ln y + 2x\right) dx + \left(\ln x + \frac{x}{y} + 1\right) dy$.
- 6.23. $\left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} + x^2\right) dx + \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}} + y\right) dy$.
- 6.24. $\left(\frac{y}{1+x^2y^2} - 1\right) dx + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} - 10\right) dy$.
- 6.25. $\frac{1-y}{x^2y} dx + \frac{1-2x}{y^2x} dy$.
- 6.26. $\left(\frac{y^2}{(x+y)^2} - \frac{1}{x}\right) dx + \left(\frac{x^2}{(x+y)^2} + \frac{1}{y}\right) dy$.
- 6.27. $\left(x - \frac{y}{x^2+y^2}\right) dx + \left(\frac{x}{x^2+y^2} - y\right) dy$.
- 6.28. $(y \cos xy + 2x - 3y) dx + (x \cos xy - 3x + 4y) dy$.
- 6.29. $(5y + \cos x + 6xy^2) dx + (5x + 6x^2y) dy$.
- 6.30. $(y - \sin x) dx + (x - 2y \cos y^2) dy$.

ВЕКТОР АНАЛИЗИ

1- §. Скаляр майдон. Сатҳ чизиклари ва сиртлари.
Йўналиш бўйича ҳосила. Градиент. Вектор майдон.
Вектор чизиклар

12.1.1. Агар фазодаги бирор D соҳанинг ҳар бир $M = M(x, y, z)$ нуктасида $u = u(M) = f(x, y, z)$ скаляр функция берилган бўлса, у ҳолда бу соҳада *скаляр майдон берилган* дейилади. $u = f(x, y, z)$ функция *майдон функцияси* дейилади.

Агар D соҳа текисликка тегишли бўлса, скаляр майдон *ясси майдон* дейилади.

Скаляр майдоннинг $u(x, y, z) = C$ (C — ўзгармас сон) тенглама билан аниқланган қисми *сатҳ сирти* дейилади. $u(x, y) = C$ тенглама ясси скаляр майдоннинг *сатҳ чизигини* аниқлайди.

Агар $\vec{l} = \cos\alpha \cdot \vec{i} + \cos\beta \cdot \vec{j} + \cos\gamma \cdot \vec{k}$ — бирор l йўналишдаги бирлик вектор бўлса, у ҳолда скаляр майдоннинг дифференциалланувчи $u = f(x, y, z)$ функциясининг l йўналиш бўйича ҳосиласи $\frac{\partial u}{\partial l}$ куйидаги

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos\gamma$$

формула билан аниқланади.

Скаляр майдон функцияси $u = f(x, y)$ бўлса, у ҳолда

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos\beta,$$

бу ерда $\vec{l} = \cos\alpha \cdot \vec{i} + \cos\beta \cdot \vec{j}$, $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$.

$u = f(x, y, z)$ скаляр майдоннинг градиенти деб, куйидаги

$$\text{grad}u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$$

векторга айтилади.

$u = f(x, y, z)$ функциянинг берилган нуктадаги градиенти билан бу нуктадаги йўналиш бўйича ҳосила орасида куйидаги муносабат билан ифодаланувчи боғланиш мавжуд:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \text{grad} u \cdot \vec{l} \text{ ёки } \frac{\partial u}{\partial l} = \text{пр. grad} u.$$

Градиент куйидаги хоссаларга эга:

- а) $\text{grad}(u_1 + u_2) = \text{grad} u_1 + \text{grad} u_2$;
- б) $\text{grad} C u = C \text{grad} u$ ($C = \text{const}$);
- в) $\text{grad}(u_1 \cdot u_2) = u_1 \text{grad} u_2 + u_2 \text{grad} u_1$.

1- мисол. $u = xy^2z^3$ функция ва $M(3, 2, 1)$, $N(5, 4, 2)$ нукта берилган. Бу функциянинг M нуктадаги \overline{MN} вектор йўналиши бўйича ҳосиласини топинг.

Ечиш. u функциянинг $M(3, 2, 1)$ нуктадаги хусусий ҳосилалари:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_M = y^2 z^3 \Big|_M = 2^2 \cdot 1^3 = 4;$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_M = 2xy z^3 \Big|_M = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1^3 = 12;$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_M = 3xy^2 z^2 \Big|_M = 3 \cdot 3 \cdot 2^2 \cdot 1^2 = 36.$$

\overline{MN} вектор билан йўналиши бир хил бўлган \vec{l} бирлик вектор

$$\vec{l} = \frac{\overline{MN}}{|\overline{MN}|}$$

га тенг, бу ерда

$$\overline{MN} = (5-3)\vec{i} + (4-2)\vec{j} + (2-1)\vec{k} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k},$$

$$|\overline{MN}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = 3. \text{ Демак,}$$

$$\vec{l} = \frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}.$$

Шундай қилиб,

$$\frac{\partial u}{\partial l} = 4 \cdot \frac{2}{3} + 12 \cdot \frac{2}{3} + 36 \cdot \frac{1}{3} = \frac{68}{3}.$$

2- мисол. $u = \ln(x^2 + y^2)$ функциянинг $M(3, 4)$ нуктадаги u функция градиенти йўналишидаги ҳосиласини топинг.

Ечиш. Бу ерда \vec{l} вектор функциянинг $M(3, 4)$ нуктадаги градиенти билан бир хил йўналган, шунинг учун $\frac{\partial u}{\partial l} = |\text{grad} u|$.

$M(3, 4)$ нуктадаги хусусий ҳосилалар:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_M = \frac{2x}{x^2 + y^2} \Big|_M = \frac{6}{25}; \quad \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_M = \frac{2y}{x^2 + y^2} \Big|_M = \frac{8}{25}.$$

Демак,

$$\text{grad} u \Big|_M = \frac{6}{25}\vec{i} + \frac{8}{25}\vec{j}.$$

Шундай қилиб,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sqrt{\left(\frac{6}{25}\right)^2 + \left(\frac{8}{25}\right)^2} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}.$$

12.1.2. Агар фазодаги D соҳанинг ҳар бир $M(x, y, z)$ нуктасида $\vec{a}(M) = \{P, Q, R\}$ вектор (бу ерда $P = P(x, y, z)$, $Q = Q(x, y, z)$, $R = R(x, y, z)$ — скаляр функциялар) аниқланган бўлса, у ҳолда D соҳада вектор майдон берилган дейилади.

Вектор майдоннинг вектор чизиғи деб шундай чизиққа айтиладики, унинг ҳар бир нуктасида уринманинг йўналиши шу нуктага мос келган $\vec{a}(M)$ векторнинг йўналиши билан бир хил бўлади.

Сирт бўлагининг нукталари орқали ўтувчи ҳамма вектор чизиқлар тўплами вектор найчалари дейилади.

Вектор чизиқлари ушбу дифференциал тенгламалар системасидан аниқланади

$$\frac{dx}{P(x, y, z)} = \frac{dy}{Q(x, y, z)} = \frac{dz}{R(x, y, z)}$$

Координаталари вақтга боғлиқ бўлмаган майдон (скаляр ёки вектор) стационар ёки барқарор майдон дейилади.

3-ми с о л. $\vec{a} = -y\vec{i} + x\vec{j} + b\vec{k}$ вектор майдоннинг $M(1, 0, 0)$ нуктадан ўтадиган вектор чизиғини топинг.

Е ч и ш. $P(x, y, z) = -y$, $Q(x, y, z) = x$, $R(x, y, z) = b$ эканлигини ҳисобга олиб, вектор чизиқларнинг ушбу

$$\frac{dx}{-y} = \frac{dy}{x} = \frac{dz}{b}$$

дифференциал тенгламалар системасини ҳосил қиламиз.

Уларни ечамиз:

$$\begin{cases} \frac{dx}{-y} = \frac{dy}{x}, & \begin{cases} xdx + ydy = 0, \\ \frac{dz}{b} = \frac{dy}{x} \end{cases} \\ \frac{dy}{x} = \frac{dz}{b}, & \begin{cases} x^2 + y^2 = C_1^2, \\ \frac{dz}{b} = \frac{dy}{x} \end{cases} \end{cases}$$

ёки параметрик шаклда:

$$\begin{cases} x = C_1 \cos t, \\ y = C_1 \sin t, \\ \frac{dz}{b} = \frac{C_1 \cos t dt}{C_1 \cos t} \end{cases} \quad \begin{cases} x = C_1 \cos t, \\ y = C_1 \sin t, \\ z = bt + C_2. \end{cases}$$

Интеграллаш донмийлари вектор чизик $M(1, 0, 0)$ нуктадан утади деган шартдан топилди: $C_1=1$ ва $C_2=0$.

Шундай қилиб, $\vec{a} = -y\vec{i} + x\vec{j} + b\vec{k}$ вектор майдоннинг вектор чизиклари ўшбу $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = bt$ (винт чизик) тенгламалар билан аниқланади.

1-дарсхона топшириғи

1. Қуйидаги

а) $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$; б) $u = \frac{z}{x^2 + y^2}$

функциялар аниқтайлиган скаляр майдонларнинг сатҳ сиртлари тенгламаларини ёзинг ва уларни чизинг.

2. $z = xy$ ясси скаляр майдоннинг сатҳ чизикларини чизинг.

3. $u = \ln(3 - x^2) + xy^2z$ функциянинг $M_1(1, 3, 2)$ нуктадаги $M_2(0, 5, 0)$ нукта томон йўналиши бўйича ҳосиласини топинг. Ж: $-\frac{11}{3}$.

4. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ функциянинг $M_0(3, 4)$ нуктадаги:

а) $\vec{a} = \{1, 1\}$ вектор бўйича; б) M_0 нуктанинг радиус-вектори бўйича; в) $\vec{s} = \{4, 3\}$ вектор йўналиши бўйича ҳосиласини топинг.

Ж: а) $\frac{7\sqrt{2}}{2}$; б) 1; в) 0.

5. Агар $u = x^2yz - xy^2z + xyz^2$ бўлса, $M_0(1, 1, 1)$ нуктада $\text{grad } u$ ни топинг.

Ж: $\text{grad } u = 2\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$.

6. $u = \frac{3}{2}x^2 + 3y^2 - 2z^2$ ва $v = x^2yz$ функцияларнинг $M(2, \frac{1}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ нуктадаги градиентлари орасидаги φ бурчақни топинг. Ж: $\frac{\pi}{2}$.

7. $z = \frac{2x^2}{y}$ сиртининг $M(2, 1, 8)$ нуктадаги энг катта қутарилиш тиклигининг φ бурчақини топинг. Ж: $\text{tg } \varphi = 8\sqrt{10}$, $\varphi \approx 87^\circ 40'$.

8. Агар: а) $\vec{a} = \omega y\vec{i} + \omega x\vec{j}$, $\omega \neq 0$; б) $\vec{a} = \bar{\omega}x\vec{i} + 10y\vec{j}$; в) $\vec{a} = 4z\vec{j} - 9y\vec{k}$ бўлса, вектор майдоннинг вектор чизикларини топинг. Ж: а) $x^2 - y^2 = C_1$, $z = C_2$; б) $x^2 = C_1y$; $z = C_2$; в) $9y^2 + 4z^2 = C_1^2$, $x = C_2$.

1-мустақил иш

1. Ясси $z = 4 - x^2 - y^2$ скаляр майдоннинг сатҳ чизикларини ва $M(1, 2)$ нуктадаги $\text{grad } z$ ни ясанг.

2. $u = x + \ln(y^2 + z^2)$ функциянинг $M(2, 1, 1)$ нуктадаги $\vec{a} = -2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ вектор йўналишидаги ҳосиласини ҳисобланг. Ж: $-\frac{\sqrt{6}}{3}$.

3. $z = 5x^2 - 2xy + y^2$ сиртнинг $M(1, 1, 4)$ нуктадаги энг катта кўтарилиш тиклигининг φ бурчагини топинг.

Ж: $\operatorname{tg}\varphi = 8$, $\varphi \approx 83^\circ$.

4. Агар:

а) $\vec{a} = (x+y)\vec{i} - x\vec{j} - x\vec{k}$; б) $\vec{a} = 2x\vec{i} + 8z\vec{k}$

бўлса, вектор майдонларнинг вектор чизикларини топинг.

Ж: а) $x^2 + y^2 + z^2 = C_2$, $y - z = C_1$;

б) $z = C_1 x^4$, $y = C_2$.

2-§. Вектор майдон оқими. Остроградский теоремаси. Вектор (майдон) дивергенцияси

12.2.1. Сирт оркали ўтадиган оқимни ҳисоблаш.

Агар σ сиртнинг ҳар бир нуктасидаги нормалнинг мусбат йўналиши

$$\vec{n}^0 = \cos\alpha \vec{i} + \cos\beta \vec{j} + \cos\gamma \vec{k}$$

бирлик вектор оркали аниқланган бўлса, у ҳолда $\vec{a}(M) = \{P, Q, R\}$ вектор майдоннинг σ сирт оркали ўтувчи Π оқими деб қуйидаги иккинчи тур сирт интегралига айтилади:

$$\Pi = \iint_{\sigma} [P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy],$$

ёки

$$\Pi = \iint_{\sigma} [P(x, y, z) \cos\alpha + Q(x, y, z) \cos\beta + R(x, y, z) \cos\gamma] d\sigma$$

ёки вектор шаклда

$$\Pi = \iint_{\sigma} \vec{a} \cdot \vec{n}^0 d\sigma.$$

Агар σ — ёпиқ бўлаккли-силлик сирт бўлиб, ташки нормалнинг бирлик вектори $\vec{n}^0 = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$ бўлса, у ҳолда бу сирт оркали оқиб ўтадиган $\vec{a} = \{P, Q, R\}$ вектор оқими Π ни ушбу Остроградский — Гаусс формуласи ёрдамида ҳисоблаш мумкин:

$$\Pi = \oiint_{\sigma} (P \cos\alpha + Q \cos\beta + R \cos\gamma) d\sigma = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz,$$

бу ерда Ω — фазонинг σ сирт билан чегаралаган бўлаги.

$\vec{a}(M) = \{P, Q, R\}$ вектор майдоннинг *дивергенцияси* деб $\operatorname{div}\vec{a} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ муносабат билан аниқланган скаляр микдорга айтилади.

Остроградский — Гаусс формуласи вектор шаклида қуйидагича ёзилади:

$$\oiint_{\sigma} \vec{a} \cdot \vec{n} \cdot d\sigma = \iiint_{\Omega} \operatorname{div}\vec{a} dxdydz$$

Вектор майдони дивергенциясининг асосий хоссалари:

а) $\operatorname{div}(\vec{a} + \vec{b}) = \operatorname{div}\vec{a} + \operatorname{div}\vec{b}$;

б) $\operatorname{div}\vec{c} = 0$, агар \vec{c} — ўзгармас вектор бўлса;

в) $\operatorname{div}f\vec{a} = f\operatorname{div}\vec{a} + \vec{a}\operatorname{grad}f$,

бу ерда $f = f(x, y, z)$ — скаляр функция.

12.2.2. Сирт оркали оқиб ўтадиган оқимни ҳисоблашга мисоллар кўраимиз.

1- мисол. $\vec{a} = x\vec{i} - 2y\vec{j} + z\vec{k}$ вектор майдоннинг $x + 2y + 3z = 6 = 0$ текислигининг биринчи октантда жойлашган юқори қисми бўйича оқимни ҳисобланг.

Ечиш. Текислиkning нормал бирлик вектори $\vec{n}^0 = \left\{ \frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right\}$ бўлади. \vec{a} вектор оқимини куйидаги формула бўйича ҳисоблаймиз:

$$\Pi = \oint_{\sigma} \vec{a} \cdot \vec{n}^0 d\sigma = \frac{1}{\sqrt{14}} \iint_{\sigma} (x - 4y + 3z) d\sigma$$

Бу ерда

$$z = \frac{1}{3}(6 - x - 2y), \quad d\sigma = \sqrt{1 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2} dx dy = \frac{\sqrt{14}}{3} dx dy.$$

Шундай қилиб,

$$\begin{aligned} \Pi &= \frac{1}{3} \iint_D (x - 4y + 6 - x - 2y) dx dy = \frac{1}{3} \iint_D (6 - 6y) dx dy = \\ &= 2 \int_0^3 dy \int_0^{6-2y} (1 - y) dx = 2 \int_0^3 (1 - y)(6 - 2y) dy = 2 \int_0^3 (6 - 8y + 2y^2) dy = \\ &= 4 \int_0^3 (y^2 - 4y + 3) dy = 4 \left(\frac{1}{3}y^3 - 2y^2 + 3y \right) \Big|_0^3 = \\ &= 4 \left(\frac{27}{3} - 18 + 9 \right) = 0. \end{aligned}$$

2- мисол. $\vec{a} = xz^2\vec{i} + yx^2\vec{j} + zy^2\vec{k}$ вектор майдоннинг $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ шар сирти бўйича унинг ташки томонига оқимни ҳисобланг.

Ечиш. Сирт ёпик бўлгани учун \vec{a} вектор майдоннинг шар сирти бўйича ташки томонига оқими Π ни Остроградский — Гаусс формуласи бўйича топамиз:

$$\Pi = \oint_{\sigma} \vec{a} \cdot \vec{n}^0 d\sigma = \iiint_{\Omega} \operatorname{div}\vec{a} dx dy dz = \iiint_{\Omega} (z^2 + x^2 + y^2) dx dy dz.$$

Уч ўлчовли интегрални ҳисоблаш учун куйидаги формулалар ёрдамида сферик координаталарга ўтамиз:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta,$$

$$dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta,$$

$$0 \leq r \leq a,$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$

$$0 \leq \theta \leq \pi.$$

У ҳолда

$$\Pi = \iiint_{\Omega} r^4 \sin \theta dr d\varphi d\theta = \int_0^a r^4 dr \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{4a^5 \pi}{5}.$$

2- дарсхона топириғи

1. $\vec{a} = (x - 3z)\vec{i} + (x + 2y + z)\vec{j} + (4x + y)\vec{k}$ вектор майдоннинг $x + y + z = 2$ текисликнинг биринчи октантда ётган юқори қисми бўйича оқимини ҳисобланг. Ж: $\frac{26}{3}$.

2. $\vec{a} = 8x\vec{i} + 11y\vec{j} + 17z\vec{k}$ вектор майдоннинг $x + 2y + 3z = 1$ текисликнинг биринчи октантда жойлашган қисми бўйича оқимини ҳисобланг. Нормал Oz ўқи билан ўткир бурчак ҳосил қилади. Ж: 1.

3. $\vec{a} = (xy + z^2)\vec{i} + (yz + x^2)\vec{j} + (zx + y^2)\vec{k}$ вектор майдоннинг $M(1, 3, -5)$ нуктадаги дивергенциясини ҳисобланг. Ж: -1 .

4. $\vec{a} = (x - y)\vec{i} + (x + y)\vec{j} + z^2\vec{k}$ вектор майдоннинг $x^2 + y^2 = 1, z = 0$ ва $z = 2$ сиртлар билан чегараланган цилиндрик жисм сирти бўйича ташқи нормал йўналишида оқимини ҳисобланг. Ж: -4π .

2- мустақил иш

1. Вектор майдоннинг дивергенциясини топинг.

а) $\vec{a} \approx xy^2\vec{i} + x^2y\vec{j} + z^3\vec{k}$, $M(1, -1, 3)$ нуктада;

б) $\text{grad } u$, бу ерда $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$;

в) $\text{grad } \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

2. Вектор майдоннинг Π оқимини ҳисобланг:

а) $\vec{a} = x\vec{i} + 3y\vec{j} + 2z\vec{k}$ нинг $x + y + z = 1$ текисликнинг биринчи октантда ётган юқorigи қисми бўйича;

б) $\vec{a} = 3xi - yj - zk$ нинг $9 - z = x^2 + y^2, x = 0, y = 0, z = 0$ текисликлар билан чегараланган бирор жисм бўйича ташқи нормал йўналишида;

в) $\vec{a} = 2xi + zk$ нинг $z = 3x^2 + 2y^2, x^2 + y^2 = 4, z = 0$ сиртлар бўйича чегараланган сиртга ташқи нормал бўйича.

Ж: а) 1; б) $\frac{81\pi}{8}$; в) 20.

3- §. Вектор майдонидаги чизикли интеграл.
 Циркуляция. Вектор майдон ротори.
 Стокс теоремаси. Циркуляцияни ҳисоблаш.

$\vec{a} = \{P, Q, R\}$ векторнинг L эгри чизик бўйича *чизикли интеграл* деб бу L эгри чизик бўйича вектор майдон бажарган ишни аниқловчи ушбу эгри чизикли интегралга айтилади:

$$\int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_L \vec{a} \cdot d\vec{r}$$

Агар L контур ёпик бўлса, чизикли интеграл \vec{a} вектор майдоннинг бу контур бўйича *циркуляцияси* дейилади.

Ёпик эгри чизик L фазода бирор σ сиртни чегаралаган бўлиб, бу сиртда $\vec{a} = \{P, Q, R\}$ вектор берилган бўлсин, у ҳолда циркуляция ва сирт интегралини боғловчи ушбу *Стокс формуласи* ўринлидир:

$$\oint Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\sigma} \left(\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos\alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos\beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos\gamma \right) d\sigma,$$

бу ерда $\vec{n}^0 = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$ — интеграллаш бажарилаётган σ сирт томони нормалининг бирлик вектори, бунда σ сиртнинг шу томони бўйича L контурни айланиб ўтиш мусбат бўлиши керак.

Грин формуласи Стокс формуласининг L эгри чизик ва σ сирт *Оху* текисликда ётган ҳолдаги хусусий ҳолидир.

$\vec{a} = \{P, Q, R\}$ вектор майдоннинг *ротори* ёки *уюрмаси* деб ушбу

$$\begin{aligned} \text{rot } \vec{a} &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k} = \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \end{aligned}$$

векторга айтилади.

Вектор шаклида Стокс формуласи куйидаги кўринишда ёзилади:

$$\oint_L \vec{a} d\vec{r} = \iint_{\sigma} \vec{n}^0 \cdot \text{rot } \vec{a} d\sigma$$

Вектор майдони роторининг баъзи хоссалари:

а) $\text{rot}(\vec{a} + \vec{b}) = \text{rot } \vec{a} + \text{rot } \vec{b}$;

б) $\text{rot } c = \vec{0}$, бу ерда c — доимий (ўзгармас) вектор;

в) $\text{rot}(\varphi \vec{a}) = \varphi \text{rot } \vec{a} + \text{grad } \varphi \cdot \vec{a}$, бу ерда $\varphi = \varphi(x, y, z)$ скаляр функция.

1-мисол. $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ чизикли тезлик вектор майдонининг фазонинг ихтиёрий $M(x, y, z)$ нуктасидаги роторини топинг.

Ечиш. Чизикли тезлик вектори \vec{v} ни ҳисоблаймиз:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ x & y & z \end{vmatrix} = (\omega_y z - \omega_z y) \vec{i} + (\omega_z x - \omega_x z) \vec{j} + (\omega_x y - \omega_y x) \vec{k}$$

Демак,

$$\text{rot } \vec{v} = 2\omega_x \vec{i} + 2\omega_y \vec{j} + 2\omega_z \vec{k} = 2\vec{\omega}.$$

2-мисол. $\vec{a} = y\vec{i} + x^2\vec{j} - z\vec{k}$ вектор майдонининг $L: x^2 + y^2 = 4, z = 3$ айлана бўйича бирлик вектор \vec{k} га нисбатан айланиб ўтишнинг мусбат йўналишда циркуляциясини икки усул билан:

а) циркуляция таърифидан фойдаланиб;

б) Стокс формуласидан фойдаланиб ҳисобланг.

Ечиш. Чизма чизиб, унда нормалнинг бирлик вектор $n^0 = \vec{k}$ йўналишини ва контурни айланиш йўналишини курсатамиз (62-шакл).

а) Айлананинг параметрик тенгламалари:

$$x = 2\cos t, \quad y = 2\sin t, \quad z = 3, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Изланаётган C циркуляцияни таърифдан фойдаланиб топамиз:


$$C = \oint_n y dx + x^2 dy - z dz = \int_0^{2\pi} [2\sin t (-2\sin t dt) +$$

$$+ 4\cos^2 t \cdot 2\cos t dt - 3 \cdot 0] = 8 \int_0^{2\pi} \cos^3 t dt -$$

$$- 4 \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = 8 \int_0^{2\pi} (1 - \sin^2 t) d(\sin t) -$$

$$- 2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2t) dt = 8 \left(\sin t - \frac{1}{3} \sin^3 t \right) \Big|_0^{2\pi} -$$

$$- 2 \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} = -4\pi.$$



Шакл-62

б) Шартга кўра: $\vec{n}^0 = \vec{k}$, $\text{rot} \vec{a} = (2x-1)\vec{k}$. Сток формуласига кўра:

$$\begin{aligned} C &= \iint_{\sigma} \text{rot} \vec{a} \cdot \vec{n}^0 d\sigma = \iint_{\sigma_{xy}} (2x-1) dx dy = \iint_{\sigma_{xy}} (2r \cos \varphi - 1) r dr d\varphi = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (2r \cos \varphi - 1) r dr = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{3} r^3 \cos \varphi - \frac{1}{2} r^2 \right) \Big|_0^2 d\varphi = \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{8}{3} \cos \varphi - 2 \right) d\varphi = \left(\frac{8}{3} \sin \varphi - 2\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = -4\pi. \end{aligned}$$

(Икки ўлчовли интегрални ҳисоблашда қутб координаталарига утилди.)

3-дарсхона топшириғи

1. $\vec{a} = xyz\vec{i} + (x+y+z)\vec{j} + (x^2+y^2+z^2)\vec{k}$ вектор майдоннинг $M(1, -1, 2)$ нуктадаги роторини топинг. Ж: $\text{rot} \vec{a} = -3\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}$.

2. $\vec{a} = y\vec{i} - 2z\vec{j} + x\vec{k}$ вектор майдоннинг бир паллали $2x^2 - y^2 + z^2 = R^2$ гиперболоидни $y=x$ текислик кесишидан ҳосил бўлган эллипс бўйича циркуляциясини топинг. Натижани Стокс формуласи ёрдамида текширинг. Ж: $\pm 3\pi R^2$.

3. $\vec{a} = zy^2\vec{i} + xz^2\vec{j} + yx^2\vec{k}$ вектор майдоннинг $x=y^2+z^2$ параболоидни $x=9$ текислик билан кесишиш контури бўйича $\vec{n}^0 = \vec{i}$ ортга нисбатан мусбат айланиб ўтишдаги циркуляциясини ҳисобланг. Ж: 729 π .

4. $\vec{a} = -y\vec{i} + 2z\vec{j} + \vec{k}$ вектор майдоннинг $x^2+y^2-z^2=0$ конуснинг $z=1$ текислик билан кесишиш чизиги L бўйича $\vec{n}^0 = \vec{k}$ ортга нисбатан мусбат айланиб ўтишдаги циркуляциясини ҳисобланг. Ж: π .

3-мустақил иш

1. $\vec{a} = y\vec{i} - x\vec{j} + z\vec{k}$ вектор майдоннинг $x^2+y^2+z^2=4$ сферанинг $\sqrt{x^2+y^2}=z$ конус билан кесишиш чизиги L бўйича $\vec{n}^0 = \vec{k}$ ортга нисбатан мусбат айланиб ўтишдаги циркуляциясини ҳисобланг.

2. $\vec{a} = yz\vec{i} + 2xz\vec{j} + y^2\vec{k}$ вектор майдоннинг $z = \sqrt{25-x^2-y^2}$ ярим сферанинг $x^2+y^2=16$ цилиндр билан кесишиш чизиги L бўйича $\vec{n}^0 = \vec{k}$ ортга нисбатан мусбат йўналишда айланиб ўтишдаги циркуляциясини ҳисобланг.

3. $\vec{a} = (x-y)\vec{i} + x\vec{j} - z\vec{k}$ вектор майдоннинг $x^2+y^2=1$ цилиндрнинг $z=2$ текислик билан кесишиш чизиги L бўйича $\vec{n}^0 = \vec{k}$ бўлгандаги циркуляциясини ҳисобланг.

4-§. Потенциал майдон.

Потенциал майдондаги чизикли интеграл.

Гамильтон ва Лаплас операторлари

12.4.1. Агар фазонинг бир боғламли Ω соҳасининг ҳар бир нуктасида $\text{rot} \vec{a} = 0$ бўлса, $\vec{a} = \{P, Q, R\}$ вектор майдон Ω соҳада *потенциал ёки уюрмасиз майдон* дейилади.

$\text{rot} \text{grad} u = 0$ бўлгани учун исталган $u = u(x, y, z)$ скаляр майдоннинг градиенти ҳосил қилган вектор майдон ҳар доим потенциалдир. \vec{a} майдон Ω соҳада потенциал бўлиши учун икки марта узлуксиз дифференциалланувчи $u = u(x, y, z)$ скаляр функция мавжуд бўлиши зарур ва етарли бўлиб, унинг учун $\vec{a} = \text{grad} u$ бўлиши керак. $u = u(x, y, z)$ функция \vec{a} майдоннинг *потенциали* (ёки *потенциал функцияси*) дейилади.

$\vec{a} = \{P, Q, R\}$ потенциал майдон учун потенциални топишнинг ушбу формуласи ўриқлидир:

$$u(x, y, z) = \int_{M_0, M} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz + C,$$

бу ерда $M_0(x_0, y_0, z_0)$ — Ω соҳанинг бирорта тайин нуктаси, $M(x, y, z)$ — соҳанинг ихтиёрий нуктаси, C — ихтиёрий ўзгармас.

Бу формуладан интеграллаш йўлига боғлиқ бўлмаган иккинчи тур эгри чизикли интегрални ҳисоблаш формуласи ҳам келиб чиқади:

$$\int_{AB} P dx + Q dy + R dz = u(B) - u(A),$$

бу ерда $u(A)$ ва $u(B)$ потенциалнинг йўлнинг бошланғич A ва охири B нукталаридаги қийматлари.

Агар фазонинг Ω соҳасидаги ҳар бир нуктада $\text{div} \vec{a} = 0$ бўлса, \vec{a} вектор майдон бу соҳада *соленоидли ёки найчасимон майдон* дейилади. $\text{div} \text{rot} \vec{a} = 0$ бўлгани учун исталган \vec{a} вектор майдоннинг ротор майдони соленоидли майдон бўлади.

Агар фазонинг Ω соҳасида \vec{a} вектор майдон бир вақтнинг ўзида ҳам потенциал, ҳам соленоидли бўлса, яъни Ω соҳанинг ҳар қайси нуктасида $\text{div} \vec{a} = 0$, $\text{rot} \vec{a} = 0$ бўлса, \vec{a} вектор майдон Ω соҳада *гармоник майдон* дейилади. Гармоник майдоннинг u потенциали

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

Лаплас тенгламасининг ечимидан иборатдир. Лаплас тенгламасини капоатлантирувчи $u = u(x, y, z)$ функция *гармоник функция* дейилади.

1- мисол. $\vec{a} = \{2xy + z, x^2 - 2y, x\}$ векторнинг майдони потенциал, лекин соленоидли эмаслигини кўрсатинг. Берилган майдоннинг потенциали u ни топинг.

Ечиш. Қўйидагига эгамиз:

$P = 2xy + z, Q = x^2 - 2y, R = x$, шунинг учун:

$$\operatorname{rot} \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy + z & x^2 - 2y & x \end{vmatrix} = \\ = \vec{i}(0 - 0) - \vec{j}(1 - 1) + (2x - 2x)\vec{k} = 0, \text{ яъни } \vec{a} \text{ — потенциал майдон.} \\ \vec{a} \text{ вектор дивергенциясини топамиз:}$$

$$\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 2y - 2 + 0 \neq 0,$$

бинобарин, \vec{a} — соленоидли майдон эмас. Берилган \vec{a} майдон потенциали u ни қўйидаги формуладан аниқлаймиз:

$$u(x, y, z) = \int_{M_0, M} P dx + Q dy + R dz + C,$$

чизикли интеграл бошланғич $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ва охири $M(x, y, z)$ нуктага боғлиқ. Аниқ интегралга утиб топамиз:

$$u(x, y, z) = \int_{x_0}^x P(x, y, z) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y, z) dy + \int_{z_0}^z R(x_0, y_0, z) dz + C.$$

Мазкур ҳолда $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нукта сифатида координаталар боши $O(0, 0, 0)$ ни олиш мумкин. Шундай қилиб,

$$u(x, y, z) = \int_{OM} (2xy + z) dx + (x^2 - 2y) dy + x dz + C = \\ = \int_0^x (2xy + z) dx + \int_0^y (-2y) dy + \int_0^z 0 dz + C = (x^2 y + xz) \Big|_0^x - \\ - y^2 \Big|_0^y + C = x^2 y + xz - y^2 + C.$$

2- мисол. $\vec{a} = \{yz - xy, xz - \frac{x^2}{2} + yz^2, xy + y^2 z\}$ майдон потенциал ёки потенциал эмаслигини текширинг, унинг потенциални топинг ҳамда $A(1, 1, 1)$ ва $B(2, -2, 3)$ нукталарни туташтирувчи чизик бўйича мос чизикли интегрални ҳисобланг.

Е ч и ш. Берилишига кўра:

$$P = yz - xy, \quad Q = xz - \frac{x^2}{2} + yz^2, \quad R = xy + y^2z,$$

шунинг учун

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{a} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz - xy & xz - \frac{x^2}{2} + yz^2 & xy + y^2z \end{vmatrix} = \\ &= (x + 2yz - x - 2yz)\vec{i} + (y - y)\vec{j} + (z - x - z + x)\vec{k} = 0 \end{aligned}$$

демак, \vec{a} — потенциал майдон, бинобарин, унинг потенциали мавжуд. Уни оқдинги мисолдагига ўхшаш топамиз:

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= \int_0^x (yz - xy) dx + \int_0^y yz^2 dy + \int_0^z 0 dz + C = \\ &= \left(xyz - \frac{x^2 y}{2} \right) \Big|_0^x + \frac{1}{2} y^2 z^2 \Big|_0^y + C = xyz - \frac{x^2 y}{2} + \frac{y^2 z^2}{2} + C. \end{aligned}$$

Шундай қилиб,

$$u(x, y, z) = xyz - \frac{x^2 y}{2} + \frac{y^2 z^2}{2} + C.$$

Потенциал майдонда чизикли интеграл A ва B нукталарни туташтирувчи йўлга боғлиқ бўлмайди, шунинг учун уни

$$\int_{AB} P dx + Q dy + R dz = u(B) - u(A)$$

формула бўйича ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} &\int_{AB} (yz - xy) dx + \left(xz - \frac{x^2}{2} + yz^2 \right) dy + (xy + y^2z) dz = \\ &= u(B) - u(A) = \left(2 \cdot (-2) \cdot 3 - \frac{2^2 \cdot (-2)}{2} + \frac{(-2)^2 \cdot 3^2}{2} \right) - \\ &\quad - \left(1 \cdot 1 \cdot 1 - \frac{1^2 \cdot 1}{2} + \frac{1^2 \cdot 1^2}{2} \right) = 9. \end{aligned}$$

12.4.2. Вектор анализнинг асосий тушунчалари (градиент, дивергенция, ротор)ни *Гамильтон оператори* деб аталувчи

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \bar{i} + \frac{\partial}{\partial y} \bar{j} + \frac{\partial}{\partial z} \bar{k}$$

дифференциал оператор (символик ∇ вектор каби белгиланувчи ва «набла» деб укилувчи) ёрдамида тавсифлаш кулай.

Векторни скалярга кўпайтириш, иккита векторнинг скаляр ва вектор кўпайтмалари каби маълум операциялардан фойдаланиб, асосий дифференциал амалларни ∇ оператори ёрдамида ёзамиз:

$$\text{grad} u = \bar{i} \frac{\partial u}{\partial x} + \bar{j} \frac{\partial u}{\partial y} + \bar{k} \frac{\partial u}{\partial z} = \nabla u,$$

$$\text{div} \bar{a} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \nabla \cdot \bar{a},$$

$$\text{rot} \bar{a} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \nabla \times \bar{a}.$$

Келтириб ўтилган амаллар *биринчи тартибли дифференциал амаллар* дейилади. Гамильтон оператори ёрдамида вектор анализинг мураккаб ифодалари устида дифференциал амалларни (иккита ёки кўпроқ скаляр функциялар кўпайтмаси, скаляр функциянинг векторга кўпайтмаси, векторларнинг вектор кўпайтмалари ва ҳ. к.) бажариш кулай. Бунда фақат шуни эсда саклаш лозимки, бу оператор дифференциаллаш операторидир ва кўпайтмани дифференциаллаш коидасини билиш керак.

3-мисол. Иккита скаляр функция u ва v кўпайтмасининг градиентини топинг.

Ечиш. Қуйидагига эгамиз:

$$\text{grad } u \cdot v = \nabla uv = u \nabla v + v \nabla u$$

ёки

$$\text{grad } uv = u \text{grad} v + v \text{grad} u.$$

12.4.3. Иккинчи тартибли бешта дифференциал амални ёзиш мумкин:

$$\text{div grad} u = \nabla \cdot \nabla u = \nabla^2 u = \Delta u,$$

бу ерда

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \nabla^2$$

ифода Лаплас оператори дейилади:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \operatorname{grad} u &= (\nabla \times \nabla) u; \\ \operatorname{div} \operatorname{rot} \vec{a} &= \nabla \cdot (\nabla \times \vec{a}); \\ \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{a} &= \nabla (\nabla \cdot \vec{a}); \\ \operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{a} &= \nabla \times (\nabla \times \vec{a}). \end{aligned}$$

Гамильтон оператори ∇ нинг вектор маъносидан $\operatorname{rot} \operatorname{grad} u = \vec{0}$ (иккита коллинеар векторнинг вектор кўпайтмасига эгамиз) эканлиги ва $\operatorname{div} \operatorname{rot} \vec{a} = 0$ (компланар векторларнинг аралаш кўпайтмасига эгамиз) эканлиги келиб чиқади.

4- м и с о л. $u = \frac{1}{r}$ функция, бу ерда $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, гармоник функция эканлигини ва $\vec{a} = \operatorname{grad} u$ — вектор майдон гармоник эканлигини исбот қилинг.

Е ч и ш. Дастлаб берилган функция учун Лаплас тенгламаси

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \text{ ёки } \Delta u = 0 \text{ ўринли эканини текширамиз. Бунинг}$$

учун $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$ ва Δu ларни ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{x}{r^3}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{y}{r^3}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{z}{r^3}; \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= -\frac{1}{r^3} + \frac{3x^2}{r^5}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3y^2}{r^5}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3z^2}{r^5}; \\ \Delta u &= -\frac{3}{r^3} + \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = -\frac{3}{r^3} + \frac{3}{r^3} = 0. \end{aligned}$$

Демак, $\Delta u = 0$ Лаплас тенгламаси ўринли, бинобарин, берилган $u = \frac{1}{r}$ — гармоник функция.

Мисолни ечишда давом этамиз. Топамиз:

$$\vec{a} = \operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$$

ёки

$$\vec{a} = -\frac{1}{r^3} (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}).$$

Маълумки, исталган u функция учун: $\operatorname{rot} \vec{a} = \operatorname{rot} \operatorname{grad} u = \vec{0}$, яъни \vec{a} нинг гармониклигини аниқлашнинг биринчи шарти бажарилган. Иккинчи шарт: $\operatorname{div} \vec{a} = 0$ ҳам бажарилади, чунки

$$\operatorname{div} \vec{a} = \operatorname{div} \operatorname{grad} u = \Delta u = 0.$$

4- дарсхона топшириғи

1. \vec{a} майдоннинг потенциал эканини кўрсатинг ва унинг потенциалли u ни топинг:

- а) $\vec{a} = \{2xy, x^2 - 2yz, -y^2\}$;
 б) $\vec{a} = \{3x^2y - y^3, x^3 + 3xy^2\}$;
 в) $\vec{a} = \{y + 2, x + z, y + x\}$;
 г) $\vec{a} = \{yz \cos xy, xz \cos xy, \sin xy\}$.
 Ж: а) $u = x^2y - y^2z + C$;
 б) $u = x^3y - xy^3 + C$;
 в) $u = xy + yz + xz + C$;
 г) $u = z \sin xy + C$.

2. $\vec{a} = \{yz + 1, xz, xy\}$ майдон потенциалли u ни топинг ва

$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,2)} (yz + 1) dx + xz dy + xy dz$ чизикли интегрални ҳисобланг.

Ж: $u = x + xyz + C$; 12.

3. Берилган функция гармоникми:

- а) $u = \ln r$, бу ерда $r = \sqrt{x^2 + y^2}$;
 б) $u = r - x$, бу ерда $r = \sqrt{x^2 + y^2}$;
 в) $y = Ax + By + Cz + D$.
 Ж: а) ҳа; б) йўқ; в) ҳа.

4- мустақил иш

\vec{a} вектор майдоннинг потенциаллигини текширинг, унинг потенциаллини топинг ва \vec{a} вектордан A (ёй боши) ва B (ёй охири) нукталарни туташтирувчи ёй чизиғи бўйлаб олинган чизикли интеграл қийматини ҳисобланг:

1. $\vec{a} = \{2xyz, x^2z, x^2y\}$,
 $A(1, -1, 2)$, $B(-2, 4, 2)$. Ж: 34.
 2. $\vec{a} = \{x^2 - 2yz, y^2 - 2xz, z^2 - 2xy\}$,
 $A(1, -1, 1)$, $B(-2, 2, 3)$. Ж: $\frac{92}{3}$.
 3. $\vec{a} = \{2xy + z^2, 2xz + x^2, 2xz + y^2\}$,
 $A(0, 1, -2)$, $B(2, 3, 1)$. Ж: 25.

1 $u = u(x, y, z)$ скаляр майдоннинг M нуктадаги \vec{l} вектор йўналиши бўйича ҳосиласини топинг:

1.1. $u = (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$,
 $\vec{l} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$,
 $M(1, 1, 1)$.

1.2. $u = x + \ln(z^2 + y^2)$,
 $\vec{l} = -2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$,
 $M(2, 1, 1)$.

1.3. $u = x^2y - \sqrt{xy + z^2}$,
 $\vec{l} = 2\vec{j} - 2\vec{k}$,
 $M(1, 5, -2)$.

1.4. $u = y \ln(1 + x^2) - \arctg z$,
 $\vec{l} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - 2\vec{k}$,
 $M(0, 1, 1)$.

1.5. $u = x(\ln y - \arctg z)$,
 $\vec{l} = 8\vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}$,
 $M(-2, 1, -1)$.

1.6. $u = \ln(3 - x^2) + xy^2z$,
 $\vec{l} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$,
 $M(1, 3, 2)$.

1.7. $u = \sin(x + 2y) + \sqrt{xyz}$,
 $\vec{l} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$,
 $M = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, 3\right)$.

1.8. $u = x^2y^2z - \ln(z - 1)$,
 $\vec{l} = 5\vec{i} - 6\vec{j} + 2\sqrt{5}\vec{k}$,
 $M(1, 1, 2)$.

1.9. $u = x^3 + \sqrt{y^2 + z^2}$,
 $\vec{l} = \vec{j} - \vec{k}$,
 $M(1, -3, 4)$.

1.10. $u = \frac{\sqrt{x}}{y} - \frac{yz}{x + \sqrt{y}}$,
 $\vec{l} = 2\vec{i} + \vec{k}$,
 $M(4, 1, -2)$.

1.11. $u = \sqrt{xy} + \sqrt{9 - z^2}$,
 $\vec{l} = -2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$,
 $M(1, 1, 0)$.

1.12. $u = 2\sqrt{x + y} + y \arctg z$,
 $\vec{l} = 4\vec{i} - 3\vec{k}$,
 $M(3, -2, 1)$.

1.13. $u = z^2 + 2 \arctg(x - y)$,
 $\vec{l} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$,
 $M(1, 2, -1)$.

1.14. $u = \ln(x^2 + y^2) + xyz$,
 $\vec{l} = \vec{i} - \vec{j} + 5\vec{k}$,
 $M(1, -1, 2)$.

1.15. $u = xy - \frac{x}{z}$,
 $\vec{l} = 5\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$,
 $M(-4, 3, -1)$.

1.16. $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$,
 $\vec{l} = -2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$,
 $M(1, -3, 4)$.

1.17. $u = x^2 - \arctg(y + z)$,
 $\vec{l} = 3\vec{j} - 4\vec{k}$,
 $M(2, 1, 1)$.

1.18. $u = x^2y + y^2z + z^2x$,
 $\vec{l} = 2\vec{i} + 5\vec{j} - 3\vec{k}$,
 $M(1, -1, 2)$.

1.19. $u = \ln(xy + yz + xz)$,
 $\vec{l} = 4\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$,
 $M(-2, 3, -1)$.

1.20. $u = 5x^2yz - xy^2z + yz^2$,
 $\vec{l} = 8\vec{i} - 4\vec{j} + 8\vec{k}$,
 $M(1, 1, 1)$.

1.21. $u = \frac{10}{x^2 + y^2 + z^2 + 1}$,
 $\vec{l} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$,
 $M(-1, 2, 2)$.

1.22. $u = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}$,
 $\vec{l} = -4\vec{i} - 3\vec{k}$,
 $M(1, 2, 2)$.

1.23. $u = 5x^2yz - xy^2z + yz^2$,
 $\vec{l} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$,
 $M(1, -3, 2)$.

1.24. $u = x^2 + xy^2 - 6xyz$,
 $\vec{l} = 3\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$,
 $M(1, 3, -5)$.

$$1.25. u = \sqrt{1+x^2+y^2+z^2},$$

$$\vec{l} = 2\vec{i} + \vec{j},$$

$$M(1, 1, 1).$$

$$1.26. u = \ln(x^3 + y^3 + z + 1),$$

$$\vec{l} = -5\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k},$$

$$M(1, 3, 0).$$

$$1.27. u = \frac{x}{y} + \frac{y}{z} - \frac{z}{x},$$

$$\vec{l} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$M(-1, 1, 1).$$

$$1.28. u = x^2 + y^2 + z^2 - 2xyz,$$

$$\vec{l} = 4\vec{i} + 2\vec{k},$$

$$M(1, -1, 2).$$

$$1.29. u = \ln(x^2 + y^2 + z^2),$$

$$\vec{l} = 4\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k},$$

$$M(-1, 2, 1).$$

$$1.30. u = \frac{x}{y} - \frac{y}{z} - \frac{x}{z},$$

$$\vec{l} = -5\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k},$$

$$M(2, 2, 2).$$

2. $u = u(x, y, z)$ функциянинг M нуктадаги энг катта ўзгариши катталиги ва йўналишини тошинг:

$$2.1. u = xyz,$$

$$M(0, 1, -2).$$

$$2.2. u = xy^2z,$$

$$M(1, -2, 0).$$

$$2.3. u = x^2y^2z,$$

$$M(-1, 0, 3).$$

$$2.4. u = xy^2z^2,$$

$$M(-2, 1, 1).$$

$$2.5. u = x^2y + y^2z,$$

$$M(0, -2, 1).$$

$$2.6. u = xy - xz,$$

$$M(-1, 2, 1).$$

$$2.7. u = xyz,$$

$$M(2, 1, 0).$$

$$2.8. u = x^2yz,$$

$$M(2, 0, 2).$$

$$2.9. u = xyz^2,$$

$$M(3, 0, 1).$$

$$2.10. u = x^2yz^2,$$

$$M(2, 1, -1).$$

$$2.11. u = y^2z - x^2,$$

$$M(0, 1, 1).$$

$$2.12. u = x(y+z),$$

$$M(0, 1, 2).$$

$$2.13. u = x^2yz,$$

$$M(1, -1, 1).$$

$$2.14. u = xyz^2,$$

$$M(4, 0, 1).$$

$$2.15. u = 2x^2yz,$$

$$M(-3, 0, 2).$$

$$2.16. u = (x+y)z^2,$$

$$M(0, -1, 4).$$

$$2.17. u = x^2(y+z),$$

$$M(4, 1, -3).$$

$$2.18. u = x^2(y+z^2),$$

$$M(3, 0, 1).$$

$$2.19. u = x(y^2+z^2),$$

$$M(1, -2, 1).$$

$$2.20. u = x^3z - y^2,$$

$$M(1, 1, -2).$$

$$2.21. u = x^3y - z,$$

$$M(-2, 2, 1).$$

$$2.22. u = y(x+z),$$

$$M(0, 2, -2).$$

$$2.23. u = x^2yz,$$

$$M(1, 0, 4).$$

$$2.24. u = (x+z)y^2,$$

$$M(2, 2, 2).$$

$$2.25. u = (x^2+z)y^2,$$

$$M(-4, 1, 0).$$

$$2.26. u = (x^2-y)z^2,$$

$$M(1, 3, 0).$$

$$2.27. u = x^2 + 3y^2 - z^2,$$

$$M(0, 0, 1).$$

$$2.28. u = xz^2 + y,$$

$$M(2, 2, 1).$$

$$2.29. u = xy^2 - z,$$

$$M(-1, 2, 1).$$

$$2.30. u = z(x+y),$$

$$M(1, -1, 0).$$

3. $u = u(x, y, z)$ ва $v = v(x, y, z)$ скаляр майдонлар градиентлари орасидаги бурчакни топинг:

- 3.1. $u = \frac{x^3}{2} + 6y^3 + 3\sqrt{6}z^3$,
 $v = \frac{yz^2}{x^2}$,
 $M\left(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.
- 3.2. $u = \frac{4\sqrt{6}}{x} - \frac{\sqrt{6}}{9y} + \frac{3}{z}$,
 $v = x^2yz^3$,
 $M\left(2, \frac{1}{3}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$.
- 3.3. $u = 9\sqrt{2}x^3 - \frac{y^3}{2\sqrt{2}} - \frac{4z^3}{\sqrt{3}}$,
 $v = \frac{z^3}{xy^2}$,
 $M\left(\frac{1}{3}, 2, \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$.
- 3.4. $u = 6\sqrt{6}x^3 - 6\sqrt{6}y^3 + 2z^3$,
 $v = \frac{xz^2}{y}$,
 $M\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, 1\right)$.
- 3.5. $u = \frac{\sqrt{6}}{2x} - \frac{\sqrt{6}}{2y} + \frac{2}{3z}$,
 $v = \frac{yz^2}{x}$,
 $M\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.
- 3.6. $u = \frac{3}{x} + \frac{4}{y} - \frac{1}{\sqrt{6}z}$,
 $v = \frac{z}{x^3y^2}$,
 $M\left(1, 2, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$.
- 3.7. $u = \frac{x^3}{2} + 6y^3 + 3\sqrt{6}z^3$,
 $v = \frac{x^2}{yz^2}$, $M\left(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.
- 3.8. $u = 3\sqrt{2}x^2 - \frac{y^2}{\sqrt{2}} - 3\sqrt{2}z^2$,
 $v = \frac{z^2}{xy^2}$,
 $M\left(\frac{1}{3}, 2, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$.
- 3.9. $u = 3\sqrt{2}x^2 - \frac{y^2}{\sqrt{2}} - 3\sqrt{2}z^2$,
 $v = \frac{xy^2}{z^2}$,
 $M\left(\frac{1}{3}, 2, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$.
- 3.10. $u = \frac{3}{x} + \frac{4}{y} - \frac{1}{\sqrt{6}z}$,
 $v = \frac{x^3y^2}{z}$,
 $M\left(1, 2, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$.
- 3.11. $u = -\frac{4\sqrt{2}}{x} + \frac{\sqrt{2}}{9y} + \frac{1}{\sqrt{3}z}$,
 $v = \frac{1}{x^2yz}$,
 $M\left(2, \frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$.
- 3.12. $u = \frac{6}{x} + \frac{2}{y} - \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}z}$,
 $v = \frac{x^2}{y^2z^3}$,
 $M\left(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
- 3.13. $u = x^2 + 9y^2 + 6z^2$,
 $v = xyz$,
 $M\left(1, \frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$.
- 3.14. $u = \frac{2}{x} + \frac{3}{2y} - \frac{\sqrt{6}}{4z}$,
 $v = \frac{y^3}{x^2z}$, $M\left(\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{1}{2}\right)$.

$$3.15. u = \sqrt{2}x^2 - \frac{3y^2}{\sqrt{2}} - 6\sqrt{2}z^2,$$

$$v = xy^2z,$$

$$M\left(1, \frac{2}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right).$$

$$3.16. u = -\frac{\sqrt{6}}{2x} + \frac{\sqrt{6}}{2y} - \frac{2}{3z},$$

$$v = \frac{x}{yz^2},$$

$$M\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$$3.17. u = \frac{6}{x} + \frac{2}{y} - \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}z},$$

$$v = \frac{y^2z^3}{x^2},$$

$$M\left(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$3.18. u = \frac{1}{\sqrt{2}x} - \frac{2\sqrt{2}}{y} - \frac{3\sqrt{3}}{2z},$$

$$v = \frac{y^2z^3}{x},$$

$$M\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$3.19. u = 6\sqrt{6}x^3 - 6\sqrt{6}y^3 + 2z^3,$$

$$v = \frac{y}{xz^2},$$

$$M\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, 1\right).$$

$$3.20. u = x^2 - y^2 - 3z^2,$$

$$v = \frac{yz^2}{x},$$

$$M\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$$3.21. u = \frac{3x^2}{\sqrt{2}} - \frac{y^2}{\sqrt{2}} + \sqrt{2}z^2,$$

$$v = \frac{z^2}{x^2y^2},$$

$$M\left(\frac{2}{3}, 2, \sqrt{\frac{2}{3}}\right).$$

$$3.22. u = \frac{x^3}{\sqrt{2}} - \frac{y^3}{\sqrt{2}} - \frac{8z^3}{\sqrt{3}},$$

$$v = \frac{x^2}{y^2z^3},$$

$$M\left(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$3.23. u = \frac{3}{2}x^2 + 3y^2 - 2z^2,$$

$$v = x^2yz^3,$$

$$M\left(2, \frac{1}{3}, \frac{3}{2}\right).$$

$$3.24. u = 9\sqrt{2}x^3 - \frac{y^3}{2\sqrt{2}} - \frac{4z^3}{3},$$

$$v = \frac{xy^2}{z^3},$$

$$M\left(\frac{1}{3}, 2, \sqrt{\frac{3}{2}}\right).$$

$$3.25. u = \sqrt{2}x^2 - \frac{3y^2}{2} - 6\sqrt{2}z^2,$$

$$v = \frac{1}{xy^2z},$$

$$M\left(1, \frac{2}{3}, \frac{1}{6}\right).$$

$$3.26. u = \frac{1}{\sqrt{2}x} - \frac{2\sqrt{2}}{y} - \frac{3\sqrt{3}}{2z},$$

$$v = \frac{x}{y^2z^3},$$

$$M\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$3.27. u = -\frac{4\sqrt{2}}{x} + \frac{\sqrt{2}}{9y} + \frac{1}{\sqrt{3}z},$$

$$v = x^2yz,$$

$$M\left(2, \frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right).$$

$$3.28. u = x^2 + 9y^2 + 6z^2,$$

$$v = \frac{1}{xyz},$$

$$M\left(1, \frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right).$$

$$3.29. u = \frac{x^3}{\sqrt{2}} - \frac{y^3}{\sqrt{2}} - \frac{8z^3}{\sqrt{3}},$$

$$u = \frac{y^2 z^3}{x^2},$$

$$M\left(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$3.30. u = -\frac{3x^3}{\sqrt{2}} + \frac{2\sqrt{2}y^3}{3} + 8\sqrt{3}z^3,$$

$$u = \frac{x^2 z}{y^3},$$

$$M\left(\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{1}{2}\right).$$

4. \vec{a} вектор майдондаги вектор чизиқларни топинг:

$$4.1. \vec{a} = 4y\vec{i} - 9x\vec{j}.$$

$$4.16. \vec{a} = 2x\vec{i} + 4y\vec{j}$$

$$4.2. \vec{a} = x\vec{i} + 4y\vec{j}.$$

$$4.17. \vec{a} = 4z\vec{i} - 9x\vec{k}.$$

$$4.3. \vec{a} = 4y\vec{i} + 8z\vec{k}.$$

$$4.18. \vec{a} = 2x\vec{i} + 8z\vec{k}$$

$$4.4. \vec{a} = 4z\vec{j} - 9y\vec{k}.$$

$$4.19. \vec{a} = 6x\vec{i} + 12z\vec{k}.$$

$$4.5. \vec{a} = 5x\vec{i} + 10y\vec{j}.$$

$$4.20. \vec{a} = 4x\vec{i} + y\vec{j}.$$

$$4.6. \vec{a} = y\vec{j} + 4z\vec{k}.$$

$$4.21. \vec{a} = x\vec{i} + z\vec{k}.$$

$$4.7. \vec{a} = 9y\vec{i} - 4x\vec{j}.$$

$$4.22. \vec{a} = 7y\vec{j} + 14z\vec{k}.$$

$$4.8. \vec{a} = 4x\vec{i} + z\vec{k}.$$

$$4.23. \vec{a} = 9z\vec{j} - 4y\vec{k}.$$

$$4.9. \vec{a} = 2y\vec{i} + 3x\vec{j}.$$

$$4.24. \vec{a} = x\vec{i} + 3y\vec{j}.$$

$$4.10. \vec{a} = 3x\vec{i} + 6z\vec{k}.$$

$$4.25. \vec{a} = 2z\vec{i} + 3x\vec{k}.$$

$$4.11. \vec{a} = y\vec{j} + 3z\vec{k}.$$

$$4.26. \vec{a} = x\vec{i} + 3z\vec{k}.$$

$$4.12. \vec{a} = 2z\vec{j} + 3y\vec{k}.$$

$$4.27. \vec{a} = 2x\vec{i} + 6y\vec{j}.$$

$$4.13. \vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}.$$

$$4.28. \vec{a} = 5y\vec{i} + 7x\vec{j}.$$

$$4.14. \vec{a} = 2y\vec{j} + 6z\vec{k}.$$

$$4.29. \vec{a} = 9z\vec{i} - 4x\vec{k}.$$

$$4.15. \vec{a} = 5z\vec{i} + 7x\vec{k}.$$

$$4.30. \vec{a} = 2x\vec{i} + 6z\vec{k}.$$

5. \vec{a} вектор майдоннинг p текислик ва координата текисликлари ҳосил қилган пирамиданинг ташқи сирти бўйича оқимини икки усул билан топинг:

а) оқим таърифидан фойдаланиб;

б) Остроградский — Гаусс формуласи ёрдамида.

$$5.1. \vec{a} = 3x\vec{i} + (y+z)\vec{j} + (x-z)\vec{k},$$

$$p : x + 3y + z = 3.$$

$$5.2. \vec{a} = (3x-1)\vec{i} + (y-x+z)\vec{j} + 4z\vec{k},$$

$$p : 2x - y - 2z = 2.$$

$$5.3. \vec{a} = x\vec{i} + (x+z)\vec{j} + (y+z)\vec{k},$$

$$p : 3x + 3y + z = 3.$$

$$5.4. \vec{a} = (x+z)\vec{i} + (z-x)\vec{j} + (x+2y+z)\vec{k},$$

$$p : x + y + z = 2.$$

$$5.5. \vec{a} = (y+2z)\vec{i} + (x+2z)\vec{j} + (x-2y)\vec{k},$$

$$p : 2x + y + 2z = 2.$$

- 5.6. $\vec{a} = (x+z)\vec{i} + 2y\vec{j} + (x+y-z)\vec{k}$,
 $\rho : x+2y+z=2$.
- 5.7. $\vec{a} = (3x-y)\vec{i} + (2y+z)\vec{j} + (2z-x)\vec{k}$,
 $\rho : 2x-3y+z=6$.
- 5.8. $\vec{a} = (2y+z)\vec{i} + (x-y)\vec{j} - 2z\vec{k}$,
 $\rho : x-y+z=2$.
- 5.9. $\vec{a} = (x+y)\vec{i} + 3y\vec{j} + (y-z)\vec{k}$,
 $\rho : 2x-y-2z=-2$.
- 5.10. $\vec{a} = (x+y-z)\vec{i} - 2y\vec{j} + (x+2z)\vec{k}$,
 $\rho : x+2y+z=2$.
- 5.11. $\vec{a} = (y-z)\vec{i} + (2x+y)\vec{j} + z\vec{k}$,
 $\rho : 2x+y+z=2$.
- 5.12. $\vec{a} = x\vec{i} + (y-2z)\vec{j} + (2x-y+2z)\vec{k}$,
 $\rho : x+2y+2z=2$.
- 5.13. $\vec{a} = (x+2z)\vec{i} + (y-3z)\vec{j} + z\vec{k}$,
 $\rho : 3x+2y+2z=6$.
- 5.14. $\vec{a} = 4x\vec{i} + (x-y-z)\vec{j} + (3y+2z)\vec{k}$,
 $\rho : 2x+y+z=4$.
- 5.15. $\vec{a} = (2z-x)\vec{i} + (x+2y)\vec{j} + 3z\vec{k}$,
 $\rho : x+4y+2z=8$.
- 5.16. $\vec{a} = 4z\vec{i} + (x-y-z)\vec{j} + (3y+z)\vec{k}$,
 $\rho : x-2y+2z=2$.
- 5.17. $\vec{a} = (x+y)\vec{i} + (y+z)\vec{j} + 2(z+x)\vec{k}$,
 $\rho : 3x-2y+2z=6$.
- 5.18. $\vec{a} = (x+y+z)\vec{i} + 2z\vec{j} + (y-7z)\vec{k}$,
 $\rho : 2x+3y+z=6$.
- 5.19. $\vec{a} = (2x-z)\vec{i} + (y-x)\vec{j} + (x+2z)\vec{k}$,
 $\rho : x-y+z=2$.
- 5.20. $\vec{a} = (2y-z)\vec{i} + (x+y)\vec{j} + x\vec{k}$,
 $\rho : x+2y+2z=4$.
- 5.21. $\vec{a} = (2z-x)\vec{i} + (x-y)\vec{j} + (3x+z)\vec{k}$,
 $\rho : x+y+2z=2$.
- 5.22. $\vec{a} = (x+z)\vec{i} + (x+3y)\vec{j} + y\vec{k}$,
 $\rho : x+y+2z=2$.
- 5.23. $\vec{a} = (x+z)\vec{i} + z\vec{j} + (2x-y)\vec{k}$,
 $\rho : 2x+2y+z=4$.
- 5.24. $\vec{a} = (3x+y)\vec{i} + (x+z)\vec{j} + y\vec{k}$,
 $\rho : x+2y+z=2$.
- 5.25. $\vec{a} = (y+z)\vec{i} + (2x-z)\vec{j} + (y+3z)\vec{k}$,
 $\rho : 2x+y+3z=6$.

$$5.26. \vec{a} = (y+z)\vec{i} + (x+6y)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : x+2y+2z=2.$$

$$5.27. \vec{a} = (2y-z)\vec{i} + (x+2y)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : x+3y+2z=6.$$

$$5.28. \vec{a} = (y+z)\vec{i} + x\vec{j} + (y-2z)\vec{k},$$

$$p : 2x+2y+z=2.$$

$$5.29. \vec{a} = (x+z)\vec{i} + z\vec{j} + (2x-y)\vec{k},$$

$$p : 3x+2y+z=6.$$

$$5.30. \vec{a} = z\vec{i} + (x+y)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : 2x+y+2z=2.$$

6. \vec{a} вектор майдоннинг p текисликнинг координата текисликлари билан кесишдан ҳосил бўлган учбурчак контури бўйича циркуляциясини (бу текисликнинг нормал векторига нисбатан айланиб ўтиш йўналиши мусбат бўлганда) қуйидаги икки усул билан ҳисобланг:

- а) циркуляция таърифидан фойдаланиб;
- б) Стокс формуласи ёрдамида.

$$6.1. \vec{a} = z\vec{i} + (x+y)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : 2x+y+2z=2.$$

$$6.2. \vec{a} = (x+z)\vec{i} + z\vec{j} + (2x-y)\vec{k},$$

$$p : 3x+2y+z=6.$$

$$6.3. \vec{a} = (y+z)\vec{i} + x\vec{j} + (y-2z)\vec{k},$$

$$p : 2x+2y+z=2.$$

$$6.4. \vec{a} = (2y-z)\vec{i} + (x+2y)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : x+3y+2z=6.$$

$$6.5. \vec{a} = (y+z)\vec{i} + (x+6y)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : x+2y+2z=2.$$

$$6.6. \vec{a} = (y+z)\vec{i} + (2x-z)\vec{j} + (y+3z)\vec{k},$$

$$p : 2x+y+3z=6.$$

$$6.7. \vec{a} = (3x+y)\vec{i} + (x+z)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : x+2y+z=2.$$

$$6.8. \vec{a} = (x+z)\vec{i} + z\vec{j} + (2x-y)\vec{k},$$

$$p : 2x+2y+z=4.$$

$$6.9. \vec{a} = (x+z)\vec{i} + (x+3y)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : x+y+2z=2.$$

$$6.10. \vec{a} = (2y-z)\vec{i} + (x+y)\vec{j} + x\vec{k},$$

$$p : x+2y+2z=4.$$

$$6.11. \vec{a} = (2z-x)\vec{i} + (x-y)\vec{j} + (3x+z)\vec{k},$$

$$p : x+y+2z=2.$$

$$6.12. \vec{a} = (2x-z)\vec{i} + (y-x)\vec{j} + (x+2z)\vec{k},$$

$$p : x-y+z=2.$$

- 6.13. $\vec{a} = (x + y + z)\vec{i} + 2z\vec{j} + (y - 7z)\vec{k}$.
 $p: 2x + 3y + z = 6$.
- 6.14. $\vec{a} = (x + y)\vec{i} + (y + z)\vec{j} + 2(x + z)\vec{k}$.
 $p: 3x - 2y + 2z = 6$.
- 6.15. $\vec{a} = 4z\vec{i} + (x - y - z)\vec{j} + (3y + z)\vec{k}$.
 $p: x - 2y + 2z = 2$.
- 6.16. $\vec{a} = (2z - x)\vec{i} + (x + 2y)\vec{j} + 3z\vec{k}$.
 $p: x + 4y + 2z = 8$.
- 6.17. $\vec{a} = 4x\vec{i} + (x - y - z)\vec{j} + (3y + 2z)\vec{k}$.
 $p: 2x + y + z = 4$.
- 6.18. $\vec{a} = (x + 2z)\vec{i} + (y - 3z)\vec{j} + z\vec{k}$.
 $p: 3x + 2y + 2z = 6$.
- 6.19. $\vec{a} = x\vec{i} + (y - 2z)\vec{j} + (2x - y + 2z)\vec{k}$.
 $p: x + 2y + 2z = 2$.
- 6.20. $\vec{a} = (y - z)\vec{i} + (2x + y)\vec{j} + z\vec{k}$.
 $p: 2x + y + z = 2$.
- 6.21. $\vec{a} = (x + y - z)\vec{i} - 2y\vec{j} + (x + 2z)\vec{k}$.
 $p: x + 2y + z = 2$.
- 6.22. $\vec{a} = (x + y)\vec{i} + 3y\vec{j} + (y - z)\vec{k}$.
 $p: 2x - y - 2z = -2$.
- 6.23. $\vec{a} = (2y + z)\vec{i} + (x - y)\vec{j} - 2z\vec{k}$.
 $p: x - y + z = 2$.
- 6.24. $\vec{a} = (3x - y)\vec{i} + (2y + z)\vec{j} + (2z - x)\vec{k}$.
 $p: 2x - 3y + z = 6$.
- 6.25. $\vec{a} = (x + z)\vec{i} + 2y\vec{j} + (x + y - z)\vec{k}$.
 $p: x + 2y + z = 2$.
- 6.26. $\vec{a} = (y + 2z)\vec{i} + (x + 2z)\vec{j} + (x - 2y)\vec{k}$.
 $p: 2x + y + 2z = 2$.
- 6.27. $\vec{a} = (x + z)\vec{i} + (z - x)\vec{j} + (x + 2y + z)\vec{k}$.
 $p: x + y + z = 2$.
- 6.28. $\vec{a} = x\vec{i} + (x + z)\vec{j} + (y + z)\vec{k}$.
 $p: 3x + 3y + z = 3$.
- 6.29. $\vec{a} = (3x - 1)\vec{i} + (y - x + z)\vec{j} + 4z\vec{k}$.
 $p: 2x - y - 2z = -2$.
- 6.30. $\vec{a} = 3x\vec{i} + (y + z)\vec{j} + (x - z)\vec{k}$.
 $p: x + 3y + z = 3$.

7. \vec{a} вектор майдон соленоидлими (1—11- вариантлар), потенциалми (12—25- вариантлар), гармоникми (26—30- вариантлар) эканини аниқланг:

- 7.1. $\vec{a} = (y+z)\vec{i} + xy\vec{j} - xz\vec{k}$.
- 7.2. $\vec{a} = x^2y\vec{i} - 2xy^2\vec{j} + 2xyz\vec{k}$.
- 7.3. $\vec{a} = (2yz - 2x)\vec{i} + (xz - 2y)\vec{j} + xy\vec{k}$.
- 7.4. $\vec{a} = (x^2 - z^2)\vec{i} - 3xy\vec{j} + (y^2 + z^2)\vec{k}$.
- 7.5. $\vec{a} = 2xyz\vec{i} - y(yz + 1)\vec{j} + z\vec{k}$.
- 7.6. $\vec{a} = (2x - 3y)\vec{i} + 2xy\vec{j} - z^2\vec{k}$.
- 7.7. $\vec{a} = (x^2 - y^2)\vec{i} + (y^2 - z^2)\vec{j} + (z^2 - x^2)\vec{k}$.
- 7.8. $\vec{a} = yz\vec{i} + (x - y)\vec{j} + z^2\vec{k}$.
- 7.9. $\vec{a} = (y + z)\vec{i} + (x + z)\vec{j} + (x + y)\vec{k}$.
- 7.10. $\vec{a} = 3x^2y\vec{i} - 2xy^2\vec{j} - 2xyz\vec{k}$.
- 7.11. $\vec{a} = (x + y)\vec{i} - 2(y + z)\vec{j} + (z - x)\vec{k}$.
- 7.12. $\vec{a} = (yz - 2x)\vec{i} + (xz + zy)\vec{j} + xy\vec{k}$.
- 7.13. $\vec{a} = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$.
- 7.14. $\vec{a} = 6xy\vec{i} + (3x^2 - 2y)\vec{j} + z\vec{k}$.
- 7.15. $\vec{a} = (2x - yz)\vec{i} + (2x - xy)\vec{j} + yz\vec{k}$.
- 7.16. $\vec{a} = (y - z)\vec{i} + 3xyz\vec{j} + (z - x)\vec{k}$.
- 7.17. $\vec{a} = (y - z)\vec{i} + (x + z)\vec{j} + (x^2 - y^2)\vec{k}$.
- 7.18. $\vec{a} = (x + y)\vec{i} - 2xz\vec{j} - 3(y + z)\vec{k}$.
- 7.19. $\vec{a} = z^2\vec{i} + (xz + y)\vec{j} + x^2y\vec{k}$.
- 7.20. $\vec{a} = xy(3x - 4y)\vec{i} + x^2(x - 4y)\vec{j} + 3z^2\vec{k}$.
- 7.21. $\vec{a} = 6x^2\vec{i} + 3\cos(3x + 2z)\vec{j} + \cos(3y + 2z)\vec{k}$.
- 7.22. $\vec{a} = (x + y)\vec{i} + (z - y)\vec{j} + 2(x + z)\vec{k}$.
- 7.23. $\vec{a} = 3(x - z)\vec{i} + (x^2 - y^2)\vec{j} + 3z\vec{k}$.
- 7.24. $\vec{a} = (2x - yz)\vec{i} + (xz - 2y)\vec{j} + 2xyz\vec{k}$.
- 7.25. $\vec{a} = 3x^2\vec{i} + 4(x - y)\vec{j} + (x - z)\vec{k}$.
- 7.26. $\vec{a} = x^2z\vec{i} + y^2\vec{j} - xz^2\vec{k}$.
- 7.27. $\vec{a} = (x + y)\vec{i} + (y + z)\vec{j} + (x + z)\vec{k}$.
- 7.28. $\vec{a} = \frac{x}{y}\vec{i} + \frac{y}{z}\vec{j} + \frac{z}{x}\vec{k}$.
- 7.29. $\vec{a} = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$.
- 7.30. $\vec{a} = (y - z)\vec{i} + (z - x)\vec{j} + (x - y)\vec{k}$.

МАТЕМАТИК ФИЗИКАНИНГ АСОСИЙ ТЕНГЛАМАЛАРИ

1-§. Тор тебраниш тенгласи учун Коши масаласини
Даламбер усули билан ечиш

13.1.1. Математик физиканинг кўпгина масалалари хусусий ҳосилали дифференциал тенгламаларга келтирилади. Булардан энг кўп учрайдигани иккинчи тартибли тенгламалардир.

Умумий кўрипиши

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu = f(x, y)$$

Бўлган хусусий ҳосилали иккинчи тартибли чизикли дифференциал тенгламани караймиз. Бу тенгламада номаълум $u(x, y)$ функция иккита ўзгарувчига боғлиқ бўлиб, тенгламанинг A, B, C, D, E ва F коэффициентлари ҳам умуман айтганда x ва y ларга боғлиқ маълум функциялар. Тенгламанинг ўнг томонидаги $f(x, y)$ функция берилган функция бўлиб, у нолга тенг бўлса, тенглама *иккинчи тартибли бир жинсли чизикли хусусий ҳосилали тенглама* дейилади.

Агар тенгламанинг берилган соҳасида:

$B^2 - 4AC > 0$ бўлса, тенглама гиперболик,

$B^2 - 4AC = 0$ бўлса, тенглама параболик,

$B^2 - 4AC < 0$ бўлса, тенглама эллиптик турга тегишли бўлади.

Торнинг кундалиқ тебраниши, металл стерженнинг бўйлама тебраниши, симдаги электр тебранишлар, айланувчи цилиндрдаги айланма тебранишлар, газнинг тебранишлари каби масалалар гиперболик турдаги энг содда тўлқин тенгласи

$$a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

га олиб келади.

Иссикликнинг тарқалиш жараёни, ғовак муҳитда суюқлик ва газнинг оқиши масаласи каби масалалар параболик турдаги энг содда иссиқлик тарқалиш тенгласи (Фурье тенгласи)

$$a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

га олиб келади.

Табранишлар, иссиқлик ўтказиш ва диффузия каби масалаларга тегишли стационар жараёнларнинг тадқиқотида эллиптик турдаги тенгламалардан фойдаланилади. Бу турдаги энг содда тенглама

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Лаплас тенгламасидир.

13.1.2. Умумий кўринишда берилган хусусий ҳосилали иккинчи тартибли чизиқли дифференциал тенгламанинг *характеристик тенгламаси* деб

$$A(dy)^2 - B dx dy + C(dx)^2 = 0$$

оддий дифференциал тенгламага айтилади.

Гиперболик турдаги тенгламалар учун характеристик тенглама $\varphi(x, y) = C_1$ ва $\psi(x, y) = C_2$ интегралга эга бўлади. Умумий тенглама

$$\xi = \varphi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y)$$

алмаштиришлар ёрдамида

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = F\left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta}\right)$$

шаклдаги *каноник* кўринишга келтирилади.

Параболик турдаги тенгламалар учун характеристик тенглама битта $\varphi(x, y) = c$ умумий интегралга эга бўлиб, улар $\xi = \varphi(x, y)$, $\eta = \eta(x, y)$ (η φ га боғлиқ бўлмаган ихтиёрий функция) алмаштириш ёрдамида

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = F\left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta}\right)$$

шаклдаги каноник кўринишга келтирилади.

Эллиптик турдаги тенгламалар учун характеристик тенглама интеграллари ушбу кўринишга эга бўлади: $\varphi(x, y) \pm i\psi(x, y) = C_{1,2}$, бу ерда $\varphi(x, y)$ ва $\psi(x, y)$ — ҳақиқий функциялар. $\xi = \varphi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$ алмаштиришлар ёрдамида эллиптик турдаги тенгламалар ушбу

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = F\left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta}\right)$$

каноник шаклга келтирилади.

1- мисол. Ушбу

$$4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 8 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 3 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial y} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

дифференциал тенгламани каноник кўринишга келтириш.

Ечиш. Бунда $A=4$, $B=8$, $C=3$, $AC - \frac{B^2}{4} = -4 < 0$, демак,

гиперболик турдаги тенгламага эгамиз. Тегинли характеристик тенгламани тузамиз:

$$4(dy)^2 - 8dxdy + 3(dx)^2 = 0$$

ёки

$$4\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 8\frac{dy}{dx} + 3 = 0.$$

$\frac{dy}{dx}$ ни топамиз: $\frac{dy}{dx} = \frac{4 \pm 2}{4}$. бундан $y = \frac{3}{2}$ ва $y' = \frac{1}{2}$. Характеристик тенглама интеграллари: $y - \frac{3}{2}x = C_1$ ва $y - \frac{1}{2}x = C_2$ эканлигини эътиборга олиб, $\xi = y - \frac{3}{2}x$, $\eta = y - \frac{1}{2}x$ ўзгарувчиларни алмаштиришни бажарамиз. Эски ўзгарувчилар бўйича хусусий ҳосилаларни янги ўзгарувчилар бўйича хусусий ҳосилалар билан ифодалаймиз:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \left(-\frac{3}{2}\right) + \frac{\partial u}{\partial \eta} \left(-\frac{1}{2}\right), \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}; \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= -\frac{3}{2} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi}\right) - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial \eta}\right) = \\ &= -\frac{3}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x}\right) - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial x}\right) = \\ &= -\frac{3}{2} \left(-\frac{3}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}\right) - \frac{1}{2} \left(-\frac{3}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}\right) = \\ &\quad \frac{9}{4} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{3}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{1}{4} \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi}\right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial \eta}\right) = \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \\ &= -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{3}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{3}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \\ &= -\frac{3}{2} \frac{\partial u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi}\right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial \eta}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial y} = \\
 & = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}.
 \end{aligned}$$

Берилган дифференциал тенгламага иккинчи тартибли хосилалар учун тошилган ифодаларни кўямиз:

$$\begin{aligned}
 & \left(9 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 6 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) + \left(3 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 6 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \right. \\
 & \left. + 3 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) + \left(-12 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 16 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) + \\
 & + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) + \left(-3 \frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = 0.
 \end{aligned}$$

Соддалаштиришдан кейин берилган тенглама ушбу

$$2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial u}{\partial \eta} = 0 \text{ ёки } \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{1}{2} \frac{\partial u}{\partial \eta} = 0$$

каноник кўринишга (гиперболик тур) келтирилади.

13.1.3. Гиперболик турдаги ва параболик турдаги тенгламалар кўпинча вақт давомида содир бўлувчи жараёнларни ўрганишда қўлланилади. Шу сабабли бу ҳолларда изланаётган u функция t вақтга ва x координатага боғлиқ бўлади, яъни $u = u(x, t)$.

Кўйилган масалани тўлиқ ҳал этиш учун бу турдаги тенгламалар билан бирга *чегаравий* ва *бошланғич шартлар* ҳам берилган бўлиши шарт.

Бошланғич шартлар $t=0$ да изланаётган u функция ва унинг ҳосиласи қийматининг берилишидан (гиперболик турдаги тенгламалар учун) ёки функция қийматининггина берилишидан (параболик турдаги тенгламалар учун) иборатдир.

Чегаравий шартларда $u(x, t)$ номаълум функциянинг ўзгарувчи x ни ўзгариш оралигининг охириларидаги қийматлари берилди.

Агар қаралаётган жараён учун ўзгарувчи x нинг ўзгариш оралиғи чексиз деб қаралса, u ҳолда масала фақат бошланғич шартлардагина ечилиб, $u(x, t)$ функция учун чегаравий шартлар қўйилмайди. Масалада фақат бошланғич шартлар берилса, бундай масала *Қоши масаласи* дейлади.

Агар масала чекли оралик учун қўйилса, u ҳолда бошланғич шартлар ҳам, чегаравий шартлар ҳам берилиши керак. Бу ҳолда *аралаш масалага* эга бўламиз.

Эллиптик турдаги тенгламалар одатда стационар жараёнларга тегишли масалалар қаралаётганда қўлланилади. Шунинг учун t вақт бу тенгламаларда қатнашмайди ва изланаётган ечим фақат координаталарга боғлиқ бўлиб, масала чегаравий шартлардагина

счилади. Шартларнинг берилишига кўра Дирихле масаласи, Нейман масаласи ёки аралаш масалалар қўйилиши мумкин.

13.1.4. Торнинг кўндаланг тебранишлари ҳақидаги масалани кўриб чиқайлик. Эркин эгила оладиган ингичка ип тор деб аталади. Торнинг кичик кўндаланг тебранишлари торнинг тебраниш тенгламаси (тўлқин тенгламаси)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

ни қаноатлантирувчи $u = u(x, t)$ функция билан характерланади, бу тенгламада x тор нуктаси координатаси, t — вақт, a^2 — тор тайёрланган материалнинг физик хоссаларини ақс эттирувчи доимий.

Гиперболик турдаги тенгламага эгамиз. $t=0$ пайтда торнинг ҳолати $u|_{t=0} = \varphi(x)$ ва тор нукталарининг тезлиги $\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \Psi(x)$ маълум бўлсин (Коши масаласи).

Торнинг тебранишлари тенгламасининг ечими ушбу кўринишга эга:

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x-at) + \varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(x) dx.$$

Бу формула тор тебраниш тенгламаси учун Коши масаласининг Даламбер ечими деб аталади.

2- мисол. $u|_{t=0} = x^2$, $\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0$ бўлса,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

тенглама ечимини тошинг.

Ечиш. $a=1$, $\varphi(x) = x^2$, $\Psi(x) = 0$, шунга кўра $u = \frac{\varphi(x-t) + \varphi(x+t)}{2}$.

бунда $\varphi(x) = x^2$. Шундай қилиб, $u = \frac{(x-t)^2 + (x+t)^2}{2}$ ёки $u = x^2 + t^2$.

1- дарсхона топшириги

1. Тенгламаларни канолик кўринишга келтиринг:

а) $x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0;$

б) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \sin^2 x - 2y \sin x \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0;$

$$в) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

$$Ж: а) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = \frac{1}{2\xi} \frac{\partial u}{\partial \eta}; \quad б) \frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2} = \frac{2\xi}{\xi^2 + \eta^2} \frac{\partial z}{\partial \xi}; \quad в) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = 0.$$

2. Агар $u|_{t=0} = 0$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = x$ экани маълум бўлса, $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ тенглама ечимини топинг. Ж: $u = xt$.

3. Агар $u|_{t=0} = \sin x$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 1$ бўлса, $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ тенглама билан аниқланувчи торнинг $t = \frac{\pi}{2a}$ пайтдаги шаклини аниқланг.

Ж: $u = \sin x \cos at + t$; агар $t = \frac{\pi}{2a}$ бўлса, y ҳолда $u = \frac{\pi}{2a}$, яъни тор абсциссалар укига параллел.

1- мустақил иш

1. Тенгламаларни каноник кўринишга келтиринг:

$$а) x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0;$$

$$б) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 4 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial z}{\partial x} + 6 \frac{\partial z}{\partial y} = 0;$$

$$в) \frac{1}{x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{1}{y^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

$$Ж: а) \frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2} = 0, \xi = \frac{y}{x}; \eta = y; \quad б) \frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{\partial z}{\partial \xi} = 0, \xi = x + y,$$

$$\eta = 3x + y; \quad в) \frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\xi} \frac{\partial z}{\partial \xi} + \frac{1}{\eta} \frac{\partial z}{\partial \eta} \right), \quad \xi = y^2, \eta = x^2.$$

2. Тенгламаларнинг ечимини топинг:

$$а) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \text{ бунда } u|_{t=0} = x, \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = -x;$$

$$б) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \text{ бунда } u|_{t=0} = 0, \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \cos x.$$

$$Ж: а) u = x(1-t);$$

$$б) u = \frac{1}{a} \cos x \cdot \sin at.$$

3. Агар $u|_{t=0} = \sin x$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \cos x$ бўлса, $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ тенглама

билан аниқланувчи торнинг $t=\pi$ даги шаклини топинг.

Ж: $u = -\sin x$.

2-§. Иссиқлик ўтказиш (тўлқин) тенгламаси учун аралаш масалани Фурье усули билан ечиш

13.2.1. Берилган бошланғич ва чегаравий шартлардан фойдаланиб, стерженда температура тақсимоти аниқловчи $u(x, t)$ функциясини топиш талаб қилинсин.

Масала $u(x, t)|_{t=0} = f(x)$ бошланғич ва $u(x, t)|_{x=0} = u(x, t)|_{x=l} = 0$ ёки

$$\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = \frac{\partial u}{\partial x}|_{x=l} = 0,$$

чегаравий шартларда

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, 0 < x < l$$

иссиқлик ўтказиш тенгламасини ечишга келтирилади.

Хусусий ҳосилалари тенгламаларни ечишнинг кенг тарқалган усулларидан бири ўзгарувчиларни ажратиш усули ёки Фурье усулидир. Бу усулга кўра хусусий ечим $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \varphi_n(x) \psi_n(t)$

қуринишда изланади. $u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0$ чегаравий шартлар билан қўйилган масала учун Фурье усулига мувофиқ ечим:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2 t}{l^2}} \cdot \sin \frac{n\pi x}{l}$$

қуринишда бўлади, бунда

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx,$$

$\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = \frac{\partial u}{\partial x}|_{x=l} = 0$ чегаравий шартлар билан қўйилган масала учун эса ечимни

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2 t}{l^2}} \cdot \cos \frac{n\pi x}{l} + a_0$$

$$\left(a_0 = \frac{1}{l} \int_0^l f(x) dx, a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \right)$$

қуринишда оламиз.

1- мисол.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (0 < x < l, t > 0) \text{ тенгламининг}$$

$$u|_{t=0} = f(x) = \begin{cases} x, & \text{агар } 0 < x \leq \frac{l}{2} \text{ бўлса,} \\ l-x, & \text{агар } \frac{l}{2} < x < l \text{ бўлса} \end{cases}$$

бошланғич шартни ва $u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0$ чегаравий шартларни каноатлантирувчи ечимни топинг.

Ечиш. Берилган чегаравий шартларни каноатлантирувчи ечимни ушбу кўринишда излаймиз:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\frac{\pi^2 n^2 t}{l^2}} \cdot \sin \frac{\pi n x}{l},$$

бунда

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{\pi n x}{l} dx = \frac{2}{l} \int_0^{\frac{l}{2}} x \cdot \sin \frac{\pi n x}{l} dx + \\ &+ \frac{2}{l} \int_{\frac{l}{2}}^l (l-x) \sin \frac{\pi n x}{l} dx = \left\{ \begin{aligned} s=x, ds=dx, \\ dt = \sin \frac{\pi n x}{l} dx, t = -\frac{l}{\pi n} \cos \frac{\pi n x}{l} \end{aligned} \right\} = \\ &= \frac{2}{l} \left(-\frac{lx}{\pi n} \cos \frac{\pi n x}{l} + \frac{l^2}{\pi^2 n^2} \sin \frac{\pi n x}{l} \right) \Big|_0^{\frac{l}{2}} + \\ &+ \frac{2}{l} \left(-\frac{l^2}{\pi n} \cos \frac{\pi n x}{l} + \frac{lx}{\pi n} \cos \frac{\pi n x}{l} - \frac{l^2}{\pi^2 n^2} \sin \frac{\pi n x}{l} \right) \Big|_{\frac{l}{2}}^l = \\ &= -\frac{4l}{\pi^2 n^2} \sin \frac{\pi n}{2}. \end{aligned}$$

Демак, изланаётган ечим ушбу кўринишга эга:

$$u(x, t) = \frac{4l}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{\pi n}{2} e^{-\frac{\pi^2 n^2 t}{l^2}} \cdot \sin \frac{\pi n x}{l}$$

ёки

$$u(x, t) = \frac{4l}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(2k+1)^2} e^{-\frac{\pi^2 (2k+1)^2 t}{l^2}} \cdot \sin \frac{\pi l(2k+1)x}{l}.$$

13.2.2. Бир томондан чегараланган (ярим чексиз) стержен учун

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

тенгламининг $u|_{t=0}=f(x)$ бошланғич шартни ва $u|_{x=0}=\varphi(t)$ чегаравий шартни канонатлантурувчи ечими ушбу формула билан аниқланади:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_0^{+\infty} f(\xi) \left[e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}} - e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4t}} \right] d\xi + \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_0^t \varphi(\eta) \cdot e^{-\frac{x^2}{4(t-\eta)}} (t-\eta)^{-\frac{1}{2}} d\eta$$

2-мисол. $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ тенгламининг $u|_{t=0}=f(x)=u_0$ бошланғич шартни ва $u|_{x=0}=0$ чегаравий шартни канонатлантурувчи ечимини топинг.

Ечиш. Берилган шартларни канонатлантурувчи ечим юқоридаги формулага кўра ушбу кўринишга эга:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_0^{+\infty} u_0 \left[e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4t}} - e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4t}} \right] d\xi$$

ёки

$$u(x, t) = \frac{u_0}{2\sqrt{\pi t}} \int_0^{+\infty} \left[e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4t}} - e^{-\frac{(\xi+x)^2}{4t}} \right] d\xi$$

$\frac{x-\xi}{2\sqrt{t}} = \mu$, $d\xi = -2\sqrt{t} d\mu$ деб белгилаб, биринчи интегрални алмаштирамиз, яъни

$$\frac{u_0}{2\sqrt{\pi t}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4t}} d\xi = \frac{u_0}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu; \frac{u_0}{2} \left[1 + \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{t}}\right) \right],$$

бунда $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$, $\frac{x+\xi}{2\sqrt{t}} = \mu$, $d\xi = 2\sqrt{t} d\mu$ деб белгилаб,

$\frac{u_0}{2\sqrt{\pi t}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4t}} d\xi = \frac{u_0}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\sqrt{t}}}^{+\infty} e^{-\mu^2} d\mu = \frac{u_0}{2} \left[1 - \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{t}}\right) \right]$ га эга бўламиз. Шундай қилиб, ечим ушбу кўринишни олади:

$$u(x, t) = u_0 \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{t}}\right)$$

2- дарсхона топшириғи

1. Узунлиги l га тенг, ташқи мухит таъсиридан мухофазаланган ва $u|_{t=0} = f(x) = \frac{cx(l-x)}{l^2}$ бошланғич температурага эга бўлган бир жинсли стержен берилган. Стерженнинг охирлари нолга тенг температурада тутиб турилади. Иссиқлик ўтказиш тенгламаси ечимини топинг (стерженнинг $l > 0$ вақтдаги температурасини аниқланг).

$$\text{Ж: } u(x, t) = \frac{8c}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} e^{-\frac{(2n+1)^2 a^2 t}{l^2}} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{l}$$

2. Агар ярим чексиз стерженнинг $x=0$ чап охири иссиқликдан мухофазаланган, температуранинг бошланғич тақсимоти

$$u|_{t=0} = f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0, \\ u_0, & \text{агар } 0 < x < l, \\ 0, & \text{агар } x > l \end{cases}$$

бўлса, иссиқлик ўтказиш тенгламасининг ечимини топинг.

$$\text{Ж: } u(x, t) = \frac{u_0}{2} \left[\Phi\left(\frac{x+l}{2a\sqrt{t}}\right) - \Phi\left(\frac{x-l}{2\sqrt{t}}\right) \right].$$

3. Агар стерженнинг $u|_{t=0} = f(x) = \frac{2\pi}{l}x - \sin \frac{2\pi}{l}x$ бошланғич температураси берилган ва охирлари иссиқликдан мухофазаланган, яъни $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = 0$ бўлса, узунлиги l га тенг ва сирти ҳам иссиқликдан мухофазаланган стерженда температура тақсимотини топинг.

$$\text{Ж: } u(x, t) = \pi + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{32}{\pi(2k+1)^2(2k-1)(2k+3)} \times \\ \times e^{-\left(\frac{a(2k+1)\pi}{l}\right)^2 t} \cdot \cos \frac{(2k+1)\pi x}{l}.$$

2- мустақил иш

1. $u|_{t=0} = x(l-x)$, $u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0$ шартларда

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

иссиқлик ўтказиш тенгламасини ечинг.

$$\text{Ж: } u(x, t) = \frac{8l^2}{\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\left(\frac{a(2n+1)\pi}{l}\right)^2 t} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cdot \frac{1}{(2n+1)^3}$$

2. Агар узунлиги l га тенг сирти иссиқликдан муҳофазаланган стерженнинг бошланғич температураси

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2u_0}{l}, & \text{агар } 0 \leq x \leq \frac{l}{2}, \\ \frac{2u_0}{l} (l-x), & \text{агар } \frac{l}{2} < x \leq l \end{cases}$$

бўлиб, стерженнинг учлари ҳам иссиқликдан муҳофазаланган бўлса, шу стерженда иссиқлик тақсимланишини топинг.

$$\text{Ж: } u(x, t) = \frac{u_0}{2} - \frac{4u_0}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{2(2n+1)\pi x}{l}}{(2n+1)^2} e^{-\frac{2(2n+1)^2 \pi^2 a^2 t}{l^2}}$$

3-§. Дирихле масаласини доирада Фурье усули билан ечиш

Дирихле масаласини қараймиз: доира ичида Лаплас тенгламасини қаноатлантирувчи ва доира чегарасида берилган функцияга тенг бўлган гармоник функцияни топинг.

Масалани ечиш учун кутб координаталаридан фойдаланамиз. Маркази кутбда бўлиб, радиуси R га тенг доира берилган бўлсин. $r \leq R$ доирада гармоник, $r=R$ айланада $u|_{r=R}=f(\varphi)$ шартни қаноатлантирувчи ($f(\varphi)$ — берилган функция) ва бу айланада узлуксиз бўлган $u=u(r, \varphi)$ функцияни излаймиз. Изланаётган функция доирада кутб координаталарида ёзилган ушбу Лаплас тенгламасини қаноатлантириши керак.

$$r^2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0.$$

Фурье усулидан фойдаланиб доира учун Дирихле масаласи ечимини топамиз:

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\tau) \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\tau - \varphi) + r^2} d\tau.$$

Бу интеграл *Пуассон интеграл*и деб аталади.

Мисол. Бир жинсли юнка доиравий пластинкада температура-нинг стационар тақсимланишини топинг. Пластинка радиуси R га тенг, унинг юқори қисми 1° да, пастки қисми 0° да тутиб турилади.

Ечиш. Масала шартига қўра:

$$f(\tau) = \begin{cases} 0, & \text{агар } -\pi < \tau < 0 \text{ бўлса,} \\ 1, & \text{агар } 0 < \tau < \pi \text{ бўлса.} \end{cases}$$

Температура таксимои

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\varphi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\tau - \varphi) + r^2} d\tau$$

интеграл билан аниқланади.

а) юкори ярим доира ($0 < \varphi < \pi$) нукталари учун $\operatorname{tg} \frac{\tau - \varphi}{2} = t$ алмаштиришни киритамиз, бундан $\cos(\tau - \varphi) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} dt = 1 - \frac{2dt}{1 + t^2}$. Янги интеграллаш ўзгарувчиси $t \left(-\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}\right)$ дан $\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2}$ гача ўзгаради. Шундай қилиб,

$$\begin{aligned} u(r, \varphi) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2}}^{\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2}} \frac{R^2 - r^2}{(R - r)^2 + (R + r)^2 t^2} dt = \frac{1}{\pi} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{R + r}{R - r} t \right) \Big|_{-\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2}}^{\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2}} = \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{R + r}{R - r} \operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2} \right) + \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{R + r}{R - r} \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{\pi} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{\frac{R + r}{R - r} \left(\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2} + \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} \right)}{\left(1 - \frac{R + r}{R - r} \right)^2} = -\frac{1}{\pi} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{R^2 - r^2}{2Rr \sin \varphi} \end{aligned}$$

ёки

$\operatorname{tg} u = -\frac{R^2 - r^2}{2Rr \sin \varphi}$, $0 < \varphi < \pi$. Бу тенгликни ўнг томони маъний, демак $0 < \varphi < \pi$ да u функция $\frac{1}{2} < u < 1$ тенгсизликларни қаноатлантиради. Бу ҳол учун $0 < \varphi < \pi$ да ушбу счимга эга бўламиз:

$$\operatorname{tg}(\pi - u) = \frac{R^2 - r^2}{2Rr \sin \varphi} \quad \text{ёки} \quad u = 1 - \frac{1}{\pi} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{R^2 - r^2}{2Rr \sin \varphi}.$$

б) Пастки ярим доирада жойлашган нукталар учун ($\pi < \varphi < 2\pi$) $\operatorname{ctg} \frac{\tau - \varphi}{2} = t$ ўрнига қўйишдан фойдаланамиз, бундан $\cos(\tau - \varphi) = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} dt = -\frac{2dt}{t^2 + 1}$, янги интеграллаш ўзгарувчиси $t \left(-\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2}\right)$ дан $\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}$ гача ўзгаради. У ҳолда φ нинг бу қийматлари учун ушбуга эгамиз:

$$u(r, \varphi) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\operatorname{arctg} \frac{r}{2}}^{\operatorname{arctg} \frac{r}{2}} \frac{R^2 - r^2}{(R+r)^2 + (R-r)^2 t^2} dt =$$

$$= -\frac{1}{\pi} \left[\operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{R-r}{R+r} \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} \right) + \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{R-r}{R+r} \operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2} \right) \right]$$

ёки

$$u = -\frac{1}{\pi} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{R^2 - r^2}{2Rr \sin \varphi}, \quad \pi < \varphi < 2\pi.$$

Энди унڭ томон мусбат ($\sin \varphi < 0$), шунинг учун $0 < u < \frac{1}{2}$.

3- дарсхона топириги

Кутб координаталарини киритиб, $1 \leq r \leq 2$ халканинг ички кисми учун Лаплас тенгламасининг

$$u|_{r=1} = 0, \quad u|_{r=2} = y$$

чегаравий шартларни каноатлантирувчи ечимини топинг.

$$\text{Ж: } u(r, \varphi) = \frac{8}{3} \operatorname{sh}(\ln r) \cdot \sin \varphi.$$

3- мустақил иш

$\Delta u = 0$ Лаплас тенгламаси учун Дирихле масаласининг $1 < r < 2$ халкада $u|_{r=1} = \sin 3\varphi$, $u|_{r=2} = 1 + \cos 2\varphi$ чегаравий шартларни каноатлантирувчи ечимини топинг.

$$\text{Ж: } u(r, \varphi) = \frac{\ln r}{\ln 2} \left(\frac{4}{15} r^2 - \frac{4}{15} \frac{1}{r^2} \right) \cos 2\varphi + \left(\frac{64}{63} r^{-3} - \frac{1}{63} r^3 \right) \sin 3\varphi.$$

ЭХТИМОЛЛИКЛАР НАЗАРИЯСИ ВА МАТЕМАТИК СТАТИСТИКА

1- §. Эхтимолликнинг классик ва статистик таърифлари. Геометрик эхтимоллик

14.1.1. Эхтимолликлар назариясида *ҳодиса* деб, синов натижасида рўй бериши мумкин бўлган ҳар қандай фактга айтилади.

Синов натижасида албатта рўй берадиган ҳодиса *муқаррар* (U) *ҳодиса* дейилади.

Синов натижасида ҳеч қачон рўй бермайдиган ҳодиса *мумкин бўлмаган* (V) *ҳодиса* дейилади.

Синов натижасида рўй бериши ҳам, рўй бермаслиги ҳам мумкин бўлган ҳодиса *тасодифий ҳодиса* дейилади.

Синовнинг ҳар қандай натижаси *элементар ҳодиса* дейилади.

Агар битта синовнинг ўзида A ва B тасодифий ҳодисалар бир вақтда рўй бермасалар, улар *биргаликдмас* (*биргаликди бўлмаган*) *ҳодисалар* дейилади. Агар синов натижасида бир нечта ҳодисалардан факат биттаси рўй берса, улар *ҳодисаларнинг тўла гуруҳини* ташкил этади дейилади.

Агар A ва B ҳодисаларнинг ҳеч бирини иккинчисига нисбатан рўй бериши мумкин дейишга асос бўлмаса, бу ҳодисалар *тенг имкониятли* дейилади.

A ҳодисанинг рўй бермаслигидан иборат бўлган \bar{A} ҳодиса A ҳодисага *қарама-қарши ҳодиса* дейилади.

Агар A ва B ҳодисалардан бирининг рўй бериши иккинчисининг рўй бериш ёки рўй бермаслигига таъсир этмаса, бу ҳодисалар *ўзаро эркили* (*боғлиқ бўлмаган*) *ҳодисалар* дейилади. Акс ҳолда A ва B ҳодисалар *боғлиқ ҳодисалар* дейилади.

14.1.2. Сипаш натижасида тенг имкониятдан n та элементар ҳодисалар рўй бериши мумкин бўлсин. Бирор A ҳодисанинг рўй бериши учун элементар ҳодисалардан m таси қулайлик туғдирсин. У ҳолда A ҳодисанинг классик эхтимоллиги

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

формула билан аниқланади.

Эхтимолликнинг хоссалари:

1. Муқаррар ҳодисанинг эхтимоллиги 1 га тенг, яъни

$$P(U) = 1.$$

2. Мумкин бўлмаган ҳодисанинг эҳтимоллиги 0 га тенг, яъни

$$P(V) = 0.$$

3. Тасодифий A ҳодисанинг эҳтимоллиги учун

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

уринли.

14.1.3. Эҳтимолликларни бевосита ҳисоблашда кўпинча комбинаторика формулаларидан фойдаланилади.

Ўрин алмаштиришлар деб n та турли элементларнинг бир-биридан факат жойлашиши билан фарқ қилувчи комбинацияларига айтилади. n та турли элементларнинг ўрин алмаштиришлари сони $P_n = n!$ га тенг ($n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$).

Ўринлаштиришлар n та турли элементдан m тадан тузилган комбинациялар бўлиб, улар бир-биридан ϵ элементларнинг таркиби, ϵ уларнинг тартиби билан фарқ қилади. Уларнинг сони

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!} \quad \text{ёки} \quad A_n^m = n(n-1)(n-2)\dots(n-m+1)$$

формулалар билан топилади.

Группалашлар — бир-биридан ҳеч бўлмаганда битта элементи билан фарқ қилувчи n та элементдан m тадан тузилган комбинациялардир. Уларнинг сони

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} \quad \text{га тенг.}$$

14.1.4. Ҳодисанинг *нисбий частотаси* деб ҳодиса рўй берган синовлар сонининг ўтказилган барча синовлар сонига нисбатига айтилади:

$$W(A) = \frac{m}{n},$$

бу ерда m — ҳодисанинг рўй беришлари сони, n — синовларнинг умумий сони.

Синовлар сони етарлича катта бўлганда ҳодисанинг *статистик эҳтимоллиги* сифатида нисбий частотани олиш мумкин:

$$W(A) \approx P(A) = \frac{m}{n}$$

14.1.5. Геометрик эҳтимоллик. D_1 соҳа D соҳанинг қисми (бўлаги) бўлсин. Агар соҳанинг ўлчамини (узунлиги, юзи, ҳажми) mes орқали белгиласак, таваккалга ташланган нуқтанинг D соҳага тушиш эҳтимоллиги

$$P(A) = \frac{\text{mes} D_1}{\text{mes} D} \quad \text{га тенг.}$$

1-ми с.о.л. Қутида 3 та оқ, 7 та қора шар бор. Ундан таваккалга олинган шарнинг оқ шар бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. A олинган шар оқ эканлиги ҳодисаси бўлсин. Мазкур синов 10 та тенг имкониятли элементар ҳодисалардан иборат бўлиб, уларнинг 3 таси A ҳодисага қулайлик туғдирувчидир. Демак,

$$P(A) = \frac{3}{10} = 0.3.$$

2-мисол. Гуруҳда 12 талаба бўлиб, уларнинг 8 нафари аълочилар. Рўйхат бўйича таваккалга 9 талаба танлаб олинди. Танлаб олинганлар ичида 5 талаба аълочи талаба бўлиши эҳтимоллигини топиш.

Ечиш. Синовнинг барча мумкин бўлган тенг имкониятли элементар ҳодисалари сонини C_{12}^9 га тенг. Буларнинг ичидан $C_8^5 \cdot C_4^4$ таси танлаб олинган талабалар ичидан 5 таси аълочи талабалар ҳодисаси (A) учун қулайлик туғдиради. Шунинг учун

$$P(A) = \frac{C_8^5 \cdot C_4^4}{C_{12}^9} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{12 \cdot 11 \cdot 10} = \frac{14}{55}$$

3-мисол. Қиркма алифбонинг 10 та ҳарфидан «математика» сўзи тузилган. Бу ҳарфлар тасодифан сочилиб кетган ва қайтадан ихтиёрли тартибда йиғилган. Яна «математика» сўзи ҳосил бўлиши эҳтимоллигини топиш.

Ечиш. A — «Математика» сўзи ҳосил бўлди ҳодисаси. Тенг имкониятли мумкин бўлган элементар ҳодисалар сонини $n = 10!$ бўлиб, A ҳодисага қулайлик яратувчилари $m = 2! \cdot 3! \cdot 2!$ бўлади. Бу ерда математика сўзида «м» 2 марта, «а» 3 марта, «т» 2 марта таққорланганини ҳисобга олинади.

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{2! \cdot 3! \cdot 2!}{10!} = \frac{1}{151200}$$

4-мисол. Телефонда номер тараётган абонент охириги икки рақамни эслаб чиқариб қўйди ва фақат бу рақамлар ҳар хил эканлигини эслаб қолган ҳолда уларни таваккалга терди. Керакли рақамлар терилганлиги эҳтимоллигини топиш.

Ечиш. A — иккита керакли рақам терилганлик ҳодисаси бўлсин. Ҳаммаси бўлиб, ўн та рақамдан иккитадан нечта ўринлаштиришлар тузиш мумкин бўлса шунча, яъни $A_{10}^2 = 10 \cdot 9 = 90$ та турли рақамларни териш мумкин. Шунинг учун классик эҳтимолликка кўра

$$P(A) = \frac{1}{A_{10}^2} = \frac{1}{90}$$

5-мисол. Француз табиатшуноси Бюффон (XVIII аср) танганин 4040 марта ташлаган ва бунда 2048 марта гербли томон тушган. Бу синовлар мажмуасида гербли томон тушгани частотасини топиш.

Е ч и ш.


$$W(A) = \frac{2048}{4040} \approx 0.50693.$$

6- мисол. R радиусли доврага нуқта таваккалига ташланган. Ташланган нуқтанинг доврага ички чизилган муштазам учбурчак ичига тушиши эҳтимоллигини топинг.


Е ч и ш. $S(D_1)$ — учбурчакнинг юзи, $S(D)$ — довранинг юзи бўлсин (63-шакл). A — нуқтанинг учбурчакка тушиши ҳодисаси. У ҳолда

$$P(A) = \frac{S(D_1)}{S(D)} = \frac{3\sqrt{3}R^2}{4\pi R^2} = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} \approx 0.4137.$$

$$P(A) \approx 0.4137.$$



63-шакл



64-шакл

7- мисол. $[0, 2]$ кесмадан таваккалига иккита x ва y сонлари ташланган. Бу сонлар $x^2 \leq 4y \leq 4x$ тенгсизликни қаноатлантириши эҳтимоллигини топинг.

Е ч и ш. (x, y) нуқтанинг координаталари

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 2, \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$$

тенгсизликлар системасини қаноатлантиради. Бу — (x, y) нуқта томони 2 га тенг квадрат нуқталари тўпламидан таваккалига танланишини билдиради.

Бизни қизиқтираётган A ҳодиса таъналадиган (x, y) нуқта штрихланган фигурага тегишли бўлган ҳолда ва фақат шу ҳолда рўй беради (64-шакл). Бу фигура координаталари $x^2 \leq 4y \leq 4x$ тенгсизликни қаноатлантирадиган нуқталарнинг тўплами сифатида ҳосил қилинган. Демак, изланаётган эҳтимоллик штрихланган фигура юзининг квадрат юзига нисбатига тенг, яъни

$$P(A) = \frac{\int_0^2 \left(x - \frac{1}{4}x^2\right) dx}{4} = \frac{\left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{12}x^3\right) \Big|_0^2}{4} = \frac{1}{2} - \frac{8}{12} = \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

Демак, $P(A) = \frac{1}{3}$.

1- дарсхона топшириги

1. Таваккалига 20 дан катта бўлмаган натурал сон танланганда, унинг 5 га қаррали бўлиш эҳтимоллигини топинг.

$$Ж: 0,2.$$

2. Карточкаларга 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ракамлари ёзилган. Таваккалига тўртта карточка олиниб, уларни қатор қилиб терилганда жуфт сон ҳосил бўлиши эҳтимоллигини топинг.

$$Ж: \frac{4}{9}.$$

3. Қутида 12 та оқ ва 8 та қизил шар бор. Таваккалига

а) битта шар олинганда унинг оқ бўлиши эҳтимоллигини топинг;

б) битта шар олинганда унинг қизил бўлиши эҳтимоллигини топинг;

в) 2 та шар олинганда уларнинг турли рангда бўлиши эҳтимоллигини топинг;

г) 8 та шар олинганда уларнинг 3 таси қизил рангли бўлиши эҳтимоллигини топинг;

д) 8 та шар олинганда қизил рангли шарлар 3 тадан кўп бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг;

$$Ж: а) \frac{3}{5}; б) \frac{2}{5}; в) \frac{48}{95}; г) \approx 0,35; д) \approx 0,6117.$$

4. Иккита ўйин соққаси барабар ташланганда қуйидаги ҳодисаларнинг рўй бериш эҳтимолликларини топинг:

A — тушган очколар йиғиндиси 8 га тенг.

B — тушган очколар қўпайтмаси 8 га тенг.

C — тушган очколар йиғиндиси уларнинг қўпайтмасидан катта.

$$Ж: P(A) = \frac{5}{36}; P(B) = \frac{1}{18}; P(C) = \frac{11}{36}.$$

5. Танга 2 марта ташланганда ақалли бир марта гербли томон тушиши эҳтимоллигини топинг.

$$Ж: P(A) = \frac{3}{4}.$$

6. Қутичада 6 та бир хил (номерланган) кубик бор. Таваккалига битта-битадан барча кубиклар олинганда кубикларнинг номерлари ўсиб бориш тартибида чиқиши эҳтимоллигини топинг.

$$Ж: P(A) = \frac{1}{720}.$$

7. Қутида 5 та бир хил буюм бўлиб, уларнинг 3 таси бўялган. Таваккалига 2 та буюм олинганда улар орасида:

а) битта бўялгани бўлиши;

б) иккита бўялгани бўлиши;

в) ҳеч бўлмаганда битта бўялгани бўлиши эҳтимоллигини топинг.

$$Ж: а) 0,6; б) 0,3; в) 0,9.$$

8. Учлари (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0) нукталарда бўлган квадратга (x, y) нукта ташланади. Бу нуктанинг координаталари $y < 2x$

тенгсизлиги каноатлантириши эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: } P(A) = 0,75.$$

9. Таваккалига ҳар бири бирдан катта бўлмаган иккита мусбат сон олинганда, уларнинг йигиндиси $x + y$ бирдан катта бўлмаслиги, кўпайтмаси xy эса 0,09 дан кичик бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: } P(A) \approx 0,2.$$

10. Айланага таваккалига ички учбурчак чизилади. Бу учбурчак ўткир бурчакли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: } \frac{1}{4}.$$

11. Техник назорат бўлими таваккалига олинган 100 та китобдан 5 таси яроқсиз эканини аниқлади. Яроқсиз китобларнинг нисбий частотасини аниқланг.

$$\text{Ж: } W(A) = \frac{5}{100} = 0,05.$$

1- мустақил иш

1. Домино тошларининг тўлиқ мажмуасидан (28 та тош) таваккалига биттаси олинади. Қуйидаги ходисаларнинг эҳтимоллигини топинг.

- олинган тошда 6 очко бўлиши;
- олинган тошда 5 очко ёки 4 очко бўлиши;
- чиққан очколар йигиндиси 7 га тенг бўлиши.

$$\text{Ж: а) } \frac{1}{4}; \text{ б) } \frac{13}{28}; \text{ в) } \frac{3}{28}.$$

2. Таваккалига 20 дан катта бўлмаган натурал сон танланганда унинг 20 нинг бўлувчиси бўлиши эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: } P = 0,3.$$

3. Рақамлари ҳар хил икки хонали сон ўйланган. Ўйланган сон:

- тасодифан айтилган икки хонали сон бўлиши;
- рақамлари ҳар хил бўлган тасодифан айтилган икки хонали сон бўлиши эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: а) } \frac{1}{90}; \text{ б) } \frac{1}{81}.$$

4. Алоҳида карточкаларга 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рақамлар ёзилган. Карточкалар яхшилаб аралаштирилгач, таваккалига тўрттаси олинади ва кетма-кет қатор килиб терилади. Ҳосил бўлган сон 1234 бўлиши эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: } 0,00033.$$

5. Қутида 100 та лампочка бўлиб, уларнинг 10 таси яроқсиз. Таваккалига 4 та лампочка олинади. Олинган лампочкалар ичида:

- яроқсизлари йўқ бўлиши;
- яроқлилари йўқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: } P \approx 0,65; \text{ б) } P \approx 0,00005.$$

6. R радиусли доирага нуқта ташланади. Бу нуқта доирага ички чизилган квадрат ичига тушиши эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: } P = \frac{2}{\pi}.$$

7. Таваккалига ҳар бири 2 дан катта бўлмаган иккита x ва y мусбат сон олинганда бу сонларнинг кўпайтмаси xy бирдан катта бўлмаслиги, y/x бўлима эса иккидан катта бўлмаслиги эҳтимоллигини тошинг.

$$\text{Ж: } P \approx 0,38.$$

8. Танкка қарши миналар тўғри чизик бўйлаб ҳар 15 м га жойлаштирилган. Эни 3 м бўлган танк бу тўғри чизикка перпендикуляр йуналишда келмоқда. Танкнинг милага дуч келиши эҳтимоллигини тошинг.

$$\text{Ж: } P = \frac{1}{5}.$$

9. Буюм партиясини синашда яроқли буюмлар нисбий частотаси 0,9 га тенг бўлди. Агар ҳаммаси бўлиб, 200 та буюм текширилган бўлса, яроқли буюмлар сонини тошинг.

$$\text{Ж: } 180 \text{ та}$$

10. Барча ёқлари бўялган куб 1000 та тенг «кубча»ларга аралашган. Таваккалига олинган «кубча»нинг иккита ёғи бўялган бўлиши эҳтимоллигини тошинг.

$$\text{Ж: } P = 0,096.$$

11. Яшиқда 31 та биринчи нав ва 6 та иккинчи нав деталь бор. Таваккалига 3 та деталь олинади: а) олинган учала деталь биринчи нав бўлиши; б) олинган деталларнинг ҳеч бўлмаганда биттаси биринчи нав бўлиши эҳтимоллигини тошинг.

$$\text{Ж: а) } P \approx 0,58; \text{ б) } p \approx 0,9974.$$

12. Таваккалига олинган телефон номери бешта рақамдан иборат. Унда:

а) ҳамма рақамлар ҳар хил бўлиши;

б) ҳамма рақамлар ток бўлиши эҳтимоллигини тошинг.

$$\text{Ж: а) } 0,3024; \text{ б) } 0,03125.$$

13. Шарга куб ички чизилган. Нуқта таваккалига шарга ташланади. Нуқтанинг кубга тушиши эҳтимоллигини тошинг.

$$\text{Ж: } P = \frac{2}{\pi\sqrt{3}} \approx 0,368.$$

2-§. Ҳодисалар алгебраси.

Эҳтимолликларни қўшиш ва кўпайтириш теоремалари.

Шартли эҳтимоллик

14.2.1. Иккита A ва B ҳодисанинг *йиғиндис* деб A ҳодисанинг, ёки B ҳодисанинг, ёки бу иккала ҳодисанинг рўй беришидан иборат $C = A + B$ ҳодисага айтилади.

Биргаликда бўлмаган иккита A ва B ҳодиса йиғиндисининг эҳтимоллиги бу ҳодисалар эҳтимолликларининг йиғиндисига тенг:

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

Бир нечта жуфт-жуфти билан биргаликда бўлмаган ҳодисалар йиғиндисининг эҳтимоллиги бу ҳодисалар эҳтимолликларининг йиғиндисига тенг:

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

Тўла гуруна ташкил этувчи A_1, A_2, \dots, A_n ҳодисалар эҳти молликларининг йиғиндиси 1 га тенг, яъни

$$P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = 1.$$

Қарама-қарши ҳодисалар эҳтимолликларининг йиғиндиси 1 га тенг, яъни

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1.$$

14.2.2. Иккита A ва B ҳодисанинг *қўпайтмаси* деб бу ҳодисаларнинг биргаликда рўй беришидан иборат $C = A \cdot B$ ҳодисага айтилади.

Иккита эркин ҳодисанинг биргаликда рўй бериши эҳтимоллиги бу ҳодисалар эҳтимолликларининг қўпайтмасига тенг:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B).$$

Биргаликда эркин бўлган бир нечта ҳодисанинг рўй бериши эҳтимоллиги бу ҳодисалар эҳтимолликларининг қўпайтмасига тенг:

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n).$$

B ҳодисанинг A ҳодиса рўй бериши шартли ҳисобланган эҳтимоллиги *шартли эҳтимоллик* дейилади. Шартли эҳтимоллик қуйидагича белгиланади:

$$P_1(B) \text{ ёки } P(B/A).$$

Иккита боғлиқ ҳодисанинг биргаликда рўй бериши эҳтимоллиги учун қуйидаги формулалар ўринали:

$$P(AB) = P(A) \cdot P_A(B) \text{ ёки } P(AB) = P_B \cdot P_B(A).$$

Бир нечта боғлиқ ҳодисаларнинг биргаликда рўй бериши эҳтимоллиги қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P_1(A_2) \cdot P_{1,2}(A_3) \cdot \dots \cdot P_{1,2,\dots,n-1}(A_n).$$

14.2.3. A ва B тасодифий ҳодисалар йиғиндисининг эҳтимоллиги учун қуйидаги формула ўринали:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

14.2.4. Тўла эҳтимоллик формуласи. B_1, B_2, \dots, B_n лар ҳодисаларнинг тўла гуруҳини ташкил этиб, A ҳодиса уларнинг бири билан рўй бериши мумкин бўлсин. A ҳолда

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(B_k) \cdot P_{B_k}(A).$$

14.2.5. Бейес формуласи. Агар A ходиса рўй бергани маълум бўлса, у ҳолда $P(B_k)$, $k = \overline{1, n}$ эҳтимолликларни қайта баҳолаш мумкин, яъни $P_{\cdot 1}(B_k)$ шартли эҳтимолликларни ушбу Бейес формуласи ёрдамида топиш мумкин:

$$P_{\cdot 1}(B_k) = \frac{P(B_k) \cdot P_{B_k}(A)}{P(A)}$$

1-мисол. Цехда бир нечта станок ишлайди. Смена давомида битта станокни соzлашни талаб этиш эҳтимоллиги 0,2 га тенг, иккита станокни соzлашни талаб этиш эҳтимоллиги 0,13 га тенг. Смена давомида иккитадан ортик станокни соzлашни талаб этиш эҳтимоллиги эса 0,07 га тенг. Смена давомида станокларни соzлашни талаб этилиши эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. Куйидаги ходисаларни қараймиз: A — смена давомида битта станок соzлашни талаб этади ходисаси;

B — смена давомида иккита станок соzлашни талаб этади ходисаси;

C — смена давомида 2 тадан ортик станок соzлашни талаб этади ходисаси.

A , B , C ходисалар ўзаро биргаликда эмас. Бизни куйидаги ходиса кизиқтиради: $(A + B + C)$ — смена давомида соzлаш зарур бўладиган станоклар:

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) = 0,2 + 0,13 + 0,07 = 0,4.$$

2-мисол. Иккита овчи бир пайтда бир-бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда қуёнга қарата ўқ узишди. Овчилардан ҳеч бўлмаганда бири ўқни нишонга текказса, қуён отиб олинган бўлади. Биринчи овчининг нишонга уриш эҳтимоллиги 0,8 га, иккинчисиники 0,75 га тенг бўлса, қуёни отиб олиш эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. Куйидаги ходисаларни қараймиз:

A — биринчи овчи нишонга текказиши;

B — иккинчи овчи нишонга текказиши.

A ва B эркли ходисалар. Бизни $(A + B)$ ходиса кизиқтиради.

$(A + B)$ — ҳеч бўлмаганда битта овчининг нишонга текказиши.
У ҳолда

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B) = 0,8 + 0,75 - 0,8 \cdot 0,75 = 0,95,$$

$$P(A + B) = 0,95.$$

3-мисол. Командада 12 спортчи бўлиб, уларнинг 5 таси спорт устаси. Спортчилар ичидан қуръа ташлаш орқали уч спортчи танланади. Танланган спортчиларнинг ҳаммаси спорт устаси бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. A_1 — биринчи спортчи — спорт устаси;

A_2 — иккинчи спортчи — спорт устаси;

A_3 — учинчи спортчи — спорт устаси;

$A = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$ — учала спортчи — спорт устаси.
 A_1, A_2, A_3 , ҳодисалар — боғлиқ ҳодисалар. Демак,

$$P(A) = P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 A_2}(A_3) = \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{3}{10} = \frac{1}{22}.$$

4- мисол. Талаба ўзига керакли формулани 3 та маълумотномадан қидиради. Формула биринчи, иккинчи, учинчи маълумотномада бўлиши эҳтимоллиги мос равишда 0,6; 0,7; 0,8 га тенг. Формула:

- а) фақат битта маълумотномада бўлиши;
- б) фақат иккита маълумотномада бўлиши;
- в) учала маълумотномада бўлиши;
- г) ҳеч бўлмаганда битта маълумотномада бўлиши эҳтимоллигини тошинг.

Ечиш. Қуйидаги ҳодисаларни қараймиз:

A_1 — формула биринчи маълумотномада бор,

A_2 — формула иккинчи маълумотномада бор,

A_3 — формула учинчи маълумотномада бор.

а) $A = A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$ — формула фақат битта маълумотномада бор.

$A_1 \bar{A}_2 A_3, A_1 A_2, \bar{A}_3, \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$ ҳодисалар биргаликда эмас ва $A_1, \bar{A}_2, \bar{A}_3; A_1, A_2, A_3; A_1, \bar{A}_2, A_3$ ҳодисалар боғлиқ эмас. Демак,

$$P(A) = P(A_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)P(A_2)P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3) = \\ = 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,8 = 0,188.$$

б) $A = A_1 A_2 A_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3$ — формула фақат иккита маълумотномада бор. Демак,

$$P(A) = 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,2 + 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 0,452.$$

в) $A = A_1 A_2 A_3$ — формула учала маълумотномада бор.

$$P(A) = 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 0,336.$$

г) $A = A_1 + A_2 + A_3$ — формула ҳеч бўлмаганда битта маълумотномада бор. Мазкур ҳолда A ҳодисага қарама-қарши ҳодисани қараш қўлай.

\bar{A} — формула ҳеч бир маълумотномада йўқ.

$$\bar{A} = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3, \text{ у ҳолда } P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) = \\ = 1 - 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,2 = 1 - 0,024 = 0,976.$$

Шундай қилиб, а) $P(A) = 0,188$; б) $P(A) = 0,452$; в) $P(A) = 0,336$; г) $P(A) = 0,976$.

5- мисол. Биринчи қутида 2 та оқ, 6 та қора, иккинчи қутида эса 4 та оқ, 2 та қора шар бор. Биринчи қутидан таваккалига 2 та шар олиб, иккинчи қутига солинди, шундан кейин иккинчи қутидан таваккалига битта шар олинди.

а) Олинган шар оқ бўлиши эҳтимоллиги қандай?

б) Иккинчи қутидан олинган шар оқ бўлиб чиқди. Биринчи қутидан олиб иккинчи қутига солинган 2 та шар оқ бўлиши эҳтимоллиги қандай?

Ечиш. а) Қуйидаги белгилашларни киритамиз:

A — иккинчи кутидан олинган шар оқ,
 B_1 — биринчи кутидан иккинчи кутига 2 та оқ шар солинган,
 B_2 — биринчи кутидан иккинчи кутига 2 та турли рангдаги шар солинган.

B_3 — биринчи кутидан иккинчи кутига 2 та қора шар солинган.

B_1, B_2, B_3 — ҳодисалар тўла гуруҳ ташкил этади. У ҳолда тўла эҳтимоллик формуласига кўра

$$P(A) = P(B_1)P_{B_1}(A) + P(B_2)P_{B_2}(A) + P(B_3)P_{B_3}(A).$$

$B_k, k = \overline{1,3}$ гипотезаларнинг эҳтимолликларини ва $P_{B_k}(A)$ шартли эҳтимолликларни классик схема бўйича ҳисоблаймиз:

$$P(B_1) = \frac{C_2^2}{C_8^2} = \frac{1}{28}; \quad P(B_2) = \frac{C_2^1 \cdot C_6^1}{C_8^2} = \frac{12}{28}.$$

$$P(B_3) = \frac{C_6^2}{C_8^2} = \frac{15}{28}; \quad P_{B_1}(A) = \frac{3}{4}; \quad P_{B_2}(A) = \frac{5}{8};$$

$$P_{B_3}(A) = \frac{1}{2}.$$

Топилган натижаларни тўла эҳтимоллик формуласига қўямиз:

$$P(A) = \frac{1}{28} \cdot \frac{3}{4} + \frac{12}{28} \cdot \frac{5}{8} + \frac{15}{28} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{16}.$$

б) $P_1(B_1)$ эҳтимоллиқни Бейес формуласи бўйича топамиз:

$$P_1(B_1) = \frac{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{28} \cdot \frac{3}{4}}{\frac{9}{16}} = \frac{1}{21}.$$

2- дарсхона топшириғи

1. Курсанг отиш бўйича «синов» топшириши учун 4 дан паст бўлмаган баҳо олиши керак. Агар курсант отганига «5» баҳони 0,3, «4» баҳони 0,6 эҳтимоллик билан олиши маълум бўлса, курсантнинг «синов» топшира олиш эҳтимоллигини топинг. Ж: $p=0,9$.

2. Иккита мерган нишонга қарата биттадан уқ узишда. Биринчи мерганнинг нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,6 га, иккинчиси учун 0,7 га тенглиги маълум бўлса, қуйидаги ҳодисаларнинг эҳтимолликларини топинг:

- мерганларнинг фақат бирининг нишонга текказиши;
- мерганларнинг ҳеч бўлмаганда бири нишонга текказиши;
- иккала мерган нишонга текказиши;
- ҳеч бир мерганнинг нишонга текказа олмаслиги;
- мерганларнинг ҳеч бўлмаганда бири нишонга текказа олмаслиги.

Ж: а) 0,46; б) 0,6; в) 0,42; г) 0,12; д) 0,58.

3. Ингувчига зарур деталь биринчи, иккинчи, учинчи, тўртинчи яшиқда эҳтимоллиги эҳтимоллиги мос равишда 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 га тенг. Зарур деталь:

а) кўни билан 3 та яшиқда бўлиши;

б) камн билан 2 та яшиқда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: а) 0,6976; б) 0,9572.

4. Гуруҳда 10 талаба бўлиб, уларнинг 7 нафари аълочилар. Тўрт талаба деканатга чакиртирилди. Уларнинг барчаси аълочи бўлиши эҳтимоллигини топинг. Ж: $\frac{1}{6}$.

5. Учта завод соат ишлаб чиқаради ва магазинга жўнатади. Биринчи завод бутун маҳсулотнинг 40% ини, иккинчи завод 45% ини, учинчи завод эса 15% ини тайёрлайди. Биринчи завод чиқарган соатларнинг 80% и, иккинчи завод соатларининг 70% и, учинчи завод соатларининг 90% и илгарилаб кетади. Соғиб олинган соатнинг илгарилаб кетиши эҳтимоллигини топинг. Ж: 0,77.

6. Самолётга карата учта ўк узилган. Биринчи оғишда нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,5 га, иккинчисида 0,6 га, учинчисида 0,8 га тенг. Битта ўк текканда самолётнинг уриб туширилиши эҳтимоллиги 0,3 га, иккита ўк текканда 0,6 га тенг. Учта ўк тегса, самолёт уриб туширилади. Самолётнинг уриб туширилиш эҳтимоллигини топинг. Ж: 0,594.

7. Спартакиадада биринчи гуруҳдан 4 талаба, иккинчи гуруҳдан 6, учинчи гуруҳдан 5 талаба катнашади. Институт терма жамоасига биринчи гуруҳдаги талаба 0,9 эҳтимоллик билан, иккинчи гуруҳ талабаси 0,7 ва учинчи гуруҳ талабаси 0,8 эҳтимоллик билан қабул қилиниши мумкин. Таваккалига таъланган талаба терма жамоага қабул қилиниди. Бу талабанинг қайси гуруҳда ўқиши эҳтимоллиги каттарок? Ж: Талабанинг иккинчи гуруҳда ўқиши эҳтимоллиги каттарок.

8. Цехда тайёрланадиган деталлар иккита назоратчи томонидан текширилади. Деталнинг назорат учун биринчи назоратчига тушиши эҳтимоллиги 0,6 га, иккинчи назоратчига тушиши 0,4 га тенг. Яроқли деталнинг биринчи назоратчи томонидан яроқсиз деб топиллиши эҳтимоллиги 0,06 га, иккинчи назоратчи учун эса 0,02 га тенг. Яроқсиз деб топилган деталлар текширилганда улар ичида яроқлилиги чиқиб қолди. Бу детални биринчи назоратчи текширганлиги эҳтимоллигини топинг. Ж: $\frac{9}{11}$.

2- мустақил иш

1. Битта ўк узишда нишонга тегиш эҳтимоллиги биринчи мерган учун P га, иккинчи мерган учун 0,7 га тенг. Мерганлар бир вақтда ўк узишганда роса битта ўkning нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,38 га тенглиги маълум бўлса, P ни топинг. Ж: 0,8.

2. Мергачининг битта ук узишда 10 очко уриш эхтимоллиги 0,05 га, 9 очко уриш эхтимоллиги 0,2 га, 8 очко уриш эхтимоллиги 0,6 га тенг. Битта ук узилди. Куйидаги ходисаларнинг эхтимоллигини топинг:

A — 8 дан кам булмаган очко урилган;

B — 8 дан кўп очко урилган.

Ж: $P(A) = 0,85$; $P(B) = 0,25$.

3. Устахонада учта станок ишляпти. Смена давомида биринчи станокнинг созлаши талаб этиш эхтимоллиги 0,15 га, иккинчи станок учун 0,1 га, учинчи станок учун эса 0,12 га тенг. Станоклар бараварига (бир пайтда) созлашни талаб этмайди деб хисоблаб, смена давомида ҳеч булмаганда битта станок созлашни талаб этиши эхтимоллигини топинг. Ж: $\approx 0,3268$.

4. Яшиқда 15 та деталь бўлиб, уларнинг 10 таси бўялган. Йиғувчи таваккалига 3 та деталь олади. Олинган деталларнинг барчаси бўялган бўлиши эхтимоллигини топинг. Ж: $P \approx 0,264$.

5. Бирор физикавий катталиқни бир марта ўлчашида берилган аниқликдан катта бўлган хатоликка йўл қўйилиши эхтимоллиги 0,4 га тенг. Учта боғлиқ булмаган ўлчаш ўтказилди. Бу ўлчашларнинг фақат биттасида йўл қўйилган хато берилган аниқликдан катта бўлиши эхтимоллигини топинг. Ж: 0,392.

6. Талаба 25 та имтиҳон саволларидан 20 тасига тайёрланишга улгурди. Талаба таваккалига олинган учта саволнинг камида иккитасини билиши эхтимоллигини топинг. Ж: $\frac{209}{345}$.

7. Йиғиш цехига учта автоматдан деталлар келиб тушади. Биринчи автомат 0,3%, иккинчиси 0,2%, учинчи 0,4% ярқисиз деталь ишлаб чиқариши маълум. Агар биринчи автоматдан 1000 та, иккинчисидан 2000 та, учинчисидан 2500 та деталь келиб тушгани маълум бўлса, йиғиш цехига ярқисиз деталь келиб тушганилиги эхтимоллигини топинг. Ж: 0,003091.

8. Бензин қуйиш бекати ёнидан енгил ва юк машиналари ўтиб туради. Уларнинг 60% ини юк машиналари ташкил этади. Ўтиб кетаётган машинанинг бензин олиш учун тўхташ эхтимоллиги юк машинаси учун 0,1 га, енгил машина учун эса 0,2 га тенг. Бензин қуйиш бекатига бензин қуйиб олиш учун машина келиб тўхтади. Бу юк машинаси эканлиги эхтимоллигини топинг. Ж: $\frac{3}{7}$.

3-§. Боғлиқмас синовлар кетма-кетлиги. Бернулли формуласи.

Муавр — Лаплас ва Пуассон теоремалари

14.3.1. Агар синовлар натижаларининг ҳар қандай комбинацияси боғлиқмас ҳодисалар тўпламидан иборат бўлса, бу синовлар *боғлиқмас* дейилади.

Чекли сондаги n та кетма-кет боғлиқмас синовлар ўтказилган бўлсин. Бу синовларнинг ҳар бири натижасида маълум бир ҳодиса

рўй бериши мумкин бўлса, синовларнинг бундай кетма-кетлиги *Бернулли схемаси* дейилади.

Бернулли формуласи. Хар бирида ходисанинг рўй бериш эҳтимоллиги p га тенг n та боғлиқмас синовларда бу ходисанинг роса m марта рўй бериши эҳтимоллиги

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \text{ бу ерда } q = 1 - p,$$

$$C_n^m = \frac{n!}{(n-m)!m!}$$

га тенг.

$P_n(m_1 \leq m \leq m_2)$ — n та боғлиқмас синовларда A ходисанинг камида m_1 ва кўпи билан m_2 мартагача рўй бериш эҳтимоллиги бўлсин. У ҳолда қуйидаги формула ўринлидир:

$$P_n(m_1 \leq m \leq m_2) = \sum_{m=m_1}^{m_2} C_n^m p^m q^{n-m}.$$

n та синовда ходисанинг камида бир марта рўй беришининг эҳтимоллиги

$$P_n(1 \leq m \leq n) = 1 - q^n, \quad q = 1 - p$$

га тенг.

Агар ходисанинг синовлар натижасида m_0 марта рўй бериши эҳтимоллиги қолган синовларнинг мумкин бўлган натижалари эҳтимоллигидан катта бўлса, m_0 сон энг эҳтимолли дейилади. У қуйидаги формула буйича ҳисобланади:

$$np - q \leq m_0 \leq np + q:$$

а) агар $np - q$ — каср сон бўлса, битта энг эҳтимолли m_0 сон мавжуд;

б) агар $np - q$ — бутун сон бўлса, иккита энг эҳтимолли сон m_0 ва $m_0 + 1$ мавжуд;

в) агар np — бутун сон бўлса, энг эҳтимолли сон $m_0 = np$ бўлади.

14.3.2. Лапласнинг локал теоремаси (катта n ларда). Хар бирида ходисанинг рўй бериш эҳтимоллиги p га тенг бўлган n та боғлиқмас синовларда ходиса роса m марта рўй бериш эҳтимоллиги тақрибан қуйидагига тенг:

$$P_n(m) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x),$$

бу ерда

$$x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}}, \quad \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$\varphi(x)$ функциянинг қийматлари жадвали иловада келтирилган, бунда $\varphi(x)$ — жуфт функция эканига эътибор бериш.

14.3.3. Лапласнинг интеграл теоремаси (катта n ларда). Хар бирида ҳодисанинг рўй бериш эҳтимоллиги p га тенг бўлган n та боғлиқмас синовларда ҳодисанинг камидан m_1 марта ва кўпи билан m_2 марта рўй бериш эҳтимоллиги тақрибан қуйидагига тенг:

$$P_n(m_1 \leq m \leq m_2) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1),$$

бу ерда

$$x_1 = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}, \quad x_2 = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}},$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$\Phi(x)$ — Лаплас функцияси.

$\Phi(x)$ функциянинг $x \in [0; 5]$ учун қийматлари жадвали пловлада берилган. $x > 5$ учун $\Phi(x) = 0,5$ ва $\Phi(x)$ — тоқ функция экани эътиборга олинади.

Эслатма. Лапласнинг тақрибий формулаларидан $npq > 10$ бўлган ҳолда фойдаланилади. Агар $npq < 10$ бўлса, бу формулалар катта хатоликларга олиб келади.

14.3.4. Пуассон теоремаси. Катта n лар ва кичик p ларда қуйидаги тақрибий формула ўринли:

$$P_n(m) \approx \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}, \quad \text{бу ерда } \lambda = np.$$

1- мисол. Бирор мерган учун битта ўк узишда нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,8 га тенг ва ўк узиш тартибига (номерига) боғлиқ эмас. 5 марта ўк узилганда нишонга роса 2 марта тегиш эҳтимоллигини тошинг.

Ечиш. $n=5$, $p=0,8$, $m=2$, $q=0,2$. Бернулли формуласи бўйича ҳисоблаймиз:

$$P_5(2) = C_5^2 \cdot 0,8^2 \cdot 0,2^3 = 0,0512.$$

2- мисол. Танга 10 марта ташланганда гербли томон:

а) 4 тадан 6 мартагача тушиш эҳтимоллигини;

б) ҳеч бўлмаганда бир марта тушиш эҳтимоллигини тошинг.

Ечиш. $n=10$, $m_1=4$, $m_2=6$, $p=q=0,5$.

$$\begin{aligned} \text{а) } P_{10}(4 \leq m \leq 6) &= P_{10}(4) + P_{10}(5) + P_{10}(6) = \\ &= C_{10}^4 \cdot (0,5)^4 \cdot (0,5)^6 + C_{10}^5 \cdot (0,5)^5 \cdot (0,5)^5 + C_{10}^6 \cdot (0,5)^6 \cdot (0,5)^4 = \\ &= (0,5)^{10} (C_{10}^4 + C_{10}^5 + C_{10}^6) = \frac{21}{32} \quad \text{Ж: } \frac{21}{32} \end{aligned}$$

$$\text{б) } P_{10}(1 \leq m \leq 10) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 1 - \frac{1}{1024} = \frac{1023}{1024}.$$

3- мисол. А ҳодисанинг 900 та боғлиқмас синовнинг ҳар бирида рўй бериш эҳтимолиги $p=0,8$ га тенг. А ҳодиса:

а) 750 марта, б) 710 дан 740 мартагача рўй бериш эҳтимолигини топинг.

Ечиш. $npq=900 \cdot 0,8 \cdot 0,2=144 > 10$ булгани учун а) бандда Лапласнинг локал теоремасидан фойдаланамиз, б) бандда эса Лапласнинг интеграл теоремасидан фойдаланамиз.

$$а) x = \frac{750 - 900 \cdot 0,8}{\sqrt{900 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = 2,5, \quad \varphi(2,5) \approx 0,0175.$$

$$P_{900}(750) \approx \frac{1}{12} \cdot 0,0175 \approx 0,00146.$$

$$б) x_1 = \frac{710 - 720}{12} \approx -0,83, \quad x_2 = \frac{740 - 720}{12} \approx 1,67.$$

$$\Phi(-0,83) = -\Phi(0,83) \approx -0,2967.$$

$$\Phi(1,67) \approx 0,4527.$$

$$P_{900}(710 \leq m \leq 740) \approx 0,4525 + 0,2967 = 0,7492.$$

Ж: а) 0,00146, б) 0,0236, в) 0,7492.

4- мисол. Телефон станцияси 400 абонентга хизмат кўрсатади. Агар ҳар бир абонент учун унинг бир соат ичида станцияга қўнғирок килиш эҳтимолиги 0,01 га тенг бўлса, қуйидаги ҳодисаларнинг эҳтимоликларини топинг:

а) бир соат давомида 5 абонент станцияга қўнғирок килади;

б) бир соат давомида 4 та дан кўп бўлмаган абонент қўнғирок килади;

в) бир соат давомида камида 3 абонент станцияга қўнғирок килади.

Ечиш. $p=0,01$ жуда кичик, $n=400$ эса катта булгани учун $\lambda=400 \cdot 0,01=4$ да Пуассоннинг тақрибий формуласидан фойдаланамиз.

$$а) P_{400}(5) \approx \frac{4^5}{5!} e^{-1} \approx 0,156293.$$

$$б) P_{400}(0 \leq m \leq 4) \approx 0,018316 + 0,073263 + 0,146525 + 0,195367 + 0,195367 = 0,628838;$$

$$в) P_{400}(3 \leq m \leq 400) = 1 - P_{400}(0 \leq m \leq 2) = 1 - 0,018316 - 0,073263 - 0,146525 = 0,761896.$$

Ж: а) 0,156293; б) 0,628838; в) 0,761896.

5- мисол. Бирорта қурилманинг 15 та элементининг ҳар бири синаб қўрилади. Элементларнинг синовга бардош бериш эҳтимолиги 0,9 га тенг. Қурилма элементларининг синовга бардош бера оладиган энг катта эҳтимолиги сонини топинг.

Ечиш. $n=15$, $p=0,9$, $q=0,1$.

Энг эҳтимоли m_0 сонини ушбу

$$np - q \leq m_0 \leq np + p$$

кўш тенгсизликдан топамиз. Берилганларни кўйиб,

$$15 \cdot 0,9 - 0,1 \leq m_0 < 15 \cdot 0,9 + 0,9$$

ёки

$$13,4 \leq m_0 \leq 14,4 \text{ га эга бўламиз.}$$

m_0 — бутун сон бўлгани учун изланаётган энг эҳтимолли сон $m_0 = 14$ бўлади.

Ж: 14.

3- дарсхона топшириғи

1. Қайси ҳодисанинг эҳтимоллиги катта:

а) Тенг кучли ракиб билан ўйнаб, тўртта партиядан учтасини ютиб олишми ёки саккиз партиядан бештасини ютиб олишми?

б) Тўртта партиянинг камида учтасини ютиб олишми ёки саккизта партиянинг камида бештасини ютиб олишми?

Ж: а) $\frac{1}{4}$ ва $\frac{7}{32}$ — 4 та партиядан 3 тасини ютиш эҳтимоллиги

катта;

б) $\frac{5}{16}$ ва $\frac{93}{256}$ — 8 та партиядан камида 5 тасини ютиб олиш

эҳтимоллиги катта.

2. Ўйин соккаси 800 марта ташланганда учга каррали очко 267 марта тушини эҳтимоллигини тошинг.

Ж: $P_{800}(267) \approx 0,03$.

3. 100 та станок бир-бирига боғликсиз ишлайди, шу билан бирга смена давомида уларнинг ҳар бирининг тўхтовсиз ишлаш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. Смена давомида 75 дан 85 тагача станок бетўхтов ишлаши эҳтимоллигини тошинг. Ж: 0,7887.

4. Завод оморга 5000 та сифатли буюмлар юборди. Ҳар бир буюмнинг йўлда шикастланиш эҳтимоллиги 0,0002 га тенг. 5000 та буюм ичидан йўлда:

а) роса 3 таси шикастланиши эҳтимоллигини;

б) 3 тадан кўп бўлмагани шикастланиши эҳтимоллигини;

в) 3 тадан кўп шикастланиши эҳтимоллигини тошинг.

Ж: а) 0,06313; б) 0,981; в) 0,019.

5. Техника назорат бўлими 10 та деталдан иборат партияни текширади. Деталнинг стандарт бўлиши эҳтимоллиги 0,75 га тенг. Стандарт деб тошладиган деталларнинг энг эҳтимолли сонини тошинг. Ж: $m_0 = 8$.

6. Узунлиги 15 см бўлган AB кесма C нукта билан 2:1 нисбатда бўлинган. Бу кесмага таваккалга 4 та нукта ташланади. Улардан иккитаси C нуктадан чапрокка, иккитаси унгарокка тушиши эҳтимоллигини тошинг. Нуктанин кесмага тушиш эҳтимоллиги кесма узунлигига пропорционал ва унинг жойлашишига боғлиқ эмас деб фараз қилинади. Ж: $\frac{8}{27}$.

1. Ўйин соккаси 10 марта ташланганда учга каррали очколар камида 2 марта, кўпи билан беш марта тушиши эҳтимоллигини топинг. Ж: 0,488.

2. Битта ўк узилганда нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. 100 марта ўк узилганда нишонга роса 75 марта тегиш эҳтимоллигини топинг. Ж: $P_{100}(75) = 0,04565$.

3. t вақт ичида битта конденсаторнинг ишдан чиқиши эҳтимоллиги 0,2 га тенг. t вақт ичида 100 та бир-бирига боғлиқсиз ишловчи конденсатордан:

в) камида 20 таси ишдан чиқиши;

б) 28 тадан ками ишдан чиқиши;

в) 14 тадан 28 тагачасининг ишдан чиқиши эҳтимоллигини топинг. Ж: а) 0,55; б) 0,98; в) 0,9.

4. Дўкон 1000 шиша маъданли сув олди. Ташиб келтиришда 1 та шишанинг синиб қолиши эҳтимоллиги 0,003 га тенг. Дўконга келтирилган шиша идишларнинг:

а) роса 2 таси,

б) 2 тадан ками;

в) 2 тадан кўпи;

г) ҳеч бўлмаганда биттаси синган бўлиши эҳтимоллигини топинг. Ж: а) 0,224; б) 0,1992; в) 0,5768; г) 0,95.

5. Товаршунос буюмларнинг 24 та намунасини кўриб чиқади. Ҳар бир намунанинг сотишга яроқли деб топилиш эҳтимоллиги 0,6 га тенг. Товаршунос сотишга яроқли деб топган намуналарнинг энг эҳтимолли сонини топинг. Ж: $m_0 = 14$, $m_0'' = 15$.

6. Узунлиги a бўлган AB кесмага таваккалига b та нукта ташланади. Бунда 2 та нукта A нуктадан x дан кичик масофада, 3 та нукта эса A дан x дан катта масофада ётиш эҳтимоллигини топинг. Нуктанинг кесмага тушиш эҳтимоллиги кесма узунлигига пропорционал ва унинг жойлашишига боғлиқ эмас.

$$\text{Ж: } P_3(2) = C_3^2 \left(\frac{x}{a}\right)^2 \left[\frac{(a-x)}{a}\right]^3.$$

4-§. Дискрет тасодифий миқдорлар.

Баъзи тақсимот қонуни

14.4.1 Синов натижасида олдиндан маълум бўлган қийматлардан бирини қабул қиладиган миқдор, *тасодифий миқдор* дейилади.

Дискрет тасодифий миқдор деб мумкин бўлган қийматлари чекли ёки чексиз сонли кетма-кетликлардан иборат миқдор айтилади.

X дискрет тасодифий миқдорнинг мумкин бўлган қийматлари билан уларнинг эҳтимолликлари орасидаги боғланиш тасодифий миқдорнинг *тақсимот қонуни* дейилади.

X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонуни қуйидаги усуллар билан берилиши мумкин:

а) биринчи сатри мумкин бўлган x_k қийматлардан, иккинчи сатри p_k эҳтимолликлардан иборат *жадвал ёрдамида*:

X	x_1	x_2	...	x_n
P	p_1	p_2	...	p_n

бу ерда $\sum_{k=1}^n p_k = 1$;

б) график усулда — бунинг учун тўғри бурчакли координатлар системасида (x_k, p_k) нукталар ясалди, сўнгра уларни тўғри чизик кесмалари билан туташтириб, *тақсимот кўпбурчаги* деб аталувчи фигурани ҳосил қилинади;

в) аналитик усулда (формула кўринишида):

$$P(X=x_k) = p(x_k)$$

ёки *интеграл функциялар* (таксимот функциялари) деб аталувчи функциялар ёрдамида.

14.4.2. Ҳар бир $x \in (-\infty; +\infty)$ учун X тасодифий миқдорнинг x дан кичик қиймат қабул қилиш эҳтимоллигини аниқловчи $F(x) = P(X < x)$ функция *тақсимот функцияси* дейилади.

Тақсимот функциясининг асосий хоссалари:

1. Тақсимот функциясининг қийматлари $[0; 1]$ кесмага тегишлидир:

$$0 \leq F(x) \leq 1.$$

2. Тақсимот функцияси камаймайдиган функциядир, яъни агар $x_2 > x_1$ бўлса, $F(x_2) \geq F(x_1)$.

3. X тасодифий миқдорнинг $[a, b]$ ораликдаги қийматларни қабул қилиш эҳтимоллиги тақсимот функциясининг бу ораликдаги орттирмасига тенг, яъни

$$P(a < x < b) = F(b) - F(a).$$

4. Агар X тасодифий миқдорнинг барча мумкин бўлган қийматлари (a, b) ораликка тегишли бўлса, у ҳолда

$$\begin{aligned} x \leq a \text{ да } F(x) &= 0, \\ x \geq b \text{ да } F(x) &= 1, \end{aligned}$$

Дискрет тасодифий миқдорлар тақсимотининг баъзи қонунларини қараб чиқамиз.

14.4.3. X дискрет тасодифий миқдор — ҳодисанинг n та боғлиқ-мас синовларда рўй беришлари сони, p — ҳодисанинг ҳар бир синовда рўй бериш эҳтимоллиги, $x_1 = 0, x_2 = 1, \dots, x_{n+1} = n$ — X дискрет тасодифий миқдорнинг мумкин бўлган қийматлари бўлсин. Бу қийматларга мос эҳтимолликлар ушбу Бернулли формуласи бўйича ҳисобланади:

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \quad q = 1 - p.$$

Бернулли формуласи ёрдамида аниқланадиган эҳтимолликлар тақсимоти *биномиал тақсимот* дейилади.

Биномиал қонунни жадвал кўринишида тасвирлаш мумкин:

x	0	1	2	...	n
P	q^n	$C_n^1 p q^{n-1}$	$C_n^2 p^2 q^{n-2}$...	p^n

14.4.4. Агар синовлар сони жуда катта бўлиб, ҳодисанинг ҳар қайси синовда рўй бериш эҳтимоллиги p жуда кичик бўлса, у ҳолда дискрет тасодифий миқдорнинг мумкин бўлган қийматларига мос эҳтимолликларини Бернулли формуласи бўйича эмас, балки ушбу Пуассон формуласидан фойдаланиб топиш қулай:

$$P_n(m) \approx \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}, \quad \lambda = np.$$

Пуассон формуласи ифодалайдиган эҳтимолликлар тақсимооти *Пуассон тақсимооти* дейилади.

Пуассон тақсимооти жадвал кўринишида ифодалаш мумкин:

x	0	1	2	...	m	...
P	$e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda e^{-\lambda}}{1!}$	$\frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$...	$\frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$...

1-мисол. Қутида 7 та шар бўлиб, 4 таси оқ, қолганлари эса қора. Қутидан таваққалига 3 та шар олинади.

X дискрет тасодифий миқдор — олинган оқ шарлар сони бўлса,

а) X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимоот қонунини топинг;

б) $X \geq 2$ ҳодисанинг эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. X дискрет тасодифий миқдор қабул қилиши мумкин бўлган қийматлар: 0, 1, 2, 3.

а) Мос эҳтимолликларни классик усул билан топамиз:

$$P(X=0) = \frac{C_4^0 C_3^3}{C_7^3} = \frac{1}{35}.$$

$$P(X=1) = \frac{C_4^1 \cdot C_3^2}{C_7^3} = \frac{12}{35}.$$

$$P(X=2) = \frac{C_4^2 \cdot C_3^1}{C_7^3} = \frac{18}{35}.$$

$$P(X=3) = \frac{C_4^3 \cdot C_3^0}{C_7^3} = \frac{4}{35}.$$

Демак, X — дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимоот қонуни:

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$

экан.

(Текшириш: $\frac{1}{35} + \frac{12}{35} + \frac{18}{35} + \frac{4}{35} = 1$.)

$$б) P(X \geq 2) = P(X=2) + P(X=3) = \frac{18}{35} + \frac{4}{35} = \frac{22}{35}.$$

2-мисол. Нишонга карата 4 та ўк узилади (боғлиқсиз ҳолда), бунда ҳар қайси ўк узишда нишонга тегиш эҳтимоллиги $p=0,8$ га тенг. Қуйидагиларни топинг:

а) нишонга тегишлар сонига тенг бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини;

б) $1 \leq X \leq 3$ ва $X > 3$ ҳодисаларнинг эҳтимоллигини;

в) тақсимот қўпбурчагини чизинг;

г) X — дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот функциясини топинг ва унинг графигини чизинг;

д) тақсимот функциясидан фойдаланиб $X < 3$, $1 \leq X \leq 4$ ҳодисаларнинг эҳтимоллигини ҳисобланг.

Ечиш. а) X тасодифий миқдорнинг мумкин бўлган қийматлари: 0, 1, 2, 3, 4. Мўс эҳтимолликларни Бернулли формуласи буйича ҳисоблаймиз:

$$P(X=0) = C_4^0 \cdot 0,8^0 \cdot 0,2^4 = 0,0016,$$

$$P(X=1) = C_4^1 \cdot 0,8 \cdot 0,2^3 = 0,0256,$$

$$P(X=2) = C_4^2 \cdot 0,8^2 \cdot 0,2^2 = 0,1536,$$

$$P(X=3) = C_4^3 \cdot 0,8^3 \cdot 0,2 = 0,4096,$$

$$P(X=4) = C_4^4 \cdot 0,8^4 \cdot 0,2^0 = 0,4096.$$

X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонуни — биномнал:

X	0	1	2	3	4
P	0,0016	0,0256	0,1536	0,4096	0,4096

(Текшириш: $0,0016 + 0,0256 + 0,1536 + 0,4096 + 0,4096 = 1$.)

$$б) P(1 \leq X \leq 3) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = 0,0256 + 0,1536 + 0,4096 = 0,5888.$$

$$P(X > 3) = P(X=4) = 0,4096.$$


в) тақсимот қўпбурчагини ясаймиз (65-шакл).

г) $F(x)$ нинг тақсимот қонунидан фойдаланиб, тақсимот функциясини тузамиз.


$$x \leq 0 \text{ учун } F(x) = P(X < x) = 0,$$

$$0 < x \leq 1 \text{ учун } F(x) = P(X < x) = P(X=0) = 0,0016,$$

$$1 < x \leq 2 \text{ учун } F(x) = P(X < x) = P(X=0) + P(X=1) = 0,0016 + 0,0256 = 0,0272,$$



65- шакл



66- шакл

$$2 < x \leq 3 \text{ учун } F(x) = P(X < x) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = \\ = 0,0016 + 0,0256 + 0,1536 = 0,1808,$$

$$3 < x \leq 4 \text{ учун } F(x) = P(X < x) = 0,0016 + 0,0256 + 0,1536 + \\ + 0,4096 = 0,5904,$$

$$X > 4 \text{ учун } F(x) = P(X < x) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + \\ + P(X=3) + P(X=4) = 1.$$

Демак,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,0016, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 0,0272, & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 0,1808, & \text{агар } 2 < x \leq 3, \\ 0,5904, & \text{агар } 3 < x \leq 4, \\ 1, & \text{агар } x > 4. \end{cases}$$

Таксимот функцияси графигини чизамиз (66- шакл).

д) $F(x) = P(X < x)$ бўлгани учун:

$$P(X < 3) = F(3) = 0,1808.$$

14.4.2 даги 3- хоссага кўра.

$$P(1 \leq X < 4) = F(4) - F(1) = 0,5904 - 0,0016 = 0,5888.$$

4- дарсхона топшириги

1. 6 та деталдан иборат партиядя 4 та стандарт деталь бор. Таваккалга 3 та деталь олинади. Олинган деталлар ичидаги стандарт деталлар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий микдорнинг таксимот конунини тошинг.

	X	0	1	2	3
Ж:	P	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$

2. Иккита ўйин сокқаси биргаликда икки марта ташланади:

а) иккала ўйин сокқасида жуфт очколар тушиши сонидан иборат X дискрет тасодифий миқдорнинг биномиал тақсимот қонунини топинг;

б) тақсимот қўлбурчагини ясанг;

в) тақсимот функциясини топинг ва унинг графигини чизинг;


г) $X < 2$, $1 \leq X \leq 2$ ходисаларнинг эҳтимолликларини топинг.

Ж: а)

X	0	1	2
P	$\frac{9}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{1}{16}$


 ;

б) 67- шакл;



67- шакл

$$в) F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{9}{16}, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ \frac{15}{16}, & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2 \end{cases} \text{ (68- шакл);}$$



68- шакл

$$г) P(X < 2) = P(X=0) + P(X=1) = \frac{15}{16},$$

$$P(1 \leq x \leq 2) = P(X=1) + P(X=2) = \frac{7}{16}.$$

3. Автомат телефон станция 1000 га телефон абонентига хизмат кўрсатади. 5 минут давомида АТС га абонементдан чакирик келиш эҳтимоллиги 0,005 га тенг. 5 минут давомида АТС га келган чакириklar сонидан иборат X тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини топинг:

а) 5 минут давомида АТС га ҳеч бўлмаганда битта чакирик келиш эҳтимоллиги қандай?

б) 5 минут давомида АТС га 4 тадан кўп чакирик келиш эҳтимоллиги-чи?

Ж.:	X	0	1	2	...	1000
	P	$\frac{1}{e^5}$	$\frac{5}{e^5}$	$\frac{5^2}{2e^5}$...	$\frac{5^{1000}}{1000!e^5}$

а) 0,993; б) 0,561,

4. X дискрет тасодифий микдорнинг тақсимот функцияси берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 1, \\ 0,25, & \text{агар } 1 < x \leq 3, \\ 0,4, & \text{агар } 3 < x \leq 4, \\ 0,8, & \text{агар } 4 < x \leq 5, \\ 1, & \text{агар } x > 5. \end{cases}$$

- а) $X=2$, $2 < X \leq 4$ ҳодисаларининг эҳтимолликни топинг;
 б) берилган тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини топинг.
 Ж: а) $P(X=2)=0$, $P(2 < X \leq 4)=0,15$.

б)

X	1	3	4	5
P	0,25	0,15	0,4	0,2

4- мустақил иш

1. Икки мерган битта нишонга бараварига биттадан ўқ узади. Битта ўқ узишда биринчи мерган учун нишонга тегиш эҳтимолиги 0,5 га, иккинчи мерган учун 0,4 га тенг. Дискрет тасодифий микдор — нишонга тегишлар сони.


- а) X тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини топинг;
 б) тақсимот қўпбурчагини ясанг;
 в) тақсимот функциясини топинг ва унинг графигини чизинг,
 г) $X \geq 1$ ҳодисанинг эҳтимолликни топинг.

Ж: а)


X	0	1	2
P	0,3	0,5	0,2

 ;

б) 69- шакл.



69- шакл



70- шакл

$$в) F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,3, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 0,8, & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2 \text{ (70- шакл)}; \end{cases}$$

г) $P(X \geq 1) = 0,7$.

2. Маълум бир партиядан ностандарт деталлар 10% ни ташкил этади. Таваккалига 4 та деталь танлаб олинади. Бу 4 та деталь орасида ностандарт деталлар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий микдорнинг биномиал тақсимот қонунини топинг.

Ж:	X	0	1	2	3	4
	P	0,6561	0,2916	0,0486	0,0036	0,0001

3. Милтиқдан отилган ҳар бир ўқнинг самолётга тегиш эҳтимоллиги 0,001 га тенг. 3000 та ўқ узилади. Отилган ўқларнинг самолётга текканлари сонидан иборат X тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини топинг.

Ж:	X	0	1	2	...	3000
	P	$\frac{1}{e^3}$	$\frac{3}{e^3}$	$\frac{3^2}{2e^3}$...	$\frac{3^{3000}}{3000!e^3}$

4. X дискрет тасодифий микдорнинг тақсимот функцияси берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 2, \\ 0,3, & \text{агар } 2 < x \leq 3, \\ 0,5, & \text{агар } 3 < x \leq 4, \\ 1, & \text{агар } x > 4. \end{cases}$$

а) $1 \leq X \leq 3$ ҳодисанинг эҳтимоллигини топинг;

б) X тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини топинг.

Ж: а) $P(1 \leq X \leq 3) = 0,5$;

б)	X	2	3	4
	P	0,3	0,2	0,5

5-§. Узлуксиз тасодифий микдорлар. Айрим тақсимот қонунлари

14.5.1. Бирорта чекли ёки чексиз ораликдаги барча кийматларни қабул қилиши мумкин бўлган тасодифий микдор *узлуксиз тасодифий микдор* дейилади.

Узлуксиз тасодифий микдор:

- 1) интеграл функция (тақсимот функция)си орқали,
- 2) эҳтимолликларнинг тақсимот зичлиги (дифференциал функция) орқали берилиши мумкин.

Тақсимот функциясининг таърифи ва хоссалари 4-§ да келтирилган.

X узлуксиз тасодифий микдор эҳтимолликларининг тақсимот зичлиги деб, тақсимот функцияси $F(x)$ нинг биринчи тартибли ҳосиласи бўлган $f(x)$ функцияга айтилади.

X узлуксиз тасодифий микдорнинг (a, b) ораликка тегишли кийматни қабул қилиши эҳтимоллиги қуйидаги тенглик билан аниқланади:

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Зичлик функцияси $f(x)$ ни билган ҳолда ушбу формула бўйича тақсимот функциясини топиш мумкин:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx.$$

14.5.2. Зичлик функциясининг хоссалари:

1. Зичлик функцияси манфий эмас, яъни $f(x) \geq 0$.
2. Зичлик функциясидан $-\infty$ дан $+\infty$ гача ораликда олинган ҳосмас интеграл бирга тенг:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

Хусусан, агар тасодифий микдорнинг барча мумкин бўлган кийматлари (a, b) ораликка тегишли бўлса, у ҳолда:

$$\int_a^b f(x) dx = 1.$$

Узлуксиз тасодифий микдорнинг баъзи тақсимот қонунларини кўриб чиқамиз.

14.5.3. Агар X узлуксиз тасодифий микдорнинг мумкин бўлган барча кийматлари тегишли бўлган ораликда эҳтимолликларнинг тақсимот зичлиги ўзгармас, яъни (a, b) да $f(x) = C$ бўлса ва бу

ораликдан ташқарида эса $f(x) = 0$ (C — узгармас) бўлса, X тасодифий миқдор тақсимооти *теқис* дейилади.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq a, \\ \frac{1}{b-a}, & \text{агар } a < x \leq b, \\ 0, & \text{агар } x > b. \end{cases}$$

$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$ формула асосида тақсимоот функциясини топиш

мумкин:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{агар } a < x \leq b, \\ 1, & \text{агар } x > b. \end{cases}$$

X узлуксиз тасодифий миқдорнинг (a, b) ораликка тегишли (α, β) ораликда тушиш эҳтимолиги

$$P(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{b-a} dx = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$$

га тенг.

14.5.4. Агар зичлик функцияси

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

(бу ерда a, σ — эркили параметрлар) кўринишда берилган бўлса, X узлуксиз тасодифий миқдорнинг тақсимооти *нормал* дейилади.

Нормал тақсимиланган X узлуксиз тасодифий миқдорнинг берилган ораликка тушиш эҳтимолиги ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right), \text{ бу ерда}$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \text{ — Лаплас функцияси.}$$

Четланишнинг абсолют қиймати δ мусбат сондан кичик бўлиши эҳтимолиги

$$P(|X - a| < \delta) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right)$$

га тенг.

14.5.5. Агар зичлик функцияси

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & \text{агар } x \geq 0 \end{cases}$$

(бу ерда λ — эркили параметр) кўринишда берилган бўлса, X узлуксиз тасодифий микдорнинг тақсимоти *кўрсаткичли* дейилади:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx \text{ формула асосида тақсимот функциясини топиш}$$

мумкин:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

X узлуксиз тасодифий микдор кўрсаткичли тақсимотга эга бўлса, берилган (α, β) ораликка тушиш эҳтимоллиги учун ушбу формула ўринли:

$$P(\alpha < X < \beta) = e^{-\lambda\alpha} - e^{-\lambda\beta},$$

Агар T — бирор элементнинг тўхтовсиз ишлаш давомийлиги, λ эса тўхтаб қолишлар интенсивлиги (тезлиги)ни ифодаловчи узлуксиз тасодифий микдор бўлса, у ҳолда бу элементнинг тўхтовсиз ишлаш вақти t ни тақсимот функцияси $F(t) = P(T < t) = 1 - e^{-\lambda t}$, $\lambda > 0$ бўлган (у t вақт давомида элементнинг тўхтаб қолиш эҳтимоллигини аниқлайди) кўрсаткичли қонун бўйича тақсимланган тасодифий микдор деб ҳисоблаш мумкин.

Ишончилилик функцияси $R(t)$ элементнинг t вақт ичида тўхтовсиз ишлаш эҳтимоллигини аниқлайди:

$$R(t) = e^{-\lambda t}.$$


1- мисол. X тасодифий микдор ушбу тақсимот функцияси оркали берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ x^2, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

а) 4 та боғлиқмас синув натижасида X узлуксиз тасодифий микдор роса 3-март (0,25; 0,75) ораликка тегишли қиймат қабул қилиши эҳтимоллигини топинг;

б) зичлик функцияси $f(x)$ ни топинг;

в) $F(x)$ ва $f(x)$ ларнинг графикларини чизинг.



71-шакл

Ечиш. а) Дастлаб битта синув натижасида X узлуксиз тасодикий микдорнинг берилган ораликка тушиш эхтимоллигини топамиз:

$$P(0,25 < X < 0,75) = F(0,75) - F(0,25) = 0,75^2 - 0,25^2 = 0,5625 - 0,0625 = 0,5.$$

Энди 4 та боғлиқмас синув натижасида X узлуксиз тасодикий микдор роса 3 марта берилган ораликка тегишли кийматни қабул қилиш эхтимоллигини топамиз. Бунинг учун Бернулли формуласидан фойдаланамиз:

$$P_4(3) = C_4^3 p^3 q = C_4^3 \cdot 0,5^3 \cdot 0,5 = 4 \cdot (0,5)^4 = 4 \cdot 0,0625 = 0,25.$$

Шундай қилиб, $P_4(3) = 0,25$.

б) $f(x) = F'(x)$, демак,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 2x, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

в) 71-шакл.

2-ми с о л. X узлуксиз тасодикий микдорнинг зичлик функцияси

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{\pi}{6}, \\ 3\sin 3x, & \text{агар } \frac{\pi}{6} < x \leq \frac{\pi}{3}, \\ 0, & \text{агар } x > \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

берилган. Таксимот функцияси $F(x)$ ни топинг.

$$\text{Ечиш. } F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx.$$

Агар $x \leq \frac{\pi}{6}$ бўлса, $f(x) = 0$ бўлади, демак,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dx = 0.$$

Агар $\frac{\pi}{6} < x \leq \frac{\pi}{3}$ бўлса, у ҳолда

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^{\pi/6} 0 \cdot dx + \int_{\pi/6}^x 3\sin 3x dx = 0 - \cos 3x \Big|_{\pi/6}^x = \\ &= -(\cos 3x - \cos \frac{\pi}{2}) = -\cos 3x. \end{aligned}$$

Агар $x > \frac{\pi}{3}$ бўлса, у ҳолда

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^{\pi/6} 0 \cdot dx + \int_{\pi/6}^{\pi/3} 3\sin 3x dx + \int_{\pi/3}^x 0 \cdot dx = 0 - \cos 3x \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} + 0 = \\ &= (-\cos \pi + \cos \frac{\pi}{2}) = 1. \end{aligned}$$

Шундай қилиб,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{\pi}{6}, \\ -\cos 3x, & \text{агар } \frac{\pi}{6} < x \leq \frac{\pi}{3}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{\pi}{3}. \end{cases}$$

3-ми с.о.л. X узлуксиз тасодифий миқдорнинг зичлик функцияси бутун Ox ўқида

$$f(x) = \frac{2C}{e^x + e^{-x}}$$

тенглик билан берилган. Ўзгармас C параметрни топинг.

Ечиш. Зичлик функцияси $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ шартни қаноатлантириши керак. Шунинг учун

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2C}{e^x + e^{-x}} dx = 2C \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = 1,$$

бу ердан $C = \frac{1}{2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}}$. Қуйидаги аниқмас интегрални қарай-

миз:

$$\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{e^x dx}{1 + e^{2x}} = \int \frac{d(e^x)}{1 + (e^x)^2} = \operatorname{arctg} e^x.$$

Хосмас интегрални ҳисоблашга ўтамиз:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{e^x + e^{-x}} + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctg e^x \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow \infty} \arctg e^x \Big|_0^b = \lim_{a \rightarrow -\infty} (\arctg 1 - \arctg e^a) + \\ &+ \lim_{b \rightarrow \infty} (\arctg e^b - \arctg 1) = \left(\frac{\pi}{4} - 0\right) + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Шундай қилиб, $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \frac{\pi}{2}$. Демак, $C = \frac{1}{2 \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{1}{\pi}$.

Ж: $C = \frac{1}{\pi}$.

4- мисол. Бир соат ($0 \leq t \leq 1$, t бирлиги соатларда ҳисобланган вақт) ичида бекатга фақат битта автобус келиб тўхтайти. Вақтнинг $t=0$ пайтида бекатга келган йўловчининг автобусни 10 минутдан ортик қутмаслик эҳтимоллиги қандай?

Ечиш. Бекатга $t=0$ пайтида келган йўловчининг автобусни кутиш вақтини $[0; 1]$ ораликда текис тақсимланган X тасодифий миқдор сифатида қараш мумкин. Бу текис тақсимотнинг зичлик функцияси қуйидаги кўринишда бўлади:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 1, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

$b-a=1-0=1$ — тасодифий миқдор X нинг қийматлари жойлашган $[0, 1]$ ораликнинг узунлиги.

$\beta - \alpha = \frac{1}{6} - 0 = \frac{1}{6}$ — қулайлик туғдирувчи элементар натижалар жойлашган $\left[0; \frac{1}{6}\right]$ ораликнинг узунлиги. Шунинг учун

$$P\left(0 < X < \frac{1}{6}\right) = \frac{\beta - \alpha}{b - a} = \frac{\frac{1}{6}}{1} = \frac{1}{6}.$$

Ж: $\frac{1}{6}$.

5- мисол. X узлуксиз тасодифий миқдор кўрсаткичли конун бўйича тақсимланган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0, \\ 2e^{-2x}, & \text{агар } x \geq 0. \end{cases}$$

Синоф натижасида X тасодикий микдорнинг $(0,3; 1)$ ораликка тушиш эхтимоллигини топинг.

Е ч и ш. $P(0,3 < X < 1) = e^{-(2 \cdot 0,3)} - e^{-(2 \cdot 1)} = e^{-0,6} - e^{-2} = 0,54881 - 0,13534 \approx 0,41$.

Ж: 0,41.

6- м и с о л. Элементнинг тўхтовсиз ишлаш эхтимоллиги $f(t) = 0,02e^{-0,02t}$ ($t > 0$) кўрсаткичи конун бўйича тақсимланган. Элементнинг тўхтовсиз 50 соат ишлаши эхтимоллигини топинг.

Е ч и ш. Ишончлилик функцияси $R(t) = e^{-\lambda t}$ дан фойдалансак,

$$R(50) = e^{-0,02 \cdot 50} = e^{-1} \approx 0,3679$$

бўлади.

7- м и с о л. X тасодикий микдор эхтимолликлар тақсимотининг $a=0$, $\sigma=2$ параметрли нормал конунига бўйсунсин. X тасодикий микдорнинг $(-2; 3)$ ораликка тушиши эхтимоллигини аниқланг.

Е ч и ш. Ушбу

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right)$$

формуладан фойдалансак:

$$P(-2 < X < 3) = \Phi\left(\frac{3-0}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-2-0}{2}\right) = \Phi(1,5) - \Phi(-1) = \Phi(1,5) + \Phi(1)$$

$\Phi(x)$ функция жадвалидан:

$$\Phi(1,5) = 0,43319, \Phi(1) = 0,34134.$$

Демак,

$$P(-2 < X < 3) = 0,43319 + 0,34134 = 0,77453.$$

Ж: 0,77453.

8- м и с о л. X тасодикий микдор нормал конун бўйича тақсимланган, a ва σ параметрлар мос ҳолда 20 ва 10 га тенг. Абсолют киймат бўйича четланиш учдан кичик бўлиш эхтимоллигини топинг.

Е ч и ш. $P(|X-a| < \delta) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right)$ формуладан фойдаланамиз.

Шартга кўра $\delta=3$, $a=20$, $\sigma=10$. Демак, $P(|X-20| < 3) = 2\Phi\left(\frac{3}{10}\right) = 2\Phi(0,3)$. Жадвалдан $\Phi(0,3) = 0,1179$. Демак, изланаётган эхтимоллик:

$$P(|X-20| < 3) = 0,2358.$$

5- дарсхона топшириги

1. X тасодикий микдор $[0; \pi]$ кесмада $f(x) = A \sin x$, бу кесмадан ташқарида $f(x) = 0$ эхтимолликлар зичлигига эга

а) A ни аниқланг;



б) тақсимот функцияси $F(x)$ ни топинг;

в) $P\left(-\frac{\pi}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}\pi\right)$ эхтимолликни топинг;

г) $f(x)$ ва $F(x)$ функцияларнинг графикни чизинг.

Ж: а) $A = \frac{1}{2}$; б) $F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \sin^2 \frac{x}{2}, & \text{агар } 0 < x \leq \pi, \\ 1, & \text{агар } x > \pi. \end{cases}$ в) $3/4$.

г) 72- шакл.



72- шакл

2. Автобуслар 5 минут оралик билан катнайдилар. Бекатда автобус кутиш вақти X текис тақсимланган деб, қуйидагиларни топинг:

а) $F(x)$ тақсимот функциясини.

б) эхтимолликлар зичлиги $f(x)$ ни;

в) кутиш вақтининг 2 минутдан ошмаслик эхтимоллигини



топинг;

г) $f(x)$ ва $F(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

Ж: а) $F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,2x, & \text{агар } 0 < x \leq 5, \\ 1, & \text{агар } x > 5. \end{cases}$

б) $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,2, & \text{агар } 0 < x \leq 5, \\ 0, & \text{агар } x > 5. \end{cases}$ в) $P(X \leq 2) = 0,4$;

г) 73- шакл.



73- шакл

3. X тасодифий микдор эхтимолликлар тахсимотининг параметрлари $a=20$, $\sigma=5$ бўлган нормал қонунига бўйсунсин. Синов натижасида X тасодифий микдорнинг (15; 25) оралиқда жойлашган қиймат қабул қилиш эхтимоллигини топинг. Ж: $P(15 < X < 25) = 0,6826$.

4. Бирор модда систематик хатоларсиз тортилади. Тортишдаги тасодифий хатоликлар ўрта квадратик четланиши $\sigma=20$ г бўлган нормал қонунга бўйсунди. Тортиш абсолют қиймат бўйича 10 г дан ошмайдиган хатолик билан бажарилиши эхтимоллигини топинг.

Ж: $P(|X| < 10) = 2\Phi(0,5) = 0,383$.

5. Телевизорнинг бузилмай ишлаши эхтимоллиги ушбу кўрсаткичли қонун бўйича тахсимланган:

$$f(t) = 0,002e^{-0,002t} (t > 0).$$

Телевизорнинг 1000 соат бузилмай ишлаши эхтимоллигини топинг.

Ж: $R(1000) = e^{-2} \approx 0,1359$.

5- мустақил иш

1. X тасодифий микдорнинг эхтимолликлар зичлиги берилган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ ax, & \text{агар } 0 < x \leq 2, \\ 0, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

а) a ни аниқланг;

б) тахсимот функцияси $F(x)$ ни топинг;

в) $f(x)$ ва $F(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

$$\text{Ж: а) } a=0,5; \text{ б) } F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,25x^2, & \text{агар } 0 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

в) $P(X > 1) = 0,75$.

2. X тасодифий микдор $[0, 2]$ кесмада текис тахсимот қонунига эга,

а) эхтимолликлар зичлиги $f(x)$ ва тахсимот функцияси $F(x)$ ни топинг; б) $0 < X < 0,5$ ҳодисанинг эхтимоллигини топинг, в) $f(x)$ ва $F(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг

$$\text{Ж: а) } F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,5x, & \text{агар } 0 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,5, & \text{агар } 0 < x \leq 2, \\ 0, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

б) $P(0 < X < 0,5) = 0,25$

3. X тасодифий микдор эҳтимолликлар тақсимотининг параметрлари $a=30$, $\sigma=10$ бўлган нормал қонунига бўйсунди. X микдор (10; 50) ораликка тегишли қиймат қабул қилиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: $P(10 < X < 50) = 0,9544$.

4. X тасодифий микдор нормал тақсимланган. Бу микдорнинг ўрта квадратик четланиши 0,4 га тенг. Тасодифий микдорнинг абсолют қиймати бўйича a дан четлашиши 0,3 дан кичик бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: 0,5468.

5. Элементнинг тўхтовсиз ишлаш вақти кўрсаткичли тақсимотга эга:

$$F(t) = 1 - e^{-0,002t} \quad (t > 0).$$

$t=24$ соат давомида элементнинг:

а) ишламай қолиш эҳтимоллигини;

б) ишлаб туриш эҳтимоллигини топинг.

Ж: $F(24) = 0,3812$, $R(24) = 0,6188$.

6-§. Дискрет ва узлуксиз тасодифий микдорларнинг математик кутилиши ва дисперсияси

14.6.1. X дискрет тасодифий микдорнинг математик кутилиши $M(X)$ деб унинг мумкин бўлган барча қийматларини уларнинг эҳтимолликларига кўпайтмалари йиғиндисига тенг сонга айтилади.

$$M(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n = \sum_{k=1}^n x_k p_k.$$

$$p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1.$$

Агар ихтиёрий x ва y сонлар ҳамда X ва Y тасодифий микдорлар учун

$$P(X < x, Y < y) = P(X < x) \cdot P(Y < y)$$

тенглик ўринли бўлса, X ва Y тасодифий микдорлар *боғлиқмас тасодифий микдорлар* дейилади.

Математик кутилишнинг хоссаларини келтирамыз:

1. Ўзгармас микдорнинг математик кутилиши ўзгармаснинг ўзига тенг:

$$M(C) = C.$$

2. Тасодифий микдорлар йиғиндисининг математик кутилиши кўшилувчилар математик кутилишларининг йиғиндисига тенг:

$$M(X + Y) = M(X) + M(Y).$$

3. Боғлиқмас тасодифий микдорлар кўпайтмасининг математик кутилиши кўпайтувчилар математик кутилишларининг кўпайтмасига тенг:

$$M(XY) = M(X) \cdot M(Y).$$

4. Ўзгармас кўпайтувчи математик кутилиш белгиси олдига чиқарилади:

$$M(CX) = CM(X),$$

C — ўзгармас сон.

14.6.2. X тасодифий микдорнинг *дисперсияси* деб тасодифий микдорнинг ўзининг математик кутилишидан четланиши квадратининг математик кутилишига айтилади.

Агар $[X - M(X)]$ тасодифий микдорнинг четланиши бўлса, у ҳолда

$$D(X) = M[X - M(X)]^2.$$

Амалда бошқа формуладан фойдаланиш қулай:

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2.$$

Дисперсиянинг хоссаларини келтирамиз:

1. Ўзгармаснинг дисперсияси нолга тенг:

$$D(C) = 0.$$

2. Ўзгармас кўпайтувчини квадратга ошириб, дисперсия белгисидан ташқарига чиқариш мумкин:

$$D(CX) = C^2 D(X), \quad C — \text{ўзгармас сон.}$$

3. Боғлиқмас тасодифий микдорлар йиғиндиси (айирмаси) нинг дисперсияси қўшилувчилар дисперсияларининг йиғиндисига тенг:

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y).$$

14.6.3. 1. Дискрет тасодифий микдорнинг биномиал тақсимоти учун

$$M(X) = n \cdot p, \quad D(X) = n \cdot p \cdot q.$$

2. Пуассон тақсимоти учун:

$$M(X) = \lambda, \quad D(X) = \lambda.$$

14.6.4. Узлуксиз тасодифий микдор мумкин бўлган қийматларини бутун сон ўқида қабул қилсин, $f(x)$ унинг зичлик функцияси бўлсин.

Агар $\int_{-\infty}^{\infty} |x|f(x)dx$ интеграл мавжуд бўлса, $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x)dx$ интеграл X узлуксиз тасодифий микдорнинг математик кутилиши дейилади, яъни

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx.$$

Агар мумкин бўлган барча кийматлар (a, b) ораликка тегишли бўлса, у ҳолда

$$M(X) = \int_a^b x f(x) dx.$$

Из ох. Математик кутилишнинг дискрет тасодифий микдорлар учун хоссалари узлуксиз тасодифий микдорлар учун ҳам ўринли.

14.6.5. X узлуксиз тасодифий микдорнинг мумкин бўлган кийматлари Ox ўқида ётса, унинг дисперсияси қуйидаги тенглик орқали аниқланади:

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - M(X)]^2 f(x) dx$$

ёки

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - [M(X)]^2.$$

Агар X узлуксиз тасодифий микдорнинг мумкин бўлган барча кийматлари (a, b) ораликка тегишли бўлса, у ҳолда

$$D(X) = \int_a^b [x - M(X)]^2 f(x) dx$$

ёки

$$D(X) = \int_a^b x^2 f(x) dx - [M(X)]^2.$$

Из ох: Дисперсиянинг дискрет тасодифий микдорлар учун хоссалари узлуксиз тасодифий микдорлар учун ҳам ўринли.

14.6.6. Тасодифий микдорнинг ўрта квадратик четланиши деб дисперсиядан олинган квадрат илдизга айтилади:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

14.6.7. Математик кутилиш ва дисперсия:

1) текис таксимланган узлуксиз тасодифий микдор учун:

$$M(X) = \frac{a+b}{2}, \quad D(X) = \frac{(b-a)^2}{12};$$

2) кўрсаткичли таксимот учун:

$$M(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad D(X) = \frac{1}{\lambda^2};$$

3) нормал таксимот учун:

$$M(X) = a, \quad D(X) = \sigma^2.$$

1- мисол. X тасодифий микдор ушбу таксимот конуни билан берилган:

X	0	1	2	3	4
P	0,2	0,4	0,3	0,08	0,02

$M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Е чи ш. Тасодифий микдор дискрет бўлгани учун 14.6.1 ва 14.6.2 даги формулаларга кўра:

$$M(X) = 0 \cdot 0,2 + 1 \cdot 0,4 + 2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,08 + 4 \cdot 0,02 = 1,32.$$

X^2	0	1	4	9	16
P	0,2	0,4	0,3	0,08	0,02

$$M(X^2) = 0 \cdot 0,2 + 1 \cdot 0,4 + 4 \cdot 0,3 + 9 \cdot 0,08 + 16 \cdot 0,02 = 2,64.$$

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = 2,64 - (1,32)^2 = 2,64 - 1,7424 = 1,8976;$$

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} \approx 1,3775.$$

Шундай қилиб, $M(X) = 1,32$; $D(X) = 1,8976$; $\sigma(X) \approx 1,3775$.

2- мисол. Иккита боғлиқмас синовда A ходисанинг рўй беришлар сонидан иборат X дискрет тасодифий микдорнинг дисперсиясини топинг, бунда ходисанинг бу синовларда рўй бериш эҳтимолликлари тенг ва $M(X) = 0,9$ экани маълум.

Е чи ш. X дискрет тасодифий микдор биномиал конун бўйича таксимланган, шунинг учун $M(X) = n \cdot p$. Шартга кўра $M(X) = 0,9$, $n = 2$. Демак, $2p = 0,9$, $p = 0,45$, $q = 1 - 0,45 = 0,55$.

$$D(X) = npq = 2 \cdot 0,45 \cdot 0,55 = 0,495.$$

Шундай қилиб, $D(X) = 0,495$.

3-ми с.о.л. X узлуксиз тасодифий микдорнинг зичлик функцияси берилган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{\pi}{6}, \\ 3\sin 3x, & \text{агар } \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{3}, \\ 0, & \text{агар } x > \frac{\pi}{3}. \end{cases}$$

X тасодифий микдорнинг сонли характеристикалари — $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Е ч и ш.

$$\begin{aligned} M(X) &= \int_a^b x f(x) dx = \int_{\pi/6}^{\pi/3} x \cdot 3\sin 3x dx = \\ &= 3 \int_{\pi/6}^{\pi/3} x \cdot \sin 3x dx = 3 \left(-\frac{1}{3} x \cos 3x \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} + \frac{1}{3} \int_{\pi/6}^{\pi/3} \cos 3x dx \right) = \\ &= \left(\begin{array}{l} u = x \\ dv = \sin 3x dx \end{array} \Big| \begin{array}{l} du = dx \\ v = -\frac{1}{3} \cos 3x \end{array} \right) = \\ &= 3 \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) \left(\frac{\pi}{3} \cos \pi - \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{2} \right) + 3 \frac{1}{9} \sin 3x \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} = \\ &= - \left(-\frac{\pi}{3} - 0 \right) + \frac{1}{3} \left(\sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{3} - \frac{1}{3} = \frac{\pi-1}{3} \approx 0,7133. \\ D(x) &= \int_a^b x^2 f(x) dx - [M(X)]^2 = 3 \int_{\pi/6}^{\pi/3} x^2 \sin 3x dx - \left(\frac{\pi-1}{3} \right)^2. \end{aligned}$$

Кейинги интегрални ҳисоблаб оламиз:

$$\begin{aligned} 3 \int_{\pi/6}^{\pi/3} x^2 \sin 3x dx &= \left(\begin{array}{l} u = x^2 \\ dv = \sin 3x dx \end{array} \Big| \begin{array}{l} du = 2x dx \\ v = -\frac{1}{3} \cos 3x \end{array} \right) = \\ &= 3 \left[-x^2 \cdot \frac{1}{3} \cos 3x \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} + \frac{2}{3} \int_{\pi/6}^{\pi/3} x \cos 3x dx \right] = -x^2 \cos 3x \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} + \\ &+ 2 \int_{\pi/6}^{\pi/3} x \cos 3x dx = - \left(\frac{\pi^2}{9} \cos \pi - \frac{\pi^2}{36} \cos \frac{\pi}{2} \right) + 2 \left(\frac{1}{3} x \sin 3x \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} - \right. \\ &\left. - \frac{1}{3} \int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin 3x dx \right) = \left(\begin{array}{l} u = x \\ dv = \cos 3x dx \end{array} \Big| \begin{array}{l} du = dx \\ v = \frac{1}{3} \sin 3x \end{array} \right) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\pi^2}{9} + \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{3} \sin \pi - \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{2} \right) - \frac{2}{3} \left(-\frac{1}{3} \cos 3x \Big|_{\pi/6} \right) = \\
 &= \frac{\pi^2}{9} - \frac{\pi}{9} + \frac{2}{9} (\cos \pi - \cos \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi^2}{9} - \frac{\pi}{9} + \frac{2}{9} (-1) = \frac{\pi^2 - \pi - 2}{9}; \\
 D(X) &= \frac{\pi^2 - \pi - 2}{9} - \left(\frac{\pi - 1}{3} \right)^2 = \frac{\pi^2 - \pi - 2}{9} - \frac{\pi^2 - 2\pi + 1}{9} = \\
 &= \frac{\pi^2 - \pi - 2 - \pi^2 + 2\pi - 1}{9} = \frac{\pi - 3}{9} \approx 0,0155.
 \end{aligned}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{0,0155} \approx 0,1245.$$

4- мисол. Текис тақсимланган X тасодифий миқдор зичлик функцияси билан берилган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq a-l, \\ \frac{1}{2l} & \text{агар } a-l < x \leq a+l, \\ 0, & \text{агар } x > a+l. \end{cases}$$

$M(X)$ ва $D(X)$ ни топинг.

Ечиш. 14.6.8 даги формулалардан фойдаланамиз:

$$M(X) = \frac{a+b}{2}, \text{ демак, } M(X) = \frac{a-l+a+l}{2} = \frac{2a}{2} = a;$$

$$D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \text{ демак,}$$

$$D(X) = \frac{(a+l-a+l)^2}{12} = \frac{(2l)^2}{12} = \frac{4l^2}{12} = \frac{l^2}{3}.$$

Шундай қилиб, $M(X) = a$; $D(X) = \frac{l^2}{3}$.

5- мисол. X тасодифий миқдор нормал тақсимланган бўлиб, математик кутилиши $a=10$ га тенг. X тасодифий миқдорнинг (10; 20) ораликка тушиш эҳтимоллиги 0,3 га тенг бўлса, унинг (0; 10) ораликка тушиш эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. Нормал эгри чизик (Гаусс эгри чизиги) $x=a=10$ тўғри чизикка нисбатан симметрик бўлгани учун юқоридан нормал эгри чизик билан, пастдан эса (0; 10) ҳамда (10; 20) ораликлар билан чегараланган юзлар бир-бирига тенг. Бу юзлар сон жиҳатдан X тасодифий миқдорнинг тегишли ораликларга тушиш эҳтимолликларига тенг. Шунинг учун:

$$P(0 < X < 10) = P(10 < X < 20) = 0,3.$$

6-мисол. Зичлик функцияси $f(x) = 10e^{-10x}$ ($x \geq 0$) билан берилган кўрсаткичли таксимотнинг математик кутилиши, дисперсияси, ўрта квадратик четланишини топинг.

Ечиш. $\lambda = 10$.

$$M(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{10} = 0,1.$$

$$D(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{100} = 0,01.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \frac{1}{\lambda} = 0,1.$$

7-мисол. Таксимот функцияси $F(x) = 1 - e^{-0,1x}$ ($x > 0$) билан берилган кўрсаткичли таксимотнинг $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларини топинг.

Ечиш. $\lambda = 0,1$, $M(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,1} = 10$,

$$D(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{0,01} = 100, \quad \sigma(X) = \frac{1}{\lambda} = 10.$$

6-дарсхона топшириги

1. X тасодифий микдор — ўйин соққасини бир марта ташланганда тушадиган очколар сони. $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 3,5$; $D(X) = 2,92$; $\sigma(X) = 1,71$.

2. Нишонга қарата ҳар бир отишда тегиш эҳтимоллиги $p = 0,8$ бўлган 4 та ўқ узилади (боғлиқмас ҳолда). Нишонга тегишлар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий микдорнинг сонли характеристикалари $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 3,2$; $D(X) = 0,64$; $\sigma(X) = 0,8$.

3. X узлуксиз тасодифий микдор зичлик функцияси $f(x)$ билан берилган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\frac{\pi}{2}, \\ 0,5 \cos x, & \text{агар } -\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{агар } x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

$M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 0$; $D(X) \approx 0,4649$; $\sigma(X) \approx 0,68$.

4. X узлуксиз тасодифий микдор зичлик функцияси $f(x)$ билан берилган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 2, \\ 0,5, & \text{агар } 2 < x \leq 4, \\ 0, & \text{агар } x > 4. \end{cases}$$

$M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 3$; $D(X) = \frac{1}{3}$; $\sigma(X) = 0,58$.

5. X узлуксиз тасодифий миқдор зичлик функцияси $f(x)$ билан берилган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0, \\ 5e^{-5x}, & \text{агар } x \geq 0. \end{cases}$$

$M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 0,2$; $D(X) = 0,04$; $\sigma(X) = 0,2$.

6. Агар $M(X) = 3$, $D(X) = 16$ эканлиги маълум бўлса, нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг зичлик функциясини топинг.

$$\text{Ж: } f(x) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-3)^2}{32}}$$

6- мустақил иш

1. Қутида 7 та шар бўлиб, уларнинг тўрттаси оқ, қолгилари қора. Қутидан таваккалига 3 та шар олинади. X — олинган оқ шарлар сони. $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ни топинг.

Ж: $M(X) = 1\frac{5}{7}$; $D(X) \approx 0,49$; $\sigma(X) \approx 0,7$.

2. Иккита ўйин соққаси бараварига 2 марта ташланади. X — иккала ўйин соққасидаги тушган жуфт очколар сони. $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 0,5$; $D(X) = \frac{3}{8} = 0,375$; $\sigma(X) \approx 0,612$.

3. X узлуксиз тасодифий миқдор зичлик функцияси билан берилган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 2x, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

$M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = \frac{2}{3}$; $D(X) = \frac{1}{18}$; $\sigma(X) = 0,236$.

4. (2; 8) ораликда текис тақсимланган X тасодифий миқдорнинг $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларини топинг.

Ж: $M(X) = 5$; $D(X) = 3$; $\sigma(X) = \sqrt{3}$.

5. X узлуксиз тасодифий миқдор зичлик функцияси

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0, \\ 0,04e^{-0,04x}, & \text{агар } x \geq 0 \end{cases}$$

билан берилган. $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 25$; $D(X) = 625$; $\sigma(X) = 25$.

6. Нормал таксимланган X тасодифий микдор зичлик функцияси

$$f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-1)^2}{50}}$$

билан берилган. $M(X)$, $D(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 1$, $D(X) = 25$.

11- назорат иши

1.1. Цехда 7 эркак ва 6 аёл ишлайди. Таваккалига 8 киши ажратилганда, улар орасида уч аёл бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.2. Яшикдаги деталларининг 20% и яроқсиз. Олинган 3 та деталнинг кўпи билан биттаси яроқсиз бўлиб чиқиши эҳтимоллигини топинг.

1.3. Биринчи кутида 12 та шар бўлиб, уларнинг 8 таси ок, иккинчи кутида 15 та шар бўлиб, уларнинг 4 таси ок. Биринчи кутидан иккинчисига 2 та шар солинади. Иккинчи кутидан таваккалига олинган шар қора бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.4. $p(A) = 0,6$ бўлсин. A ҳодисанинг 2400 боғлиқсиз синовда роса 1400 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

1.5. Партияда 12% ностандарт деталлар бор. Таваккалига 5 та деталь олинади. Олинган деталлар ичида ностандарт деталлар сони — X дискрет тасодифий микдорнинг тақсимот қонуни ва $M(X)$, $D(X)$, $P(1 < X \leq 2)$, $F(x)$ ларни топинг.

2.1. Кутида номерланган олтига куб бор. Таваккалига биттадан ҳамма кублар олинганда ҳосил бўлган соннинг бешга бўлиниши эҳтимоллигини топинг.

2.2. Буюмнинг стандарт бўлиши эҳтимоли 0,8 га тенг. Тўртта буюмнинг ҳеч бўлмаганда биттаси стандарт бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.3. Учта қутининг ҳар бирида 6 та қора ва 4 та ок шар бор. Биринчи кутидан таваккалига битта шар олиб, иккинчисига солинади, шундан сўнг иккинчи кутидан таваккалига битта шар олиниб, учинчи кутига солинади. Учинчи кутидан таваккалига олинган шарнинг ок бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.4. Янги туғилган 70 чакалокнинг камида 40 ва кўпи билан 65 нафари ўғил бола бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.5. Бир-бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда ишлайдиган 4 та асбобдан иборат қурилма текширилади. Агар асбобларнинг бузилиб қолиш эҳтимолликлари $p_1 = 0,3$, $p_2 = 0,4$, $p_3 = 0,5$ ва $p_4 = 0,6$ бўлса, бузилиб қолган асбоблар сонидан иборат X дискрет тасодифий микдорнинг тақсимот қонуни $F(x)$ ни ва $P(2 < X < 4)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

3.1. 52 та картадан иборат тўлик дастадан таваккалига 4 та карта олинганда роса 2 таси гиштин бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.2. Курилма бир-бирига боғликсиз ишлайдиган учта элементдан иборат. Уларнинг бузилиб қолиши эҳтимоллари 0,05; 0,08; 0,07 га тенг. Иккита элемент бузилиб қолиши эҳтимоллигини топинг.

3.3. 10 та милтикнинг 4 таси оптик нишонга олиш мосламасига эга. Бундай мосламали милтиқдан нишонга уриш эҳтимоллиги 0,9 га, усиз 0,7 га тенг. Таваккалига олинган милтиқдан 2 та ўқ узилган. Агар мерган иккала ҳолда ҳам нишонга уролмаган бўлса, оптик мосламали милтик танланмаганлиги эҳтимоллигини топинг.

3.4. Ўйин соккасини 50 марта ташланганда «олтилик» камида 10, кўпи билан 25 марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

3.5. Тўқувчи 1000 та урчукка хизмат кўрсатади. Бир минут ичида битта урчукда ип узилиш эҳтимоллиги 0,004 га тенг. Ипи узилган урчуқлар сонидан иборат X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $M(X)$, $D(X)$, $P(100 < X < 200)$, $F(x)$ ларни топинг.

4.1. 20 та команда иккита гуруҳга бўлинади. Иккита энг кучли команда бошқа-бошқа гуруҳларга тушиши эҳтимоллигини топинг.

4.2. Тўрт мерган нишонга қарата ўқ узишади. Нишонга тегиш эҳтимолликлари мос ҳолда 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 га тенг: а) учта мерган нишонга ургани; б) нишон мўлжалга олингани эҳтимоллигини топинг.

4.3. Биринчи қутида 12 та шар бўлиб, уларнинг 7 таси оқ, иккинчи қутида 15 та шар бўлиб, уларнинг 5 таси оқ. Ҳар қайси қутидан биттадан шар олинди, сўнгра бу икки шардан таваккалига биттаси олинди. Агар танланган шар қора бўлса, олинган иккала шарнинг қора бўлиши эҳтимоллигини топинг.

4.4. Партияда 30% яроқсиз деталлар бор. 50 та деталнинг ичидан 10 тадан кўпи яроқсиз бўлиб чиқиши эҳтимоллигини топинг.

4.5. Иккита тўпдан навбатма-навбат нишонга қарата тўплардан бири нишонни мўлжалга олгунча ўқ узилади. Нишонга тегиш эҳтимолликлари тўплар учун мос ҳолда 0,7 ва 0,3. Биринчи тўп узган ўқлар сонидан иборат дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(2 \leq X \leq 5)$ ларини топинг.

5.1. Узунликлари 1, 3, 5, 7 ва 9 см бўлган бешта кесма мавжуд. Таваккалига олинган учта кесмадан учбурчак тузиш мумкинлиги эҳтимоллигини топинг.

5.2. Учта мерган нишонга қарата ўқ узишди. Нишоннинг биринчи мерган томонидан «яксон» қилиниш эҳтимоллиги 0,8 га, иккинчи ва учинчи мерганлар учун мос ҳолда 0,7 ва 0,9 га тенг. Иккитадан кўп бўлмаган мерган нишонни «яксон» қилиши эҳтимоллигини топинг.

5.3. Ичида 10 та шар бўлган қутига оқ шар солинди, шундан сўнгра таваккалига 2 та шар олинди. Иккала шар оқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.4. $p(A) = 0,8$ бўлсин. A ҳодиса 21 та синовнинг кўпчилигида рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

5.5. Курилма 1000 та элементдан иборат бўлиб, исталган

элементнинг T вақт давомида ишдан чиқиш эҳтимоллиги 0,002 га тенг. Ишдан чиққан элементлар сони бўлган X дискрет тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини, $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(X > 100)$ ларни топинг.

6.1. 52 талик карталар дастасидан таваккалига 3 та карта олинади. Булар «уч», «еттилик», «туз» бўлиши эҳтимоллигини топинг.

6.2. Таваккалига олинган буюмнинг юкори навли бўлиш эҳтимоллиги 0,7 га тенг. Олинган тўртта буюмнинг фақат иккитаси юкори навли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

6.3. Лабораторияда 6 та автомат ва 4 та ярим автомат бор. Бузилиб қолиш (ишдан чиқиш) эҳтимоллиги автомат учун 0,1 га, ярим автомат учун эса 0,2 га тенг. Таваккалига олинган машина автомат бўлса, унинг ишдан чиқиши эҳтимоллигини топинг.

6.4. $p(A) = 0,7$ бўлсин. A ходиса 50 та синовда 10 дан 25 мартагача рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

6.5. Овчининг 3 та ўқи бор. Y нишонга қарата биринчи ўқ теккунча отади. Агар ҳар қайси ўқ узишда хато кетиш эҳтимоллиги 0,2 га тенг бўлса, сарф қилинган ўқлар сонидан иборат X дискрет тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини, $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(X > 2)$ ларни топинг.

7.1. Қутида 12 шар бўлиб уларнинг 5 таси оқ ва 7 таси қора. Таваккалига 3 та шар олинади. Олинган шарларнинг 2 таси қора ва 1 таси оқ бўлиши эҳтимоллиги қандай?

7.2. 4 та боғлиқмас ходисанинг ҳар бири мос ҳолда 0,012; 0,01; 0,006 ва 0,002 эҳтимолликлар билан рўй бериши мумкин. Ҳеч бўлмаганда битта ходисанинг рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

7.3. Лампочкалар партиясида 100 та лампочкага 0 дан 5 тагача яроксизлари тўғри келиши мумкин. 100 та лампочкадан таваккалига 10 таси олинди. Олинган барча 10 та лампочка яроқли эканлиги маълум бўлса, партиядagi ҳамма лампочкалар яроқли бўлиши эҳтимоллигини аниқланг.

7.4. Тенг кучли шахматчилар учун

а) 70 та ўйиндан 60 тасини ютиш;

б) камида 40 та ўйинни ютиш эҳтимоллиги қандай?

7.5. Автомобилнинг бутун йўли давомида тўртта светофор бор. Уларнинг ҳар бири 0,5 эҳтимоллик билан ё йўлни очади, ё ҳаракатни тақиқлайди. Автомобилнинг биринчи тўхташигача ўтган светофорлар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

8.1. Яшиқда 90 та сифатли ва 10 та яроксиз буюм бор. Таваккалига олинган 5 та буюмнинг 2 тадан кўп бўлмагани яроксиз эканлиги эҳтимоллигини топинг.

8.2. Қурилма учта элементдан иборат. Биринчи, иккинчи, учинчи элементларнинг тўхтовсиз ишлаш эҳтимолликлари мос ҳолда 0,6; 0,7; 0,8 га тенг. Ҳеч бўлмаганда битта элемент ишдан чиқиши эҳтимоллигини топинг.

8.3. 3 та қутининг ҳар бирида 7 та қора ва 3 та оқ шар бор. Ҳар

кайси қутидан таваккалига биттадан шар олинади, сўнгра бу учта шардан бири олинади. Бу шар қора рангда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

8.4. Уйини сокқаси 60 марта ташланганда «учлик» 15 дан кам марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

8.5. Қурилма деталларни штамповка қилади. Деталь яроксиз бўлиб чиқиши эҳтимоллиги 0,01 га тенг. 10 та деталь ичида яроксизларининг сонидан иборат X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(5 < X \leq 8)$ ларни топинг.

9.1. Таваккалига олинган икки хонали соннинг рақамлари йиғиндиси 9 га тенг бўлиши эҳтимоллигини топинг.

9.2. Биринчи тадқиқотчининг хатога йўл қўйиши эҳтимоллиги 0,1 га, иккинчи ва учинчи тадқиқотчилар учун эса 0,2 ва 0,3 га тенг.

а) ҳеч бўлмаганда битта тадқиқотчининг;

б) иккита тадқиқотчининг хатога йўл қўйиши эҳтимоллигини топинг.

9.3. Бешта қути бор: 1-, 2- ва 3- қутиларда 2 тадан оқ ва 3 тадан қора шар бор, 4- ва 5- қутиларда 1 тадан оқ ва 1 тадан қора шар бор. Дуч келган битта қутидан таваккалига битта шар олинади. Агар олинган шар қора бўлса, тўртинчи қути танланганлиги эҳтимоллигини топинг.

9.4. Маълумотни узатишда битта белгининг бузилиш эҳтимоли 0,1 га тенг. 10 та белгидан иборат маълумотда 3 та бузилиш борлиги эҳтимоллиги қандай?

9.5. Орасида 4 та яроксизи бўлган 10 та деталдан иборат партиядан таваккалига 4 та деталь олинади. Олинган деталлар ичидаги яроксизлари сонидан иборат дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $\sigma(X)$, $P(X > 2)$ ларини топинг.

10.1. 8 та бир хил карточкага 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 сонлар ёзилган. Таваккалига иккита карточка олинади. Олинган иккита карточкадаги сонлардан тузилган каср қисқарувчи бўлиши эҳтимоллигини топинг.

10.2. Электр занжиридаги узилиш R элементнинг ёки иккита r_1 ва r_2 элементларнинг ишдан чиқиши туфайли рўй бериши мумкин. (Бу элементларнинг ишдан чиқиши эҳтимолликлари 0,3; 0,2 ва 0,1 га тенг.)

а) занжирнинг узилиш эҳтимоллигини топинг;

б) элементлардан бирининг ишдан чиқиши эҳтимоллигини топинг.

10.3. Йиғувчи 3 яшиқ деталь олади: биринчи яшиқда 40 та деталь бўлиб, 5 таси бўялган; иккинчисида 50 та деталь бўлиб, 10 таси бўялган; учинчисида 30 та деталь бўлиб, 20 таси бўялган. Таваккалига танланган яшиқдан таваккалига олинган деталь бўялган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

10.4. Янги туғилган 50 чақалоқ ичида ўғил болалар ками билан 25 ва кўпи билан 35 тани ташкил этиши эҳтимоллиги қандай?

10.5. Дарслик 100000 нусхада чоп этилган. Дарслик нотўғри муковаланган бўлиши эҳтимоллигини 0,0001 га тенг. Хамма китоблар орасидаги яроксизлари сонидан иборат X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(100 < X < 1000)$ ларни топинг.

11.1. Ўйин соккаси ташланади. Туб сон тушиши эҳтимоли қандай?

11.2. Яшиқда 100 деталь бўлиб, уларнинг 10 таси яроксиз. Таваккалига 4 та деталь олинган. Олинган деталлар ичида:

а) иккитаси яроксиз;

б) ҳеч бўлмаганда биттаси яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

11.3. Деталлар биринчи партиясининг $2/3$ қисми яроксиз, иккинчи ва учинчи партиядо барча деталлар яроқли. Таваккалига битта деталь олинади. Олинган деталнинг яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

11.4. Алоқа каналлари орқали 1000 та белги юборилади. Битта белгининг бузилиш эҳтимоллиги 0,005 га тенг. Роса 50 та белгининг бузилиши эҳтимоллигини топинг.

11.5. 3 та асбоб текширилади. Ҳар қайси асбоб ундан олдинги асбоб яроқли (ишончли) бўлиб чиққандагина текширилади. Ҳар бир асбоб учун синовга бардош бериш эҳтимоллиги 0,9 га тенг. Асбобларни синаш сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $P(X > 1)$ ларни топинг.

12.1. Таваккалига танланган икки хонали бутун сонни квадратга оширганда тўрт билан туговчи сон ҳосил бўлиши эҳтимоллигини аниқланг.

12.2. Мерган марказий доира ва иккита концентрик ҳалқадан иборат нишонга қарата битта ўк узади. Доира ва ҳалқаларга ўк тегиши эҳтимоллиги мос равишда 0,2; 0,5; 0,1 га тенг. Ўкнинг ҳалқага тегиши эҳтимоллигини топинг.

12.3. Бензин қуйиш станцияси жойлашган шоссе бўйлаб ўтаётган юк машиналари сонининг енгил машиналар сонига нисбати 3:2 каби. Юк машинасининг бензин олиш учун станцияга кириш эҳтимоллиги 0,1 га, енгил машина учун 0,2 га тенг. Бензин олиш учун кириб келган машина — юк машинаси бўлиши эҳтимоллигини топинг.

12.4. Танга ташланади. Танга 11 марта ташланганда гербли томон 3 марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

12.5. Сокка 3 марта ташланади. «Олтилик» тушишлари сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(X < 2)$ ларни топинг.

13.1. Битта тоқчадаги 10 та китоб таваккалига қўздан кечирил-япти. Учта маълум китобнинг ёнма-ён турганлиги эҳтимоллигини топинг.

13.2. Мерганнинг битта ўк узишда нишонга текказиш эҳтимоли

0,8 га тенг. Бешта ўқ узишда нишонга камида тўрт марта тегиш эҳтимоллигини топинг.

13.3. Иккита автомат деталлар тайёрлайди. Биринчи автоматнинг ностандарт деталь тайёрлаш эҳтимоллиги 0,07 га, иккинчисиники эса 0,09 га тенг. Иккинчи автоматнинг ишлаб чиқариш унумдорлиги биринчи автоматнинг унумдорлигидан уч марта юқори. Таваккалига олинган деталнинг стандарт бўлиши эҳтимоллигини топинг.

13.4. Тангани 80 марта ташланганда 50 марта «герб» тушиши эҳтимоллигини топинг.

13.5. Қурилма учта элементдан тузилган. Битта синовда ҳар қайси элементнинг ишдан чиқиш эҳтимоллиги 0,4 га тенг. Ишдан чиққан элементлар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодикий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ва $P(X > 1)$ ларни топинг.

14.1. Ўнта бир хил карточкага холдан тўққизгача турли сонлар ёзилган. Бу карточкалар ёрдамида таваккалига тузилган уч хонали соннинг 36 га бўлиниши эҳтимоллигини топинг.

14.2. Ўнта қўлёзма 30 та папкага жойлашган (битта қўлёзмага 3 та папка). Таваккалига олинган 6 та папкада бирорта ҳам қўлёзма бутунича жойлашмаслик эҳтимоллигини топинг.

14.3. Автобус паркидан 1- номердаги 6 та автобус, 2- номердаги 4 та автобус ва 3- номердаги 5 та автобус ихтиёрий тартибда чиқиб кетди. Иккинчи бўлиб чиққан автобуснинг 2- номерли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

14.4. Оилада 5 та фарзанд бор. Уларнинг 3 тадан кўп бўлмагани ўғил болалар экани эҳтимоллигини топинг.

14.5. Ишчи 3 та станокка хизмат кўрсатади. Бир соат ичида станокнинг ишчига «эҳтиёжи бўлмаслик» эҳтимоллиги I станок учун 0,9 га, II станок учун 0,8 га, III станок учун 0,7 га тенг. Бир соат ичида ишчининг аралашуви талаб этилмайдиган станоклар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодикий миқдорнинг тақсимот қонунини, $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, ва $\sigma(X)$ ларни топинг.

15.1. «36 дан 5» спортлого ўйнида мукофот олиш эҳтимоллиги қандай? (Мукофот олиши учун камида 3 та ракам тўғри топилиши керак.)

15.2. Йиғувчига керак бўлган деталь биринчи, иккинчи ва учинчи яшиқларда бўлиши эҳтимоллиги мос ҳолда 0,6; 0,7; 0,8 га тенг. Зарур деталнинг камида иккита яшиқда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

15.3. Яшиқда 1- заводда тайёрланган 10 та деталь, 2- заводда тайёрланган 5 та деталь ва 3- заводда тайёрланган 15 та деталь бор. Йиғувчи деталларни битталаб олади. Иккинчи олишида 2- заводда тайёрланган деталь чиқиши эҳтимоллигини топинг.

15.4. $p(A) = 0,25$ бўлсин. A нинг ҳодиса 243 та синовда 70 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

15.5. Икки тўпдан нишонга қарата галма-гал тўплардан бири нишонга текказгунча ўқ узилади. Ҳар қайси тўпнинг нишонга

текказиш эҳтимоллиги мос равишда 0,3 ва 0,7 га тенг. Иккинчи тўп сарф қилган ўқлар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(X > 10)$ ларни топинг.

16.1. Тўққиз йўловчи трамвайнинг 3 та вагонига чиқиб жойлашдилар. Ҳар бир йўловчи вагонни таваккалига танлайди. Бир вагонга тўрт йўловчи, бошқасига уч, учинчи вагонга эса икки йўловчи чиққанлиги эҳтимоллиги қандай?

16.2. Икки тўпдан бараварига отилганда нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,46 га тенг. Агар иккинчи тўпнинг нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,7 га тенг бўлса, биринчи тўп учун бу эҳтимоллик қандай бўлади? Тўпларнинг ҳеч бўлмаганда бири нишонга текказиши эҳтимоллигини топинг.

16.3. Иккита қутининг ҳар бирида 7 та қора, 3 та оқ шар бор. Иккинчи қутидан таваккалига иккита шар олинди ва биринчи қутига солинди. Биринчи қутидан олинган шар оқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

16.4. Ўйин соққасини 90 марта ташлашда 3 га қаррали соннинг камида 100, кўпи билан 170 марта чиқиши эҳтимоллигини топинг.

16.5. Иккита мерган галма-галдан нишонга қарата ўқ узишади. Битта ўқ узишда хато кетиш эҳтимоллиги биринчи мерган учун 0,2 га, иккинчиси учун 0,4 га тенг. Агар тўрттадан ортиқ ўқ узилмаган бўлса, нишонга теккунча отилган ўқлар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(X > 2)$ ларни топинг.

17.1. Қурилма 3 таси эскириб қолган 5 та элементдан иборат. Қурилмани тасодифан ишга туширилганда 2 та элемент ишлайди. Қурилманинг ишга тушмай қолиши эҳтимоллигини топинг.

17.2. Ҳодисанинг ҳар бир синовда рўй бериш эҳтимоллиги 0,2 га тенг. Синовлар бирин-кетин, ҳодиса рўй бергунча ўтказилади. Иккитадан кўп бўлмаган синов ўтказилиш эҳтимоллигини топинг.

17.3. 12 та милтикнинг 5 таси оптик нишонга олиш мосламасига эга. Бундай мосламали милтиқдан нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,9 га, мосламасиз милтиқдан эса 0,75 га тенг. Мерган таваккалига олган милтиқдан иккита ўқ узди. У иккала ҳолда ҳам нишонга текказганлигининг эҳтимоллигини топинг.

17.4. Битта ўқ узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. 5 та ўқ узилганда 4 таси нишонга тегиши эҳтимоллигини топинг.

17.5. Нишон 1-номерли доира ҳамда 2- ва 3-номерли концентрик ҳалкалардан иборат. 1-номерли доирага текказишга 10 очко, 2-номерли ҳалкага — 5 очко ва 3-номерли ҳалкага текказишга (— 1) очко берилади. Доирага ва ҳалкаларга текказиш эҳтимолликлари мос ҳолда 0,5, 0,3, 0,2 га тенг. Учта ўқ узилганда тўпланган очқолар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини, $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ва $P(X > 10)$ ларни топинг.

18.1. Кучада учраган биринчи автомобилнинг номери бир хил рақамлардан иборат бўлиши эҳтимоллигини аниқланг.

18.2. 100 та буюмдан иборат партияда 20 та стандарт буюм бор. Тавақкалига 3 та буюм олинди. Уларнинг ичида камида иккитаси стандарт бўлиши эҳтимоллигини топинг.

18.3. Тирда бешта милтик бўлиб, улардан нишонга текказиш эҳтимолликлари 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 га тенг. Тавақкалига олинган милтиқдан бир марта ўқ узишда нишонга текказиш эҳтимоллигини аниқланг.

18.4. $p(A) = 0,7$ бўлсин. A ҳодисанинг 2100 та синовда 1000 марта руй бериши эҳтимоллигини топинг.

18.5. Иккита ўйин соққаси бир пайтда ташланади. Иккаласида ҳам жуфт очко чиқиш соҳидан иборат бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини, $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ва $P(X > 2)$ ларни топинг.

19.1. «45 дан 6» спортлото ўйинида ютиб олинган эҳтимоллиги қандай? (Мукофот олиш учун камида 4 та рақам тўғри топиллиши керак.)

19.2. Икки спортчиинг ҳар бири учун бирор машини яхши бажариш эҳтимоллиги 0,5 га тенг. Спортчилар машини навбат билан бажарадилар, бунда ҳар бир спортчи уч мартадан уринади. Спортчиларнинг ҳеч бўлмаганда бири мукофотни олиши эҳтимоллигини топинг.

19.3. Биринчи қутида 1 та оқ ва 9 та қора шар, иккинчи қутида 1 та қора ва 5 та оқ шар бор. Ҳар қайси қутидан биттадан шар олинб ташланди ва қолган ҳамма шарларни учинчи қутига солинди. Учинчи қутидан олинган шар оқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

19.4. Ўйин соққаси 70 марта ташланганда тоқ очколар 50 дан 65 мартагача тушиши эҳтимоллигини топинг.

19.5. Агар X тасодифий миқдор иккита $x_1 < x_2$ кийматга эга бўлиб, $P(X = x_1) = 0,3$; $M(X) = 3,7$, $D(X) = 0,21$ бўлса, бу тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини топинг.

20.1. Тавақкалига танланган икки хонали соннинг тўқ сон бўлиши эҳтимоллигини топинг.

20.2. Яшиқда 15 та деталь бўлиб, уларнинг 10 таси бўялган. Тавақкалига 5 та деталь олинади. Уларнинг орасида камида 4 таси бўялган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

20.3. Автобус паркидан 1-номерадаги 6 та, 2-номерадаги 4 та ва 3-номерадаги 10 та автобус чиқиб кетди. Иккинчи бўлиб чиққан автобуснинг 1-номера бўлиши эҳтимоллигини топинг.

20.4. $p(A) = 0,8$ эканлиги маълум. A ҳодисанинг 100 та синовда камида 75 марта руй бериши эҳтимоллигини топинг.

20.5. Иккита бомбардимончи самолёт нишонга теккунча галдан галдан бомба ташлайди. Биринчи самолётнинг нишонни аниқ мўлжалга олиш эҳтимоллиги 0,7 га, иккинчисиники эса 0,8 га тенг. Агар самолётларнинг ҳар бирида 3 тадан бомба бўлса, ташланган бомбалар соҳидан иборат X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини, $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(X > 2)$ ларни топинг.

21.1. Болалар учун санаторийга 12 та, сайёҳлар лагерига 8 та ва спорт лагерига 5 та пулланма ажратилди. Агар 3 уртокнинг ота-оналари бир-бирдан беҳабар биттадан пулланма олган бўлса, бу 3 уртокнинг битта лагерга тушиб қолиши эҳтимоллиги қандай?

21.2. Биринчи станокнинг бир соат давомида узлуксиз ишлаш эҳтимоллиги 0,75 га, иккинчи станокники эса 0,8 га тенг. Агар станоклар бир-бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда ишласалар, бир соат давомида фақат битта станок тўхташи эҳтимоллиги қандай?

21.3. Асбоблар иккита заводда тайёрланади. Биринчи завод барча маҳсулотнинг $\frac{2}{3}$ қисмини тайёрлайди, уларнинг 5% и яроқсиз, иккинчи завод $\frac{1}{3}$ қисмини тайёрлайди, уларнинг 7% и яроқсиз. Яроқли деталь олингани эҳтимоллигини тошинг.

21.4. Ташгани 45 марта ташланганда «герб» 15 марта тушини эҳтимоллигини тошинг.

21.5. Овчи паррашлага карата, ўк теккунча отади, лекин тўрттадан кўп бўлмаган ўк узинга улгуради, ҳоло. Агар битта ўк узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,7 га тенг бўлса, узишган ўклар сонидан иборат бўлган X тасодифий миқдорнинг тақсимот қонуни ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни тошинг.

22.1. Ўқувчининг биринчи имтихонни тошширини эҳтимоллиги 0,9 га, иккинчисини тошшириш эҳтимоллиги 0,8 га, учинчисини тошшириш эҳтимоллиги 0,7 га тенг. Ўқувчининг: 1) барча имтихонларни; 2) ақалли битта имтихонни тошшириш эҳтимоллиги қандай?

22.2. Автобусда 5 йўловчи бор. Қолган 5 та бекатнинг ҳар бирида биттадан йўловчи тушиб қолиши эҳтимоллигини тошинг.

22.3. Асбоб икки хил тарз (режим)да ишлайди. Иш жараёнининг 80% ида одатдаги (нормал) иш тарзи кузатилади, 20% ида одатдан ташқари (нормал бўлмаган) иш тарзи кузатилади. Одатдаги тарзда асбобнинг ишдан чиқиш эҳтимоллиги 0,2 га, одатдан ташқари тарзда ишдан чиқиш эҳтимоллиги эса 0,7 га тенг. Асбобнинг ишдан чиқиши эҳтимоллигини тошинг.

22.4. Қайси бирининг эҳтимоллиги каттарок: ташгани гўрт марта ташлаганда «герб»нинг 2 марта тушишинингми ёки 8 марта ташланганда «герб»нинг 4 марта тушишинингми?

22.5. Қиз ва угил болаларнинг туғилиш эҳтимолликлари тенг деб фараз қилинади. Тўрт болали оиладаги угил болалар сонидан иборат бўлган X тасодифий миқдорнинг тақсимот қаторини тузинг. $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни тошинг.

23.1. 3 та станок ишламоқда. Бу станокларнинг бир соат давомида созлашни талаб қилмаслик эҳтимолликлари мос равишда 0,95; 0,8; 0,8 га тенг. Бир соат ичида ҳеч бўлмаганда битта станокнинг созлашни талаб этмаслик эҳтимоллигини тошинг.

23.2. 4ч уртокнинг иккитаси учрашувга келди. Агар уларнинг учрашувга келиш эҳтимолликлари мос равишда 0,1; 0,3; 0,5 га тенг бўлса, учрашувга биринчи ва учинчи уртокнинг келиши эҳтимоллигини тошинг.

23.3. 4ч хил идишлар бўлиб, 1-хилда 3 идиш, унинг ҳар бири

ичида 5 та ок ва 3 га қора шар бор. 2- хилда 3 идиш, уларнинг ҳар бири ичида 6 та ок ва 2 та қора шар бор. 3- хилда 4 идиш, уларнинг ҳар бири ичида 7 та ок ва 9 та қора шар бор. Таваккалига танланган идишдан таваккалига шар олинад. Бу шарнинг қора бўлиши эҳтимоллиги қандай?

23.4 Янги тугилган 200 чақалоқнинг камида 90 таси угил болалар бўлиши эҳтимоллиги қандай?

23.5. Учта мерган битта нишонга қарата ўк узишади. Нишонга текказиш эҳтимоллиги биринчи мерган учун 0,8 га, иккинчиси учун 0,6 га, учинчиси учун 0,5 га тенг. Нишонга теккан ўклар сонидан иборат бўлган X тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

24.1. Автомат станок деталлари штамплайди. Бир соат ичида бирорга ҳам яроқли деталь ишлаб чиқармаслик эҳтимоллиги 0,9 га тенг. 3 соат ичида чиқарилган барча деталларнинг яроқли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

24.2. Пигув цехига 3 та цехдан деталлар келтирилади: биринчи цехдан 6 та; иккинчи цехдан 7 та, учинчи цехдан 8 та. Таваккалига бир найла олинган иккита деталнинг 1- цехдан ёки 2- цехдан бўлиши эҳтимоллиги қандай?

24.3. Иккита станокда деталлар тайёрланади, бунда биринчи станок иккинчисига нисбатан 3 марта кўп деталь тайёрлайди. Биринчи станокнинг яроқсиз деталлари 2,5%ни, иккинчисиники 1,5%ни ташкил этади. Таваккалига олинган деталь яроқсиз бўлиб чиқди. Бу деталнинг иккинчи станокда тайёрланган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

24.4. Янги тугилган 200 чақалоқнинг 100 таси угил болалар бўлиши эҳтимоллиги қандай?

24.5. Тўшдан узилган битта ўк билан нишонни муҳжалга олиш эҳтимоллиги 0,4 га тенг. Учта ўк узилганда нишонга теккизишлар сонидан иборат бўлган X тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

25.1. Таваккалига олинган телефон номери 6 та рақамдан тuzилган. Барча рақамларнинг турлича бўлиши эҳтимоллиги қандай?

25.2. Қутида 9 та 40 ваттли, 11 та 60 ваттли электр лампочкалар аралаштириб қўйилган. Таваккалига олинган 2 та лампочканинг бир хил қувватли бўлиши эҳтимоллиги қандай?

25.3. Пигув цехига 1- цехдан 600 та, 2- цехдан 500 та, 3- цехдан 900 та деталь келиб тушади. 1- цехнинг яроқсиз деталлари 5%ни, 2- цехники 8%ни, 3- цехники 3%ни ташкил этади. Таваккалига олинган деталнинг яроқсиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

25.4. Агар $p(A) = 0,25$ бўлса, A ҳодиса 6 та синовда 3 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

25.5. Ичида 5 та ок ва 7 та қора шар бўлган идишдан 4 та шар олинад. Олинган ок шарлар сонидан иборат бўлган X тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

26.1. Қутида 5 та ок, 10 та қизил ва 6 та қора шар бор.

Таваккалига 2 та шар олинади. Олинган шарларнинг бири ок, иккинчиси қора бўлиши эҳтимоллиги қандай?

26.2. Мерган нишонга карага 4 марта ўк узади. Хар қайси ўк узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,7 га тенг. Унинг ҳеч бўлмаганда бир марта нишонга текказиш эҳтимоллиги қандай?

26.3. Қуйидаги ҳодисаларни қарайлик: эртага яхши об-ҳаво, коникарли об-ҳаво, ёмон об-ҳаво бўлади. Уларнинг эҳтимолликлари мос ҳолда 0,3; 0,4; 0,3 га тенг. Яхши об-ҳавода 0,9 эҳтимоллик билан, коникарли об-ҳавода 0,7 эҳтимоллик билан, ёмон об-ҳавода 0,2 эҳтимоллик билан сайрга чиқилади. Эртага сайрга чиқиш эҳтимоллигини тошинг.

26.4. Уйин соккаси 960 марта гашланганда 3 га қаррали соннинг 100 марта чиқиши эҳтимоллигини тошинг.

26.5. Иккита таиға уч мартадан ташланади. Гербли томон тушмишар сонидан иборат бўлган X тасодифий миқдорнинг таксимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни тошинг.

27.1. Олтига бир хил карточкага 2, 4, 7, 8, 12, 14 сонлари ёзилган. Иккита карточка олинади. Ҳосил қилинган каср қисқарадиган бўлиши эҳтимоллиги қандай?

27.2. « n » та конверт ва уларга мос « n » хаг бор. Хатлар конвертларга таваккалига солинади. Ҳеч бўлмаганда битта хатнинг тегишли конвертга тушмаслик эҳтимоллигини тошинг.

27.3. Гуруҳда 3 аълочи, 4 «тўртчи», 6 «уччи» ва 1 «иккичи» бор. Билетда ҳаммаси бўлиб 20 савол бор. Аълочи барча 20 та саволга жавоб бера олади, «тўртчи» 16 та саволга, «уччи» 10 та саволга, «иккичи» 5 та саволга жавоб бера олди. Таваккалига чақирилган талаба 3 та саволга жавоб берди. Бу талабанинг «иккичи» экани эҳтимоллигини тошинг.

27.4. Битта ўк узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. 100 та ўк узганда 75 марта нишонга тегиш эҳтимоллигини тошинг.

27.5. Агар битта ўк узишда нишонга тегиш эҳтимоллиги $3/4$ га тенг бўлса, 3 та ўк узишда нишонга тегишлар сонидан иборат бўлган X тасодифий миқдорнинг таксимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни тошинг.

28.1. Мерган унга қараб ҳаракат қилаётган нишонга қарата ўк қилиши биринчи ўк узишда нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,4 га тенг ва улардан кейинги ўк узишда 0,1 га ортади. 3 та ўк узишда икки марта нишонга текказиш эҳтимоллиги қандай?

28.2. Турли бир хонали сонлар билан номерланган 9 га жетоннинг 3 таси олинади. Уларни кетма-кет қуйганда ёзилган номерларнинг ўсиб бориш тартибида жойлашмиши эҳтимоллигини тошинг.

28.3. Гуруҳда 2 «аълочи», 5 «тўртчи», 18 «коникарли» ўқийдиган ва 2 та «иккичи» талаба ўқийди. Бир талаба чақирилади. Агар «аълочи» фақат 5 баҳо, «тўртчи» бирдай эҳтимоллик билан 4 ёки 5 баҳо, коникарли ўқийдиган талаба эса бирдай эҳтимоллик билан 4, 3, 2 баҳо олиши маълум бўлса, чақирилган талаба 5 ёки 4 баҳо олиши эҳтимоллигини тошинг.

28.4. $p(A) = 0,7$ бўлсин. A ҳодисанинг 2100 синовда 1000 марта рўй бериши эҳтимолигини топинг.

28.5. Идишда 4 та оқ ва 6 та қора шар бор. Ундан қора шар чикмагунча бирин-кетин шарлар олинади (қайтариб солинмасдан). Бунда чиққан оқ шарлар сонидан иборат бўлган X тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $F(x)$ ларни топинг.

29.1. Бир хил карточкаларга 1 дан 25 гача бўлган натурал сонлар ёзилган. Таваккалига икки марта биттадан (қайтариб солмай) карточка олинади. Хар иккала карточкада туб сонлар ёзилган бўлиши эҳтимолиги қандай?

29.2. 4 талаба бир хил лаборатория ишини ҳисоблайди. Уларнинг ҳатога йўл қўйиш эҳтимоликлари мос ҳолда 0,2; 0,3; 0,1; 0,4 га тенг. Ақалли битта талабанинг ҳатога йўл қўйиши эҳтимолигини топинг.

29.3. 9 та қутига 10 тадан шар шундай солинганики, иккитасида 5 тадан оқ шар, учтасида 4 тадан оқ шар, тўрттасида 3 тадан оқ шар бор. Таваккалига олинган шар оқ бўлиб чиқди. Бу шар 3 та оқ шар жойлаштирилган идишдан эканлиги эҳтимолигини топинг.

29.4. Ўйин соккасини 1000 марта ташлаганда тоқ очколар 700 марта тушиши эҳтимолигини топинг.

29.5. Ўйин соккаси 4 марта ташланади. Соккани 4 марта ташланганда 6 очконинг тушиш сонидан иборат бўлган X тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $F(x)$ ларни топинг.

30.1. Тўла домнино тошларидан (28 та) таваккалига биттаси олинади. Ундаги очколар йиғиндисин 10 дан кичик, 3 дан катта бўлиши эҳтимолиги қандай?

30.2. Идишда 10 та оқ, 15 та қора ва 20 та қизил шар бор. Кетма-кет 3 та шар (қайтариб солинмай) олинади. Шарларнинг оқ, қизил, оқ кетма-кетликда чиқиши эҳтимолигини топинг.

30.3. Асбобларнинг 30% ини юқори малакали, 70% ини ўртача малакали мутахассис ёйғади. Юқори малакали мутахассис ёйган асбобнинг ишончлиги 0,9 га, ўртача мутахассисники эса 0,8 га тенг. Олинган асбоб ишончли бўлиб чиқди. Унинг юқори малакали мутахассис тайёрлагани эҳтимолигини топинг.

30.4. Агар $p(A) = 0,8$ бўлса, A ҳодисанинг 100 та синовда 80 марта рўй бериши эҳтимолигини топинг.

30.5. Ичида 4 та оқ ва 6 та қора шар бўлган идишдан 5 та шар олинади. Чиққан оқ шарлар сонидан иборат бўлган X тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $F(x)$ ларни топинг.

**7- §. Боғлиқмас тасодифий
миқдорлар йиғиндисининг тақсимооти.
Тасодифий аргумент функцияси**

14.7.1. Агар X тасодифий миқдорнинг ҳар бир мумкин бўлган қийматига Y тасодифий миқдорнинг битта мумкин бўлган қиймати мос келса, u ҳолда Y ни тасодифий аргумент X нинг функцияси дейилади ва $Y=q(X)$ кўринишда ёзилади.

1. X — дискрет тасодифий миқдор, x_k — унинг мумкин бўлган қийматлари бўлсин, u ҳолда:

а) агар $Y=q(X)$ — монотон функция бўлса, u ҳолда Y тасодифий миқдорнинг мумкин бўлган қийматлари $y_k=q(x_k)$ тенгликдан топилиб, X ва Y ларнинг мос қийматлари эҳтимоликлари тенг бўлади, яъни

$$P(Y=y_k) = P(X=x_k).$$

б) агар $Y=q(X)$ — монотон бўлмаган функция бўлса, X нинг турли қийматларига Y нинг бир хил қийматлари мос келиши мумкин. Бу ҳолда Y нинг мумкин бўлган қийматлари эҳтимоликлари топиш учун X нинг Y бир хил қийматлар қабул қиладиган мумкин бўлган қийматлари эҳтимоликларини қўшиб керак.

2. X — узлуксиз тасодифий миқдор бўлиб, зичлик функцияси $f(x)$ бўлсин, u ҳолда:

а) агар $y=q(x)$ — монотон, дифференциалланувчи функция бўлиб, тескари функцияси $x=\psi(y)$ бўлса, Y тасодифий миқдорнинг $g(y)$ зичлик функцияси қуйидаги тенгликдан топилади:

$$g(y) = |f[\psi(y)] \cdot |\psi'(y)|.$$

б) агар $y=q(x)$ — тасодифий миқдор X нинг мумкин бўлган қийматлари оралиғида монотон бўлмаган функция бўлса, u ҳолда бу ораликни $q(x)$ функция монотон бўладиган ораликларга бўлиш ва ҳар бир монотонлик оралиғи учун зичлик функциясини топиш, сўнгра $g(y)$ ни йиғинди шаклида тасвирлаш керак, яъни

$$g(y) = \sum g_k(y).$$

14.7.2. Агар X ва Y тасодифий миқдорларнинг мумкин бўлган ҳар бир жуфтига Z тасодифий миқдорнинг мумкин бўлган битта қиймати мос келса, Z миқдор иккига X ва Y тасодифий аргументларнинг функцияси дейилади ва бу қуйидагича ёзилади:

$$Z=q(X, Y).$$

1. X ва Y — дискрет тасодифий миқдорлар боғлиқмас бўлсин.

$Z=X+Y$ функциясининг тақсимоотини топиш учун Z нинг мумкин бўлган барча қийматларини топиш керак, бунинг учун X нинг ҳар бир мумкин бўлган қийматини Y нинг барча мумкин бўлган қийматларига қўшиб чиқиш кифоя. Z нинг топилган мумкин бўлган қийматлари эҳтимоликлари X ва Y нинг қўшилётган қийматлари эҳтимолиларининг қўшайтмасига тенг бўлади.

2. X ва Y — узлуксиз боғлиқмас тасодифий миқдорлар бўлсин ва ҳеч бўлмаганда улардан бирининг зичлик функцияси $(-\infty, +\infty)$ оралиқда битта формула билан берилган бўлсин. Z ҳолда $Z = X + Y$ йининининг зичлик функцияси қуйидаги формула орқали топилади:

$$g(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x) \cdot f_2(z-x) dx$$

ёки

$$g(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(z-y) \cdot f_2(y) dy,$$

бу ерда $f_1(x)$ ва $f_2(y)$ — X ва Y нинг зичлик функциялари.

Из оҳ: Агар аргументларнинг мумкин бўлган қийматлари манфий бўлмаса, юқоридаги формулалар қуйидагича ёзилади:

$$g(z) = \int_0^z f_1(x) f_2(z-x) dx$$

ёки

$$g(z) = \int_0^z f_1(z-y) \cdot f_2(y) dy.$$

1-ми с ол. X дискрет тасодифий миқдор ушбу тақсимот қонуни билан берилган:

X	3	6	10
P	0,2	0,1	0,7

а) $Y = 2X + 1$ тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини тошинг;

б) тақсимот функцияси $G(y)$ ни тошинг.

Е чи ш. а) $Y = 2X + 1$ тасодифий миқдорнинг мумкин бўлган қийматларини топамиз:

$$y_1 = 2 \cdot 3 + 1 = 7, \quad y_2 = 2 \cdot 6 + 1 = 13, \quad y_3 = 2 \cdot 10 + 1 = 21.$$

$Y = q(x) = 2x + 1$ функция монотон ўсувчи, шунинг учун x нинг турли мумкин бўлган қийматларига Y нинг турли қийматлари мос келади. Y нинг мумкин бўлган қийматлари эҳтимолиқларини топамиз:

$$\begin{aligned} P(Y=7) &= P(X=3) = 0,2 \\ P(Y=13) &= P(X=6) = 0,1, \\ P(Y=21) &= P(X=10) = 0,7. \end{aligned}$$

Y нинг тақсимот қонунини ёзамиз:

Y	7	13	21
P	0,2	0,1	0,7

б) таксимот функцияси $G(y)$ ни топамиз.

$$G(7) = P(Y < 7) = 0.$$

$$G(13) = P(Y < 13) = P(Y = 7) = 0,2.$$

$$G(21) = P(Y < 21) = P(Y = 7) + P(Y = 13) = 0,2 + 0,1 = 0,3.$$

$$y > 21, \quad G(y) = P(Y \leq 21) = P(Y = 7) + P(Y = 13) + P(Y = 21) = 0,2 + 0,1 + 0,7 = 1.$$

Шундай қилиб,

$$G(y) = \begin{cases} 0, & \text{агар } y \leq 7, \\ 0,2, & \text{агар } 7 < y \leq 13, \\ 0,3, & \text{агар } 13 < y \leq 21, \\ 1, & \text{агар } y > 21. \end{cases}$$

2- мисол. X тасодифий миқдор қуйидаги таксимот қонунига эга:

X	0	1	2	3
P	0,1	0,3	0,4	0,2

а) $Y = \sin\left(\frac{\pi}{2}X\right) + 1$ тасодифий миқдорнинг таксимот қонунини топинг.

б) $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$; $M(Y)$, $D(Y)$, $\sigma(Y)$ ларни ҳисобланг.
Ечиш. Y нинг мумкин бўлган қийматларини топамиз:

$$y_1 = \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 0\right) + 1 = 1, \quad y_2 = \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 1\right) + 1 = 2,$$

$$y_3 = \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 2\right) + 1 = 1, \quad y_4 = \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 3\right) + 1 = 0.$$

Кўриниб турибдики, X нинг турли қийматларига Y нинг бир хил қийматлари мос келяпти.

0, 1, 2 — Y нинг мумкин бўлган қийматлари. Бу қийматларга мос эҳтимоликларни топамиз:

$$P(Y=0) = P(X=3) = 0,2,$$

$$P(Y=1) = P(X=0) + P(X=2) = 0,1 + 0,4 = 0,5,$$

$$P(Y=2) = P(X=1) = 0,3.$$

Y нинг изланаётган таксимот қонуни қуйидаги кўринишда бўлади:

Y	0	1	2
P	0,2	0,5	0,3

$$б) M(X) = 0 \cdot 0,1 + 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,4 + 3 \cdot 0,2 = 1,7.$$

$$D(X) = M(X^2) - M^2(X) = 0 + 1 \cdot 0,3 + 4 \cdot 0,4 + 9 \cdot 0,2 - 1,7^2 = 0,81$$

$$\sigma(X) = \sqrt{0,81} = 0,9.$$

$$M(Y) = 0 + 1 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,3 = 1,1,$$

$$D(Y) = 0 + 1^2 \cdot 0,5 + 2^2 \cdot 0,3 - 1,1^2 = 0,49,$$

$$\sigma(Y) = 0,7.$$

3- мисол. X тасодифий микдор $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ораликда текис таксимланган. $Y = \sin X$ тасодифий микдорнинг зичлик функцияси $g(y)$ ни тонинг.

Ечиш. X тасодифий микдор $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ораликда текис таксимланган, шунинг учун X тасодифий микдорнинг дифференциал функцияси $f(x)$ (зичлик функцияси) бу ораликда куйидаги кўринишга эга бўлади:


$$f(x) = \frac{1}{b-a} = \frac{1}{\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{1}{\pi}.$$

бу ораликдан ташкарида эса $f(x) = 0$ бўлади. $Y = \sin X$ функция $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ораликда монотон, демак, тескари функцияга эга, яъни:

$$x = \psi(y) = \arcsin y.$$

$\psi(y)$ хосилани топамиз:

$$\psi'(y) = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \quad (74\text{- шакл}).$$



74- шакл

$g(y)$ зичлик функцияни $g(y) = f[\psi(y)] \times |\psi'(y)|$ формула бўйича ҳисоблаймиз:

$$g(y) = \frac{1}{\pi} \cdot \left| \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \right| = \frac{1}{\pi \sqrt{1-y^2}}.$$

$y = \sin x$ ва $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ бўлгани учун: $-1 < y < 1$. Шундай қилиб $(-1, 1)$ ораликда:

$$g(y) = \frac{1}{\pi \sqrt{1-y^2}},$$

бу ораликдан ташкарида $g(y) = 0$.

4- мисол. X тасодифий микдорнинг интеграл функцияси (таксимот функцияси) $F(x)$ берилган. $Y = -\frac{2}{3}X + 2$ тасодифий микдорнинг таксимот функцияси $G(y)$ ни топинг.

Ечиш. Таксимот функциясининг таърифига кўра: $G(y) = P(Y < y)$. Бирок, $y = -\frac{2}{3}x + 2$ — камаювчи функция, шунинг учун $Y < y$ тенгсизлик $X > x$ тенгсизлик бажарилгандагина ўридли бўлади.

Демак,

$$G(y) = P(Y < y) = P(X > x)$$

$X < x$ ва $X > x$ карама-карши ходисалар, шунинг учун

$$P(X < x) + P(X > x) = 1 \text{ ва } P(X > x) = 1 - P(X < x) = 1 - F(x)$$

Шундай қилиб, $G(y) = 1 - F(x)$.

$y = -\frac{2}{3}x + 2$ тенгламадан x ни тонамиз:

$$x = \frac{3}{2}(2 - y).$$

Узил-кесил қуйидагига эга бўламиз.

$$G(y) = 1 - F\left[\frac{3}{2}(2 - y)\right]$$

5- мисол. X тасодифий микдор $(0; \pi)$ ораликда $f(x) = \frac{1}{2} \sin x$ зичлик функция билан берилган; бу ораликдан ташқарида $f(x) = 0$. $Y = X^2$ нинг зичлик функцияси $g(y)$ ни ва $M(Y)$ математик кутилишни топинг.

Ечиш. $y = x^2 = \psi(x)$ функция $(0, \pi)$ ораликда қатъий усувчи бўлгани учун:

$$g(y) = f[\psi(y)] \cdot |\psi'(y)|$$

$\psi(y) = \sqrt{y}$ $y = x^2$ функцияга тесқари функция,

$$\psi'(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}, \quad |\psi'(y)| = \frac{1}{2\sqrt{y}},$$

$$g(y) = \frac{1}{2} \sin \sqrt{y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{\sin \sqrt{y}}{4\sqrt{y}}.$$

$y = x^2$ ва $0 < x < \pi$ бўлгани учун $0 < y < \pi^2$, демак, Y нинг мумкин бўлган қийматлари $(0; \pi^2)$ ораликда жойлашган.

$$\begin{aligned}
 M(Y) &= \int_0^{\pi} y \cdot g(y) dy = \frac{1}{4} \int_0^{\pi} y \cdot \frac{\sin \sqrt{y}}{\sqrt{y}} dy = \\
 &\left. \begin{array}{l} y = t^2 \\ dy = 2t dt \end{array} \right| \begin{array}{l} y=0, t=0 \\ y=\pi^2, t=\pi \end{array} \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^{\pi} t^2 \cdot \frac{\sin t}{t} \cdot 2t dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} t^2 \sin t dt = \frac{1}{2} (\pi^2 - 4)
 \end{aligned}$$

6- мисол. X ва Y боғлиқмас дискрет тасодифий миқдорлар ушбу тақсимот қонуни билан берилган:

X	1	3
P	0,3	0,7

Y	2	4
P	0,6	0,4

$Z = X + Y$ тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини топинг. Ечнинг Z нинг мумкин бўлган қийматларини тонамиз:

$$z_1 = 1 + 2 = 3; \quad z_2 = 1 + 4 = 5; \quad z_3 = 3 + 2 = 5; \quad z_4 = 3 + 4 = 7.$$

Бу мумкин бўлган қийматларнинг эҳтимолликларини тонамиз.

X ва Y аргументлар боғлиқмас (эркли) бўлгани учун $X=1$ ва $Y=2$ ҳодисалар ҳам боғлиқмас. Шунинг учун $P(Z=3) = P(X=1) \cdot P(Y=2) = 0,3 \cdot 0,6 = 0,18$. Худди шундай:

$$P(Z=5) = P(X=1) \cdot P(Y=4) = 0,3 \cdot 0,4 = 0,12,$$

$$P(Z=5) = P(X=3) \cdot P(Y=2) = 0,7 \cdot 0,6 = 0,42,$$

$$P(Z=7) = P(X=3) \cdot P(Y=4) = 0,7 \cdot 0,4 = 0,28.$$

$Z = z_2 = 5$ ва $Z = z_3 = 5$ биргаликда бўлмаган ҳодисалар, уларнинг эҳтимолликлари қўшилади, яъни

$$0,12 + 0,42 = 0,54.$$

Шундай қилиб, изланаётган тақсимот қонунини қуйидаги қуришда бўлади:

Z	3	5	7
P	0,18	0,54	0,28

7- мисол. X ва Y боғлиқмас тасодифий миқдорлар зичлик функциялари билан берилган:

$$f_1(x) = e^{-x} \quad (0 \leq x < \infty),$$

$$f_2(y) = \frac{1}{2} e^{-y/2} \quad (0 \leq y < \infty).$$

$Z = X + Y$ тасодифий микдорнинг зичлик функциясини топинг.
 Ёчиш. Аргументларнинг мумкин бўлган қийматлари маъний эмас. Қуйидаги формуладан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned}
 g(z) &= \int_0^z f_1(x) \cdot f_2(z-x) dx = \\
 &= \int_0^z e^{-x} \left[\frac{1}{2} e^{-(z-x)/2} \right] dx = \frac{1}{2} \int_0^z e^{-x} \cdot e^{-\frac{z-x}{2}} dx = \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^z e^{-x} \cdot e^{-\frac{z}{2}} \cdot e^{\frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2} e^{-\frac{z}{2}} \int_0^z e^{-\frac{x}{2}} dx = \\
 &= -\frac{1}{2} e^{-\frac{z}{2}} \cdot 2 \int_0^z e^{-\frac{x}{2}} d\left(-\frac{x}{2}\right) = \\
 &= -e^{z/2} \cdot e^{-x/2} \Big|_0^z = -e^{-z/2} (e^{-z/2} - 1) = e^{-z/2} (1 - e^{-z/2}).
 \end{aligned}$$

Демак, $(0; \infty)$ ораликда:

$$g(z) = e^{-z/2} [1 - e^{-z/2}],$$

бу ораликдан ташқарида: $g(z) = 0$.

7-дарсхона топшириги

1. X тасодифий микдор ушбу тақсимот қонуни билан берилган:

X	-2	-1	0	1	2
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

Y тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини топинг:

а) $Y = X^2 + 1$; б) $Y = 2^X$.

$M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $M(Y)$, $D(Y)$, $\sigma(Y)$ ларин ҳисобланг.

Ж: $M(X) = 0,1$; $D(X) = 1,29$; $\sigma(X) \approx 1,136$,

а)

Y	1	2	5
P	0,3	0,5	0,2

б)

Y	0,25	0,5	1	2	4
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

а) $M(Y) = 2,3$; $D(Y) = 2,01$; $\sigma(Y) \approx 1,42$;

б) $M(Y) = 1,425$; $D(Y) \approx 1,13$; $\sigma(Y) = 1,06$.

2. X тасодифий микдор ушбу тақсимот қонуни билан берилган:

X	-1	0	1	2
P	0,1	0,2	0,5	0,2

$Y = |X|$ тасодифий микдорнинг тақсимот функцияси $G(y)$ ни тошинг.
Ж:

$$G(y) = \begin{cases} 0, & \text{агар } y \leq 0, \\ 0,2, & \text{агар } 0 < y \leq 1, \\ 0,8, & \text{агар } 1 < y \leq 2, \\ 1, & \text{агар } y > 2. \end{cases}$$

3. X тасодифий микдор $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ ораликда текис тақсимланган. $Y = \cos X$ тасодифий микдорнинг зичлик функцияси $g(y)$ ни тошинг.

Ж: $(0;1)$ ораликда: $g(y) = \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}$; бу ораликдан ташқарида $g(y) = 0$.

4. X тасодифий микдорнинг тақсимот функцияси $F(x)$ берилган. $Y = -5X + 1$ тасодифий микдорнинг тақсимот функцияси $G(y)$ ни тошинг.

$$\text{Ж: } G(y) = 1 - F\left[\frac{1}{5}(1-y)\right].$$

5. X тасодифий микдор $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ ораликда $f(x) = \cos x$, бу ораликдан ташқарида $f(x) = 0$ бўлган зичлик функцияси билан берилган. $Y = X^2$ функциянинг математик қутилишини тошинг.

$$\text{Ж: } M(Y) = \frac{\pi^2 - 8}{4}$$

6. X ва Y дискрет тасодифий микдорлар тақсимот қонунлари билан берилган:

X	10	12	16
P	0,4	0,1	0,5

Y	1	2
P	0,2	0,8

$Z = X + Y$ тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини тошинг.

Ж:

Z	11	12	13	14	17	18
P	0,08	0,32	0,02	0,08	0,10	0,40

7. X ва Y боғлиқмас тасодифий миқдорлар узларининг зичлик функциялари билан берилган:

$$f_1(x) = \frac{1}{3}e^{-x^3} \quad (0 \leq x < \infty),$$

$$f_2(y) = \frac{1}{5}e^{-y^5} \quad (0 \leq y < \infty)$$

$Z = X + Y$ тасодифий миқдорнинг зичлик функциясини тоинг.

$$Ж: g(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-z^2} \cdot (1 - e^{-2z^2}), & \text{агар } z \geq 0, \\ 0, & \text{агар } z < 0. \end{cases}$$

8. X ва Y боғлиқмас тасодифий миқдорларнинг ҳар бири $[0; 2\pi]$ кесмада текис тақсимланган. $Z = X + Y$ тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини тоинг.

$$Ж: g(z) = \begin{cases} 0, & \text{агар } z \leq 0, \\ 0,25z, & \text{агар } 0 < z < 2, \\ 1 - 0,25z, & \text{агар } 2 < z \leq 4, \\ 0, & \text{агар } z > 4. \end{cases}$$

7- мустақил иш

1. X тасодифий миқдор ушбу тақсимот қонуни билан берилган:

X	-2	-1	0	1	2
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

$Y = 2X - 1$ тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини тоинг.

Ж:

Y	-5	-3	-1	1	3
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

2. X тасодифий миқдор ушбу тақсимот қонуни билан берилган:

X	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$
P	0,2	0,7	0,1

а) $Y = \sin X$ тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини тоинг.

б) $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $M(Y)$, $D(Y)$, $\sigma(Y)$ ларни ҳисоблаш.

Ж: а)	Y	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
	P	0,3	0,7

б) $M(X) \approx 1,49$; $D(X) \approx 0,92$; $\sigma(X) \approx 0,96$,
 $M(Y) = 0,895$; $D(Y) \approx 0,04$; $\sigma(Y) = 0,2$.

3. X тасодифий микдор ушбу тақсимот қонуни билан берилган:

X	-1	0	1	2
P	0,1	0,2	0,5	0,2

$Y = X^2 - 1$ тасодифий микдорнинг тақсимот функцияси $G(y)$ ни топиш

$$\text{Ж: } G(y) = \begin{cases} 0, & \text{агар } y \leq -1, \\ 0,2, & \text{агар } -1 < y \leq 0, \\ 0,8, & \text{агар } 0 < y \leq 3, \\ 1 & \text{агар } y > 3. \end{cases}$$

4. X тасодифий микдорнинг зичлик функцияси берилган.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & \text{агар } x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \\ 0, & \text{агар } x \notin \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

$Y = \operatorname{tg} X$ тасодифий микдорнинг зичлик функцияси $g(y)$ ни топиш.

$$\text{Ж: } g(y) = \frac{2}{\pi(1+y^2)}, \quad -\infty < y < +\infty.$$

5. X тасодифий микдорнинг тақсимот функцияси $F(x)$ берилган бўлса, а) $Y = 4X + 6$, б) $Y = aX + b$ тасодифий микдорларнинг тақсимот функцияларини топиш.

$$\text{Ж: а) } G(y) = F\left[\frac{y-6}{4}\right];$$

$$\text{б) } G(y) = F\left[\frac{y-b}{a}\right], a > 0 \text{ да;}$$

$$G(y) = 1 - F\left[\frac{y-b}{a}\right], a < 0 \text{ да.}$$

6. X тасодифий микдор $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ ораликда $f(x) = \cos x$, бу оралик-

дан ташқарида $f(x) = 0$ бўлган зичлик функцияси билан берилган. $Y = X^2$ функциянинг дисперсиясини тошнг. Ж: $20 - 2\pi^2$.

7. X ва Y дискрет тасодифий миқдорлар ушбу тақсимот қонунлари билан берилган:

X	4	10
P	0,7	0,3

Y	1	7
P	0,8	0,2

$Z = X + Y$ тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини тошнг.

Ж:

Z	5	11	17
P	0,56	0,38	0,06

8. X ва Y тасодифий миқдорлар боғлиқмас ва ҳар бири $[0, 1]$ кесмада текис тақсимланган. $Z = X + Y$ тасодифий миқдорнинг зичлик функциясини тошнг.

$$\text{Ж: } g(z) = \begin{cases} 0, & \text{агар } z < 0, \\ z, & \text{агар } 0 \leq z < 1, \\ 2 - z, & \text{агар } 1 < z \leq 2, \\ 0, & \text{агар } z > 2. \end{cases}$$

8-§. Икки ўлчовли боғлиқ тасодифий миқдорлар. Корреляция моменти ва корреляция коэффициенти

14.8.1. Мумкин бўлган қийматлари (x, y) сонлар жуфти билан аниқлашувчи (X, Y) тасодифий миқдорлар системаси *икки ўлчовли тасодифий миқдор* дейилади.

Ташқил этувчилари X ва Y дискрет бўлган икки ўлчовли тасодифий миқдор *дискрет* дейилади. Ташқил этувчилари X ва Y узлуксиз бўлган икки ўлчовли тасодифий миқдор *узлуксиз* дейилади.

Икки ўлчовли тасодифий миқдорнинг мумкин бўлган қийматлари ва уларнинг эҳтимоликлари орасидаги мослик икки ўлчовли тасодифий миқдорнинг *тақсимоғ қонуни* дейилади.

Икки ўлчовли дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонуни қуйидаги усулларнинг бири орқали берилиши мумкин:

а) мумкин бўлган қийматлар ва уларнинг мос эҳтимоликлари ёзилган жадвал кўринишида

$Y \quad X$	x_1	x_2	...	x_n
y_1	p_{11}	p_{12}	...	p_{1m}
y_2	p_{21}	p_{22}	...	p_{2m}
...
y_n	p_{n1}	p_{n2}	...	p_{nm}

$$p_i > 0, i = \overline{1, n}, j = \overline{1, m} \text{ ва } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij} = 1.$$

б) аналитик усулда (интеграл функция кўринишида).

14.8.2. Икки ўлчовли тасодифий микдор тақсимотининг *интеграл функцияси* деб

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y)$$

функцияга айтилади.

Интеграл функциянинг асосий хоссалари

1. $0 \leq F(x, y) \leq 1$.

2. Интеграл функция ҳар қайси аргументи бўйича камай-майдаган функциядир:

агар $x_2 > x_1$ бўлса, $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$,

агар $y_2 > y_1$ бўлса, $F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$.

3. $F(-\infty, y) = 0, F(-\infty, -\infty) = 0,$

$F(x, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1.$

4. $y = +\infty$ да $F(x, y)$ интеграл функция X ташкил этувчининг интеграл функциясига айланади:

$$F(x, +\infty) = F_1(x).$$

$x = +\infty$ да $F(x, y)$ интеграл функция Y ташкил этувчининг интеграл функциясига айланади:

$$F(+\infty, y) = F_2(y).$$

Қуйидаги формула ўринли

$$P(x_1 < X < x_2, y_1 < Y < y_2) = \\ = [F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2)] - [F(x_2, y_1) - F(x_1, y_1)].$$

14.8.3. Икки ўлчовли узлуксиз тасодифий микдорнинг *зичлик функцияси* деб интеграл функциядан олинган иккинчи тартибли аралаш хусусий хосилга айтилади:

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

Зичлик функцияни билган ҳолда ушбу формула бўйича интеграл функцияни топиш мумкин:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy$$

$f(x, y)$ зичлик функцияга эга тасодифий нукта (X, Y) ning D соҳага тушиш эҳтимолиниги ушбу тенглик орқали аниқланади:

$$P[(X, Y) \in D] = \iint_D f(x, y) dx dy$$

Зичлик функция қуйидаги хоссаларга эга:

1. $f(x, y) \geq 0$.

2. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$.

Агар (X, Y) ning мумкин бўлган барча қийматлари чекли D соҳага тегишли бўлса, 2-хосса қуйидаги қуриништа бўлади:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 1$$

14.8.4. Икки ўлчовли дискрет тасодифий миқдорнинг соғлиқ характеристикалари: 1. Системани ташкил этувчи X ва Y дискрет тасодифий миқдорларнинг математик кутилиши қуйидаги формулалар бўйича аниқланади:

$$M(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x p_{ij}$$

$$M(Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m y p_{ij}$$

Агар X ва Y тасодифий миқдорлар боғлиқмас бўлса, у ҳолда бу тасодифий миқдорларнинг тақсимот конуллари дан $M(X)$ ва $M(Y)$ ни қуйидаги формулалар орқали топиш мумкин:

$$M(X) = \sum_{k=1}^n x_k p_{k\cdot}$$

$$M(Y) = \sum_{l=1}^m y_l p_{\cdot l}$$

2. X ва Y тасодифий миқдорларнинг дисперсиялари ушбу формулалардан топилади:

$$D(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij} (x_i - M(X))^2,$$

$$D(Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij} (y_j - M(Y))^2.$$

Дисперсияларни ҳисоблашда қуйидаги формулалардан ҳам фойдаланиш мумкин:

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2,$$

$$D(Y) = M(Y^2) - [M(Y)]^2.$$

3. X , Y дискрет тасодифий миқдорларнинг ўртача квадратик четланиши

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}, \quad \sigma(Y) = \sqrt{D(Y)}$$

формулалар ёрдамида аниқланади.

14.8.5. Икки ўлчовли узлуксиз тасодифий миқдорнинг солин характеристикалари: 1. Узлуксиз тасодифий миқдорларнинг математик кутилиши ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy,$$

$$M(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy,$$

бу ерда $f(x, y)$ — зичлик функция.

2. Системага кирувчи X ва Y узлуксиз тасодифий миқдорларнинг дисперсиялари қуйидаги формулалар бўйича топилади:

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [x - M(X)]^2 f(x, y) dx dy =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx dy - [M(X)]^2,$$

$$D(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [y - M(Y)]^2 f(x, y) dx dy =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x, y) dx dy - [M(Y)]^2,$$

бу ерда $f(x, y)$ — зичлик функция

3. X ва Y тасодифий микдорларнинг уртача квадратик чегланишлари куйидаги формулалардан аниқланади:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}, \quad \sigma(Y) = \sqrt{D(Y)}.$$

14.8.6. Тасодифий микдорлар системалари назариясида *корреляция моменти* (ковариация) K_{xy} муҳим роль уйнайди. Дискрет тасодифий микдорлар учун:

$$K_{xy} = \sum_i \sum_j (x_i - M(X)) (y_j - M(Y)) p_{ij}$$

Узлуксиз тасодифий микдорлар учун:

$$K_{xy} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [x - M(X)][y - M(Y)] f(x, y) dx dy.$$

Корреляция моментини яна куйидагича ҳам топши мумкин:
 $K_{xy} = M(X \cdot Y) - M(X)M(Y)$, бу ерда

$$M(X \cdot Y) = \sum_i \sum_j x_i y_j p_{ij},$$

узлуксиз тасодифий микдорлар учун эса

$$M(X \cdot Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy.$$

Корреляция моментининг асосий хоссаси: агар X ва Y — боғлиқмас (эркли) бўлса, $K_{xy} = 0$.

14.8.7. X ва Y тасодифий микдорнинг *корреляция коэффициентини* деб

$$r_{xy} = \frac{K_{xy}}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

сонга айтилди.

Корреляция коэффициентининг хоссалари:

1. Агар X ва Y — боғлиқмас тасодифий микдорлар бўлса, у ҳолда $r_{xy} = 0$.

2. r_{xy} — ўлчамсиз кагталик (микдор), ну билан бирга $|r_{xy}| \leq 1$.

3. Агар $Y = AX + B$, бу ерда A ва B — узгармас сонлар бўлса, $|r_{xy}| = 1$.

14.8.8. $f(x, y)$ зичлик функцияга эга бўлган (X, Y) система учун X ва Y боғлиқ бўлмаса

$$f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$$

бўлади, бу ерда мос ҳолда $f_1(x)$ — X нинг, $f_2(y)$ — Y нинг зичлик функцияси.

14.8.9. Иккита боғлиқ X ва Y тасодифий миқдорларнинг дисперсияси учун қуйидаги формула ўринли:

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2K_{xy}.$$

Хусусий ҳолда, агар X ва Y тасодифий миқдорлар боғлиқ бўлмаса, у ҳолда

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y).$$

1-мисол. Дискрет икки ўлчовли (X, Y) тасодифий миқдорлар системасининг тақсимот қонунни берилган:

$Y \backslash X$	3	10	12
4	0,17	0,13	0,25
5	0,10	0,30	0,05

Ташкил этувчи X ва Y миқдорларнинг тақсимот қонунларини топинг.

Ечиш. X нинг мумкин бўлган қийматлари эҳтимоликларини топамиз, бунинг учун эҳтимоликларни «устун бўйича» қўшиб чиқамиз:

$$P(X=3) = 0,17 + 0,10 = 0,27,$$

$$P(X=10) = 0,13 + 0,30 = 0,43,$$

$$P(X=12) = 0,25 + 0,05 = 0,30.$$

Демак,

X	3	10	12
P	0,27	0,43	0,30

— ташкил этувчи X нинг тақсимот қонун.

Текшириш. $0,27 + 0,43 + 0,30 = 1.$

Y нинг мумкин бўлган қийматлари эҳтимоликларини топамиз, бунинг учун эҳтимоликларни «сатр бўйича» қўшиб чиқамиз:

$$P(Y=4) = 0,17 + 0,13 + 0,25 = 0,55,$$

$$P(Y=5) = 0,10 + 0,30 + 0,05 = 0,45$$

Ташкил этувчи Y нинг тақсимот қонунни қуйидагича бўлади:

Y	4	5
P	0,55	0,45

Текшириш:
 $0,55 + 0,45 = 1.$

2-мисол. Тасодифий миқдорлар системаси (X, Y) нинг тақсимот қонунни берилган:

$X \backslash Y$	1	2	3
1	1/18	1/12	1/36
2	1/9	1/6	1/18
3	1/6	1/4	1/12

$M(X)$, $M(Y)$, $D(X)$, $D(Y)$, r_{xy} ларни топинг.

$$E \text{ чиниш } M(X) = 1 \cdot \frac{1}{18} + 2 \cdot \frac{1}{9} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{12} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{1}{18} + 3 \cdot \frac{1}{12} = \frac{7}{3},$$

$$M(Y) = 1 \cdot \frac{1}{18} + 2 \cdot \frac{1}{12} + 3 \cdot \frac{1}{36} + 1 \cdot \frac{1}{9} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{18} + 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{12} = \frac{11}{6}$$

X ва Y тасодифий микдорларнинг дисперсиясини ҳисоблаш учун (X, Y) микдорлар системасидан (\dot{X}, \dot{Y}) микдорлар системасига ўтаемиз, бу ерда

$$\dot{X} = X - M(X), \quad \dot{Y} = Y - M(Y),$$

$$\dot{X} = X - \frac{7}{3}, \quad \dot{Y} = Y - \frac{11}{6}.$$

Жадвал тузамиз:

$\dot{X} \backslash \dot{Y}$	$-5/6$	$1/6$	$7/6$
$-4/3$	$1/18$	$1/12$	$1/36$
$-1/3$	$1/9$	$1/6$	$1/18$
$2/3$	$1/6$	$1/4$	$1/12$

$$D(X) = \left(-\frac{4}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{18} + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{9} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} + \left(-\frac{4}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{12} + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{4} + \left(-\frac{4}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{36} + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{18} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{5}{9}.$$

$$D(Y) = \left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{18} + \left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} + \left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{12} + \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{4} + \left(\frac{7}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{36} + \left(\frac{7}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{18} + \left(\frac{7}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{17}{36}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{\frac{17}{36}} = \frac{\sqrt{17}}{6}$$

(\dot{X}, \dot{Y}) система тақсимоли жадвалдан фойдаланиб, K_{xy} ни тонамиз.

$$\begin{aligned}
 K_{xy} &= \left(-\frac{4}{3}\right)\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{18} + \left(-\frac{4}{3}\right) \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12} + \\
 &\left(-\frac{4}{3}\right) \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{1}{36} + \left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{9} + \left(-\frac{1}{3}\right) \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \\
 &+ \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{1}{18} + \frac{2}{3}\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{6} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} + \\
 &+ \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{1}{12} = -\frac{4}{3}\left(-\frac{5}{108} + \frac{1}{72} + \frac{7}{216}\right) - \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{5}{54} + \right. \\
 &\left. + \frac{1}{36} + \frac{7}{108}\right) + \frac{2}{3}\left(-\frac{5}{36} + \frac{1}{24} + \frac{7}{72}\right) = \frac{4}{3} \cdot 0 - \frac{1}{3} \cdot 0 + 7 \frac{2}{3} \cdot 0 = 0.
 \end{aligned}$$

$K_{xy}=0$ бўлгани учун корреляция коэффицентини ҳам нолга тенг булади: $r_{xy}=0$.

3- мисол. (X, Y) тасодифий миқдорлар системаси куйидаги зичлик функцияси билан берилган:

$$f(x, y) = \begin{cases} a \sin(x+y), & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D. \end{cases}$$

$$D: \begin{cases} 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Куйидагиларни тошинг: а) a коэффицентини; б) $M(X)$, $M(Y)$ ни; в) $\sigma(X)$, $\sigma(Y)$ ни; г) r_{xy} ни.

Ечиш. а) a коэффицентини

$$a \cdot \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin(x+y) dy dx = 1$$

тенгламадан тонамиз.

$$\begin{aligned}
 a \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin(x+y) dy dx &= -a \int_0^{\pi/2} \cos(x+y) \Big|_0^{\pi/2} dx = \\
 &= a \int_0^{\pi/2} (\sin x + \cos x) dx = a(\sin x - \cos x) \Big|_0^{\pi/2} = 2a, a = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

D соҳада $f(x, y) = \frac{1}{2} \sin(x+y)$.

$$\begin{aligned}
 \text{б) } M(X) &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} x \sin(x+y) dy dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x dx \int_0^{\pi/2} \sin(x+y) dy = \\
 &= -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos(x+y) \Big|_0^{\pi/2} x dx = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} [\cos(x + \frac{\pi}{2}) - \cos x] x dx =
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x(\sin x + \cos x) dx = \frac{1}{2} x(\sin x - \cos x) \Big|_0^{\pi/2} - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (\sin x - \cos x) dx = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} (\cos x + \sin x) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}$$

Худди шунга ўқшани:

$$\begin{aligned} \text{в) } \sigma^2(X) &= M(X^2) - [M(X)]^2 = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} x^2 \sin(x+y) dy dx - \\ &- \frac{\pi^2}{16} = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x \cos(x+y) \Big|_0^{\pi/2} dx - \frac{\pi^2}{16} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x^2 (\sin x + \cos x) dx - \\ &- \frac{\pi^2}{16} = \frac{1}{2} x^2 (\sin x - \cos x) \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} x (\sin x - \cos x) dx - \frac{\pi^2}{16} = \\ &= \frac{\pi^2}{8} + x(\sin x + \cos x) \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} (\sin x + \cos x) dx - \frac{\pi^2}{16} = \\ &= \frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi}{2} + (\sin x - \cos x) \Big|_0^{\pi/2} - \frac{\pi^2}{16} = \frac{\pi^2}{16} + \frac{\pi}{2} - 2. \end{aligned}$$

$$\sigma^2(Y) = \frac{\pi^2 + 8\pi - 32}{16}$$

$$\begin{aligned} \text{г) } K_{xy} &= M(XY) - M(X)M(Y) = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} xy \sin(x+y) dy dx - \\ &+ \frac{\pi^2}{16} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x dx \int_0^{\pi/2} y \sin(x+y) dy - \frac{\pi^2}{16} = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} [y \cos(x+y) \Big|_0^{\pi/2} - \\ &- \int_0^{\pi/2} \cos(x+y) dy] x dx - \frac{\pi^2}{16} = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x \left[\frac{\pi}{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \right. \\ &+ \left. \sin x \right] dx - \frac{\pi^2}{16} = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x \left(-\frac{\pi}{2} \sin x - \cos x + \sin x \right) dx - \frac{\pi^2}{16} = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x \left(\frac{\pi}{2} \sin x + \cos x - \sin x \right) dx - \frac{\pi^2}{16} = \frac{1}{2} x \left(\sin x - \frac{\pi}{2} \cos x + \right. \\ &+ \left. \cos x \right) \Big|_0^{\pi/2} - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \left(\sin x - \frac{\pi}{2} \cos x + \cos x \right) dx - \frac{\pi^2}{16} = \frac{\pi}{4} - \end{aligned}$$

$$-\frac{1}{2} \left(\sin x - \frac{\pi}{2} \sin x - \cos x \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{16} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} - \frac{\pi^2}{16} =$$

$$= \frac{8\pi - 16 - \pi^2}{16}$$

$$r_{xy} = \frac{K_{xy}}{\pi(X)\pi(Y)} = \frac{8\pi - 16 - \pi^2}{\pi^2 + 8\pi - 32} \approx -\frac{0.73688}{3.00232} \approx -0.2454$$

8- дарсхона топишириги

1. Дискрет икки ўлчовли (X, Y) тасодифий микдор тақсимот қонуни орқали берилган:

$Y \backslash X$	26	30	41	50
2,3	0,05	0,12	0,08	0,04
2,7	0,09	0,30	0,11	0,21

Ташкил этувчи X ва Y тасодифий микдорларнинг тақсимот қонунларини топинг.

Ж:

X	26	30	41	50
P	0,14	0,42	0,19	0,25

2. Иккита тасодифий микдорлар системаси (X, Y) ning тақсимот қонуни берилган:

$Y \backslash X$	20	40	60
10	3λ	λ	0
20	2λ	4λ	2λ
30	λ	2λ	5λ

Қуйидагиларни топинг:

а) λ коэффициентини; б) $M(X)$, $M(Y)$ ни; в) $D(X)$, $D(Y)$ ни; г) r_{xy} ни.

Ж: а) $\lambda = 1/20$; б) $M(X) = 22$; $M(Y) = 41$; в) $\sigma^2(X) = 56$;
 $\sigma^2(Y) = 259$; г) $r_{xy} = 0,56$.

3. (X, Y) тасодифий микдорлар системаси қуйидаги зичлик функция орқали берилган:

$$f(x, y) = \begin{cases} axy, & x \in D, \\ 0, & x \notin D. \end{cases}$$

D соҳа $x+y-1=0$, $x=0$, $y=0$ тугри чизиклар билан чегараланган учбурчак.

Қуйидагиларни тоинг: а) a коэффициентни; б) $M(X)$, $M(Y)$; в) $D(X)$, $D(Y)$; г) r_{xy} .

Ж а) $a=24$; б) $M(X)=M(Y)=\frac{2}{5}$; в) $D(X)=D(Y)=\frac{1}{25}$;

г) $r_{xy}=-\frac{2}{3}$.

4. Икки ўлчовли $(X; Y)$ тасодифий микдорнинг зичлик функцияси берилган:

$$f(x, y) = \frac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}$$

Қуйидагиларни тоинг: а) $P(0 < X < 1, 0 < Y < 1)$ ни;

б) тахсимот функцияси $F(x, y)$ ни;

в) ҳар бир X ва Y тасодифий микдорнинг зичлик функцияларини.

Ж: а) $P = \frac{1}{16}$; б) $F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\operatorname{arctg} x + \frac{\pi}{2} \right) \left(\operatorname{arctg} y + \frac{\pi}{2} \right)$;

в) $f_1(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$; $f_2(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}$

8- мустақил иш

1. Тахсимот қонуни билан берилган икки ўлчовли тасодифий микдор ташкил этувчиларининг тахсимот қонуларини тоинг.

$Y \backslash X$	2	4	5
1	$0,12$	$0,18$	$0,10$
3	$0,10$	$0,11$	$0,39$

Ж:

X	2	4	5
P	$0,22$	$0,29$	$0,49$

Y	1	3
P	$0,40$	$0,60$

2. Тахсимот функция

$$F(x, y) = \left(\frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{y}{3} + \frac{1}{2} \right)$$

булган икки ўлчовли (X, Y) тасодифий микдорнинг X ва Y ташкил этувчилари синнов натижасида $X < 2$, $Y < 3$ қийматларни қабул қилиши эҳтимолигини тоинг.

Ж. $P(x < 2, Y < 3) = \frac{9}{16}$.

3. Тасодифий микдорлар системасининг зичлик функцияси

$$f(x, y) = \begin{cases} a^2 - x^2 - y^2, & \text{агар } x^2 + y^2 \leq a^2 \ (a > 0), \\ 0, & \text{агар } x^2 + y^2 > a^2 \end{cases}$$

булган такемлот конунига бўйсинади.

Қуйидагиларни тонинг:

а) a коэффициентини;

б) $M(X)$, $M(Y)$;

в) $\sigma^2(X)$, $\sigma^2(Y)$;

г) r_{xy} .

Ж: а) $a = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$; б) $M(X) = M(Y) = 0$;

в) $\sigma^2(X) = \sigma^2(Y) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}}$; г) $r_{xy} = 0$

9- §. Вариацион қатор учун полигон ва гистограмма. Танланманинг асосий сонли характеристикалари

14.9.1. Текширилаётган аломат бўйича урганиладиган барча объектлар тўплами *бош тўплам* дейилади. *Танланма тўплам* ёки *танлама* деб текшириш учун олинган объектлар тўпламига айтилади.

Тўплам (танланма ёки бош тўплам) *қажми* деб бу тўпламдаги объектлар сонига айтилади.

Бирор X белгини (дискрет ёки узлуксиз) микдор (сон) жиҳатидан урганиш учун бош тўпламдан n хажмли X_1, X_2, \dots, X_n танланма ажратилган бўлсин.

X белгининг кузатиладиган x_1, x_2, \dots, x_n қийматлари *варианталар* дейилади.

Варианталарнинг ушиб бориш тартибида ёзилган кетма-кетлиги *вариацион қатор* дейилади.

Танланманинг *статистик тақсимоли* деб вариантлар ва уларга мос частоталар ёки нисбий частоталардан иборат жадвалга айтилади:

X_i	x_1	x_2	...	x_k	ёки	X_i	x_1	x_2	...	x_k
n_i	n_1	n_2	...	n_k		ω_i	n_1/n	n_2/n	...	n_k/n

Барча частоталар йиғиндиси танланма хажмига тенг, яъни $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, бу ерда n_1, n_2, \dots, n_k — частоталар.

Барча нисбий частоталар йиғиндиси бирга тенг, яъни $\omega_1 + \omega_2 + \dots + \omega_k = 1$, бу ерда $\omega_1 = n_1/n, \omega_2 = n_2/n, \dots, \omega_k = n_k/n$ — нисбий частоталар.

Белги узлуксиз бўлса, унинг барча кузатиладиган қийматлари жойлашган оралик h узунликдаги қисмий ораликларга бўлинади ва i -ораликка тушган частоталар йиғиндиси (ёки нисбий частоталар йиғиндиси) топилади.

14.9.2. Частоталар полигони деб кесмалари $(x_1, n_1), (x_2, n_2), \dots, (x_k, n_k)$ нукталарни туташтирадиган синик чизикка айтилади, бу ерда x_i — танланма вариантлари, n_i — мос частоталар.

Нисбий частоталар полигони деб кесмалари $(x_1, \omega_1), (x_2, \omega_2), \dots, (x_k, \omega_k)$ нукталарни туташтирадиган синик чизикка айтилади, бу ерда x_i — танланма вариантлари; ω_i — уларга мос нисбий частоталар.

Белгининг узлуксиз тақсимландини яқколот кўрсатиш учун **гистограммалар** деб аталувчи диаграммалардан фойдаланилади.

Частоталар гистограммаси деб асослари h узунликдаги ораликлар, баландликлари эса n_i/h (частота зичлиги) нисбатларга тенг бўлган тўғри тўртбурчаклардан иборат поғонавий фигурага айтилади.

$$S_i = h \cdot \frac{n_i}{h} = n_i \text{ — қисмий } i\text{-тўғри тўртбурчакнинг юзи.}$$

$$S = \sum_{i=1}^k n_i = n \text{ — частоталар гистограммаси юзи.}$$

Нисбий частоталар гистограммаси деб асослари h узунликдаги ораликлар, баландликлари эса ω_i/h (нисбий частота зичлиги) нисбатларга тенг бўлган тўғри тўртбурчаклардан иборат поғонавий фигурага айтилади.

$$S_i = h \cdot \frac{\omega_i}{h} = \omega_i \text{ — қисмий } i\text{-тўғри тўртбурчакнинг юзи.}$$

$$S = \sum_{i=1}^k \omega_i = 1 \text{ — нисбий частоталар гистограммасининг юзи.}$$

14.9.3. X белгиди бош тўпلامнинг тақсимот функцияси $F(x, \theta)$ бўлиб, θ — номаълум параметр бўлсин. X_1, \dots, X_n шу бош тўпلامдан олинган таңлама бўлсин. Таңламанинг ихтиёрый функцияси $L(X_1, \dots, X_n)$ статистика дейилади.

Статистиканинг кузатилган қиймати $L(x_1, \dots, x_n)$ ни θ параметрнинг тақрибий қиймати сифатида олинади. Бу ҳолда $L = L(x_1, \dots, x_n)$ статистика θ параметрнинг баҳоси дейилади.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ — таңламанинг ўрта қиймати, } S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

таңламанинг **дисперсияси** дейилади.

Агар $ML(X_1, \dots, X_n) = \theta$ шарт бажарилса, L баҳо θ параметр учун **силжимаган баҳо** дейилади.

Агар L баҳо ва ҳар қандай $\epsilon > 0$ учун

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|L - \theta| \leq \epsilon) = 1$$

ўринли бўлса, L баҳо θ параметр учун асосли баҳо дейилади.

Агар L баҳо учун

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(L) = 0$$

бўлса, L баҳо θ параметр учун асосли баҳо бўлади.

Агар L баҳо учун

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M(L) = \theta$$

бўлса, L баҳо θ параметр учун асимптотик силжимаган баҳо дейилади.

Агар θ параметрнинг L_1 ва L_2 силжимаган баҳолари берилган бўлиб, $D(L_1) < D(L_2)$ бўлса, L_1 баҳо L_2 баҳога нисбатан самарали баҳо дейилади.

Берилган n хажмли таъланмада энг кичик дисперсияли баҳо самарали баҳо дейилади.

\bar{X} бош тўплам ўрта қиймати учун силжимаган, асосли ва самарали баҳо бўлади.

S^2 бош тўплам дисперсияси учун асимптотик силжимаган, асосли баҳо бўлади.

$\frac{n}{n-1} S^2$ бош тўплам дисперсияси учун силжимаган, асосли баҳо бўлади. Таъланманинг ўрта қиймати ва дисперсияларини ҳисоблашни соддалаштириш учун баъзан қуйдаги формулалардан фойдаланилади:

$$u_i = \frac{X_i - c}{h}, \quad i = \overline{1, n}.$$

$$\bar{u} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n u_i, \quad \bar{X} = \bar{u} \cdot h + c,$$


$$S_u^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2,$$

$$S_x^2 = h^2 \cdot S_u^2.$$


бу ерда c ва h сонлари ҳисоблашни енгиллаштирадиган қилиб таъланади.

1-мисол. Берилган таъланма тақсироти буйича частоталар ва нисбий частоталар полигонларини чизинг.

X_i	1	2	4	5	8
n_i	5	10	15	7	3



75-шакл



76-шакл

Ечиш. $n = 5 + 10 + 15 + 7 + 3 = 40$ — таъланма ҳажми. Нисбий частоталарни топамиз:

$$\omega_1 = \frac{n_1}{n}, \omega_2 = \frac{10}{40}, \omega_3 = \frac{15}{40}, \omega_4 = \frac{7}{40}, \omega_5 = \frac{3}{40}$$

$$\omega_5 = \frac{3}{40}$$

X_i	1	2	4	5	8
ω_i	5/40	10/40	15/40	7/40	3/40

75-шаклда частоталар полигони ва 76-шаклда нисбий частоталар полигони тасвирланган.

2-ми с.о.л. Берилган таъланма тақсимоги бўйича частоталар ва нисбий частоталар гистограммаларини чизинг.


$X_i - X_{i+1}$	5—10	10—15	15—20	20—25
n_i	2	6	12	10
ω_i	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{3}$

Ечиш. $n = 2 + 6 + 12 + 10 = 30$ — таъланма ҳажми.


$$h = 5, \frac{n_1}{h} = \frac{2}{5} = 0,4, \frac{n_2}{h} = \frac{6}{5} = 1,2;$$

$$\frac{n_3}{h} = \frac{12}{5} = 2,4; \frac{n_4}{h} = \frac{10}{5} = 2$$

$$\frac{\omega_1}{h} = \frac{2}{150}, \frac{\omega_2}{h} = \frac{6}{150}, \frac{\omega_3}{h} = \frac{12}{150}, \frac{\omega_4}{h} = \frac{10}{150}$$



77-шакл



78-шакл

77-шаклда частоталар полигоми ва 78-шаклда нисбий частоталар гистограммалари тасвирланган.

3-мисол. Бош тўпладан $n=50$ ҳажмдаги таълалма ажратилган:

X_i	2	5	7	10
n_i	16	12	8	14

Бош тўпладан урта қийматининг сўлжимаган баҳосини топиш

Ечиш. Бош тўпладан ўрта қийматининг сўлжимаган баҳоси — таъламнинг урта қиймати. Шунинг учун

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{16 \cdot 2 + 12 \cdot 5 + 8 \cdot 7 + 14 \cdot 10}{50} = 5.76.$$

4-мисол. Бир асбоб ёрдамида стерженнинг узунлиги беш марта ўлчанганда (систематик хатоларсиз) қуйидаги натижалар олинган: 92, 94, 103, 105, 106.

а) стержен узунлигининг таълама урта қийматини топиш;

б) асбоб йўл қўйган хатоларнинг таълама дисперсиясини топиш

Ечиш. а) Таълама ўрта қиймати \bar{X} ни топиш учун шартли вариантлардан фойдаланамиз, чунки дастлабки вариантлар катта сонлардир:

$$u_i = X_i - 92$$

$$\bar{X} = 92 + \frac{0+2+11+13+14}{5} = 92 + 8 = 100.$$

б) Таълама дисперсияни топиш:

$$S^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n} = \frac{(92-100)^2 + (94-100)^2 + (103-100)^2 + (105-100)^2 + (106-100)^2}{5} = 34$$

5-мисол. $n=10$ ҳажмли танланманинг ушбу тақсимоти бўйича танланма ўрта қийматини топинг:

X_i	1250	1270	1280
n_i	2	5	3

Ечиш. Дастлабки вариантлар катта сонлар, шунинг учун $u_i = x_i - 1270$ шартли вариантларга ўтамиз:

u_i	-20	0	10
n_i	2	5	3

$$\bar{X} = C + \bar{u} = 1270 + \frac{2 \cdot (-20) + 5 \cdot 0 + 3 \cdot 10}{10} = 1270 - 1 = 1269.$$

6-мисол. Ушбу $n=10$ ҳажмли танланма тақсимоти бўйича танланма дисперсияни топинг.

X_i	186	192	194
n_i	2	5	3

Ечиш. $u_i = X_i - 191$ шартли вариантларга ўтамиз:

u_i	-5	1	3
n_i	2	5	3

$$S_u^2 = \frac{\sum n_i u_i^2}{n} - \left[\frac{\sum n_i u_i}{n} \right]^2 = \frac{2 \cdot 5^2 + 5 \cdot 1^2 + 3 \cdot 3^2}{10} - \left[\frac{2 \cdot (-5) + 5 \cdot 1 + 3 \cdot 3}{10} \right]^2 = 8,2 - 0,16 = 8,04.$$

7-мисол. Ушбу $n=10$ ҳажмли танланма тақсимоти бўйича танланма ўрта қийматини ва танланма дисперсияни топинг:

X_i	0,01	0,04	0,08
n_i	5	3	2

Ечиш. $u_i = 100X_i$ ($h=100$) шартли вариантларга ўтамиз, натижада қуйидаги тақсимотни ҳосил қиламиз:

u_i	1	4	8
n_i	5	3	2

$$u = \frac{\sum n_i u_i}{n} = \frac{1}{100} (1 \cdot 5 + 4 \cdot 3 + 8 \cdot 2) = 0.33.$$

$$S_u^2 = \frac{\sum n_i u_i^2}{n} - \left[\frac{\sum n_i u_i}{n} \right]^2 = \frac{5 \cdot 1^2 + 3 \cdot 4^2 + 2 \cdot 8^2}{10} - \left[\frac{5 \cdot 1 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot 8}{10} \right]^2 = 7.21$$

$$S_{\bar{x}}^2 = \frac{1}{h^2} \cdot S_u^2 = \frac{1}{100^2} \cdot 7.21 \approx 0.0007.$$

9- дарсхона топшириги

1. Бирор дискрет тасодифий миқдорни урганиш чоғида 40 та боғлиқмас синовлар натижасида қуйидаги таъланма ҳосил қилинган:

10, 13, 10, 9, 9, 12, 12, 6, 7, 9,
8, 9, 11, 9, 14, 13, 9, 8, 8, 7,
10, 10, 11, 11, 11, 12, 8, 7, 9, 10,
13, 3, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12.

а) вариацион қаторни тузинг;

б) нисбий частоталар жадвалини тузинг;


в) нисбий частоталар полигонини чизинг.

Ж: а) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

б)

X_i	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ω_i	1/40	3/40	6/40	8/40	6/40	6/40	5/40	3/40	2/40


в) 79- шакл.



2. Берилган таъланма тақсимоги буйича нисбий частота-лар гистограммасини чизинг.

$X_i - X_{i+1}$	0—2	2—4	4—6
n_i	20	30	50

Ж: 80- шакл.



80- шакл

3. Бош тўпладан $n=60$ ҳажмли таъланма ажратилган:

X_i	1	3	6	26
n_i	8	40	10	2

Бош тўпладан ўрта қийматининг сиқжмаган баҳосини топинг.

Ж: $\bar{X}=4$.

4. Таваккалга таълаб олинган 100 талаба буйини (см.ларда) ўлчаш натижалари берилган:

Буйи	154—158	158—162	162—166	166—170	170—174	174—178	178—182
Талаба-лар сони	10	14	26	28	12	8	2

Текширилган талабалар буйларининг таъланма ўрта қийматини ва таъланма дисперсиясини топинг.

Кўрсатма: Ораликларнинг ўрталарини топинг ва уларни вариантлар деб қабул қилинг.

Ж: $\bar{X}=166$, $S^2=33,44$.

5. Гуруҳдаги 40 талабанинг ёзма ишлари баҳоларининг частота-лари жадвали берилган:

Баҳо — X_i	2	3	4	5
Частота — n_i	3	8	25	4

\bar{X} , S^2 , S ларни тошинг

Ж: $\bar{X}=3,75$; $S^2=0,5375$; $S=0,74$

6) Ушбу $n=100$ хажмли танланма тақсимоли буйича танланма дисперсияни тошинг:

X_i	2502	2804	2903	3028
n_i	8	30	60	2

Курсатма: $n_i = X_i - 2844$ шарли вариантларга утинг
 Ж: $S_x^2 = S_y^2 = 12603$.

9- мустақил иш

1. Кириш имтиҳонларида элик абитуриент қуйдаги балларни олди:

12, 14, 19, 15, 14, 18, 13, 16, 17, 12, 20, 17, 15, 13, 17, 16, 20, 14, 14, 13, 17, 16, 15, 19, 16, 15, 18, 17, 15, 14, 16, 15, 15, 18, 15, 15, 19, 14, 16, 18, 18, 15, 15, 17, 15, 16, 16, 14, 14, 17.

- а) вариацион каторни тузинг;
 - б) нисбий частоталар жадвалини тузинг;
 - в) нисбий частоталар полигонини чизинг.
- Ж: а) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

б)

X_i	12	13	14	15	16	17	18	19	20
w_i	0,04	0,06	0,16	0,24	0,16	0,14	0,10	0,06	0,04

2. Берилган танланма тақсимоли буйича нисбий частоталар гистограммасини чизинг.

$X-X_{i+1}$	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	$n=20$
n_i	2	4	8	4	2	

Ж: $w_1 = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$; $w_2 = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$; $w_3 = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$;

$w_4 = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$; $w_5 = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$; $h=5$.

$\frac{w_1}{h} = \frac{1}{50}$; $\frac{w_2}{h} = \frac{1}{25}$; $\frac{w_3}{h} = \frac{1}{25}$; $\frac{w_4}{h} = \frac{1}{25}$; $\frac{w_5}{h} = \frac{1}{50}$.

3. Қуйдаги танланма берилган
 2, 1, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 2, 2, 3, 3.

- а) вариацион каторни тузинг;
 - б) частоталар жадвалини тузинг;
 - в) нисбий частоталар полигонини чизинг;
 - г) \bar{X} , S^2 , S ларни тошинг
- Ж: а) 1, 2, 3, 4,

б)

X_i	1	2	3	4
w_i	0,15	0,25	0,50	0,10

г) $\bar{X} = 2,55$; $S^2 = 0,7475$; $S = 0,86$.

4. Ушбу $n = 100$ ҳажмли танланма тақсимоти бўйича танланма дисперсияни топинг:

X_i	340	360	375	380
n_i	20	50	18	12

Қўрсатма: $u_i = X_i - 360$ шартли вариантларга ўтинг.

Ж: $S^2(X) = S^2(u) = 167,29$.

5. Ушбу $n = 10$ ҳажмли танланма тақсимоти бўйича танланма дисперсияни топинг:

X_i	23,5	26,1	28,2	30,4
n_i	2	3	4	1

Қўрсатма: $u_i = 10x_i - 268$ шартли вариантларга ўтинг.

Ж: $S^2 = \frac{S^2_u}{100} = 4,89$.

1-лаборатория машғулоти

Танланмаларнинг сонли характеристикаларини ҳисоблаш

Берилган танланма тақсимотининг танланма ўрта қийматини, танланма дисперсиясини $u_i = \frac{X_i - c}{h}$ формула ёрдамида соддалаштириб ҳисобланг.

1.	X	10,3	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1
	n_i	4	7	8	10	25	15	12	10	4	5
2.	X	83	85	87	89	91	93	95	97	99	101
	n_i	6	7	12	15	30	10	8	6	4	2
3.	X	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8			
	n_i	5	10	17	30	20	12	6			
4.	X	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
	n_i	6	13	38	74	106	85	30	10	4	
5.	X	18,6	19,0	19,4	19,8	20,2	20,6				
	n_i	4	6	30	40	18	2				
6.	X	65	70	75	80	85	90				
	n_i	2	5	25	15	5	3				
7.	X	20,2	20,4	20,6	20,8	21,0					
	n_i	4	7	20	15	3					
8.	X	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45					
	n_i	18	20	25	22	15					

9.	\bar{X} n_i	5 10	10 20	15 40	20 30	25 15	30 5		
10.	\bar{X} n_i	5,3 5	5,6 10	5,9 25	6,2 20	6,5 15	6,8 4		
11.	\bar{X} n_i	6,4 7	6,8 12	7,2 16	7,6 30	8,0 25	8,4 15	8,8 6	
12.	\bar{X} n_i	7,3 10	7,6 15	7,9 18	8,2 24	8,5 20	8,8 14	9,1 5	
13.	\bar{X} n_i	8,2 6	8,6 12	9,0 30	9,4 25	9,8 20	10,2 4		
14.	\bar{X} n_i	9,1 10	9,3 13	9,5 16	9,7 28	9,9 23	10,1 17	10,3 7	
15.	\bar{X} n_i	10,1 20	10,5 25	10,9 30	11,3 45	11,7 40	12,1 35	12,5 15	
16.	\bar{X} n_i	1,5 15	2,0 18	2,5 23	3,0 25	3,5 35	4,0 32	4,5 22	5,0 13
17.	\bar{X} n_i	2,1 19	2,3 25	2,5 28	2,7 30	2,9 40	3,1 35	3,3 24	3,5 15
18.	\bar{X} n_i	2,4 20	2,6 25	2,8 35	3,0 40	3,2 50	3,4 32	3,6 23	3,8 15
19.	\bar{X} n_i	3,2 10	3,5 15	3,8 20	4,1 22	4,4 35	4,7 30	5,0 25	5,3 12
20.	\bar{X} n_i	3,6 15	4,0 25	4,4 30	4,8 35	5,2 45	5,6 40	6,0 30	6,4 20
21.	\bar{X} n_i	4,3 6	4,6 8	4,9 13	5,2 15	5,5 25	5,8 20	6,1 14	6,4 5
22.	\bar{X} n_i	4,5 10	5,0 16	5,5 18	6,0 20	6,5 30	7,0 28	7,5 15	8,0 8
23.	\bar{X} n_i	11,2 5	11,4 8	11,6 12	11,8 15	12,0 25	12,2 22	12,4 13	12,6 7
24.	\bar{X} n_i	11,5 10	11,9 14	12,3 18	12,7 20	13,1 26	13,5 21	13,9 13	14,3 8
25.	\bar{X} n_i	12,3 2	12,5 5	12,7 8	12,9 12	13,1 20	13,3 15	13,5 7	13,7 3
26.	\bar{X} n_i	12,4 3	12,8 10	13,2 15	13,6 25	14,0 40	14,4 30	14,8 20	15,2 5
27.	\bar{X} n_i	13,2 10	13,4 15	13,6 18	13,8 20	14,0 30	14,2 25	14,4 16	14,6 12
28.	\bar{X} n_i	13,8 4	14,3 7	14,8 9	15,3 11	15,8 15	16,3 10	16,8 6	17,3 5
29.	\bar{X} n_i	14 15	16 17	18 20	20 22	22 25	24 23	26 16	28 13
30.	\bar{X} n_i	16,1 10	16,4 14	16,7 21	17,0 28	17,3 23	17,6 15		

10- §. Математик кутилиш ва дисперсия учун ишончли ораликлар

14.10.1. X_1, X_2, \dots, X_n X — белгилли бош тўнламдан олинган танланма бўлиб, унинг тақсимот функцияси $F(x, \theta)$ бўлсин. θ параметр учун $L(X_1, \dots, X_n)$ баҳо бўлсин.

Агар ихтиёрий $\alpha > 0$ сон учун шундай $\delta > 0$ сон топиш мумкин бўлсаки, унинг учун

$$P(|L - \theta| < \delta) = 1 - \alpha$$

бўлса, δ ҳолда $(L - \delta; L + \delta)$ оралик θ параметрнинг $1 - \alpha$ ишончлилиқ даражаси *ишончли оралиги* дейилади.

14.10.2. X белгиси нормал тақсимланган бош тўнламини қарай миз. Бу тақсимотнинг математик кутилиши a учун қуйидаги ишончли ораликдан фойдаланилади:

$$a) \bar{X} - t_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + t_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

бу ерда σ — ўрта квадратик четлаиш, t_{α} — Лаплас функцияси $\Phi(t)$ нинг $\Phi(t_{\alpha}) = \alpha/2$ бўладиган қиймати.

б) σ — номаълум бўлиб, танланма ҳажми $n > 30$ бўлганда:

$$\bar{X} - t_{n-1, \alpha} \frac{S}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + t_{n-1, \alpha} \frac{S}{\sqrt{n}}, \text{ бу ерда}$$

S^2 — танланма дисперсия, $t_{n-1, \alpha}$ — Стьюдент тақсимоти жадвалидан берилган n ва α лар буйича топилади.

14.10.3. X белгиси нормал тақсимланган тақсимот функцияси-нинг дисперсияси σ^2 учун қуйидаги ишончли ораликлардан фойдаланилади:

$$S^2(1 - q)^2 < \sigma^2 < S^2(1 + q)^2, \quad q < 1 \text{ бўлганда,}$$

$$0 < \sigma^2 < S^2(1 + q^2), \quad q > 1 \text{ бўлганда.}$$

1- мисол. Тасодифий микдор $\sigma = 2$ параметр билан нормал конун буйича тақсимланган. $n = 25$ ҳажмли танланма олинган. Бу тақсимотнинг номаълум a параметри учун $\gamma = 0,95$ ишончлилиқ билан ишончли ораликни топиш

Ечиш. $\Phi(t) = \frac{1}{2}\gamma = 0,475$ тенгликдан, $\Phi(t)$ функция жадвалидан $t = 1,96$ сонни тонамиз. δ ҳолда баҳо аниқлиги қуйидагича бўлади:

$$\delta = \frac{\sigma}{n} t = \frac{2}{25} \cdot 1,96 = 0,1568,$$

ишончли оралик эса

$$\bar{X} - t \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + t \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \text{ ёки } (\bar{X} - 0,1568, \bar{X} + 0,1568).$$

Масалан, агар олинган танланма учун $\bar{X}=2,3$ бўлса, у ҳолда (1,5; 3,1) оралик 95% ишончлилик билан номаълум параметр a ни коплайди.

2- м и с о л. Бош тўпламнинг нормал тақсимланган X белгисининг номаълум математик қутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг. Бунда $\sigma=5$, танламанинг ўрта қиймати $X=14$ ва танлама ҳажми $n=25$ берилган.

Е ч и ш. $\Phi(t) = \frac{\gamma}{2}$ муносабатдан: $\Phi(t) = \frac{0,95}{2} = 0,475$. Жадвалдан $t=1,96$ ни топамиз. Топилганларни $\bar{X} - t \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + t \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ га қўямиз:

$$\left(14 - 1,96 \cdot \frac{5}{\sqrt{25}}; 14 + 1,96 \cdot \frac{5}{\sqrt{25}} \right)$$

ёки

$$(12,04; 15,96)$$

ишончли ораликни топамиз.

3- м и с о л. Бош тўпламнинг X белгиси нормал тақсимланган. $n=16$ ҳажмли танланма бўйича танланма ўрта қиймат $\bar{X}=20,2$ ва танланма ўрта квадратик четланиш $S=0,8$ топилган. Номаълум математик қутилишни ишончли оралик ёрдамида $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳоланг.

Е ч и ш. $t_{n-1;\gamma}$ ни жадвалдан топамиз:

$$\gamma=0,95; n=16; t_{n-1;\gamma}=2,13.$$

Буларни

$$\bar{X} - t_{n-1;\gamma} \frac{S}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + t_{n-1;\gamma} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

формулага қўйсак,

$$\left(20,2 - 2,13 \cdot \frac{0,8}{\sqrt{16}}; 20,2 + 2,13 \cdot \frac{0,8}{\sqrt{16}} \right)$$

ёки

$$(19,774; 20,626)$$

ҳосил бўлади. Шундай қилиб, номаълум a параметр 0,95 ишончлилик билан

$$19,774 < a < 20,626$$

ишончли ораликда ётади.

4- м и с о л. Физик катталикни тўққизта бир хил, боғлиқмас ўлчаш натижасида олинган натижаларнинг ўрта арифметиги $\bar{X}=42,319$ ва танланма ўрта квадратик четланиши $S=5,0$ топилган. Ўлчанаётган катталикнинг ҳақиқий қийматини $\gamma=0,95$ ишончлилик билан аниқлаш талаб қилинади.

Ечиш. Ўлчанаётган катталикнинг хакикий қиймати унинг математик кутилишига тенг. Шунинг учун масала σ номаълум бўлганда

$$\bar{X} - t_{n-1, \gamma} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + t_{n-1, \gamma} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

ишончлилик оралиғи ёрдамида математик кутилишни баҳолашга келтирилади.

Жадвалдан $\gamma=0,95$ ва $n=9$ бўйича $t_{n-1, \gamma}=2,31$ ни топамиз. У ҳолда

$$42,319 - 2,31 \cdot \frac{5}{3} < a < 42,319 + 2,31 \cdot \frac{5}{3}$$

ёки

$$38,469 < a < 46,169.$$

Шундай қилиб, изланаётган катталикнинг хакикий қиймати 0,95 ишончлилик билан $38,469 < a < 46,169$ ишончли ораликда ётади.

5- мисол. Бош тўпلامнинг X белгиси нормал тақсимланган. $n=16$ хажмли танланма бўйича танланма ўрта квадратик четланиши $S=1$ топилган. Бош тўпلام ўрта квадратик четланиш σ ни 0,95 ишончлилик билан қоплайдиган ишончли ораликни топинг.

Ечиш. Берилганлар $\gamma=0,95$ ва $n=16$ бўйича жадвалдан $q=0,44 < 1$ ни топамиз. Топилганларни $S(1-q) < \sigma < S(1+q)$ формулага қўямиз ва

$$1 \cdot (1 - 0,44) < \sigma < 1(1 + 0,44)$$

ёки

$$0,56 < \sigma < 1,44$$

ни ҳосил қиламиз.

6- мисол. Бирор физик катталик битта асбоб ёрдамида 12 марта ўлчанган, бунда ўлчанлардаги тасодифий хатоликларнинг ўрта квадратик четланиши 0,6 га тенг бўлиб чиқди. Асбоб аниқлигини 0,99 ишончлилик билан топинг.

Ечиш. Асбобнинг аниқлиги ўлчанлардаги тасодифий хатоликларнинг ўрта квадратик четланиши билан тавсифланади. Шунинг учун масала ўрта квадратик четланиш σ ни берилган $\gamma=0,99$ ишончлилик билан қоплайдиган ишончли ораликни топишга келтирилади.

Жадвалдан $\gamma=0,99$ ва $n=12$ бўйича $q=0,9$ ни топамиз. $S=0,6$ ва $q=0,9$ ларни формулага қўйиб, изланаётган ораликни топамиз:

$$0,6(1 - 0,9) < \sigma < 0,6(1 + 0,9)$$

ёки

$$0,06 < \sigma < 1,14.$$

1. Бош тўпламнинг нормал тақсимланган X сон белгисининг номаълум математик кутилиши a ни 0,99 ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг, бунда ўрта квадратик четланиш $\sigma=4$, танламанинг ўрта қиймати $\bar{X}=10,2$ ва танлама ҳажми $n=16$.

Ж: $7,63 < a < 12,77$.

2. Бош тўпламнинг нормал тақсимланган X белгисининг математик кутилишини танланма ўрта қиймат бўйича баҳосининг 0,925 ишончлилик билан аниқлиги 0,2 га тенг бўладиган танламанинг минимал ҳажмини топинг. Ўрта квадратик четланишни $\sigma=1,5$ га тенг деб олинг.

Ж: $n=179$.

3. Бош тўпладан $n=10$ ҳажмли танланма олинган:

X_i	-2	1	2	3	4	5
n_i	2	1	2	2	2	1

Бош тўпламнинг нормал тақсимланган белгиси математик кутилишини танланма ўрта қиймати бўйича 0,95 ишончлилик билан ишончли оралик ёрдамида баҳоланг.

Ж: $0,3 < a < 3,7$.

4. Бирор физик катталикни боғлиқмас бир хил аниқликдаги 9 та ўлчаш маълумотлари бўйича ўлчашларнинг ўрта арифметик қиймати $\bar{X}=30,1$ ва ўрта квадратик четланиши $S=6$ топилган. Ўлчанаётган катталикнинг хақиқий қийматини ишончли оралик ёрдамида $\gamma=0,99$ ишончлилик билан баҳоланг.

Ж: $23,38 < a < 36,82$.

5. Бош тўпламнинг микдорий белгиси нормал тақсимланган. n ҳажмли танланма бўйича тузатилган ўрта квадратик четланиш S топилган.

а) ўртача квадратик четланиш σ ни;

б) дисперсияни 0,99 ишончлилик билан қоплайдиган ишончли ораликни топинг, бунда $n=10$; $S=5,1$.

Ж: а) $0 < \sigma < 14,28$; б) $0 < \sigma^2 < 203,92$.

6. Битта асбоб ёрдамида (систематик хатоларсиз) бирор физик катталик 10 марта ўлчанган, бунда ўлчашлардаги тасодифий хатоларнинг ўрта квадратик четланиши 0,8 га тенг бўлган. Асбоб аниқлигини 0,95 ишончлилик билан аниқланг.

Ж: $0,28 < \sigma < 1,32$.

7. Нормал тақсимланган бош тўпладан $n=10$ ҳажмли танланма олинган ва ушбу частоталар жадвали тузилган:

X_i	-2	1	2	3	4	5
w_i	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1

Математик қутилиши учун $\gamma=0,95$ ишончлилик билан ишончли ораликни тоинг.

8. 10 та боғликмас (эркли) ўлчанлар натижасида стержень узунлиги (мм) учун қуйидаги маълумотлар олинган: 23,24,23,25,25, 26,26,25,24,25. Ўлчаш хатолиги нормал тақсимланган деб фараз қилиб, стержень узунлигининг математик қутилиши учун $\gamma=95\%$ билан ишончли ораликни тоинг.

$$\text{Ж: } 23,8 < a < 25,4.$$

9. Агар 10 та боғликсиз ўлчанлар натижасида объектгача бўлган масофа (м) учун 25025, 24970, 24780, 25315, 24097, 24646, 24717, 25354, 24912, 25374 натижалар олинган бўлса, объектгача бўлган масофанинг математик қутилиши учун $\gamma=0,9$ ишончлилик билан ишончли ораликни тоинг. Бунда ўлчаш хатолиги $\sigma=100$ ўрта квадратик четланиш билан нормал тақсимланган деб фараз қилинади.

$$\text{Ж: } 24948 < a < 25052.$$

10- мустақил иш

1. Бош тўпلامнинг X белгиси нормал тақсимланган. Агар ўрта квадратик четланиш σ , танланма ўрта қиймати \bar{X} ва танланма ҳажми n берилган бўлса ($\sigma=5$, $\bar{X}=16,8$; $n=25$), номаълум a математик қутилиши 0,99 ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни тоинг.

$$\text{Ж: } 19,23 < a < 19,37.$$

2. Ўлчанларнинг тасодифий хатоликлари ўрта квадратик четланиши $\sigma=40$ м бўлган биргина асбоб ёрдамида тўпдан нишонгача бўлган масофа 5 марта (бир хил шаронгда) ўлчанган. Агар ўлчанларнинг ўрта арифметик қиймати $\bar{X}=2000$ м эканлиги маълум бўлса, нишонгача бўлган a ҳақиқий масофани 0,95 ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни тоинг.

$$\text{Ж: } 1960,8 < a < 2039,2.$$

3. Дисперсияси номаълум нормал тақсимланган бош тўпلام математик қутилиши учун танланма ҳажми n бўйича γ ишончлилик билан ишончли оралигини тоинг. Бунда $n=25$, $\bar{X}=2,4$; $S^2=4$; $\gamma=0,95$.

$$\text{Ж: } 1,5744 < a < 3,2256.$$

4. Бош тўпلامдан $n=12$ ҳажмли танланма олинган:

X_i	-0,5	-0,4	-0,2	0	0,2	0,6	0,8	1	1,2	1,5
n_i	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1

Бош тўпلامнинг нормал тақсимланган белгиси математик қутилиши a ни 0,95 ишончлилик билан ишончли оралик ёрдамида баҳолаш.

$$\text{Ж: } -0,04 < a < 0,88.$$

5. Бош тўпلامнинг нормал тахсимланган миқдорий белгисидан олинган n хажмли танланма бўйича ўрта квадратик четланиш S топилган.

Агар $n=50$, $S=14$ бўлса, а) ўрта квадратик четланиш σ ни 0,994 ишончлик билан қонловчи ишончли ораликни топинг;

б) худди шу маълумотлар бўйича юқоридаги талабни дисперсия учун бажаринг.

Ж: а) $7,98 < \sigma < 20,02$; б) $63,9 < \sigma^2 < 400,8$

6. Бир хил аниқликдаги 15 та ўлчаш бўйича ўрта квадратик четланиш $S=0,12$ топилган. Ўлчаш аниқлигини 0,99 ишончлик билан аниқланг.

Ж: $0,03 < \sigma < 0,21$.

7. Бирор физик катталик X ни бир-бирига боғлиқ бўлмаган 4 та ўлчаш нагжасида 28,6; 28,3; 28,2, 28,4 кийматлар олинган. Ўлчаш хатолиги нормал тахсимотга эга деб фараз қилиб, нормал тахсимланган X тасодифий миқдорнинг a математик кутилиши учун 95% ишончлик билан ишончли оралик топинг.

Ж: $28,11 < a < 28,65$.

11-§. Гипотезаларни Пирсоннинг мувофиқлик критерийси бўйича текшириш

X белгилни бош тўпلامдан олинган X_1, X_2, \dots, X_n танланма берилган бўлиб, унинг асосида бош тўпلامнинг тахсимот функцияси ҳақидаги $H_0: F(x) = F_0(x)$ асосий гипотезани $H_1: F(x) \neq F_0(x)$ конкурент гипотеза бўлганда текшириш керак бўлсин. X белги кийматларини $(-\infty, a_1) = \Lambda_1, \Lambda_2 = [a_1; a_2), \dots, \Lambda_{k-1} = [a_{k-2}; a_{k-1}), \Lambda_k = [a_{k-1}; +\infty)$ ораликларга бўламиз, n танланма кийматларининг Λ_i ораликларга тушган кийматларининг сони бўлсин ва

$\omega_i = \frac{n_i}{n}, p_i = P(X \in \Lambda_i)$. У ҳолда

$$p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1,$$

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k = n,$$

$$\omega_1 + \omega_2 + \dots + \omega_k = 1$$

Қуйидаги статистикани аниқлаймиз:

$$Y^2 = n \sum_{i=1}^k \frac{(\omega_i - p_i)^2}{p_i} = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

Агар H_0 гипотеза ўрилин бўлиб, $np_i > 5$ бўлса, $Y^2(k-1)$ — озодлик даражали χ^2 — квадрат тахсимот бўйича тахсимлангандир.

Агар $F_0(x)$ тахсимот функцияда l та номальум параметрлар бўлиб, улар танланма бўйича баҳоланган бўлса, озодлик даражалари сони $(k-l-1)$ га тенг бўлади.

Энди Пирсоннинг мувофиқлик критерийсини аниқлаймиз. Бунинг учун аввал α аниқлик даражаси ва chi — квадрат тақсимот учун жадвалдан $\chi_{k-1; \alpha}$ нинг $P(Y^2 > \chi_{k-1; \alpha}) = \alpha$ бўладиган критик қиймати топилади.

Сўнгра танланма қийматига кўра Y^2 ҳисобланади, агар $Y^2 < \chi_{k-1; \alpha}$ бўлса, H_0 гипотеза қабул қилинади ва бош тўпلام $F_0(x)$ тақсимот функцияга эга деб ҳисобланади, агар $Y^2 > \chi_{k-1; \alpha}$ бўлса, H_0 гипотеза рад этилади.

Агар озодлик даража 30 дан катта бўлса, критик қиймат нормал тақсимотдан фойдаланиб топилади.

1-мисол. X белгиси бош тўпладан олинган танланманинг статистик тақсимоти берилган:

Δi	[0;5)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)	[45;50)
n_i	2	12	8	4	14	6	10	2	1	11

X белгининг тақсимот функцияси текис тақсимотга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслигини 0,05 аниқлик даражаси билан Пирсоннинг мувофиқлик критерийсини ёрдамида текширинг.

Е ч и ш.

$$n = \sum_{i=1}^k n_i = 70.$$

Қуйидаги жадвални тузамиз:

X	2,5	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5	32,5	37,5	42,5	47,5
w	0,029	0,171	0,114	0,057	0,2	0,086	0,143	0,029	0,014	0,157

$$w_1 = \frac{2}{70} = 0,029; \quad w_2 = \frac{12}{70} = 0,171; \quad w_3 = \frac{8}{70} = 0,114;$$

$$w_4 = \frac{4}{70} = 0,057; \quad w_5 = \frac{14}{70} = 0,2; \quad w_6 = \frac{6}{70} = 0,086;$$

$$w_7 = \frac{10}{70} = 0,143; \quad w_8 = \frac{2}{70} = 0,029; \quad w_9 = \frac{1}{70} = 0,014; \quad w_{10} = \frac{11}{70} = 0,157.$$

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \sum_{i=1}^{10} w_i X_i = 2,5 \cdot 0,029 + 7,5 \cdot 0,171 + 12,5 \cdot 0,114 + \\ &+ 17,5 \cdot 0,057 + 22,5 \cdot 0,2 + 27,5 \cdot 0,086 + 32,5 \cdot 0,143 + \\ &+ 37,5 \cdot 0,029 + 42,5 \cdot 0,014 + 47,5 \cdot 0,157 = \\ &= 2,5 \cdot 0,029 + 3 \cdot 0,171 + 5 \cdot 0,114 + 7 \cdot 0,057 + 9 \cdot 0,2 + \\ &+ 11 \cdot 0,086 + 13 \cdot 0,14 + 15 \cdot 0,029 + 17 \cdot 0,014 + 19 \cdot 0,157) = \\ &= 24,4285; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X^2 = & 2,5^2(0,029 + 9 \cdot 0,171 + 25 \cdot 0,114 + 49 \cdot 0,057 + 81 \cdot 0,2 + \\ & + 121 \cdot 0,086 + 169 \cdot 0,143 + 225 \cdot 0,029 + \\ & + 289 \cdot 0,014 + 361 \cdot 0,157) = 782,67; \end{aligned}$$

$$\overline{S^2} = \overline{X^2} - \overline{X}^2 = 782,67 - (24,4285)^2 = 782,67 - 596,75 = 185,92;$$

$$S = \sqrt{185,92} \approx 13,63.$$

X белгнн учун

$$M(X) = \frac{a+b}{2}; \quad D(X) = \frac{(b-a)^2}{2}; \quad \sigma(X) = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$$

бўлганидан a ва b ни апиқлаш учун қуйндаги системани тузамиз:

$$\begin{cases} \frac{a+b}{2} = 24,43, \\ \frac{b-a}{2\sqrt{3}} = 13,63 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b = 48,86, \\ b-a = 47,16 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (b = 48,01; a = 0,85);$$

$$\frac{1}{b-a} = \frac{1}{47,16} = 0,0212.$$

Шундай қилиб,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0,85, \\ 0,0212, & \text{агар } 0,85 \leq x \leq 48,01, \\ 0, & \text{агар } x > 48,01, \end{cases}$$

бу ерда $f(x)$ — X белгннннг зичлик функцияси.

Энди текис тақсимот бўйича X белгннннг $[0; 5)$, $[5; 10)$, ..., $[45; 50)$ оралиқларга тушнн эҳтимоликларини топамиз.

Δi	$[-5;0)$	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$
P_i	0	0,088	0,106	0,106	0,106	0,106

Δi	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$
P_i	0,106	0,106	0,106	0,106	0,064	0

$$\begin{aligned} p_1 = P(0 < X < 5) &= p(0,85 < X < 5) = \int_{0,85}^5 0,0212 dx = \\ &= 0,0212x \Big|_{0,85}^5 = 0,0212 \cdot 4,15 = 0,088. \end{aligned}$$

$$p_{10} = P(45 < X < 50) = P(45 < X < 48,01) = \int_{45}^{48,01} 0,0212 dx =$$

$$= 0,0221x \Big|_{45}^{48,01} = 0,0212 \cdot 3,01 = 0,064$$

Y^2 ни ҳисоблаш учун қуйидаги жадвалини тузамиз:

w_i	P_i	$w_i - P_i$	$(w_i - P_i)^2$	$\frac{(w_i - P_i)^2}{P_i}$
0,029	0,088	-0,059	0,003	0,034
0,171	0,106	0,065	0,004	0,038
0,114	0,106	0,008	0,006	0,057
0,057	0,106	-0,049	0,002	0,019
0,2	0,106	0,094	0,009	0,085
0,086	0,106	-0,020	0,000	0,000
0,143	0,106	0,037	0,001	0,009
0,029	0,106	-0,077	0,006	0,057
0,014	0,106	-0,092	0,008	0,075
0,157	0,064	0,093	0,009	0,141
				0,515

Шундай қилиб $Y^2 = n \cdot \sum_{i=1}^k \frac{(w_i - P_i)^2}{P_i} = 70 \cdot 0,515 = 36,05$, яъни

$$Y^2 = 36,05.$$

χ^2 — квадрат таксимот жадвалидан маълумки

$$\chi_{10-2-1, 0,05} = \chi_{7, 0,05} = 14,1.$$

$Y^2 > 14,1$ булгани учун бош тупламнинг таксимот функцияси 0,05 аниқлик даража билан текис таксимотга мўх келмайди деган хулосага эга буламиз.

2-мисол. X белгилни бош тупламдан олинган танланманинг статистик таксимоти берилган:

Δi	[0;3)	[3;6)	[6;9)	[9;12)	[12;15)	[15;18)	[18;21)	[21;24)	[24;27)	[27;30)
n_i	1	3	4	6	11	10	7	5	2	1

X белгининг таксимот функцияси нормал таксимотга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслигини 0,05 аниқлик даражаси билан Пирсоннинг мувофиқлик критерийси ёрдамида аниқланг.

Ечиш. $n = \sum_{i=1}^{10} n_i = 50$, $w = \frac{n_i}{n}$, $i = 1, \bar{10}$ деб олинб, қуйидаги жадвалини тузамиз:

X_i	1,5	4,5	7,5	10,5	13,5	16,5	19,5	22,5	25,5	28,5
w_i	0,02	0,06	0,08	0,12	0,22	0,20	0,14	0,10	0,04	0,02

$\bar{X} = 3T - 1,5$ алманитиришни бажарсак, T ва T^2 учун статистик тахсимот куйидагича бўлади:

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
w	0,02	0,06	0,08	0,12	0,22	0,2	0,14	0,1	0,04	0,02
T^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
w	0,02	0,06	0,08	0,12	0,22	0,2	0,14	0,1	0,04	0,02

$$\bar{T} = 0,2 + 0,12 + 0,24 + 0,48 + 1,1 + 1,2 + 0,98 + 0,8 + 0,36 + 0,2 = 5,5.$$

$$T^2 = 0,02 + 0,24 + 0,72 + 1,92 + 5,5 + 7,2 + 6,86 + 6,4 + 3,24 + 2 = 34,1$$

$$\bar{X} = 3 \cdot \bar{T} - 1,5 = 3 \cdot 5,5 - 1,5 = 15.$$

$$S^2 = 9(T^2 - \bar{T}^2) = 34,65.$$

$$S = 5,9.$$

Демак,

$$f(x) = \frac{1}{5,9 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-15)^2}{69,3}}$$

$$\frac{x-15}{5,9} = u \text{ бўлсин, у ҳолда}$$

$$f(x) = \frac{1}{5,9 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} \approx 0,17 \cdot \varphi(u),$$

бу ерда $\varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}$ бўлади.

Бу функциянинг кийматларидан фойдаланиб яна битта жадвал тузамиз ($h=3$):

X	u	$\varphi(u)$	$f(x)$	$h f(x)$	X	u	$\varphi(u)$	$f(x)$	$h f(x)$
1,5	-2,29	0,029	0,005	0,02	16,5	0,25	0,387	0,066	0,20
4,5	-1,78	0,082	0,014	0,04	19,5	0,76	0,299	0,051	0,15
7,5	-1,27	0,178	0,030	0,09	22,5	1,27	0,178	0,030	0,09
10,5	-0,76	0,299	0,051	0,15	25,5	1,78	0,082	0,014	0,04
13,5	-0,25	0,387	0,066	0,20	28,5	2,29	0,029	0,005	0,02

Энди куйидаги

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - a}{\gamma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - a}{\gamma}\right).$$

(бу ерда a — математик кутилиш ва

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

формула ёрдамида оралиқларга тушиш эҳтимоликларини ҳисоблаймиз:

$$P(0 < X < 3) = 0,0154 \approx 0,02,$$

$$P(3 < X < 6) = 0,0425 \approx 0,04,$$

$$P(6 < X < 9) = 0,0905 \approx 0,09,$$

$$P(9 < X < 12) = 0,151 \approx 0,15,$$

$$P(12 < X < 15) = 0,1946 \approx 0,19,$$

$$P(15 < X < 18) = 0,1946 \approx 0,19,$$

$$P(18 < X < 21) = 0,151 \approx 0,15,$$

$$P(21 < X < 24) = 0,0915 \approx 0,09,$$

$$P(24 < X < 27) = 0,0425 \approx 0,04,$$

$$P(27 < X < 30) = 0,0154 \approx 0,02,$$

Натижада куйидаги жадвалга эга бўламиз:

Δi	[0;3)	[3;6)	[6;9)	[9;12)	[12;15)	[15;18)	[18;21)	[21;24)	[24;27)	[27;30)
P_i	0,02	0,04	0,09	0,15	0,19	0,19	0,15	0,09	0,04	0,02

Юқоридагилардан фойдаланиб, Y^2 ни ҳисоблаш учун жадвал тузамиз:

w_i	P_i	$w_i - P_i$	$(w_i - P_i)^2$	$\frac{(w_i - P_i)^2}{P_i}$
0,02	0,02	0	0,0000	0,00
0,06	0,04	0,02	0,0004	0,01
0,08	0,09	-0,01	0,0001	0,001
0,12	0,15	-0,03	0,0009	0,006
0,22	0,20	0,02	0,0004	0,006
0,2	0,20	0,00	0,0000	0,02
0,14	0,15	-0,01	0,0001	0,00
0,1	0,09	0,01	0,0001	0,0007
0,04	0,04	0	0,0000	0,00
0,02	0,02	0	0,0000	0,00
				0,0387

$$Y^2 = n \sum \frac{(w_i - p_i)^2}{p_i} = 50 \cdot 0,0387 = 1,935;$$

χ^2 — квадрат таксимот жадвалидан $\chi_{10-2-1, 0,05} = 14,1$.

$Y^2 < 14,1$ бўлгани учун бош тўпلامнинг тахсимот функцияси 0,05 аниқлилик даража билан нормал тахсимотга мос келади деган хулосага эга бўламиз.

11- дарсхона топшириги

X белгилни бош тўпلامдан олинган танланманинг статистик тахсимоти берилган:

Δi	[4,1;4,2)	[4,2;4,3)	[4,3;4,4)	[4,4;4,5)	[4,5;4,6)	[4,6;4,7)	[4,7;4,8)	[4,8;4,9)	[4,9;5,0)
n_i	1	2	3	4	5	8	8	9	10

X белгилнинг тахсимот функцияси нормал тахсимотга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслигини 0,05 аниқлик даража билан Пирсоннинг мувофиқлик критерийси ёрдамида аниқланг.

Ж: Нормал тахсимотга мос келади.

11- мустақил иш

X белгилни бош тўпلامдан олинган танламанинг статистик тахсимоти берилган:

Δi	[0;10)	[10;20)	[20;30)	[30;40)	[40;50)	[50;60)
n_i	11	14	15	10	14	16

X белгилнинг тахсимот функцияси текис тахсимотга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслигини 0,05 аниқлилик даражаси билан Пирсоннинг мувофиқлик критерийси ёрдамида аниқланг.

Ж: Текис тахсимот билан мувофиқлашади.

2-лаборатория машғулот

Чизиқли регрессия тенгламасини энг кичик квадратлар усули ёрдамида аниқлаш

X ва Y белгилни икки ўлчовли бош тўпلامдан олинган n хажмли танланма берилган бўлсин. (x_i, y_k) кузатишган кийматларини мос частоталари билан ушбу корреляцион жадвалга жойлаштирамиз:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	...	y_m	$\sum_{f=1}^m n_{if}$
	n_{11}	n_{12}	...	n_{1m}	n_{x_1}
x_2	n_{21}	n_{22}	...	n_{2m}	n_{x_2}
...
x_l	n_{l1}	n_{l2}	...	n_{lm}	n_{x_l}
$\sum_{i=1}^l n_{if}$	n_{y_1}	n_{y_2}	...	n_{y_m}	$n = \sum_{i=1}^l \sum_{f=1}^m n_{if}$

Куйидаги белгилашларни киритамиз:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l x_i n_{x_i}, \quad \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m y_j n_{y_j},$$

$$\overline{XY} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m x_i y_j n_{ij}, \quad \overline{X^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l x_i^2 n_{x_i},$$

$$\overline{Y^2} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m y_j^2 n_{y_j}, \quad \sigma_x^2 = \overline{X^2} - \bar{X}^2$$

$$\sigma_y^2 = \overline{Y^2} - \bar{Y}^2, \quad r = \frac{\overline{XY} - \bar{X} \cdot \bar{Y}}{\sigma_x \sigma_y}$$

$Y - \bar{Y} = \frac{\sigma_y}{\sigma_x} r (x - \bar{x})$ энг кичик квадратлар усули билан топишган

Y нинг X га тўғри чизикли регрессия тенгласмасидир.

Куйинчи бу тенгламани топишни соддалаштириш учун

$$u_i = \frac{x_i - C_1}{h_1}, \quad v_i = \frac{y_i - C_2}{h_2}$$

алмаштиришлар киритилади.

C_1 ва C_2 мос равишда $x_1 \leq \dots \leq x_l$ ва $y_1 \leq \dots \leq y_m$ вариацион каторларнинг ўрталарида жойлашган вариантлар, h_1 ва h_2 лар эса вариацион каторлар кўшни вариантларининг айирмаси.

Юқоридаги алмаштиришлардан фойдаланиб, чизикли регрессия тенгласмасини топишда куйидаги формулалар ишлатилади:

$$\bar{u} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l u_i n_{x_i}, \quad \bar{v} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m v_j n_{y_j},$$

$$\overline{u^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l u_i^2 n_{x_i}, \quad \overline{v^2} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m v_j^2 n_{y_j},$$

$$\sigma_u^2 = \overline{u^2} - \bar{u}^2, \quad \sigma_v^2 = \overline{v^2} - \bar{v}^2,$$

$$\sigma_x = h_1 \sigma_u, \quad \sigma_y = h_2 \sigma_v, \quad \bar{X} = \bar{u} \cdot h_1 + C_1$$

$$Y = \bar{v} \cdot h_2 + C_2, \quad r = \frac{\sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m u_i v_j n_{ij} - n \cdot \bar{u} \bar{v}}{n \sigma_u \sigma_v}$$

Корреляцион жадвал маълумотлари бўйича Y нинг X га тўғри чизикли регрессия тенгласмасини энг кичик квадратлар усули билан топиш.

1.

$Y \backslash X$	5	10	15	20	25	30	n_y
45	2	4	—	—	—	—	6
55	—	3	5	—	—	—	8
65	—	—	5	35	5	—	45
75	—	—	2	8	17	—	27
85	—	—	—	4	7	3	14
n_x	2	7	12	47	29	3	$n=100$

2.

$Y \backslash X$	10	15	20	25	30	35	n_y
40	2	4	—	—	—	—	6
50	—	3	7	—	—	—	10
60	—	—	5	30	10	—	45
70	—	—	7	10	8	—	25
80	—	—	—	5	6	3	14
n_x	2	7	19	45	24	3	$n=100$

3.

$Y \backslash X$	15	20	25	30	35	40	n_y
15	4	1	—	—	—	—	5
25	—	6	4	—	—	—	10
35	—	—	2	50	2	—	54
45	—	—	1	9	7	—	17
55	—	—	—	4	3	7	14
n_x	4	7	7	63	12	7	$n=100$

4.

$Y \backslash X$	2	7	12	27	22	27	n_y
100	1	5	—	—	—	—	6
110	—	5	3	—	—	—	8
120	—	—	3	40	12	—	55
130	—	—	2	10	5	—	17
140	—	—	—	3	4	7	14
n_x	1	10	8	53	21	7	$n=100$

5.

$Y \backslash X$	5	10	15	20	25	30	n_y
10	3	5	—	—	—	—	8
20	—	4	4	—	—	—	8
30	—	—	7	35	8	—	50
40	—	—	2	10	8	—	20
50	—	—	—	5	6	3	14
n_x	3	9	13	50	22	3	$n=100$

6.

$Y \backslash X$	12	14	22	27	32	37	n_y
25	2	4	—	—	—	—	6
35	—	6	3	—	—	—	9
45	—	—	6	35	4	—	45
55	—	—	2	8	6	—	16
65	—	—	—	14	7	3	24
n_x	2	10	11	57	17	3	$n=100$

7.

$Y \backslash X$	15	20	25	30	35	40	n_y
25	3	4	—	—	—	—	7
35	—	6	3	—	—	—	9
45	—	—	6	35	2	—	43
55	—	—	12	8	6	—	26
65	—	—	—	4	7	4	15
n_x	3	10	21	47	15	4	$n=100$

8.

$Y \backslash X$	4	9	14	19	24	29	n_y
30	3	3	—	—	—	—	6
40	—	5	4	—	—	—	9
50	—	—	40	2	8	—	50
60	—	—	5	10	6	—	21
70	—	—	—	4	7	3	14
n_x	3	8	49	16	21	3	$n=100$

9.

$Y \backslash X$	5	10	15	20	25	30	n_y
30	2	6	—	—	—	—	8
40	—	5	3	—	—	—	8
50	—	—	7	40	2	—	49
60	—	—	4	9	6	—	19
70	—	—	—	4	7	5	16
n_x	2	11	14	53	15	5	$n=100$

10.

$Y \backslash X$	10	15	20	25	30	35	n_y
20	5	1	—	—	—	—	6
30	—	6	2	—	—	—	8
40	—	—	40	5	5	—	50
50	—	—	2	8	7	—	17
60	—	—	—	4	7	8	19
n_x	5	7	9	52	19	8	$n=100$

11.

$Y \backslash X$	5	10	15	20	25	30	35	40	n_y
100	2	1	—	—	—	—	—	—	3
120	3	4	3	—	—	—	—	—	10
140	—	—	5	10	8	—	—	—	23
160	—	—	—	1	—	6	1	1	9
180	—	—	—	—	—	—	4	1	5
n_x	5	5	8	11	8	6	5	2	$n=50$

12.

$Y \backslash X$	18	23	28	33	38	43	48	n_y
125	—	1	—	—	—	—	—	1
150	1	2	5	—	—	—	—	8
175	—	3	2	12	—	—	—	17
200	—	—	1	8	7	—	—	16
225	—	—	—	—	3	3	—	6
250	—	—	—	—	1	1	—	2
n_x	1	6	8	20	10	4	1	$n=50$

13.

$Y \backslash X$	5	10	15	20	25	30	35	n_y
100	—	—	—	—	—	6	1	7
120	—	—	—	—	—	4	2	6
140	—	—	8	10	5	—	—	23
160	3	4	3	—	—	—	—	10
180	2	1	—	1	—	—	—	4
n_x	5	5	11	11	5	10	3	$n=50$

14.

$Y \backslash X$	13	18	23	28	33	n_y
25	3	2	—	—	—	5
35	—	6	4	—	—	10
45	—	1	9	5	—	15
55	—	1	2	4	8	15
65	—	—	1	—	4	5
n_x	3	10	16	9	12	$n=50$

15.

$Y \backslash X$	30	35	40	45	50	n_y
46	2	6	—	—	—	8
56	2	8	10	—	—	20
66	—	—	32	3	9	44
76	—	—	4	11	6	21
86	—	—	—	2	5	7
n_x	4	14	46	16	20	$n=100$

16.

$Y \backslash X$	33	38	43	48	53	58	n_y
65	4	8	1	—	—	—	13
75	—	4	4	2	—	—	10
85	—	1	6	6	1	—	14
95	—	—	—	1	5	—	6
105	—	—	—	1	4	1	6
115	—	—	—	—	2	4	6
n_x	4	13	11	10	12	5	$n=55$

17.

$Y \backslash X$	3	7	11	15	19	23	n_y
6	5	3	—	2	—	—	10
16	7	10	1	2	—	—	20
26	2	18	15	20	—	—	55
36	—	—	30	26	—	—	56
46	—	—	—	19	12	—	31
56	—	—	—	—	21	7	28
n_x	14	31	46	69	33	7	$n=200$

18.

$Y \backslash X$	45	50	55	60	65	70	75	n_y
30	—	—	—	—	8	2	1	11
35	—	1	6	22	33	10	3	75
40	1	2	10	48	37	8	1	107
45	—	1	12	11	2	—	—	26
50	—	2	1	1	—	—	—	4
55	—	—	1	—	—	—	—	1
n_x	1	6	30	82	80	20	5	$n=224$

19.

$Y \backslash X$	0	1	2	3	4	n_y
0	18	1	1	—	—	20
3	1	20	—	—	—	21
6	3	5	10	2	—	20
9	—	—	7	12	—	19
12	—	—	—	—	20	20
n_x	22	26	18	14	20	$n=100$

20.

$Y \backslash X$	0	4	8	12	16	n_y
7	19	1	1	—	—	21
13	2	14	—	—	—	16
19	—	3	22	2	—	27
25	—	—	—	15	—	15
31	—	—	—	—	21	21
n_x	21	18	23	17	21	$n=100$

21.

$Y \backslash X$	0	1	2	3	4	n_y
10	20	5	—	—	—	25
20	7	15	3	1	—	26
30	—	3	17	4	—	24
40	—	—	8	13	7	28
50	—	—	—	5	42	47
n_x	27	23	28	23	49	$n = 150$

22.

$Y \backslash X$	150	165	175	185	195	n_y
50	2	2	—	—	—	4
70	—	2	—	—	—	2
90	—	—	9	2	1	12
110	—	—	2	7	9	18
130	—	—	—	3	11	14
n_x	2	4	11	12	21	$n = 50$

23.

$Y \backslash X$	20	25	30	35	40	n_y
10	3	7	—	—	—	10
16	—	12	5	1	—	18
20	—	—	6	1	1	8
24	—	—	—	3	1	4
28	—	—	—	—	1	1
n_x	3	19	11	5	3	$n = 41$

24.

$Y \backslash X$	25	35	45	55	65	n_y
2	5	10	—	—	—	15
4	—	13	10	10	—	33
6	—	—	18	16	—	34
8	—	—	—	2	2	4
10	—	—	—	—	1	1
n_x	5	23	28	28	3	$n = 87$

25.

$Y \backslash X$	10	20	30	40	50	n_y
10	7	17	10	—	—	34
20	—	23	12	5	—	40
30	—	10	5	3	2	20
40	—	—	2	2	1	5
50	—	—	—	—	1	1
n_x	7	50	29	10	4	$n = 100$

26.

$Y \backslash X$	5	15	25	35	45	n_y
2	3	14	—	—	—	17
12	—	16	18	—	—	34
22	—	—	20	10	11	41
32	—	—	—	6	2	8
n_x	3	30	38	16	13	$n = 100$

27.

$Y \backslash X$	1	6	11	16	21	n_y
5	3	10	—	—	—	13
10	4	11	10	—	—	25
15	—	5	15	10	—	30
20	—	—	11	10	4	25
25	—	—	—	4	3	7
n_x	7	26	36	24	7	$n = 100$

28.

$Y \backslash X$	4	6	8	10	12	n_y
3	7	21	10	—	—	38
8	—	5	15	10	—	30
13	—	—	11	10	4	25
18	—	—	—	4	3	7
n_x	7	26	36	24	7	$n = 100$

29.

$Y \backslash X$	3	7	11	15	19	n_y
2	2	4	—	—	—	6
6	—	3	5	—	—	8
8	—	—	5	35	5	45
10	—	—	2	8	17	27
12	—	—	—	4	10	14
n_x	2	7	12	47	32	$n=100$

30.

$Y \backslash X$	2	5	8	11	14	17	n_y
1	2	4	—	—	—	—	6
6	—	6	3	—	—	—	9
11	—	—	6	35	4	—	45
16	—	—	2	8	6	—	16
21	—	—	—	14	7	3	24
n_x	2	10	11	57	17	3	$n=100$

12- назорат иши

1.1. X тасодифий микдор $F(x)$ тақсимот функцияси орқали берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 1, \\ \frac{1}{10}(3x^2 + x - 4), & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни тоинг.

$F(X)$ ва $f(x)$ функцияларининг графигини чизинг.

1.2. Нормал тақсимланган X тасодифий микдорнинг математик кутилиши $\sigma=2$ ва ўрта квадратик четланниши $\sigma=6$. $P(4 < X < 9)$ ни тоинг.

1.3. Нормал тақсимотнинг номаълум математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли ораликни тоинг ($\bar{X}=74,69$; $n=25$; $\sigma=2,5$).

2.1. X тасодифий микдор $F(x)$ тақсимот функцияси билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\frac{1}{5}, \\ 5x + 1, & \text{агар } -\frac{1}{5} < x \leq 0, \\ 1, & \text{агар } x > 0. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

2.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=3$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=2$. $P(3 < X < 10)$ ни топинг.

2.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг ($\bar{X}=74,70$; $n=25$; $\sigma=3$).

3.1. X тасодифий миқдор $F(x)$ тақсимот функцияси билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\pi, \\ \sqrt{2} \cos \frac{x}{2}, & \text{агар } -\pi < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

3.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=4$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=2$. $P(5 < X < 9)$ ни топинг.

3.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг ($\bar{X}=74,71$; $n=49$; $\sigma=3,5$).

4.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{\sqrt{x}}{2}, & \text{агар } 0 < x \leq 4, \\ 1, & \text{агар } x > 4 \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг, ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

4.2. X тасодифий миқдор нормал қонун бўйича тақсимланган. Унинг математик кутилиши $a=5$, ўрта квадратик четланиши $\sigma=4$. $P(2 < X < 10)$ ни топинг.

4.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг ($\bar{X}=71,72$; $n=64$; $\sigma=4$).

5.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 4, \\ \ln \frac{x}{4}, & \text{агар } 4 < x \leq 4e, \\ 1, & \text{агар } x > 4e. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

5.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=6$, ўрта квадратик четланиши $\sigma=2$. $P(4 < X < 12)$ ни топинг.

5.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан қоплайдиган ишончли ораликни топинг. ($\bar{X}=74,73$; $n=81$; $\sigma=4,5$).

6.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{1}{3}(2x^2 + x), & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ ларнинг графикларини чизинг.

6.2. X тасодифий миқдор нормал қонуни бўйича тақсимланган, математик кутилиши $a=7$, ўрта квадратик четланиши $\sigma=2$. $P(3 < X < 10)$ ни топинг.

6.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг. ($\bar{X}=74,73$; $n=81$; $\sigma=4,5$).

7.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{1}{2}(x^3 + x), & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ нинг графикларини чизинг.

7.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=8$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=5$. $P(3 < x < 15)$ ни топинг.

7.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг. ($\bar{X}=74,74$; $n=100$; $\sigma=5$).

8.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 3x^2 + 2x, & \text{агар } 0 < x \leq \frac{1}{3}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{1}{3}. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(x)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топниг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ нинг графикни чизинг.

8.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=9$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=6$. $P(5 < X < 14)$ ни топниг.

8.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиг билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топниг ($\bar{X}=74,75$; $n=121$; $\sigma=5,5$).

9.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 2 \sin x, & \text{агар } 0 < x \leq \frac{\pi}{6}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{\pi}{6}. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топниг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

9.2. X тасодифий миқдор нормал қонун бўйича тақсимланган, математик кутилиши $a=10$, ўрта квадратик четланиши $\sigma=4$. $P(2 < x < 13)$ ни топниг.

9.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиг билан баҳолаш учун ишончлилик оралиқини топниг ($\bar{X}=74,76$; $n=114$; $\sigma=6$).

10.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 1, \\ \frac{1}{6} (x^2 + 3x - 4), & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топниг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ ларнинг графикларини чизинг.

10.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=11$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=5$. $P(7 < x < 17)$ ни топниг.

10.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\sigma=0,95$ ишончлилиг билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топниг ($\bar{X}=74,91$; $n=729$; $\sigma=13,5$).

11.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{1}{3}, \\ \frac{1}{6} (3x - 1), & \text{агар } \frac{1}{3} < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни тонинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графигини чизинг.

11.2. Нормал тақсимланган X тасодифий микдорнинг математик кутилиши $a=12$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=4$ $P(7 < x < 18)$ ни тонинг.

11.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли оралиқни тонинг ($\bar{X}=74,77$, $n=169$, $\sigma=6,5$).

12.1. X тасодифий микдорнинг тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -1, \\ \sqrt{x+1}, & \text{агар } -1 < x \leq 0, \\ 1, & \text{агар } x > 0. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни тонинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

12.2. Нормал тақсимланган X тасодифий микдорнинг математик кутилиши $a=13$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=5$ $P(9 < x < 18)$ ни тонинг.

12.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\sigma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли оралиқни тонинг ($\bar{X}=74,78$; $n=196$; $\sigma=7$).

13.1. X тасодифий микдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 3 \\ \ln \frac{x}{3}, & \text{агар } 3 < x \leq 3e, \\ 1, & \text{агар } x > 3e. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни тонинг, ҳамда $f(x)$ ва $F(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

13.2. X тасодифий микдор нормал конун бўйича тақсимланган, математик кутилиши $a=14$, ўрта квадратик четланиши $\sigma=9$ $P(11 < x < 17)$ ни тонинг.

13.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли оралиқни тонинг ($\bar{X}=74,79$; $n=225$; $\sigma=7,5$).

14.1. X тасодифий микдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{3}{4}\pi, \\ \cos 2x, & \text{агар } \frac{3}{4}\pi < x \leq \pi, \\ 1, & \text{агар } x > \pi. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни тонинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

14.2. X тасодифий миқдор нормал конун бўйича тақсимланган. математик кутилиши $a=15$, ўрта квадратик четланиши $\sigma=8$. $P(9 < x < 21)$ ни тонинг.

14.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли ораликни тонинг ($\bar{X}=74,8$; $n=256$; $\sigma=8$).

15.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -1, \\ \frac{1}{2}(x+1), & \text{агар } -1 < x \leq 1 \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни тонинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

15.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=16$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=6$. $P(2 < x < 9)$ ни тонинг.

15.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли ораликни тонинг ($\bar{X}=74,81$; $n=289$; $\sigma=8,5$).

16.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{9}, & \text{агар } 0 < x \leq 3, \\ 1, & \text{агар } x > 3. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни тонинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

16.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=17$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=11$. $P(9 < x < 20)$ ни тонинг.

16.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли ораликни тонинг ($\bar{X}=74,82$; $n=324$; $\sigma=9$).

17.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 2, \\ \frac{1}{2}(x^2 - 3x + 2), & \text{агар } 2 < x \leq 3, \\ 1, & \text{агар } x > 3. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

17.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=18$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=6$. $P(10 < x < 22)$ ни топинг.

17.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,83$; $n=381$; $\sigma=9,5$).

18.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 2, \\ \frac{1}{2}x - 1, & \text{агар } 2 < x < 4, \\ 1, & \text{агар } x > 4. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

18.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=19$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=7$. $P(11 < x < 23)$ ни топинг.

18.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,84$; $n=400$; $\sigma=10$).

19.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2}(2x^2 + x - 1), & \text{агар } \frac{1}{2} < x \leq 1, \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

19.2. X тасодифий миқдор нормал тақсимланган. Унинг математик кутилиши $a=20$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=7$. $P(13 < x < 24)$ ни топинг.

19.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,85$; $n=441$; $\sigma=10,5$).

20.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{4}, & \text{агар } 0 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

20.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=21$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=9$. $P(9 < x < 15)$ ни топинг.

20.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишонччилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,86$; $n=484$; $\sigma=11$).

21.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{1}{12}(x^3 + 2x), & \text{агар } 0 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

21.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=22$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=8$. $P(10 < X < 18)$ ни топинг.

21.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишонччилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,87$; $n=529$; $\sigma=11,5$).

22.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 2, \\ \ln \frac{x}{2}, & \text{агар } 2 < x \leq 2e, \\ 1, & \text{агар } x > 2e. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

22.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=23$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=9$. $P(11 < X < 20)$ ни топинг.

22.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишонччилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,88$; $n=576$; $\sigma=12$).

23.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \sqrt{2} \sin \frac{x}{2}, & \text{агар } 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

23.2 X тасодифий миқдор нормал конус бўйича тақсимланган. Математик кутилиши $a=24$ ва урта квадратик четланиши $\sigma=11$. $P(13 < X < 25)$ ни топинг.

23.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлиликл билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг ($\bar{X}=74,89$; $n=625$; $\sigma=12,5$).

24.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \sqrt{x}, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 1 & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

24.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=2$ ва урта квадратик четланиши $\sigma=5$. $P(4 < X < 9)$ ни топинг.

24.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлиликл билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг. ($\bar{X}=74,9$, $n=676$, $\sigma=13$).

25.1 X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\frac{1}{2}, \\ \frac{1}{5}(2x+1), & \text{агар } -\frac{1}{2} < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

25.2 Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=3$ ва урта квадратик четланиши $\sigma=5$. $P(4 < X < 7)$ ни топинг.

25.3. Нормал тақсимотнинг a математик кутилишини $\gamma=0,95$ ишончлиликл билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг ($\bar{X}=74,92$; $n=784$, $\sigma=14$).

26.1 X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 1, \\ \frac{1}{2}(x^2-x), & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

26.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=4$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=3$. $P(3 < X < 11)$ ни топинг.

26.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг ($\bar{X}=74,93$; $n=841$; $\sigma=14,5$).

27.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 2, \\ \frac{1}{4}(x^2 - x - 2), & \text{агар } 2 < x \leq 3, \\ 1, & \text{агар } x > 3. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

27.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=5$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=4$. $P(2 < X < 11)$ ни топинг.

27.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг ($\bar{X}=74,94$; $n=841$; $\sigma=29$).

28.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\frac{\pi}{2}, \\ \cos x, & \text{агар } -\frac{\pi}{2} < x \leq 0, \\ 1, & \text{агар } x > 0. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

28.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=6$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=3$. $P(6 < X < 16)$ ни топинг.

28.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг ($\bar{X}=74,95$; $n=784$; $\sigma=28$).

29.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 1, \\ \sqrt{x-1}, & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топнинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

29.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=7$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=3$. $P(5 < X < 13)$ ни топинг.

29.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг ($\bar{X}=74,96$; $n=729$; $\sigma=27$).

30.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 5, \\ \ln \frac{x}{5}, & \text{агар } 5 < x \leq 5e, \\ 1, & \text{агар } x > 5e. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топнинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

30.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=8$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=1$. $P(4 < X < 9)$ ни топинг.

30.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлик билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг. ($\bar{X}=74,97$; $n=676$; $\sigma=26$).

10-намунавий ҳисоб топшириқлари

1.1. Қутида 6 та оқ, 4 та қора, 3 та қизил шар бор. Таваккалига олинган 3 та шарнинг ҳаммаси турли рангда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.2. 7 та ўриндиқли қаторга 4 қиз ва 3 ўғил ўтиришди. Уч ўғилнинг ёнма-ён ўтириши эҳтимоллигини топинг.

1.3. Қиғоб тоқчасида алгебрадан 4 та, геометриядан 3 та қиғоб таваккалига териб чиқилган. Ҳар қайси фанга доир китоблар ёнма-ён турини эҳтимоллигини топинг.

1.4. Тангани 10 марта ташланганида 5 марта гербли томон ва 5 марта рақамли томон тушган. Гербли томонларнинг ҳаммаси дастлабки 5 марта ташланганда тушганлиги эҳтимоллигини топинг.

1.5. Яшиқда 15 та деталь бўлиб, уларнинг 5 таси бўялган. Таваккалига олинган 5 та деталнинг 4 таси бўялган, биттаси бўялмаган бўлиб чиқиши эҳтимоллигини топинг.

1.6. Спортлото ўйнидаги бош ютукни (45 тадан 6 та номерни топиш) ютиб олиш эҳтимоллигини топинг. 5 та номерни топиш эҳтимоллигини аниқланг.

1.7. 52 талик ўйин картасини 2 тадан тарқатилганда «туз» ва «қират» чиқиши эҳтимоллигини топинг.

1.8. Театрга 6 та қизга олинган бўлиб, улардан 4 таси 1-қатордаги жойлардан иборагдир. Таваккалига олинган 3 та

чиптанинг 2 таси биринчи катордаги жойларда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.9. Футбол бўйича мусобақаларда 20 та жамоа катнашади. Тасодифий равишда бу жамоалар 10 тадан қилиб иккита гуруҳга бўлинди. Бунда 2 та энг кучли жамоа битта гуруҳга тушиб қолиши эҳтимоллигини топинг.

1.10. Қутичада 7 та оқ ва 5 та қора шар бор.

а) таваккалига олинган шар қора бўлиши;

б) таваккалига олинган 2 та шар қора бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.11. Талаба ўқув дастуридаги 40 саволдан 30 тасини билади. Ҳар бир имтиҳон билетида 2 тадан савол бўлса, талабанинг ҳар иккала саволни билиши эҳтимоллигини топинг.

1.12. Қуръа ташлаш катнашчилари яшиқдан 1 дан 100 гача номерланган жетонларни тортадилар. Таваккалига биринчи бўлиб олинган жетон номерида 5 рақами иштирок этмаслиги эҳтимоллигини топинг.

1.13. Олтита бир хил карточкаларнинг ҳар бирига куйидаги ҳарфлардан бири ёзилган: а, б, с, м, р, о. Карточкалар яхшилаб аралаштирилгач, галма-галдан битталаб олинган ва катор қилиб, териб чиқилган тўртта карточкада «ромб» сўзининг ҳосил бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.14. Барча ёқлари бўялган куб мингта бир хил ўлчамли кубчаларга бўлинади ва улар яхшилаб аралаштирилади. Таваккалига олинган кубчанинг: а) битта, б) иккита ёғи бўялган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.15. Саккизта ҳар хил китоб битта тоқчага таваккалига териб кўйилганда, иккита маълум китоб ёнма-ён туриб қолиши эҳтимоллигини топинг.

1.16. 10 та ҳар хил китобнинг 5 таси ҳар бири 4 сўмдан, учтаси 1 сўмдан, 2 таси 3 сўмдан сотиляпти. Таваккалига олинган иккита китоб биргаликда 5 сўм бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.17. Гуруҳнинг 8 нафари кизлар бўлган 17 талабаси орасида 7 та билет ўйналяпти. Билетга «эга чикканлар» ичида 4 та талабанинг кизлар бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.18. Беш қаватли уйнинг лифти уч йўловчи билан кўтарила бошлади. Ҳар қайси қаватдан биттадан ортиқ бўлмаган йўловчи тушиб қолиши эҳтимоллигини топинг. (Бунда йўловчиларни қаватлар бўйича тақсимлашнинг мумкин бўлган барча усулларини тенг эҳтимолли деб ҳисобланг.)

1.19. Натурал каторнинг 1, 2, 3, ..., 100 сонлари таваккалига жойлаштирилган 1 ва 2 сонлари ёнма-ён, шу билан бирга, ўсиб бориш тартибида жойлашганлиги эҳтимоллигини топинг.

1.20. Ўнта талаба тайин электропоездда кетишга шартлашиб олдилар, лекин қайси вагонда кетишга келишиб олмадилар. Агар электропоездда 10 та вагон бўлса иккита талабанинг битта вагонга тушиб қолмаслик эҳтимоллигини топинг. (Бунда талабаларнинг

вагонлар бўйича жойлашишларининг барча имкониятлари тенг имкониятли деб фараз қилинади.)

1.21. Таваккалига олинган учта рақамнинг: а) ҳаммаси бир хил; б) икkitаси бир хил бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.22. 10 эрақ ва 10 аёлдан иборат гуруҳ тасодифий равишда 2 та тенг қисмга бўлинади. Ҳар қайси қисмда эрақлар ва аёллар сони бир хил бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.23. Йиғувчида бир-биридан кам фарқ қиладиган 10 та деталь бор. Уларнинг тўрттаси биринчи турдаги, икkitаси иккинчи, икkitаси учинчи ва икkitаси тўртинчи турдаги деталлардир. Бир пайтда олинган олти та деталнинг учтаси — биринчи турдаги, икkitаси иккинчи, биттаси — учинчи турдаги деталь бўлиш эҳтимоллигини топинг.

1.24. Таваккалига олиннадиган икки хонали соннинг а) тўб сон; б) 5 га қаррали сон бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.25. Ҳар хил рақамлар билан номерланган 9 та жетоннинг 3 таси олинади. Уларнинг ўсиб бориш тартибида чиқиши эҳтимоллигини топинг. Учала жетоннинг номерлари жуфт бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.26. Таваккалига танланган телефон номери 5 та рақамдан иборат. Уларда:

а) барча рақамлар ҳар хил бўлиши;

б) барча рақамлар тоқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.27. Таваккалига олинган натурал сон 2 га ҳам, 3 га ҳам бўлинмаслиги эҳтимоллигини топинг.

1.28. 2,3,4,5,6 сонлари ёзилган бешта карточкадан тасодифий равишда уч хонали сон тузилади. Бу сон тоқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.29. Берилган 1, 2, 3, 4, 5 рақамдан фойдаланиб турли рақамли тўрт хонали сон тузилади. Тузилган сон рақамларининг ўсиш тартибида бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.30. Яшиқда 40 та ярқоқ ва 6 та ярқосиз сақлагичлар бор. Яшиқдан 3 та сақлагич олинган:

а) барча сақлагичлар ярқоқ бўлиши;

б) ақалли биттаси ярқосиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.1. Айланага таваккалига ички учбурчак чизилади. Бу учбурчак тенг ёнали бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.2. Айланага таваккалига ички учбурчак чизилади. Бу учбурчак тўғри бурчакли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.3. Айланага таваккалига ички учбурчак чизилади. Бу учбурчак ўткир бурчакли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.4. 200 м ли магнитофон тасмасига 20 м ораликда маълумот ёзилган, шу тасманинг 60 м дан 75 м гача бўлган оралиғида узлуксиз ёзув бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.5. Икки ўрток маълум бир жойда соат 14⁰⁰ билан 15⁰⁰ орасида учрашишга келишдилар. Ҳар қайси ўрток 20 мин қутиб, кейин кетади. Учрашув рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

2.6. Томони a га тенг квадратлар түри чизилган текисликка таваккалига $r < \frac{a}{2}$ радиусли танга ташланади. Танга квадратларнинг томонларидан ҳеч бирини кесмаслик эҳтимоллигини топинг. Нуктанинг текис фигурага тушиш эҳтимоллиги фигура юзига пропорционал ва унинг жойлашишига боғлиқ эмас деб фараз қилинади.

2.7. Текислик бир-биридан $2a$ масофада жойлашган параллел түғри чизиклар билан бўлинган. Бу текисликка таваккалига радиуси $r < a$ бўлган танга ташланади. Танга түғри чизиклардан ҳеч бирини кесмаслиги эҳтимоллигини топинг.

2.8. Парабола ярим доирага уринади ва унинг диаметри чегараларидан утади. Ярим доирага таваккалига ташланган нукта ярим доира ва парабола билан чегараланган соҳага тушиш эҳтимоллигини топинг.

2.9. Парабола квадратнинг pastки асосига уринади ва унинг юкори учлари оркали утади. Квадратга таваккалига ташланган нуктанинг квадратнинг юкори томони ва парабола билан чегараланган соҳага тушиш эҳтимоллигини топинг.

2.10. Таваккалига 1 дан катта бўлмаган иккита x ва y сон олинган. Агар бу сонлар квадратларнинг йгиндиси $\frac{1}{4}$ дан катта бўлса, уларнинг йгиндиси бирдан катта бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг.

2.11. Таваккалига ҳар бири иккидан катта бўлмаган иккита мусбат x ва y сон олинган. $xy \leq 1$; $y/x \leq 2$ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.12. Иккита x ва y хақиқий сон $|x| \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$ тенгсизликларни қаноатлантирадиган қилиб таваккалига танланади. $x^2 < y$ шартнинг бажарилиши эҳтимоллигини топинг.

2.13. Иккита x ва y хақиқий сон $|x| \leq 3$, $|y| \leq 5$ тенгсизликларни қаноатлантирадиган қилиб таваккалига танланади. $\frac{x}{y}$ каср мусбат бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.14. R радиусли доира ичига r радиусли кичик доира жойлаштирилган. Катта доирага таваккалига ташланган нукта кичик доирага ҳам тушиши эҳтимоллигини топинг. (Доирага тушиш эҳтимоллиги доира юзига пропорционал бўлиб, унинг жойлашишига боғлиқ эмас деб фараз қилинади.)

2.15. Радиуси 15 см бўлган шар марказидан 25 см масофада ёруғликнинг нуқтавий манбаи жойлашган. Шар сиртида таваккалига олинган нукта ёритилган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.16. Ичидан томони $a = 14$ см квадрат қирқиб олинган $R = 25$ см радиусли доирага радиуси $r = 2$ см бўлган шар таваккалига ташланади. Агар шар албатта доирага тунса, унинг бу тешик четларига тегмай ундан утиб кетиш эҳтимоллигини топинг.

2.17. R радиусли доирага мунтазам олтибурчак ички чизилган. Доира ичига таваккалига ташланган нуктанинг олтибурчак ичига тушиш эҳтимоллигини топинг.

2.18. Квадратнинг тайинланган учидан унинг диагоналидан кичик ихтиёрый радиус билан айлана чизилган. Айлана квадратнинг бу учга эга бўлган томонларини кесиб ўтиши эҳтимоллигини топинг.

2.19. R радиусли айланада таваккалига нукта ташланади. Бу нукта айланада белгилаб қўйилган A нуктадан R радиусдан катта бўлмаган масофада ётиши эҳтимоллигини топинг.

2.20. Миналар қўйилиб килинган тусик миналар ораси 100 м дан килиб, бир чизик бўйича жойлаштирилган. Кенглиги 20 м бўлган кеманинг бу тусикни тўғри бурчак остида кесиб ўтганда, минага дуч келиши эҳтимоллигини топинг. (Чизикнинг кенглигини ҳисобга олмаслик мумкин.)

2.21. Узунлиги 12 см бўлган AB кесмага таваккалига C нукта қўйилади. AC кесмага қурилган квадрат юзи 36 см^2 ва 81 см^2 лар орасида бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.22. Учлари $(0; 0)$, $(0; 1)$, $(1; 1)$, $(1; 0)$ бўлган квадратга таваккалига (x, y) нукта ташланади. Бу нуктанинг координаталари $y < 2x$ тенгсизликни қаноатлантириши эҳтимоллигини топинг.

2.23. R радиусли доирага таваккалига ташланган нуктанинг доирага ички чизилган квадратга тушиши эҳтимоллигини топинг.

2.24. R радиусли доирага таваккалига ташланган нуктанинг доирага ички чизилган мунтазам учбурчакка тушиши эҳтимоллигини топинг.

2.25. Тез айланаётган диск жуфт сондаги тенг секторларга ажратилган ва улар навбат билан оқ ва қора рангларга бўяб чиқилган. Диска қарата ўқ узилади. Ўқнинг секторлардан бирига тегиши эҳтимоллигини топинг. (Ўқнинг текис фигурага тегиш эҳтимоллиги бу фигуранинг юзига пропорционал деб фараз қилинади.)

2.26. Разведкачилар радиоприёмниги сигналларни узун тулкидаги частоталарда даврий равишда ҳар 2 мин да 16 с давомида қабул қилади. Агар сигнални қайд қилиш учун қабул 1 с дан кам бўлмаслиги зарур бўлса, радиоприёмникнинг 10 с давом этадиган сигнални қайд қилиши эҳтимоллигини топинг.

2.27. Узунлиги L бўлган AB телефон линиясининг C нуктасида (унинг ҳолати линия бўйича тенг имкониятли) узлиш рўй берди. C нуктанинг A нуктадан l дан кичик бўлмаган масофада жойлашганлиги эҳтимоллигини топинг.

2.28. Аэропортнинг қўндириш системаси (тизими) мураккаб метеошароитларда самолётларни 5 мин дан кам бўлмаган оралик билан қўндиришни таъминлайди. Иккита самолёт жадвал бўйича бири соат 10 да, иккинчиси соат 10 у 10 минутда аэродромга қўнишлари керак. Агар биринчи самолёт аэродромга жадвалга нисбатан 10 мин атрофида, иккинчиси 5 мин атрофида четланиш билан кириб келиши мумкин бўлса (бунда жадвалдан кўрсатилган

чегараларда четланишлар катталиклари тенг имкониятли деб фараз қилнади), иккинчи самолётнинг кутиш зонасига кетиб туриши эҳтимоллигини топинг.

2.29. Томони a бўлган мунтазам учбурчаклардан терилган паркетга r радиусли танга таваккалига ташланди. Танга учбурчаклардан ҳеч қайсисининг томонига тегмаслиги эҳтимоллигини топинг.

2.30. a узунликдаги стержень таваккалига 3 бўлакка бўлинди. Ҳар қайси бўлакнинг узунлиги $a/4$ дан кагта бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.1. Пул-буюм лотереясининг ҳар 10000 билетига 150 та буюм ва 50 та пул ютуқлари уиналади. Бир дона лотерея билети эгасининг буюм еки пул ютуғи ютиб олиш эҳтимоллигини топинг.

3.2. Мерганнинг битта ўк узиб 10 очко олиш эҳтимоллиги 0,1 га, 9 очко олиш эҳтимоли 0,3 га, 8 ёки ундан кам очко олиш эҳтимоллиги 0,6 га тенг. Мерганнинг битта ўк узиб 9 тадан кам бўлмаган очко олиши эҳтимоллигини топинг.

3.3. Партиядаги 10 та деталнинг 8 таси стандарт. Таваккалига олинган 2 та деталнинг акалли биттаси стандарт бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.4. Яшиқда 10 та деталь бўлиб, уларнинг 2 таси ностандарт. Таваккалига олинган 6 та деталь ичида биттадан кўп бўлмаган ностандарт деталь бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.5. Мерганнинг унлик соҳага урши эҳтимоли 0,05; тўққизликка 0,2; саккизликка 0,6. Битта ўк узилади. Қўйидаги ходисаларнинг эҳтимолликларини топинг.

A — камида 8 очко олинган.

B — 8 дан кўп очко олинган.

3.6. Яшиқда 8 та оқ ва 12 та қизил бир хил шарлар бор. Таваккалига учта шар олинади. Уларнинг акалли биттаси оқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.7. Яшиқда 8 та оқ ва 12 та қизил шар бор. Таваккалига 5 та шар олинади. Уларнинг ичида биттадан кўп бўлмаган оқ шар бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.8. Яшиқда 9 та оқ ва 14 та қизил шар бор. Таваккалига 6 та шар олинади. Уларнинг ичида камида иккитаси оқ шар бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.9. Жисмоний тарбиячилар куни талаба ўйингоҳга борди. Футболга 0,3 эҳтимоллик билан, баскетболга 0,4 эҳтимоллик билан, волейболга 0,2 эҳтимоллик билан чипта сотиб олиш мумкин эди. Талабанинг мусобақага тушиши эҳтимоллигини топинг. Талабанинг баскетбол ёки волейбол мусобақасига кира олиш эҳтимоллигини топинг.

3.10. Яшиқда 8 та қизил, 10 та яшил ва 12 та кўк рангдаги бир хил шар бор. Таваккалига учта шар олинади. Уларнинг акалли иккитаси бир хил рангда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.11. Устахонада учта станок ишлаб турибди. Смена давомида

биринчи станокнинг бузилиши эҳтимоллиги 0,15 га, иккинчи станокники 0,1 га, учинчи станокники 0,12 га тенг. Станоклар бир пайтда бузилмайди деб фараз қилиб, смена давомида ақалли битта станокнинг бузилиши эҳтимоллигини топинг.

3.12. Қутида 15 та ок, 20 та қора, 25 та яшил, 10 та қизил шар бор. Таваккалига олинган шар ок, қора ёки қизил бўлиши эҳтимолликларини топинг.

3.13. Қутида 10 та ок, 15 та қора, 20 та яшил, 25 та қизил шар бор. Таваккалига олинган шар ок, қора ёки қизил бўлиши эҳтимолликларини топинг.

3.14. Ишчи учта станокка хизмат кўрсатади. Смена давомида ишчининг аралашувини талаб қилиш эҳтимоллиги биринчи станок учун 0,7 га, иккинчи станок учун 0,75 га, учинчи станок учун эса 0,8 га тенг. Смена давомида ишчининг аралашувини қайсидир 2 та станокнинг талаб қилиши эҳтимоллигини топинг.

3.15. Битта ўк узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги биринчи мерган учун p га иккинчиси учун 0,7 га тенг. Битта ўк узишда роса бир марта нишонга текказиш эҳтимоллиги иккала мерган учун 0,38 га тенг эканлиги маълум. P ни топинг.

3.16. Бирор физик микдорни бир марта ўлчашда берилган аниқликдан ортиқ бўлган хатоликка йўл қўйиш эҳтимоллиги 0,2 га тенг. Тўртта боғлиқмас ўлчаш ўтказилди. Қўпи билан битта ўлчашда берилган аниқликдан ортиқ бўлган хатоликка йўл қўйилганлик эҳтимоллигини топинг.

3.17. Бир дона пул-буюм лотереяси билан ютиш эҳтимоллиги $1/7$ га тенг. 5 дона билет сотиб олиб: а) бешта билетнинг ҳаммасига ютиши, б) ақалли битта билетга ютиш эҳтимоллигини топинг.

3.18. Бир бирига боғлиқмас 3 та ўк узишда ақалли бир марта нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,9984 га тенг. Битта ўк узишда нишонга текказиш эҳтимоллигини топинг.

3.19. Абонент тераётган телефон номерининг охири рақамини эсидан чиқариб қўйди ва уни таваккалига терди. Унинг 2 тадан ортиқ бўлмаган муваффақиятсиз уриниш қилиши эҳтимоллигини топинг.

3.20. Битта ўк узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,2 га тенг. 8 та ўк узилади. Нишонни яқсон қилиш учун ҳеч бўлмаганда бир марта нишонга текказиш етарли бўлса, нишоннинг яқсон қилиниши эҳтимоллигини топинг.

3.21. Талаба имтиҳон саволларининг 25 тасидан 20 тасинигина гайёрлашга улгурди. Талабанинг таваккалига танлаган 4 та саволнинг камида 2 тасини билиш эҳтимоллигини топинг.

3.22. Овчи ўзоқлашиб бораётган нишонга қарата 3 марта ўк узди. Нишонга тегиш эҳтимоллиги ўк узишнинг бошида 0,8 га тенг, у кейинги ҳар бир ўк узишда 0,1 га камаяди. Овчи:

- а) учала ҳолда теккиза олмаслиги;
- б) ақалли бир марта текказиш;
- в) икки марта текказиш эҳтимоллигини топинг.

3.23. Имтиҳон билетидида 3 та савол бор. Талабанинг биринчи ва иккинчи саволга жавоб бериш эҳтимоллиги 0,9 га, учинчи саволга эса 0,8 га тенг. Агар имтиҳонни топшириш учун:

- а) ҳамма саволларга жавоб бериш керак;
- б) акалли 2 та саволга жавоб бериш керак бўлса, талабанинг имтиҳонни топшириш эҳтимоллигини топинг.

3.24. n та оқ ва m та қора шар бўлган қутидан 2 та шар олинади. Олинган шарлар турли рангда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.25. Қутидида 10 та оқ, 15 та қора, 20 та яшил ва 25 та кизил шар бор. Битта шар олинади. Олинган шар:

- а) кизил, оқ ёки қора бўлиши;
- б) яшил ёки кизил бўлиши;
- в) оқ, қора ёки яшил бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.26. Танга 4 марта ташланади. Гербли томон роса икки марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

3.27. Заём облигацияларининг ярмиси ютуқли. Акалли битта облигацияга 0,95 дан катта эҳтимоллик билан ютуқ чиқишига ишонч ҳосил қилиш учун нечта облигация сотиб олиш керак?

3.28. Яшиқда 90 та яроқли ва 10 та яроксиз деталь бор. Йигувчи кетма-кет (қайтариб сотмай) 10 та деталь олади. Олинган деталлар орасида:

- а) яроксизлари йўқлиги,
- б) ҳеч бўлмаганда биттаси яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.29. Иккита ўйин соққасини неча марта ташланганда акалли бир марта 12 очко тушишига 0,5 дан кам бўлмаган эҳтимоллик билан ишонч ҳосил қилиш мумкин?

3.30. Ўйин иккита ўйинчининг бири кетма-кет 2 партиyani ютгунча давом этади (дуранг натижа ҳисобга олинмайди). Ҳар бир ўйинчининг партиyani ютиши эҳтимоллиги 0,5 га тенг ва олдинги партиयाлар натижаларига боғлиқ эмас. Ўйин 6- партиയാгача тугаши эҳтимоллигини топинг.

4.1. 10 000 та қиймат келтирилган логарифмлар жадвалида битта хато кетган. Жадвалдан таваккалига олинган 100 та логарифм қиймати орасида акалли битта хато қиймат борлиги эҳтимоллигини топинг.

4.2. Олти лампали (ҳамма лампалар ҳар хил) радиоприёмникнинг битта лампаси «қўйиб» қолди. Приёмникни тузатиш учун зашжирдаги элементдан таваккалига танланган лампани олиб аралаштирилади ва приёмник текшириб қўрилади. Приёмникнинг

- а) битта лампани;
- б) иккита лампани;
- в) учта лампани алмаштиргандан сўнг одатдагидек ишлаб кетиши эҳтимоллигини топинг.

4.3. Тўрт овчи нишонга қарата маълум бир тартибда ўк узишга келишиб олишди: навбатдаги овчи ундан олдинги овчи нишонга теккиза олмаган тақдирдагина ўк узади. Ҳар бир овчининг нишонга

текказиш эҳтимоллиги бир хил бўлиб, 0,8 га тенг. Нишонга карата:

- а) битта;
- б) иккита;
- в) учта ўқ узилдиш эҳтимоллигини топинг.

4.4. Рақамли қулф умумий уқида тўртта диск бор. Ҳар бир диск рақамлар билан белгиланган олтига секторга бўлинган. Қулфни дисклардаги рақамлар маълум комбинация (у қулфнинг «сири»дан иборат) ташкил этгандагина очиш мумкин. Рақамларнинг ихтиёрий комбинациясини териб, қулфни очиш мумкинлиги эҳтимоллигини топинг.

4.5. Механизмга учта бир хил деталь киради. Агар механизмни йиғишда учала деталь ўрнига ўлчамлари чизмада белгиланганидан катта бўлган деталлар қўйилса, механизмнинг иши бузилади. Йиғувчида 5 таси катта ўлчамдаги 12 та деталь қолди. Агар йиғувчи деталларни таваккалига олса, бу деталлардан йиғилган механизмнинг норма ишламаслик эҳтимоллигини топинг.

4.6. Корхонада яроқсиз маҳсулот умумий маҳсулотнинг уртача 2 %ни ташкил этади. Яроқли маҳсулотнинг 95 % ини биринчи нав ташкил этади. Таваккалига олинган маҳсулот:

- а) текширишдан ўтган маҳсулотдан олинган бўлса;
- б) тайёрланган умумий маҳсулотдан олинган бўлса, унинг биринчи навли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

4.7. Овчи узоклашаётган нишонга карата 2 марта ўқ узди. Отиш бошланганда нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,8 га тенг, кейинги ҳар қайси ўқ узилганда эса у 0,1 га камайдди. Овчининг:

- а) ҳар иккала ҳолда ҳам нишойга текказа олмаслиги;
- б) ақалли бир марта текказиш эҳтимоллигини топинг.

4.8. «А» ва «В» ҳодисалар қуйидагича: «А» ҳодиса — 4 та ўйин соққасини бир пайтда ташланганда ақалли битта бир тушиши; «В» ҳодиса — 2 та соққани 24 марта ташланганда ақалли бир марта 2 та бир тушиши. Бу ҳодисаларнинг қайси бири эҳтимоллироқ?

4.9. Ишчи тайёрлайдиган деталларнинг 8 %и яроқсиз. Синаб кўришга олинган деталлар орасида бирорта ҳам яроқсиз бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг.

4.10. Несоқлик электростанциясида 15 смена муҳандислари бўлиб, уларнинг 3 таси аёллар. Сменада 3 киши туради. Таваккалига танланган сменада эркаклар 2 тадан кам бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг.

4.11. 30 талабанинг ишлаб чиқариш амалиёти учун Тошкентда 15 та жой, Фарғонада 8 та жой, Олмалиқда 7 та жой ажратилган. Икки ўроқнинг битта шаҳарда амалиёт ўтиши эҳтимоллигини топинг.

4.12. Қутида a дона оқ ва b дона қора шар бор. Қутидаги ҳамма шарлар бирин-кетин, тасодифий равишда олинади. Тартиб бўйича иккинчи олинган шарнинг оқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

4.13. Карталарнинг тўлиқ дастаси (52 та карта)дан бирварақайига 4 та карта олинади. Қуйидаги ҳодисалар қаралади:

«А» — олинган карталар ичида ҳеч бўлмаганда битта «гиштин» бўлади;

«В» — олинган карталар ичида ҳеч бўлмаганда битта «карға» бўлади.

А+В ҳодисанинг эҳтимоллигини тошинг.

4.14. Қасаба уюшмаси езда дам олинган кетадиган болалар учун 15 та спорт лагерига, 9 та сайёҳлик лагерига ва 4 та соғломлаштириш лагерига йўлланмалар ажратди. Агар учта уртокнинг оналари бир-биринга боғлиқ бўлмаган ҳолда биттадан йўлланма олиб келган бўлсалар, бу уч уртокнинг битта лагерда дам олиши эҳтимоллигини тошинг.

4.15. Биринчи қутида 5 та ок, 11 та қора ва 8 та кизил шар, иккинчи қутида эса 10 та ок, 8 та қора ва 6 та кизил шар бор. Ҳар иккала қутидан таваккалига биттадан шар олинади. Олинган шарлар бир хил рангда бўлиши эҳтимоллигини тошинг.

4.16. Яшиқда тўрт рангдаги галтак иплар бор: ок — 50 %, кизил — 20 %, яшил — 20 %, кўк — 10 %. Таваккалига олинган галтакнинг яшил ёки кўк бўлиши эҳтимоллигини тошинг.

4.17. Тайёрланаётган деталларнинг ўртача 3 %и яроқсиз. Синаш учун олинган 5 та деталнинг орасида бирорта ҳам яроқсиз бўлмаслиги эҳтимоллигини тошинг.

4.18. Қуғичада 30 % и ок, қолганлари кизил галтак иплар аралаштирилиб қўйилган. Таваккалига олинган икки галтак ип бир хил рангда бўлиши эҳтимоллигини тошинг.

4.19. Техник қаров станциясига 20 та машина келтирилади. Уларнинг 5 тасида юриш қисмида, 8 тасида моторда нуқсонлар бўлиб, 10 тасида ҳеч қандай нуқсон топилмади. Юриш қисмида нуқсони бўлган машинанинг моторида ҳам нуқсон борлиги эҳтимоллигини тошинг.

4.20. 12 ўғил бола ва 18 киз бола бор гуруҳдан 2 киши таваккалига танланди. Уларнинг

а) иккаласи ўғил бола;

б) киз бола ва ўғил бола бўлиши эҳтимоллигини тошинг.

4.21. Харидорга 41-ўлчамдаги пойафзал зарурлиги эҳтимоллиги 0,2 га тенг бўлсин. Дастлабки бешта харидорнинг 41-ўлчамдаги пойафзалини сўраш эҳтимоллигини тошинг.

4.22. 1 ва 2 деб белгиланган 2 та ўйин соққаси ташланди. Биринчи соққадаги очколарнинг иккинчи соққадаги очколардан катта бўлиши эҳтимоллигини тошинг.

4.23. Ўйин соққасини ташланганда жуфт ёки учга қаррали очко тушиши эҳтимоллигини тошинг.

4.24. Ишчи 4 та станокка хизмат кўрсатади. Бир соат давомида биринчи станок ишчининг сошлаш учун аралашувини талаб қилмаслик эҳтимоллиги 0,2 га тенг; иккинчи станок учун 0,25; учинчи станок учун 0,6 га, тўртинчи станок учун эса 0,4 га тенг. Бир соат давомида бирорта ҳам станокнинг ишчининг аралашувини талаб этмаслиги эҳтимоллигини тошинг.

4.25. Талаба олий математикадан имтихонга тайёрланиши учун математик таҳлил фанидан 20 саволга ва геометриядан 25 та саволга жавоб тайёрлаши керак. Бирок, у математик таҳлилдан 15 та, геометриядан 20 та саволга жавоб тайёрлай олди, холос. Билетда 3 та савол бор: 2 та таҳлилдан ва 1 та геометриядан.

а) талаба имтихонни аълога топшириши (учала саволга ҳам жавоб бериши);

б) яхшига топшириши (исталган иккита саволга жавоб бериши) эҳтимоллигини топинг.

4.26. Деталларга 3 боскичда ишлов берилади. Биринчи боскичда яроксиз деталь олиш эҳтимоллиги 0,02 га, иккинчисидан 0,03 га, учинчисидан 0,02 га тенг. Айрим боскичларда яроксиз деталь олиш боғлиқмас ҳодисалар деб фарз қилиб, 3 та боскичдан сунг яроқли деталь олиш эҳтимоллигини топинг.

4.27. 1,2,3,4,5 ракамлардан биттаси, қолганларидан яна биттаси танланади. Ток сон танланган бўлиб, унинг

а) биринчи галда,

б) иккинчи галда,

в) иккала галда ҳам танланганлиги эҳтимоллигини топинг.

4.28. n - тартибли дитермиант ёйилмасининг битта ҳади таваккалига танланади. Танланган ҳадда бош диагональ элементлари бўлмаслиги эҳтимоллиги p_n ни топинг. $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$ ни ҳисобланг.

4.29. Уч киши галма-галдан тангани ташлайди. Кимда биринчи бўлиб гербли томон тушса, ўша ютган ҳисобланади. Ҳар қайси ўйинчи учун ютиш эҳтимоллигини топинг.

4.30. Икки киши галма-галдан тангани ташлайди. Кимда биринчи бўлиб гербли томон тушса, ўша ютган ҳисобланади. Ҳар қайси ўйинчи учун ютиш эҳтимоллигини топинг.

5.1. Пластмасса гўлалар учта прессда тайёрланади. I пресс барча гўлаларнинг 50 % ини, II- 30 %, III- 20 % ини ишлаб чиқаради. Бунда I пресс гўлаларининг 0,025, II нинг 0,02, III нинг 0,015 қисми ностандартдир. Тайёр гўлалар ичидан таваккалига олинган стандарт бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.2. Пластмасса буюмлар учта автоматда тайёрланади: I автомат маҳсулотнинг 40 % ини, II-35 % ини, III-25 % ини ишлаб чиқаради. Бунда I автоматнинг 0,13, II-0,025, III-0,025 қисми ностандарт буюмлардир. Танланган стандарт буюм III автоматда тайёрланганлиги эҳтимоллигини топинг.

5.3. Дўконга 4 лампочка заводидан тайёрланган бир хил лампочкалар қабул қилиб олинди: I заводдан 350 дона, II дан 625 дона, III дан 245 дона ва IV дан 850 дона. Лампочкалар 1500 соатдан ортиқ вақт ёниши эҳтимоллиги I завод учун 0,25 га, II завод учун 0,30 га, III завод учун 0,40 га, IV завод учун 0,75 га тенг. Дўкон тоқчаларига лампочкалар аралаштириб териб чиқилади. Сотиб олинган лампочканинг 1500 соатдан кўп вақт ёниши эҳтимоллигини топинг.

5.4. Омборга 1000 та подшинник келтирилди. Уларнинг 260 таси I заводда, 400 таси II заводда ва 340 таси III заводда тайёрланган. Подшинникнинг ностандарт бўлиб чиқиши эҳтимоллиги I завод учун 0,08 га, II завод учун 0,025 га, III завод учун, 0,04 га тенг. Таваккалига олинган подшинник ностандарт бўлиб чиқди. Бу подшинникнинг I заводда тайёрланганлиги эҳтимоллигини топинг.

5.5. Электр лампочкалари партиясининг 10 % и I заводда, 40 % и II заводда, 50 % и III заводда тайёрланган. Яроксиз лампочка ишлаб чиқариши I завод учун 0,02, II завод учун 0,008, III завод учун 0,006. Таваккалига олинган лампочканинг яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.6. Соатлар учта заводда тайёрланади ва дўконга келтирилади. I завод маҳсулотнинг 40 % ини, II завод 45 % ини, III завод 15 % ини тайёрлайди. I завод тайёрлаган соатларнинг 90 % и, II завод соатларининг 70 % и, III завод соатларининг 90 % и илгарилаб кетади. Соғиб олинган соатнинг илгарилаб кетиши эҳтимоллигини топинг.

5.7. Иккита яшиқда радиолампалар бор. Биринчи яшиқда 12 лампа бўлиб, 1 таси яроксиз, иккинчи яшиқда 10 та лампочка бўлиб, уларнинг 1 таси яроксиз. Биринчи яшиқдан битта лампа олинди, иккинчи яшиққа солинади. Иккинчи яшиқдан таваккалига олинган лампанинг яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.8. Биринчи жамоада 6 та спорт устаси ва 4 та биринчи разрядли спортчи, иккинчи жамоада 6 та биринчи разрядли спортчи ва 4 та спорт устаси бор. Бу жамоалар ўйинчиларидан тузилган терма жамоада 10 ўйинчи бор: 6 ўйинчи — биринчи жамоадан, 4 ўйинчи — иккинчи жамоадан. Терма жамоадан таваккалига бир ўйинчи танланади. Бу ўйинчининг спорт устаси бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.9. Ҳамма буюмлар иккита назоратчи томонидан текширилади. Буюмнинг текшириш учун биринчи назоратчига тушиши эҳтимоллиги 0,55 га, иккинчи назоратчига тушиши эҳтимоллиги 0,45 га тенг. Биринчи назоратчининг ностандарт буюмни ўтказиб юбориши эҳтимоллиги 0,01 га, иккинчи назоратчи учун 0,02 га тенг. Таваккалига «стандарт» тамгали буюм олинганда у яроксиз бўлиб чиқди. Бу буюмнинг иккинчи назоратчи томонидан текширилганлиги эҳтимоллигини топинг.

5.10. Илгирш учун деталлар иккита станокда тайёрланиб, уларнинг биринчисини иккинчисига нисбатан 3 марта кўп деталь ишлаб чиқаради. Бунда биринчи станок ишлаб чиқарадиган деталларнинг 0,025, иккинчи станок учун 0,015 қисмини яроксиз деталлар ташкил этади. Таваккалига илгирш учун олинган битта деталь яроқли бўлиб чиқди. Бу деталнинг иккинчи станокда тайёрланган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.11 9 та бир хит ёшиқ қутининг ҳар бирида факат ранглари билан фарқланувчи 10 тадан шар бор. 2 та қутида 5 тадан ок шар бор, 3 қутида 4 тадан ок шар бор ва 4 қутида 3 тадан ок шар бор. Тугмачани босиши натижасида қайси бир қутидан ок шар оғилиб

чикди. Бу қутда 3 та ок шар бўлганлиги эҳтимоллигини топинг.

5.12. 4 та мерган бир-бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда битта нишонга биттадан ўқ уздилар. Бу мерганлар учун нишонга текказиш эҳтимолликлари мос равишда 0,4; 0,6; 0,7; 0,8 га тенг. Отиш тугагандан сўнг нишондан учта ўқнинг изи топилди. Туртинчи мерганнинг ўқи ҳато кетганлиги эҳтимоллигини топинг.

5.13. Биринчи қутда 10 та шар бўлиб, уларнинг 8 таси ок, иккинчи қутда 20 та шар бўлиб, 4 таси ок. Хар қайси қутидан таваккалига биттадан шар олинди, сўнгра таваккалига бу шарларнинг бири олинди. Ок шар олинганлиги эҳтимоллигини топинг.

5.14. Талабаларнинг қурилиш отрядида 2 та бригада биринчи босқич талабаларидан, битта бригада эса иккинчи босқич талабаларидан тузилган. Биринчи босқичларнинг хар қайси бригадасида 5 йигит ва 3 киз бор, иккинчи босқичларнинг бригадасида 4 йигит ва 4 киз бор. Қуръа ташлаш билан отряд бригадаларининг бирдан шахарга бориш учун бир киши танланди.

а) Йигит танланганлиги эҳтимоллигини топинг.

б) Йигит танланган. Унинг биринчи босқич талабаси экани эҳтимоллигини топинг.

5.15. Омборда 3 та фабрикадан маҳсулот келади: биринчи фабриканинг маҳсулоти 20 % ни, иккинчи фабриканики 46 % ни, учинчи фабриканики 34 % ни ташкил этади. Ностандарт буюм ишлаб чиқариш 1-фабрика учун ўртача 3 % ни, 2-фабрика учун 2 % ни, 3-фабрика учун 1 % ни ташкил этади. Агар таваккалига олинган буюм ностандарт бўлса, унинг 1-фабрикада тайёрланганлик эҳтимоллигини топинг.

5.16. Имтиҳонга келган 10 талабанинг учтаси аъло, тўрттаси — яхши, иккитаси — ўртача ва биттаси — ёмон тайёргарликка эга. Имтиҳон билетларида 20 та савол бор. Аъло тайёргарликка эга талаба барча 20 та саволга, яхши тайёргарликка эга талаба 16 та саволга, ўртачаси 10 та саволга, ёмони 5 та саволга жавоб бериши мумкин. Таваккалига чакирилган талаба берилган 3 та исталган саволга жавоб берди. Бу талабанинг: а) аъло тайёргарликка; б) ёмон тайёргарликка эга эканлиги эҳтимоллигини топинг.

5.17. Радиолампа учта заводнинг хар бирдан тегишли 0,25; 0,50; 0,25 эҳтимолликлар билан қабул қилинади. Бир йил ичида лампочкаларнинг ишдан чиқиш эҳтимоллиги 1-завод лампалари учун 0,1 га, иккинчи учун 0,2 га, учинчи учун 0,4 га тенг. Таваккалига танланган лампанинг бир йил ишлаши эҳтимоллигини топинг.

5.18. Бензин қуйиш шохобчаси олдидан енгил ва юк машиналари ўтиб туради. Уларнинг 60 % и юк машиналаридан иборат. Ўтиб кетаётган машинанинг бензин қуйиш шохобчасига кириб ўтиш эҳтимоллиги юк машинаси учун 0,1 га, енгил машина учун 0,2 га тенг. Шохобчага машина кириб келди. Унинг юк машинаси эканлиги эҳтимоллигини топинг.

5.19. Қурилишга 1000 дона гишт келтирилди. Йўлда гиштниги синиш эҳтимоллиги 0,003 га тенг. Қурилишга: а) 2 тадан ортик

синган гишт: б) акалли битта синган гишт келтирилганлиги эҳтимоллигини топинг.

5.20. Спартакиадада 1-гурухдан 4 талаба, 2-гурухдан 6 талаба, 3-гурухдан 5 талаба катнашмоқда. 1-гурух талабаси институт терма жамоасига 0,9 эҳтимоллик билан қабул қилинади, 2-гурух талабаси учун бу эҳтимоллик 0,7 га, 3-гурух талабаси учун 0,8 га тенг. Таваккалига танланган талаба институт терма жамоасига қабул қилинди. Бу талабанинг қайси гурухда ўқиши эҳтимоллироқ?

5.21. Инжилган электр занжирга I тур сақлагич қўйилиши мумкин, у қучланиш ортиб кетганда 0,8 эҳтимоллик билан ишлаб кетади ёки II тур сақлагич қўйилиши мумкинки, у ўша шароитда 0,9 эҳтимоллик билан ишлаб кетади. I тур сақлагич занжирга 0,6 эҳтимоллик билан, II тур сақлагич эса 0,4 эҳтимоллик билан уланиши мумкин. Занжирга уланган сақлагич ишга тушиб кетди. Қайси бири эҳтимоллироқ: I тур сақлагич қўйилганими ёки II тур сақлагич қўйилганими?

5.22. Ишчи бир хил деталларга ишлов бериладиган учта станокка хизмат кўрсатади. Яроксиз деталь ишлаб чиқариш эҳтимоллиги 1-станок учун 0,02 га, 2-станок учун 0,03 га, учинчи станок учун — 0,04 га тенг. Ишлов берилган деталлар битта яшикка жойланади. 1-станокнинг унумдорлиги 2-станокка нисбатан уч марта юқори, 3-станокнинг унумдорлиги эса 2-станокнинг унумдорлигига нисбатан икки марта паст. Таваккалига олинган деталнинг яроксиз бўлиб чиқиши эҳтимоллигини топинг.

5.23. Самолётга қарата учта ўк узилди. 1-отишда мўлжалга тегиш эҳтимоллиги 0,5 га, 2-отишда 0,6 га, 3-отишда 0,8 га тенг. Битта ўк текканда самолётнинг уриб туширилиш эҳтимоллиги 0,3 га, иккита ўк текканда 0,6 га тенг, учта ўк текканда эса самолётнинг уриб туширилиши аниқдир. Самолётнинг уриб туширилиши эҳтимоллигини топинг.

5.24. Учта станок конвейерга деталлар етказиб беради. 1-станок учун яроксиз деталь чиқариш эҳтимоллиги 0,03 га, 2-станок учун 0,02 га, 3-станок учун 0,01 га тенг. 1-станокнинг унумдорлиги 2-станокникига нисбатан уч марта юқори. 3-станокники эса 2-станокникига нисбатан 2 марта юқори. Конвейердан таваккалига олинган деталнинг яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.25. Йиғув цехига деталлар 3 та автоматдан келтирилади. 1-автомат 0,3 %, 2-автомат — 0,2 %, 3-автомат 0,4 % яроксиз деталь ишлаб чиқариши маълум. Агар 1-автоматдан 1000 та, 2-автоматдан 2000 та, 3-автоматдан 2500 та деталь келтирилган бўлса, йиғишга таваккалига олинган деталнинг яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.26. Йиғиш цехига деталлар 2 та бўлимдан келтирилади: I бўлимдан — 70 %, II бўлимдан — 30 %. Бунда I бўлим деталларининг 10 %и, II бўлимники эса 20 % и яроксиз. Таваккалига олинган деталнинг яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.27. Электр лампочкалари партиясининг 20 % ини 1- завод, 30 % ини 2- завод, 50 % ини 3- завод тайёрлаган. 1- завод учун яроқсиз лампочка ишлаб чиқариш эҳтимоллиги 0,01 га, 2- завод учун 0,005 га, 3- завод учун 0,006 га тенг. Таваккалига олинган лампочканинг яроқсиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.28. Омборга 1000та деталь келтирилди. Уларнинг 200 таси 1- заводда, 460 таси 2- заводда, 340 таси 3- заводда тайёрланган. Деталанинг яроқсиз бўлиб чиқиши эҳтимоллиги 1- завод учун 0,03 га, 2- завод учун 0,02 га, 3- завод учун эса 0,01 га тенг. Таваккалига олинган деталь яроқсиз бўлиб чиқди. Унинг 1- заводда тайёрланган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.29. Дуқонга 4 та лампа заводида тайёрланган бир хил электр лампочкалари келтирилди: 1- заводдан 250 та, 2- заводдан 525 та, 3- заводдан 275 та ва 4- заводдан 950 та. Лампочканинг 1500 соатдан кўн ёниши эҳтимоллиги 1- завод учун 0,15 га, 2- завод учун 0,30 га, 3- завод учун 0,20 га ва 4- завод учун 0,70 га тенг. Лампочкалар токчаларга жойлаштириладиганда улар аралашиб кетди. Сотиб олинган лампочканинг 1500 соатдан ортиқ ёниши эҳтимоллигини топинг.

5.30. Пластмасса буюмлар учта станокда тайёрланади. I станок бутун маҳсулотнинг 50 % ини, II 30 % ини, III 20 % ни тайёрлайди. Буца I станок буюмларининг 0,025 қисми, II нинг 0,02 қисми, III нинг 0,015 қисми яроқсиз. Стандартга жавоб берувчи буюмнинг II станокда тайёрланганлик эҳтимоллигини топинг.

6.1. Цехда 6 та мотор бор. Ҳар бир мотор учун унинг мазкур пайтда ишга туширилганлик эҳтимоллиги 0,8 га тенг. Мазкур пайтда а) 4 та мотор; б) ҳамма моторлар ишга туширилганлик эҳтимоллиги; в) барча моторлар учириб қўйилганлик эҳтимоллигини топинг.

6.2. Бир дона лотерея билетига ютук чиқиш эҳтимоллиги $\frac{1}{7}$ га тенг. 6 та билетга эга бўлиб: а) иккига билетга; б) учта билетга; в) ҳамма билетларга ютук чиқиши эҳтимоллигини топинг.

6.3. Банаплар ортилган учта кема келиши кутуляпти. Статистиканинг кўрсатишича келтириладиган банапларнинг йўлда айниб қолиши 13 % ни ташкил этади. У ҳолда а) битга кеманинг; б) иккита кеманинг; в) учтала кеманинг айниган маҳсулот билан келиши эҳтимоллигини топинг. Барча кемалардаги банапларнинг айнимаган бўлиши эҳтимоллиги нимага тенг?

6.4. Автобазада 12 та машина бор. Уларнинг ҳар бирининг йўлга чиқиш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. Автобаза меъёрида ишлаши учун камида 8 та машина йўлда бўлиши керак бўлса, автобазанинг меъёрида ишлаши эҳтимоллигини топинг.

6.5. Телевизорнинг кафолат муддати ичида таъмирлашни талаб этиши эҳтимоллиги 0,2 га тенг. Кафолат муддати ичида 6 та телевизорнинг а) биттадан кўп бўлмагани; б) ақалли биттаси таъмирлашни талаб этиши эҳтимоллигини топинг.

6.6. Таваккалига олинган деталнинг ностандарт бўлиши эҳтимоллиги 0,1 га тенг бўлсин. Таваккалига олинган бешта

деталнинг иккитадан кўп бўлмагани ностандарт бўлиши эҳтимоллигини топинг.

6.7. 6 та болали оилада камида иккитаси қиз бола бўлиши эҳтимоллигини топинг. Угил бола туғилиши эҳтимоллигини 0,51 деб олинг.

6.8. Битта лотерея билетига ютук чиқиши эҳтимоллиги $\frac{1}{7}$ га тенг. Олти билетнинг энг камида иккитасига ютук чиқиши эҳтимоллигини топинг.

6.9. Объектни яқсон қилиш учун камида 3 марта нишонга тегиш керак 15 та уқ узилди. Ҳар қайси отишда нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,4 га тенг бўлса, объектнинг яқсон қилиши эҳтимоллигини топинг.

6.10. Синаш пайтида ишламай қолиш эҳтимоллиги ҳар бир асбоб учун 0,4 га тенг. Қайси ҳодисанинг эҳтимоллиги катта 4 та боғлиқмас синашда 2 та асбобнинг ишламай қолиши ёки 6 та боғлиқмас синашда 3 та асбобнинг ишламай қолишими?

6.11. Устахонада 8 та мотор ишлапти. Ҳар бир мотор учун тушликкача кизиб кетиш эҳтимоллиги 0,7 га тенг. Тушгача: а) 4 та моторнинг кизиб кетиши; б) барча моторларнинг кизиб кетиши; в) бирорта ҳам моторнинг кизиб кетмаслик эҳтимоллигини топинг.

6.12. Яшиқда бир неча минг саклагичлар бор. Уларнинг ярмисини 1- завод, қолганини 2- завод тайёрлаган. Таваққалига 5 та саклагич олинди. Уларнинг: а) иккитаси; б) камида иккитаси; в) иккитадан кўпи 1- заводда тайёрланганлик эҳтимоллигини топинг.

6.13. Қайси бири эҳтимоллироқ: тенг кучли рақиб билан ўйнаб турт партиядан учтасини ютишни ёки саккиз партиядан камида бештасини ютишни (дуранг ҳисобга олинмайди)?

6.14. Ўйин сокқасини 10 марта ташланганда учга каррали очко икки мартадан кўп, лекин беш мартадан кам марта тушини эҳтимоллигини топинг.

6.15. Яшиқдаги деталларнинг 40 % и 1- заводда, қолганлари 2- заводда тайёрланган. Яшиқдан таваққалига 7 та деталь олинди. Уларнинг ичида: а) иккитаси; б) 3 тадан кўп бўлмагани; в) 2 тадан ортиги 1- заводда тайёрланган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

6.16. Ишчи 50 та дастгоҳга хизмат кўрсатади. 6 соатлик иш вақтида дастгоҳнинг солашни талаб этиши эҳтимоллиги $\frac{1}{3}$ га

тенг. Қайси бири эҳтимоллироқ:

а) 17 та дастгоҳ солашни талаб этади;

б) 16 та дастгоҳ солашни талаб этади.

6.17. Завод дўконга 5000 дона сифатли буюм жўнатди. Ҳар буюмнинг йўлда шикастланиш эҳтимоллиги 0,0002 га тенг. Йўлда 5000 буюмнинг: а) роса 3 таси; б) 3 тадан ортиги шикастланиши эҳтимоллигини топинг.

6.18. Кинотеатрга 730 томошабин сиғади. а) 3 та томошабин бир кунда (масалан, 1 марта) туғилганлиги; б) 3 тадан кўп бўлмаган томошабин бир кунда туғилганлиги эҳтимоллигини топинг.

6.19. Қурилишга 1000 дона гишт келтирилади. Ташини ва келгириш пайтида гиштининг синиш эҳтимоллиги 0,003 га тенг. Қурилишга: а) 2 тадан ортик синган гишт келтирилганлик; б) камида битта синиш гишт келтирилганлик эҳтимоллигини топинг.

6.20. Чапакайлар ўртача 1% ни ташкил этади. 200 талаба орасида: а) роса 4 та; б) 4 тадан кам бўлмаган чапакай борлиги эҳтимоллигини топинг.

6.21. Дўконга 1000 шиша маъдан сув келтирилади. Келтириш пайтида шиша идишнинг синиб қолиши эҳтимоллиги 0,003 га тенг. Дўконга: а) роса 2 та; б) 2 тадан кам синган шиша идиш келтирилганлиги эҳтимоллигини топинг.

6.22. Дарслик 10000 нусхада чоп этилди. Дарслик нусхаси нотўғри белланганлик эҳтимоллиги 0,0001 га тенг. Ҳамма нусха ичида роса 5 дона яроқсиз дарслик борлиги эҳтимоллигини топинг.

6.23. Беш болали оилада учтадан ортик киз бола бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг. (Ўғил бола туғилиши эҳтимоллиги 0,51 деб олинсинг.)

6.24. Китоб саҳифасида хато учраши эҳтимоллиги 0,002 га тенг. 500 саҳифали китоб текширилмоқда: а) 2 саҳифада; б) 2 дан ортик бўлмаган саҳифада хато учраши эҳтимоллигини топинг.

6.25. 4 ҳодисанинг рўй бериш эҳтимоллиги 0,4 га тенг. 10 та синовда 4 ҳодиса 3 тадан кўп бўлмаган ҳолда рўй бериш эҳтимоллигини топинг.

6.26. Завод дўконга 6000 дона сифатли буюм жунатди. Йўлда шикастланиш эҳтимоллиги ҳар бир буюм учун 0,00025 га тенг. Жўнатилган 600 дона буюм орасида йўлда: а) роса 2 таси; б) 2 тадан кўп шикастланган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

6.27. Кинотеатрга 1000 та томошабин сиғади. а) 2 та томошабиннинг бир кунда (масалан 1 мартда) туғилганлиги эҳтимоллиги; б) 2 тадан кўп бўлмаган томошабиннинг бир кунда туғилганлиги эҳтимоллигини топинг.

6.28. Дарслик 40000 нусхада чоп этилган. Дарслик нусхасида камчилик бўлиш эҳтимоллиги 0,00015 га тенг. Бугун нусхада роса 6 дона камчилиги бор дарслик бўлиши эҳтимоллигини топинг.

6.29. 4 ҳодисанинг рўй бериш эҳтимоллиги 0,45 га тенг. 40 та синовда 4 ҳодиса 8 тадан кўп бўлмаган ҳолда рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

6.30. Устахонада 9 та мотор ишлаяпти. Ҳар бир мотор учун гушгача кизиб кетиш эҳтимоллиги 0,6 га тенг. Тушгача: а) 3 та могор кизиб кетиши эҳтимоллигини; б) ҳамма моторлар кизиб кетиши эҳтимоллигини; в) бирорта ҳам могор кизиб кетмаслиги эҳтимоллигини топинг.

7.1. Тўпдан ўк узишда битта ўк узиб, нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. 900 та ўк узилганда уларнинг камида 690 тасининг, кўпи билан 740 тасининг нишонга тегини эҳтимоллигини топинг.

7.2. Боллар йўшида ўртача 10% бракка йўл қўйилиши

кузатилади. 400 та ботдан иборат партиядо 299 гадан ортиги яроқли бўлиши эҳтимоллигини тошинг.

7.3. Харакатланаётган нишонга битта ўк узишда текказиш эҳтимоллиги 0,7 га тенг. 20 та ўк узилганда 15 тасининг нишонга тегиши эҳтимоллигини тошинг.

7.4. Битта ўк узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,4 га тенг. 320 та ўк узилганда 100 тасининг нишонга тегиши эҳтимоллигини тошинг.

7.5. Берилган усимлик уруғининг униб чиқувчанлиги 90 % ни ташкил этади. Экилган 800 та уруғининг камида 700 тасининг униб чиқishi эҳтимоллигини тошинг.

7.6. A ходисанинг 900 та боғликмас ходисаларининг хар бирида рўй бериши эҳтимоллиги p 0,8 га тенг. A ходисанинг камида 710 марта, кўпи билан 740 марта рўй бериши эҳтимоллигини тошинг.

7.7. A ходисанинг 900 та боғликмас ходисанинг хар бирида рўй бериши эҳтимоллиги p 0,8 га тенг. A ходисанинг: а) 750 марта; б) 710 марта рўй бериши эҳтимоллигини тошинг.

7.8. Китоб саҳифасида хато бўлиши эҳтимоллиги 0,002 га тенг. 500 саҳифали китоб текширилади. Камида 3, кўпи билан 5 саҳифада хато бўлиши эҳтимоллигини тошинг.

7.9. 100 та станок бир-бирига боғлик бўлмай ишлайди, бунда уларнинг хар бирининг 6 соат иш вақтида узлуксиз ишлаш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. Олти соат иш вақтида камида 75 та, кўпи билан 85 та станокнинг узлуксиз ишлаши эҳтимоллигини тошинг.

7.10. 100 та станок бир-бирига боғлик бўлмай ишлайди, бунда уларнинг хар бирининг 6 соат иш вақтида узлуксиз ишлаш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. Олти соат иш вақтида 85 та станок узлуксиз ишлаши эҳтимоллигини тошинг.

7.11. Фабрика 75 % биринчи нав маҳсулот чиқаради. 300 та маҳсулот ичидан биринчи навлилари сони камида 219 та ва кўпи билан 234 та бўлиши эҳтимоллигини тошинг.

7.12. Ўйин соққаси 500 марта ташланади. Бунда бир очко камида 70 марта ва кўпи билан 83 марта тушиши эҳтимоллигини тошинг.

7.13. Танга 400 марта ташланади. Гербли гомошини камида 204 марта ва кўпи билан 214 марта тушиши эҳтимоллигини тошинг.

7.14. Хар кайси ўнта деталнинг 9 таси стандартга жавоб беради. Олинган 50 та деталлар ичида стандартга жавоб берадиганлари сони камида 42 та, кўпи билан 48 та бўлиши эҳтимоллигини тошинг.

7.15. Ўйин соққаси 500 марта ташланади. Бунда бир очконинг: а) 83 марта; б) 78 марта тушиши эҳтимоллигини тошинг.

7.16. Танга 400 марта ташланади. Бунда гербли гомошини: а) 200 марта; б) 160 марта тушиши эҳтимоллигини тошинг.

7.17. Мерганнинг битта ўк узиб нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,75 га тенг. 100 марта ўк узилганда нишонга: а) камида 70 ва кўпи билан 80 марта; б) кўпи билан 70 марта текказиш эҳтимоллигини тошинг.

7.18. Агар ходисанинг хар бир синовда рўй бериш эҳтимоллиги 0,2 га тенг бўлса, 400 та синовда унинг 104 марта рўй бериши эҳтимоллигини тақрибан тошинг.

7.19. Агар боғлиқмас 1000 та синовларнинг ҳар бирида A ҳодиса 0,5 эҳтимоллик билан рўй беради, унинг камида 500 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

7.20. Агар боғлиқмас синовларнинг умумий сони 600 та бўлиб, ҳодисанинг алоҳида синовларда рўй бериши эҳтимоллиги 0,6 га тенг бўлса, ҳодисанинг камида 342 ва кўпи билан 378 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

7.21. Тўндан ҳар бир алоҳида ўқ узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,9 га тенг. 20 та ўқ узилганда нишонга тегишлар сони 16 дан кам, 19 дан ортиқ бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг.

7.22. Карбонит гўлачаларни автоматик прессланганда улар умумий сонининг $\frac{2}{3}$ қисми тамғасиз бўлади. Таваккалга олинган 450 та гўлача орасида тамғасизлари сони камида 280 та, кўпи билан 320 та бўлиши эҳтимоллигини топинг.

7.23. Тўндан ўқ узилганда нишон 0,8 эҳтимоллик билан яқсон бўлади. 2000 та ўқ узилди. Бунда: а) камида 1200 марта, лекин 1300 дан ортиқ бўлмаган марта нишонга тегиш; б) камида 1200 марта нишонга тегиш эҳтимоллигини топинг.

7.24. Агар уруғнинг униб чиқиш эҳтимоллиги 0,75 бўлса, экилган 500 уруғнинг 130 таси униб чиқмаслик эҳтимоллигини топинг.

7.25. Ўйин соққаси 80 марта ташланади. 3 раками 20 марта тушиши эҳтимоллигини аниқланг. (Лапласнинг локал теоремасини қўлланг.)

7.26. Ҳар ўнта деталнинг 5 таси стандартга жавоб беради. Олинган 50 та деталнинг стандартга жавоб берадиганлари сони камида 43 та, кўпи билан 49 та бўлиши эҳтимоллигини топинг.

7.27. Карбонит гўлачаларни автоматик прессланганда $\frac{2}{3}$ қисми тамғасиз бўлади. Таваккалга олинган 450 та гўлача ичида тамғасизлари сони камида 300 та ва кўпи билан 310 та бўлиши эҳтимоллигини топинг.

7.28. Тўндан ўқ узганда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,9 га тенг. 900 та ўқ узилганда нишонга тегишлар сони камида 700 та ва кўпи билан 720 та бўлиши эҳтимоллигини топинг.

7.29. 1000 та боғлиқсиз синовларнинг ҳар бирида A ҳодиса 0,1 эҳтимоллик билан рўй беради. A ҳодисанинг камида 100 та, кўпи билан 125 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

7.30. Ўйин соққаси 300 марта ташланади. Бир очко камида 60 марта ва ортиғи билан 70 марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

8. Қуйида X дискрет тасодифий миқдор тақсимот қонуни билан берилган.

а) Тақсимот функцияси $F(x)$ ни топинг ва унинг графигини чизинг.

б) X дискрет тасодифий миқдорнинг сонли характеристикалари $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни ҳисобланг.

8.1.	X	52	56	57	60
	P	0,1	0,3	0,4	0,2

8.2.	X	16	24	26	28
	P	0,4	0,3	0,1	0,2

8.3.	X	14	18	23	29
	P	0,2	0,1	0,3	0,4

8.4.	X	30	32	35	40
	P	0,1	0,5	0,2	0,2

8.5.	X	12	14	16	20
	P	0,1	0,5	0,3	0,1

8.6.	X	12	14	18	20
	P	0,3	0,1	0,4	0,2

8.7.	X	35	39	42	46
	P	0,1	0,3	0,2	0,4

8.8.	X	23	25	28	29
	P	0,3	0,2	0,4	0,1

8.9.	X	17	27	29	28
	P	0,2	0,4	0,3	0,1

8.10.	X	24	26	38	30
	P	0,2	0,2	0,5	0,1

8.11.	X	25	27	30	32
	P	0,2	0,4	0,3	0,1

8.12.	X	2	16	19	21
	P	0,1	0,5	0,3	0,1

8.13.	X	45	47	50	52
	P	0,2	0,4	0,3	0,1

8.14.	X	10	12	14	16
	P	0,2	0,3	0,1	0,4

8.15.	X	18	22	23	26
	P	0,2	0,3	0,4	0,1

8.16.	X	78	80	84	85
	P	0,2	0,3	0,1	0,4

8.17.	X	21	25	26	31
	P	0,1	0,4	0,2	0,3

8.18.	X	25	28	30	33
	P	0,1	0,2	0,4	0,3

8.19.	X	56	58	60	64
	P	0,2	0,3	0,4	0,1

8.20.	X	60	64	67	70
	P	0,1	0,3	0,4	0,2

8.21.	X	31	34	37	40
	P	0,3	0,5	0,1	0,1

8.22.	X	20	22	30	31
	P	0,1	0,2	0,4	0,3

8.23.	X	17	20	23	27
	P	0,1	0,4	0,3	0,2

8.24.	X	28	32	34	36
	P	0,1	0,2	0,2	0,5

8.25.	X	37	41	43	45
	P	0,2	0,1	0,5	0,2

8.26.	X	30	35	38	40
	P	0,3	0,5	0,1	0,1

8.27.	X	15	20	28	24
	P	0,1	0,4	0,3	0,2

8.28.	X	20	25	30	31
	P	0,1	0,2	0,4	0,3

8.29.	X	10	25	20	26
	P	0,4	0,3	0,1	0,2

8.30.	X	41	40	52	55
	P	0,2	0,3	0,1	0,4

9. X тасодифий микдор $F(x)$ тақсимот функцияси билан берилган бўлса, қуйидагиларни топинг:

а) зичлик функция $f(x)$ ни;

б) $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ва $P(0,3 < X < 0,7)$ ларни.

$$9.1 \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ x^2, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 1 & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

$$9.2 \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ x^3, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

$$9.3 \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0, \\ 3x^2 + 2x, & \text{агар } 0 < x \leq \frac{1}{3}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{1}{3}. \end{cases}$$

$$9.4 \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 1, \\ \frac{1}{2}(x^2 - x), & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

$$9.5 \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,2x, & \text{агар } 0 < x \leq 5, \\ 1, & \text{агар } x > 5. \end{cases}$$

$$9.6 \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -30, \\ \frac{x+30}{60}, & \text{агар } -30 < x \leq 30, \\ 1, & \text{агар } x > 30. \end{cases}$$

$$9.7. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq 0, \\ \frac{x}{a} \left(2 - \frac{x}{a}\right), & \text{arap } 0 < x \leq a, \\ 1, & \text{arap } x > a. \end{cases}$$

$$9.8. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1 - \sin x, & \text{arap } \frac{\pi}{2} < x \leq \pi, \\ 1, & \text{arap } x > \pi. \end{cases}$$

$$9.9. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq -1, \\ \frac{3}{4}(x+1), & \text{arap } -1 < x \leq \frac{1}{3}, \\ 1, & \text{arap } x > \frac{1}{3}. \end{cases}$$

$$9.10. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq 0, \\ 1 - \cos x, & \text{arap } 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & \text{arap } x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

$$9.11. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq 0, \\ \frac{x}{7}, & \text{arap } 0 < x \leq 7, \\ 1, & \text{arap } x > 7. \end{cases}$$

$$9.12. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{36}, & \text{arap } 0 < x \leq 6, \\ 1, & \text{arap } x > 6. \end{cases}$$

$$9.13. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{25}, & \text{arap } 0 < x \leq 5, \\ 1, & \text{arap } x > 5. \end{cases}$$

$$9.14. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{16}, & \text{arap } 0 < x \leq 4, \\ 1, & \text{arap } x > 4. \end{cases}$$

$$9.15. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{1 - \cos x}{2}, & \text{агар } 0 < x \leq \pi, \\ 1, & \text{агар } x > \pi. \end{cases}$$

$$9.16. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\frac{\pi}{6}, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sin 3x, & \text{агар } -\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{\pi}{6}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{\pi}{6}. \end{cases}$$

$$9.17. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -1, \\ \frac{x}{3} + \frac{1}{3}, & \text{агар } -1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

$$9.18. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\frac{\pi}{2}, \\ 1 + \sin x, & \text{агар } -\frac{\pi}{2} < x \leq 0, \\ 1, & \text{агар } x > 0. \end{cases}$$

$$9.19. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 1, \\ x - 1, & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

$$9.20. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{3\pi}{4}, \\ \cos 2x, & \text{агар } \frac{3\pi}{4} < x \leq \pi, \\ 1, & \text{агар } x > \pi. \end{cases}$$

$$9.21. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\frac{\pi}{2}, \\ \cos x, & \text{агар } -\frac{\pi}{2} < x \leq 0, \\ 1, & \text{агар } x > 0. \end{cases}$$

$$9.22. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{4}, & \text{агар } 0 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

$$9.23. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{9}, & \text{агар } 0 < x \leq 3, \\ 1, & \text{агар } x > 3. \end{cases}$$

$$9.24. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq 2, \\ \frac{1}{2}x - 1, & \text{arap } 2 < x \leq 4, \\ 1, & \text{arap } x > 4. \end{cases}$$

$$9.25. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq 0, \\ 2\sin x, & \text{arap } 0 < x \leq \frac{\pi}{6}, \\ 1, & \text{arap } x > \frac{\pi}{6}. \end{cases}$$

$$9.26. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq 0, \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \sin 3x, & \text{arap } 0 < x \leq \frac{\pi}{9}, \\ 1, & \text{arap } x > \frac{\pi}{9}. \end{cases}$$

$$9.27. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq \frac{3\pi}{4}, \\ \cos 2x, & \text{arap } \frac{3\pi}{4} < x \leq \pi, \\ 1, & \text{arap } x > \pi. \end{cases}$$

$$9.28. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq -1, \\ \frac{1}{2}(x+1), & \text{arap } -1 < x \leq 1, \\ 1, & \text{arap } x > 1. \end{cases}$$

$$9.29. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq 0, \\ \sqrt[3]{x}, & \text{arap } 0 < x \leq 1, \\ 1, & \text{arap } x > 1. \end{cases}$$

$$9.30. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{arap } x \leq 3, \\ \ln \frac{x}{3}, & \text{arap } 3 < x \leq 3e, \\ 1, & \text{arap } x > 3e. \end{cases}$$

Бу усулни тенгламалар системасига эмас, балки шу системанинг элементар алмаштиришлар ёрдамида диагонал кўринишга келтирилувчи кенгайтирилган матрицасига қўллаш қулайроқдир.

Мулоҳазаларнинг умумийлигига зарар етказмаган ҳолда фақат тўрт номаълумли тўртта тенгламалар системасини қараймиз. N ҳолда бундай системанинг кенгайтирилган матрицаси қуйидаги кўринишда бўлади:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & b_3 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & b_4 \end{pmatrix}$$

Ҳал қилувчи элемент сифатида бош диагоналда турган элемент олинади ($a_{ii}, i = \overline{1,4}$). Ҳал қилувчи элементда кесилувчи сатр ва устун мос равишда *ҳал қилувчи сатр* ва *ҳал қилувчи устун* деб аталади.


Кенгайтирилган A матрицадан унга эквивалент $A^{(1)}$ матрицага ўтиш учун

— A матрицада ҳал қилувчи элемент тақланadi (масалан, $a_{11} \neq 0$);

— ҳал қилувчи сатр эквивалент матрицага ўзгаришсиз кучириб ёзилиб, ҳал қилувчи устунинг ҳал қилувчи элементдан бошқа барча элементлари нолларга келтирилади;

— эквивалент матрицанинг қолган элементлари «тўрт тўртбурчак» қондаси деб аталувчи қонда бўйича қайта аниқланади.

Бу қонданинг моҳияти қуйидагича: A матрицанинг ушбу тўртта элементини қараймиз:



бу ерда a_{kl} — ҳал қилувчи элемент, эквивалент матрицага ёзилган $a_{lm}^{(1)}$ га мос келувчи элемент, a_{lm} ва a_{kl} ҳал қилувчи сатр ва ҳал қилувчи устундаги элементлар.

Алмаштириладиган $a_{lm}^{(1)}$ элемент (эквивалент матрица элементи) ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$a_{lm}^{(1)} = \frac{a_{kl}a_{lm} - a_{lk}a_{lm}}{a_{kl}}$$

1- мисол. Ушбу

$$\begin{cases} x + 4y + 2z = -1, \\ 2x - 3y + z = -7, \\ x - 4y = -5 \end{cases}$$

системани Жордано — Гаусс усули билан ечинг.

Ечиш. Кенгайтирилган матрицанинг сатрлари устида элементар алмаштиришлар бажарамиз:

$$\begin{aligned}
 A &= \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 4 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 1 & -7 \\ 1 & -4 & 0 & -5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 2 & -1 \\ 0 & -11 & -3 & -5 \\ 0 & -8 & -2 & -4 \end{array} \right) \sim \\
 &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 2 & -1 \\ 0 & \boxed{1} & \frac{3}{11} & \frac{5}{11} \\ 0 & 4 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{10}{11} & -\frac{31}{11} \\ 0 & 1 & \frac{3}{11} & \frac{5}{11} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{11} & \frac{2}{11} \end{array} \right) \sim \\
 &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{10}{11} & -\frac{31}{11} \\ 0 & 1 & \frac{3}{11} & \frac{5}{11} \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

Бундан,

$$x = -1, y = 1, z = -2.$$

2-мисол. Берилган

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 2 & 6 \\ 1 & -2 & 0 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 16 \\ 2 & -3 & 2 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

матрицага Жордано — Гаусс усулини қўлланг.

Ечиш. $a_{11} = 1$ ни ҳал қилувчи элемент деб олиб, биринчи сатр элементларини ўзгартиришсиз қўчириб ёзамиз ва биринчи устуннинг ҳал қилувчи $a_{11} = 1$ элементдан бошқа барча элементларини эса ноллар билан алмаштирамиз. Тўртбурчак қайдасини қўллаб,

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 2 & 6 \\ 0 & -3 & 3 & -3 & -12 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 16 \\ 0 & -5 & 8 & -4 & -6 \end{pmatrix}$$

ни ҳосил қиламиз.

Иккинчи сатр элементларини (-3) га бўлиб, ушбу матрицага эга бўламиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 2 & 6 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 16 \\ 0 & -5 & 8 & -4 & -6 \end{pmatrix}$$

Энди $a_{22}'=1$ ни ҳал қилувчи элемент деб оламиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 14 \end{pmatrix}$$

Учинчи сатр элементларини 2 га бўламиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 14 \end{pmatrix}$$

$a_{33}''=1$ ни ҳал қилувчи элемент деб оламиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

Тўртинчи сатр элементларини (-2) га бўламиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 \end{pmatrix}$$

$a_{44}'''=1$ ни ҳал қилувчи элемент деб оламиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

15.1.2. Жордано — Гаусс усулидан қизикли тенгламалар системасини ечишдан ташқари детерминантларни ҳисоблашда, матрица

рангини аниқлашда, тескари матрицани топишда ҳам фойдаланилади.

3- м и с о л. Детерминантни Жордано — Гаусс усули билан ҳисобланг:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 7 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & -3 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 4 \end{vmatrix}$$

Е ч и ш.

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} \boxed{1} & 2 & 10 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & -3 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 4 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 10 & 4 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 23 & 10 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 10 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 23 & 10 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \end{vmatrix} = \\ &= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 20 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 28 & 10 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 20 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 28 & 10 \end{vmatrix} = \\ &= -7 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 20 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 28 & 10 \end{vmatrix} = -7 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{vmatrix} = \\ &= -7 \cdot 10 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \end{vmatrix} = -7 \cdot 10 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -70. \end{aligned}$$

4- м и с о л. Ушбу

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \\ 4 & 1 & 4 & 6 \\ 3 & -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

матрица рангини Жордано — Гаусс усулини қўллаб аниқланг.

Ечиш. Элементар алмаштиришларда матрицанинг ранги ўзгармаслиги маълум. A матрицага Жордано—Гаусс усулини қўллаймиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & 3 & 5 & 7 \\ 7 & -1 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & 4 & 6 \\ 3 & -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & -22 & -32 & -44 \\ 0 & -11 & -16 & -22 \\ 0 & -11 & -16 & -22 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & 11 & 16 & 22 \\ 0 & 11 & 16 & 22 \\ 0 & 11 & 16 & 22 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & 11 & 16 & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ҳосил бўлган матрицанинг ҳар қандай иккинчи тартибли детерминанти нолдан фарқли, демак, $r(A) = 2$.

5-мисол. Берилган

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

матрицага тесқари A^{-1} матрицани Жордано—Гаусс усули билан топинг.

Ечиш. $\Delta = 24 \neq 0$ бўлгани учун A хосмас матрица. A матрицанинг ўнг томонига бирлик матрицани ёзиб тўғри бурчакли матрица ҳосил қиламиз ва унга Жордано—Гаусс усулини қўллаймиз.

$$(A|E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \boxed{3} & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{4}{3} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{10}{3} & -\frac{2}{3} & 0 & 1 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{1}{7} & \frac{5}{7} & -\frac{2}{7} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{4}{7} & \frac{3}{7} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{24}{7} & -\frac{6}{7} & \frac{1}{7} & 1 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & -\frac{7}{24} & \frac{1}{24} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{12} & -\frac{1}{12} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{24} & \frac{7}{24} \end{array} \right)$$

Демак,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{7}{24} & -\frac{1}{24} \\ -\frac{1}{2} & \frac{5}{12} & -\frac{1}{12} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{24} & \frac{7}{24} \end{pmatrix}$$

1- дарсхона топириги

Куйидаги масалаларни Жордано — Гаусс усулидан фойдаланиб ечинг:

1. Детерминантларни ҳисобланг:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}; \quad \text{б) } \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -4 & 3 \\ 4 & 3 & 2 & -1 \\ 3 & -4 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$

Ж: а) 96; б) — 900.

2. Матрица рангини топинг:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Ж: а) $r=2$; б) $r=3$.

3. Берилган матрица учун A^{-1} тескари матрицани топинг:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}$$

Ж:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -38 & 41 & -34 \\ 27 & -29 & 24 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \begin{pmatrix} -8 & 29 & -11 \\ -5 & 18 & -7 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Тенгламалар системасини ечинг:

$$\text{a) } \begin{cases} 5x + 8y + z = 2, \\ 3x - 2y + 6z = -7, \\ 2x + y - z = 6; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 11x_3 + 5x_4 = 2, \\ x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -3, \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3. \end{cases}$$

Ж: а) $x = -3, y = 2, z = 1$;

б) $x_1 = -2, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = -1$.

1- мустақил иш

Қуйидаги масалаларни Жордано — Гаусс усули билан ечинг:

1. Детерминантни ҳисобланг:

$$\begin{vmatrix} 8 & 7 & 2 & 10 \\ -8 & 2 & 7 & 10 \\ 4 & 4 & 4 & 5 \\ 0 & 4 & -3 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{Ж: } -1800.$$

2. Матрица рангини тошинг:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Ж: } r = 3.$$

3. Берилган A матрицага тескари A^{-1} матрицани тошинг:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -4 & -3 \\ 0 & 6 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{Ж: } \begin{pmatrix} -7 & 5 & 12 & -19 \\ 3 & -2 & -5 & 8 \\ 41 & -30 & -69 & 111 \\ -59 & 43 & 99 & -159 \end{pmatrix}$$

4. Чизикли тенгламалар системасини ечинг:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8, \\ x_2 + 3x_3 + x_4 = 15, \\ 4x_1 + x_3 + x_4 = 11, \\ x_1 + x_2 + 5x_4 = 23. \end{cases}$$

Ж: $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 4$.

3- лаборатория машғулоти
Чизиқли тенгламалар системасини ечиш

Жордано — Гаусс усулини қўллаб чизиқли тенгламалар системасини учта усул билан ечинг:

- Кramer коидаси бўйича;
- тескари матрица ёрдамида;
- номаълумларни йўқотиш усули билан.

$$1. \begin{cases} 3x + 2y + z = 5 \\ 2x + 3y + z = 1, \\ 2x + y + 3z = 11. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 4x - 3y + 2z = 9, \\ 2x + 5y - 3z = 4, \\ 5x + 6y - 2z = 18. \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 2x - y - z = 4, \\ 3x + 4y - 2z = 11, \\ 3x - 2y + 4z = 11. \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x + y - z = 1, \\ 8x + 3y - 6z = 2, \\ 4x + y - 3z = 3. \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} 7x - 5y = 31, \\ 4x + 11z = -43, \\ 2x + 3y + 4z = -20. \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 3x + 4y + 2z = 8, \\ 2x - y - 3z = -1, \\ x + 5y + z = -7. \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} x - 2y + 3z = 6, \\ 2x + 3y - 4z = 20, \\ 3x - 2y - 5z = 6. \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} x - 4y - 2z = -7, \\ 3x + y + z = 5, \\ -3x + 5y + 6z = 7. \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} 3x + 4y + 2z = 8, \\ 2x - 4y - 3z = -1, \\ x + 5y + z = 0. \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} 3x + y + z = 21, \\ x - 4y - 2z = -16, \\ -3x + 5y + 6z = 41. \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} x + y - z = -2, \\ 4x - 3y + z = 1, \\ 2x + y - z = 1. \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} x + y + 3z = -1, \\ 2x - y + 2z = -4, \\ 4x + y + 4z = -2. \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} x + 2y + 4z = 31, \\ 5x + y + 2z = 20, \\ 3x - y + z = 0. \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} 5x + 8y - z = 7, \\ 2x - 3y + 2z = 9, \\ x + 2y + 3z = 1. \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} 2x - y + 5z = 4, \\ 5x + 2y + 13z = 2, \\ 3x - y + 5z = 0. \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} 7x - 5y = 34, \\ 4x + 11y = -36, \\ 2x + 3y + 4z = -20. \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} x + 2y + z = 4, \\ 3x - 5y + 3z = 1, \\ 2x + 7y - z = 8. \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} x + 2y = 6, \\ 3x - y - z = 12, \\ y + 2z = -1. \end{cases}$$

$$21. \begin{cases} x - 3y + z = -9, \\ 4x + 2y - z = -8, \\ x + 2z = -3. \end{cases}$$

$$23. \begin{cases} 4x - 3y + 2z = 8, \\ 2x + 5y - 3z = 11, \\ 5x + 6y - 2z = 13. \end{cases}$$

$$25. \begin{cases} x + 3y - z = 8, \\ 2x + z = 1, \\ -x + 2y + z = 12. \end{cases}$$

$$27. \begin{cases} 4x + y - 3z = 9, \\ x + y - z = -2, \\ 8x + 3y - 6z = 12. \end{cases}$$

$$29. \begin{cases} 2x + 3y + z = 4, \\ 2x + y + 3z = 0, \\ 3x + 2y + z = 1. \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} x - 2y + 3z = 6, \\ 2x + 3y - 4z = 20, \\ 3x - 2y - 5z = 6. \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} x + 2z = 6, \\ x - 3y + z = 5, \\ 4x + 2y - z = -14. \end{cases}$$

$$22. \begin{cases} x + y - z = 1, \\ 8x + 3y - 6z = 2, \\ -4x - y + 3z = -3. \end{cases}$$

$$24. \begin{cases} 2x + z = 1, \\ x + 3y - z = -4, \\ -x + 2y + z = 4. \end{cases}$$

$$26. \begin{cases} 2x + y + 3z = 7, \\ 2x + 3y + z = 1, \\ 3x + 2y + z = 6. \end{cases}$$

$$28. \begin{cases} 2x - y + 3z = -4, \\ x + 3y - z = 11, \\ x - 2y + 2z = -7. \end{cases}$$

$$30. \begin{cases} 7x + 4y - z = 13, \\ 3x + 2y + 3z = 3, \\ 2x - 3y + z = -10. \end{cases}$$

2-§. Тенгламалар ва тенгламалар системаларини ечишнинг итерация усуллари

15.2.1. $f(x) = 0$ тенглама хақиқий илдизларининг тақрибий қийматларини топиш учун аввал илдиз яққаланади, яъни берилган тенгламанинг битта илдизидан бошқа илдизлари йўқ бўлган оралик аниқланади.

$[a; b]$ кесма узлуксиз $f(x)$ функция илдизининг яққалаш оралиғи бўлиши учун қуйидаги шартлар бажарилиши керак:


а) $f(a) \cdot f(b) < 0$,

б) $[a; b]$ да $f'(x)$ ишорасини сақлаши зарур.

Баъзан $f(x) = 0$ тенгламани $\varphi(x) = \psi(x)$ кўринишда ёзиб, $y = \varphi(x)$ ва $y = \psi(x)$ функциялар графикларини битта координаталар текислигида чизиб илдизнинг яққалаш оралиқларини топиш мумкин.

1-мисол. $2 - \lg x - x = 0$ тенглама илдининг яккалаш оралигини топинг.

Ечиш. Берилган тенгламани $\lg x = 2 - x$ кўринишда ёзиб, $y = \lg x$ ва $y = 2 - x$ функциялар графикларини битта чизмада тасвирлаймиз. Бу графикларнинг кесишиш нуктаси M нинг ξ абсциссаси $[1; 2]$ ораликда ётади (81-шакл). Бу ораликда берилган



81-шакл

тенгламанинг чап томонидаги ифода тегишли шартларни каноатлантирганлиги сабабли, y илдини яккалаш оралиги бўлади.

15.2.2. Тенгламаларни сонли ечининг энг мухим усулларида бири итерация усули ёки кетма-кет яқинлашиши усули бўлиб, унинг мохияти куйидагидан иборат.

Ушбу $f(x) = 0$ тенглама берилган бўлсин, бу ерда $f(x)$ — узлуксиз функция. Бу тенгламани унга тенг кучли $x = \varphi(x)$ тенглама билан алмаштирамиз.

Агар бирор $[a, b]$ ораликнинг ҳамма нукталарида $|\varphi'(x)| \leq r < 1$ (r — узгармас сон) бўлиб, дастлабки функция бу ораликда ягона илдиэга эга бўлса, у ҳолда бирор усул билан илдининг бошланғич x_0 тақрибий кийматини танлаймиз. Шундан сўнг ушбу кетма-кетликни тузиш мумкин:

$$x_1 = \varphi(x_0), \quad x_2 = \varphi(x_1), \quad \dots, \quad x_n = \varphi(x_{n-1}), \quad \dots$$

Бу кетма-кетликнинг лимити $f(x) = 0$ тенгламанинг $[a, b]$ ораликдаги ягона илдиэи бўлади, яъни $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$.

ξ илдининг итерация усули билан топилган x_n тақрибий киймати $|\xi - x_n| < \frac{r}{1-r} |x_n - x_{n-1}|$ тенгсизлик билан баҳоланади.

Бу ерда ξ қаралаётган тенгламанинг илдиэи, x_{n-1} ва x_n иккита яқинлашиш, r эса $|\varphi'(x)|$ нинг $[a, b]$ даги энг кичик киймати

Илдининг кийматини ϵ дан катта бўлмаган хатолик билан топиш учун n нинг кийматини

$$|x_n - x_{n-1}| < \frac{r-1}{r} \epsilon$$

тенгсизлик бажариладиган қилиб аниқлаш етарлидир.

$f(x) = 0$ тенгламани $x = \varphi(x)$ кўринишдаги тенгламага келтириш учун уни

$$x = x - \lambda f(x), \quad (\lambda \neq 0)$$

эквивалент тенглама билан алмаштирамиз. Унда

$$\varphi(x) = x - \lambda f(x)$$

λ параметрни $\varphi(x)$ функция итерация жараёнининг якинлашиши учун етарли булган шартни каноатлантирадиган килиб топиш мумкин:

$$|\varphi'(x)| = |1 - \lambda f'(x)| < 1.$$

Агар

$$1 - \lambda f'(x) = 0$$

деб олинса, x_0 якинлашиш атрофида юкоридаги тенгсизлик үз-үзидан бажарилади. У ҳолда

$$\lambda = +\frac{1}{f'(x_0)}, \quad (f'(x_0) \neq 0).$$

2- мисол. $2 - \lg x - x = 0$ тенгламани $x_0 = 1,5$ илдизининг бошлангич якинлашишидан (1- мисолдан маълум) $x = \varphi(x)$ кўринишга келтиринг.

Ечиш. Бунда $f(x) = 2 - \lg x - x$, $f'(x) = -1 - \frac{1}{x \ln 10}$. Эквивалент тенгламани ёзамиз:

$$x = x - \lambda(2 - \lg x - x)$$

λ сонни

$$1 - \lambda f'(1,5) = 0$$

ёки

$$1 + \lambda \left(1 + \frac{2}{3 \ln 10}\right) = 0$$

тенгламадан топамиз. $\lambda = -1$ сони бу тенгламанинг илдизига яқин. Шундай килиб,

$$x = -\lg x + 2,$$

бунда $\varphi(x) = 2 - \lg x$.

3- мисол. $2 - \lg x - x = 0$ тенглама илдизини итерация усули билан 0,001 гача аниқликда топинг.

Ечиш. 2- мисолда бошлангич тенгламани $x = 2 - \lg x$ кўринишда олдик. Бунда $\varphi(x) = 2 - \lg x$, $\varphi'(x) = -\frac{\lg e}{x}$, яъни [1, 2] ораликда $|\varphi'(x)| < 1$, шунинг учун итерация усулидан фойдаланиш мумкин. 1- мисолдаги [1, 2] оралиқнинг чап охирини нолинчи якинлашиш учун қабул қиламиз, яъни $x_0 = 1$. Энди бириинчи, иккинчи ва ундан кейинги якинлашишларни топиб натижаларни ушбу жадвалга ёзамиз.

i	x_i	$\lg x_i$	$\varphi(x_i) = 2 - \lg x_i$
0	1	0	2
1	2	0,3010	1,6990
2	1,6990	0,2302	1,7698
3	1,7698	0,2480	1,7520
4	1,7520	0,2435	1,7565
5	1,7565	0,2445	1,7555
6	1,7555	0,2444	1,7556
7	1,7556	—	—

Шундай қилиб, $\varepsilon = 0,001$ гача аниқликда изланаётган илдиз $\xi = 1,755$, чунки

$$|x_7 - x_6| = 0,001.$$

15.2.3. $\begin{cases} f(x, y) = 0, \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$ тенгламалар системасининг (икки номаъ-

лумли иккита тенгламалар системаси билан чекланамиз) берилган аниқликдаги ҳақиқий илдизларини ҳисоблаш талаб қилинсин.

Система ечимларидан бири (ξ, η) нинг бошланғич яқинлашиши $x = x_0, y = y_0$ берилган бўлсин дейлик. Улар, масалан, битта чизмада $f(x, y) = 0$ ва $\varphi(x, y) = 0$ эгри чизиклар графикларини чизиш йўли билан график усулда топилган бўлиши мумкин.

Берилган тенгламалар системасини унга эквивалент бўлган

$$\begin{cases} x = F(x, y), \\ y = \Phi(x, y) \end{cases}$$

кўринишга келтирамиз ва бошланғич яқинлашиши (x_0, y_0) нинг $((\xi, \eta)$ аниқ ечимини ҳам ўз ичига олувчи) бирор D атрофида

$$\begin{aligned} |F'_x(x, y)| + |\Phi'_x(x, y)| &\leq r_1 < 1, \\ |F'_y(x, y)| + |\Phi'_y(x, y)| &\leq r_2 < 1 \end{aligned}$$

деб фараз қилиб, итерация усули билан ечамиз.

Системанинг ечимига яқинлашувчи (x_n, y_n) ($n = 1, 2, 3, \dots$) кетма-кетлик қуйидагича тузилади:

$$\begin{aligned} x_1 &= F(x_0, y_0), \quad y_1 = \Phi(x_0, y_0); \\ x_2 &= F(x_1, y_1), \quad y_2 = \Phi(x_1, y_1); \\ x_3 &= F(x_2, y_2), \quad y_3 = \Phi(x_2, y_2); \\ &\dots \end{aligned}$$

Агар (x_n, y_n) ларнинг ҳаммаси D га тегишли бўлса, у ҳолда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi \quad \text{ва} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \eta.$$

Берилган системани $x = F(x, y)$, $y = \Phi(x, y)$ кўринишга келтириш учун $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ деб, унга эквивалент бўлган

$$\begin{cases} \alpha f(x, y) + \beta \varphi(x, y) = 0, \\ \gamma f(x, y) + \delta \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

системани қараймиз.

α , β , γ , δ параметрларни шундай танлаймизки, бу функцияларнинг хусусий ҳосилалари дастлабки яқинлашишда тенг бўлсин ёки нолга яқин бўлсин. Бунинг учун α , β , γ , δ параметрларни қуйидаги тенгламалар системасининг тақрибий ечимлари сифатида топамиз:

$$\begin{cases} 1 + \alpha f'_x(x_0, y_0) + \beta \varphi'_x(x_0, y_0) = 0, \\ \alpha f'_y(x_0, y_0) + \beta \varphi'_y(x_0, y_0) = 0, \\ \gamma f'_x(x_0, y_0) + \delta \varphi'_x(x_0, y_0) = 0, \\ 1 + \gamma f'_y(x_0, y_0) + \delta \varphi'_y(x_0, y_0) = 0. \end{cases}$$

4- мисол. $x_0 = 0,8$; $y_0 = 0,55$ эканлигини ҳисобга олиб, ушбу

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 1 = 0, \\ x^3 - y = 0. \end{cases}$$

тенгламалар системасини

$$\begin{cases} x = F(x, y), \\ y = \Phi(x, y) \end{cases}$$

кўринишга келтиринг.

Ечиш. Бунда $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$,

$\varphi(x, y) = x^3 - y$; $f'_x(x_0, y_0) = 1,6$; $f'_y(x_0, y_0) = 1,1$;

$\varphi'_x(x_0, y_0) = 1,92$; $\varphi'_y(x_0, y_0) = -1$.

Берилган системага эквивалент

$$\begin{cases} \alpha (x^2 + y^2 - 1) + \beta (x^3 - y) = 0, \\ \gamma (x^2 + y^2 - 1) + \delta (x^3 - y) = 0 \end{cases}$$

системани

$$\begin{cases} x = x + \alpha (x^2 + y^2 - 1) + \beta (x^3 - y), \\ y = y + \gamma (x^2 + y^2 - 1) + \delta (x^3 - y) \end{cases}$$

кўринишда ёзиб оламиз.

α , β , γ , δ коэффициентларнинг сон қийматлари учун

$$\begin{cases} 1 + 1.6\alpha + 1.92\beta = 0, \\ 1.1\alpha - \beta = 0, \\ 1.6\gamma + 1.92\delta = 0, \\ 1 + 1.1\gamma - \delta = 0. \end{cases}$$

системанинг илдизларини оламиз, яъни

$$\alpha \approx -0.3; \beta \approx -0.3; \gamma \approx -0.5; \delta \approx 0.4$$

Шундай қилиб, тенгламалар системаси итерация усулини қўллаш учун қулай бўлган ушбу кўринишга келтирилади:

$$\begin{cases} x = x - 0.3(x^2 + y^2 - 1) - 0.3(x^3 - y) \equiv F(x, y), \\ y = y - 0.5(x^2 + y^2 - 1) + 0.4(x^3 - y) \equiv \Phi(x, y). \end{cases}$$

2 дарсхона топшириғи

1. $x^4 - 9x^2 + 18x - 1 = 0$ тенгламанинг илдизларини яқкалаш ораликларини график усул билан аниқланг:

Ж: (0,1); (2,3); (6,7).

2. Тенгламаларни итерация усули билан, 0,01 гача аниқликда ечинг:

а) $x^3 - 12x - 5 = 0$; б) $4x = \cos x$.

Ж: а) 0,42; б) 0,24.

3. Ушбу $\begin{cases} x^2 + y^2 = -1, \\ x^3 - y = 0 \end{cases}$ тенгламалар системаси илдизининг даст-

лабки яқинлаштиришни график усулида топинг ва 0,01 гача аниқликда итерация усули билан ҳисобланг.

Ж: $\xi = 0.83$; $\eta = 0.56$.

2-мустақил иш

1. $x^3 - 12x + 1 = 0$ тенглама хақиқий илдизларининг яқкалаш ораликларини график усулда аниқланг.

Ж: (-4, -3); (0,1); (3,4).

2. Тенгламаларни итерация усули билан 0,01 гача аниқликда ечинг:

а) $x^3 - 2x^2 - 4x - 7 = 0$; б) $4x - 7\sin x = 0$.

Ж: а) 3,62; б) 0 ва $\pm 1,73$.

3. Тенгламалар системасини итерация усули билан 0,01 гача аниқликда ечинг:

$$\begin{cases} x^2 + y - 4 = 0, \\ y - \lg x - 1 = 0. \end{cases} \quad \text{Ж: } \xi = 1,67; \eta = 1,22.$$

4- лаборатория машгулоти

$f(x) = 0$ тенглама илдиэлариини итерация усули билан топиш

Тенгламаларнинг энг кичик мусбат илдиэини итерация усули билан 0,0001 гача аниқликда топинг.

- | | | | |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|
| 1. $x^2 - \cos \pi x = 0.$ | Ж: 0,4373. | 16. $2 - x - \lg x = 0.$ | Ж: 1,7554. |
| 2. $\cos^2 \pi x - x = 0.$ | Ж: 0,3115. | 17. $(x-1)^2 - e^{-x} = 0.$ | Ж: 1,4776. |
| 3. $x - 3 \cos^2 1,04x = 0.$ | Ж: 0,9393. | 18. $\lg x - 3(x-2)^2 = 0.$ | Ж: 1,1439. |
| 4. $2 \ln x - \frac{1}{x} = 0.$ | Ж: 1,4215. | 19. $2 - x - 2 \ln x = 0.$ | Ж: 1,3702. |
| 5. $2 - x^2 - e^{-x} = 0.$ | Ж: 1,3150. | 20. $1 - x - x \sqrt{x} = 0.$ | Ж: 0,5698. |
| 6. $3 - x - 2 \lg x = 0.$ | Ж: 2,2830. | 21. $\frac{1}{2}x - \lg x - 3 = 0.$ | Ж: 7,7822. |
| 7. $2 \sqrt{x} - \cos \frac{\pi x}{2} = 0.$ | Ж: 0,2211. | 22. $\frac{1}{x+1} - \ln x = 0.$ | Ж: 1,4935. |
| 8. $\sqrt{x} - \cos 0,387x = 0.$ | Ж: 0,8867. | 23. $\lg \frac{5x}{2} - \sin \pi x = 0.$ | Ж: 0,8875. |
| 9. $\sqrt{x} - 2 \cos \frac{\pi x}{2} = 0.$ | Ж: 0,7210. | 24. $2 - x - \operatorname{ctg} x = 0.$ | Ж: 0,6306. |
| 10. $2 \lg x - \frac{x}{2} + 1 = 0.$ | Ж: 0,3971. | 25. $e^x - 2 + x^2 = 0.$ | Ж: 0,5378. |
| 11. $3 - x - \operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} = 0.$ | Ж: 1,3172. | 26. $\frac{2}{x} - \lg x = 0.$ | Ж: 0,5965. |
| 12. $\pi \cos \pi x - \frac{1}{x} = 0.$ | Ж: 1,5652. | 27. $4 - x - e^{-\frac{1}{x}} = 0.$ | Ж: 1,6815. |
| 13. $\frac{1}{x^2} - \lg x = 0.$ | Ж: 1,8967. | 28. $\sqrt{x+1} - \frac{1}{x} = 0.$ | Ж: 0,7545. |
| 14. $\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{3} - x^2 = 0.$ | Ж: 0,8755. | 29. $(x-1)^2 - \frac{1}{2}e^x = 0.$ | Ж: 0,2132. |
| 15. $\ln x + \sqrt{x} = 0.$ | Ж: 0,4848. | 30. $2 - x - \operatorname{arctg} 2x = 0.$ | Ж: 0,9248. |

3-§. Оддий дифференциал тенгламаларни ечишнинг сонли усуллари. Эйлер усули ва унинг модификациялари.


15.3.1. Амалиётда учрайдиган дифференциал тенгламаларнинг аниқ ечимларини хар доим ҳам топиб булавермайди. Шу сабабли дифференциал тенгламаларни тақрибий ечиш усуллари катта аҳамиятга эга. Эйлер усули ва унинг модификациялари шу усуллар жумласига киради.

Биринчи тартибли

$$y' = f(x, y)$$

дифференциал тенглама берилган бўлиб, унинг $[x_0; b]$ кесмада $y(x_0) = y_0$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи ечимини топиш талаб қилинсин (Коши масаласи).

$[x_0, b]$ кесмани n та тенг бўлакка бўламиз (82- шакл): $\frac{b-x_0}{n} = h$ (интеграллаш қадами).



82- шакл

(x_0, x_1) ораликда интеграл эгри чизик унга $M_0(x_0, y_0)$ нуктада ўтказилган уринма кесмаси билан алмаштирилади. Бу уринманинг бурчак коэффициенти ушбуга тенг:

$$y'(x_0) = f(x_0, y_0) = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0},$$

бундан y_1 нинг қийматини топамиз:

$$y_1 = y_0 + (x_1 - x_0)f(x_0, y_0)$$

ёки қисқача

$$y_1 = y_0 + hy'_0, \text{ бунда } y'_0 = y'(x_0).$$

$M_1(x_1, y_1)$ нуктада ўтказилган уринма тенгламасидан:

$$y_2 = y_1 + h \cdot y'_1, \text{ бунда } y'_1 = y'(x_1).$$

Шунга ўхшаш,

$$y_3 = y_2 + hy'_2, \text{ бунда } y'_2 = y'(x_2) \text{ ва х. к.}$$

Эйлернинг тавсифланган усулининг умумий формуласи ушбу кўринишга эга бўлади:

$$y_{i+1} = y_i + hy'_i, \text{ бунда } y'_i = y'(x_i),$$

$$i = 1, 2, \dots, n.$$

Уринмалар кесмаларидан ташкил топган синик чизик *Эйлер синик чизиги* дейлади, бу чизик берилган $M_0(x_0, y_0)$ нуктадан ўтади ҳамда изланаётган интеграл эгри чизикни аппроксимация қилади.

1- мисол. Эйлер усулидан фойдаланиб $y' = y - x$ дифференциал тенгламанинг $[0; 1,5]$ кесмада $y(0) = 1,5$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи ечимини топинг. Интеграллаш кадамини $h = 0,25$ деб олинг.

Ечиш. $x_0 = 0, y_0 = 1,5$ га эгамиз; интеграллаш кадами $h = \frac{1,5}{6} = 0,25$, яъни $n = 6$. $hy'_i = \Delta y_i = hf(x_i, y_i) = h(y_i - x_i)$ деб белгилаб, ушбу жадвални тузамиз:

i	x_i	y_i	$y'_i = y_i - x_i$	$\Delta y_i = hy_i$
0	0	1,5000	1,5000	0,3750
1	0,25	1,8750	1,6250	0,4062
2	0,50	2,2812	1,7812	0,4453
3	0,75	2,7265	1,9765	0,4941
4	1,00	3,2206	2,2206	0,5552
5	1,25	3,7758	2,5258	0,6314
6	1,50	4,4702		

15.3.2. Эйлернинг такомиллаштирилган усулини қараймиз. Унинг моҳияти бундай: масала олдингидек қўйилгани ҳолда, изланаётган функциянинг $x_{i+\frac{1}{2}} = x_i + \frac{h}{2}$ нукталардаги $y_{i+\frac{1}{2}}$ ёрдамчи қийматлари

$$y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2} y'_i$$

формула ёрдамида ҳисобланади. Шундан кейин $y' = f(x, y)$ тенгламанинг ўнг қисмининг


$$y'_{i+\frac{1}{2}} = f\left(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}}\right)$$

ўрта нуктадаги қиймати топилади ва

$$y_{i+1} = y_i + h y'_{i+\frac{1}{2}}$$

аниқланади. Бу графикда куйидагидек бўлади: M_i нукта Эйлер усули билан, M'_i нукта эса Эйлернинг такомиллаштирилган усули билан топилган (83- шакл).

2- мисол. 1- мисолдаги дифференциал тенгламани Эйлернинг такомиллаштирилган усули билан ечинг.



83- шакл

Ечиш, Тегишли белгилашлар киритиб, ҳисоблаш натижаларини ушбу жадвалда келтирамиз:

i	x_i	y_i	$y'_i = f(x_i, y_i)$	$\frac{h}{2}y'_i$	$x_{i+\frac{1}{2}} = x_i + \frac{h}{2}$	$y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2}y'_i$	$y'_{i+\frac{1}{2}} = f(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}})$	$\Delta y_i = h y'_{i+\frac{1}{2}}$
0	0	1,5000	1,5000	0,1875	0,125	1,6875	1,5625	0,3906
1	0,25	1,8906	1,6406	0,2051	0,3750	2,0957	1,7207	0,4302
2	0,50	2,3208	1,8208	0,2276	0,6750	2,5484	1,8734	0,4684
3	0,75	2,7892	2,0392	0,2549	0,8750	3,0441	2,1691	0,5423
4	1,00	3,3315	2,3315	0,2914	1,1250	3,6229	2,4974	0,6243
5	1,25	3,9558	2,7058	0,3382	1,3750	4,2940	2,9190	0,7298
6	1,50	4,6856						

15.3.3. Эйлер — Кошининг такомиллаштирилган усулининг моҳияти бундай: олдин

$$\tilde{y}_{i+1} = y_i + h y'_i$$

ёрдамчи киймат топилади, сўнгра

$$\tilde{y}'_{i+1} = f(x_{i+1}, \tilde{y}_{i+1})$$

ҳисобланади. Шундан кейин

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot \frac{y'_i + \tilde{y}'_{i+1}}{2}$$

формула бўйича тегишли ечим топилади.

3- мисол. Эйлер — Кошининг такомиллаштирилган усулидан фойдаланиб, 1- мисолдаги дифференциал тенгламани ечинг.

Е чи ш . Тегишли белгилашлар киритиб, хисоблашлар натижаларини ушбу жадвалга киритамиз:

i	x_i	y_i	$y_i' = f(x_i, y_i)$	$h y_i$	x_{i+1}	$y_{i+1} = y_i + h y_i$	$y_{i+1}' = f(x_{i+1}, y_{i+1})$	$h y_{i+1}'$	$\Delta y_i = \frac{y_i' + y_{i+1}'}{2}$
0	0	1,5000	1,5000	0,3750	0,25	1,8750	1,625	0,4062	0,3906
1	0,25	1,8906	1,6406	0,4102	0,50	2,3008	1,8008	0,4506	0,4302
2	0,50	2,3208	1,8208	0,4552	0,75	2,7760	2,0260	0,5065	0,4808
3	0,75	2,8016	2,0516	0,5129	1,00	3,3145	2,3145	0,5786	0,5458
4	1,00	3,3474	2,3474	0,5868	1,25	3,9342	2,6842	0,6710	0,6289
5	1,25	3,9763	2,7263	0,6816	1,50	4,6579	3,1579	0,7895	0,7355
6	1,50	4,7118							

3- дарсхона топириги

1. Эйлер усулидан фойдаланиб, $y' = \frac{y-x}{y+x}$ дифференциал тенгламани $y(0) = 1$ бошлангич шартда ечинг. Интеграллаш кадамини $h=0,1$ деб олинг. Унинг дастлабки 4 та кийматини топиш билан чекланг.

Ж:

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4
y	1	1,1	1,18	1,25	1,31

2. Эйлернинг такомиллаштирилган усулидан фойдаланиб, 1- масаладаги дифференциал тенгламани ечинг.

3. Эйлер — Кошининг такомиллаштирилган усулидан фойдаланиб, 1- масаладаги дифференциал тенгламани ечинг.

3- мустақил иши

1. Эйлер усули билан $y' = x + y$ дифференциал тенгламанинг $[0; 0,4]$ кесмада $y(0) = 1$ бошлангич шартни қаноатлантирувчи ечимини топинг. $h=0,1$ деб олинг.

Ж:

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4
y	1	1,1	1,22	1,36	1,52

2. Эйлернинг такомиллаштирилган усулидан фойдаланиб, 1- масаладаги дифференциал тенгламани ечинг.

3. Эйлер — Кошининг такомиллаштирилган усулидан фойдаланиб, 1- масаладаги дифференциал тенгламани ечинг.

5- лаборатория машғулоту

Оддий дифференциал тенгламаларнинг тақрибий ечимларини топиш

Эйлер усули ва унинг модификацияларидан фойдаланиб, берилган $y' = f(x, y)$ дифференциал тенгламанинг $y(x_0) = y_0$ бошланғич шарт билан $[x_0, b]$ кесмада 0,0001 гача аниқликда ечимини топинг (бўлинишлар сонини $n=5$ ва $n=10$ деб олинг).

1	$y' = y^3 - x;$ $y(0) = 1; [0; 0,5].$	2	$y' = \frac{x}{2} + \frac{e^2}{x+y};$ $y(0,3) = 1,5; [0,3; 1,3].$
3	$y' = x^2 y^2 - 1;$ $y(0) = 1; [0; 0,5].$	4	$y' = x - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{y}};$ $y(1) = 2; [1; 2].$
5	$y' = x^2 - y^2;$ $y(0) = 0; [0; 0,2].$	6	$y' = x + \sqrt{1 + y^2};$ $y(0,3) = 0,2; [0,3; 1,3].$
7	$y' = \frac{1-x^2}{y} + 1;$ $y(0) = 1; [0; 1].$	8	$y' = x + \cos \frac{y}{2,25};$ $y(1) = 2,2; [1; 2].$
9	$y' = \frac{xy}{1+x+y};$ $y(0) = 1; [0; 0,5].$	10	$y' = x^2 + 2y;$ $y(0) = 0,2; [0; 1].$
11	$y' = e^x + xy;$ $y(0) = 0; [0; 0,1].$	12	$y' = x + \sin \frac{y}{3};$ $y(1) = 1; [1; 2].$
13	$y' = \sin y - \sin x;$ $y(0) = 0; [0; 1].$	14	$y' = x + y^2;$ $y(0) = 0,3; [0; 1].$
15	$y' = 1 + x + x^2 - 2y^2$ $y(1) = 1; [1; 1,5].$	16	$y' = \frac{y^2 + x^3}{y^2}$ $y(0) = 1; [0; 1].$
17	$y' = \frac{x^2 + y^2}{10};$ $y(1) = 1; [1; 1,5].$	18	$y' = x - y^2$ $y(0) = 1; [0; 1].$
19	$y' = \frac{1}{x^2 + y^2};$ $y(0,5) = 0,5; [0,5; 1].$	20	$y' = 2x - 0,1y^2;$ $y(0) = 1; [0; 1].$
21	$y' = xy^3 + x^2;$ $y(0) = 1; [0; 0,5].$	22	$y' = xy^2 - 1;$ $y(0) = 0; [0; 1].$
23	$y' = y^2 \sqrt{x} + 1;$ $y(1) = 0; [1; 1,5].$	24	$y' = e^x - \frac{y}{x};$ $y(1) = 1; [1; 2].$

25	$y' = y^2 + xy + x^2;$ $y(0) = 1; [0; 0,5].$	26	$y' = x^2 + y^2;$ $y(0) = 1; [0; 1].$
27	$y' = xy^3 - 1;$ $y(0) = 0; [0; 1].$	28	$y' = -\frac{x}{y} - x^2;$ $y(1) = 1; [1; 2].$
29	$y' = \sqrt{1 + x^3 + y};$ $y(0,2) = 1; [0,2; 1,2].$	30	$y' = \frac{x^2 + y}{y^2};$ $y(0) = 1; [0; 1].$

ИЛОВАЛАР

1- илова

$$\eta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Функция қийматларининг жадвали

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,3989	3989	3989	3988	3986	3984	3982	3980	3977	3973
0,1	3970	3965	3961	3956	3951	3945	3939	3932	3925	3918
0,2	3910	3902	3894	3885	3876	3867	3857	3847	3836	3825
0,3	3814	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3697
0,4	3683	3668	3652	3637	3621	3605	3589	3572	3555	3538
0,5	3521	3503	3485	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3352
0,6	3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3187	3166	3144
0,7	3123	3101	3079	3056	3034	3011	2989	2966	2943	2920
0,8	2897	2874	2850	2827	2803	2780	2756	2732	2709	2685
0,9	2661	2637	2613	2589	2565	2541	2516	2492	2468	2444
1,0	0,2420	2396	2371	2347	2323	2299	2275	2251	2227	2203
1,1	2179	2155	2131	2107	2083	2059	2036	2012	1989	1965
1,2	1942	1919	1895	1872	1849	1826	1804	1781	1758	1736
1,3	1714	1691	1669	1647	1626	1604	1582	1561	1539	1518
1,4	1497	1476	1456	1435	1415	1394	1374	1354	1334	1315
1,5	1295	1276	1257	1238	1219	1200	1182	1163	1145	1127
1,6	1109	1092	1074	1057	1040	1023	1006	0989	0973	0957
1,7	0940	0925	0909	0893	0878	0863	0848	0833	0818	0804
1,8	0790	0775	0761	0748	0734	0721	0707	0694	0681	0669
1,9	0656	0644	0632	0620	0608	0596	0584	0573	0562	0551
2,0	0,0540	0529	0519	0508	0498	0488	0478	0468	0459	0449
2,1	0440	0431	0422	0413	0404	0396	0387	0379	0371	0363
2,2	0355	0347	0339	0332	0325	0317	0310	0303	0297	0290
2,3	0283	0277	0270	0264	0258	0252	0246	0241	0235	0229
2,4	0224	0219	0213	0208	0203	0198	0194	0189	0184	0180
2,5	0175	0171	0167	0163	0158	0154	0151	0147	0143	0139
2,6	0136	0132	0129	0126	0122	0119	0116	0113	0110	0107
2,7	0104	0101	0099	0096	0093	0091	0088	0086	0084	0081
2,8	0079	0077	0075	0073	0071	0069	0067	0065	0063	0061
2,9	0060	0058	0056	0055	0053	0051	0050	0048	0047	0046
3,0	0,0044	0043	0042	0040	0039	0038	0037	0036	0035	0034
3,1	0033	0032	0031	0030	0029	0028	0027	0026	0025	0025
3,2	0024	0023	0022	0022	0021	0020	0020	0019	0018	0018
3,3	0017	0017	0016	0016	0015	0015	0014	0014	0013	0013
3,4	0012	0012	0012	0011	0011	0010	0010	0010	0009	0009
3,5	0009	0008	0008	0008	0008	0007	0007	0007	0007	0006
3,6	0006	0006	0006	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0004

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3,7	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0003	0003	0003	0003
3,8	0003	0003	0003	0003	0003	0002	0002	0002	0002	0002
3,9	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0001	0001

2- илова

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad \text{функция қийматларининг жадвали}$$

x	Φ(x)	x	Φ(x)	x	Φ(x)	x	Φ(x)
0,00	0,000	0,33	0,1293	0,66	0,2454	0,99	0,3389
0,01	0,0040	0,34	0,1331	0,67	0,2486	1,00	0,3413
0,02	0,0080	0,35	0,1368	0,68	0,2517	1,01	0,3438
0,03	0,0120	0,36	0,1406	0,69	0,2549	1,02	0,3461
0,04	0,0160	0,37	0,1443	0,70	0,2580	1,03	0,3485
0,05	0,0199	0,38	0,1480	0,71	0,2611	1,04	0,3508
0,06	0,0239	0,39	0,1517	0,72	0,2642	1,05	0,3531
0,07	0,0279	0,40	0,1554	0,73	0,2673	1,06	0,3554
0,08	0,0319	0,41	0,1591	0,74	0,2703	1,07	0,3577
0,09	0,0359	0,42	0,1628	0,75	0,2734	1,08	0,3599
0,10	0,0398	0,43	0,1664	0,76	0,2764	1,09	0,3621
0,11	0,0438	0,44	0,1700	0,77	0,2794	1,10	0,3643
0,12	0,0478	0,45	0,1736	0,78	0,2823	1,11	0,3665
0,13	0,0517	0,46	0,1772	0,79	0,2852	1,12	0,3686
0,14	0,0557	0,47	0,1808	0,80	0,2881	1,13	0,3708
0,15	0,0596	0,48	0,1844	0,81	0,2910	1,14	0,3729
0,16	0,0636	0,49	0,1879	0,82	0,2939	1,15	0,3749
0,17	0,0675	0,50	0,1915	0,83	0,2967	1,16	0,3770
0,18	0,0714	0,51	0,1950	0,84	0,2995	1,17	0,3790
0,19	0,0753	0,52	0,1985	0,85	0,3023	1,18	0,3810
0,20	0,0793	0,53	0,2019	0,86	0,3051	1,19	0,3830
0,21	0,0832	0,54	0,2054	0,87	0,3078	1,20	0,3869
0,22	0,0871	0,55	0,2088	0,88	0,3106	1,21	0,3869
0,23	0,0910	0,56	0,2123	0,89	0,3133	1,22	0,3883
0,24	0,948	0,57	0,2157	0,90	0,3159	1,23	0,3907
0,25	0,0987	0,58	0,2190	0,91	0,3186	1,24	0,3925
0,26	0,1026	0,59	0,2224	0,92	0,3212	1,25	0,3944
0,27	0,1064	0,60	0,2257	0,93	0,3238	1,26	0,3962
0,28	0,1103	0,61	0,2291	0,94	0,3264	1,27	0,3980
0,29	0,1141	0,62	0,2324	0,95	0,3289	1,28	0,3997
0,30	0,1179	0,63	0,2357	0,96	0,3315	1,29	0,4015
0,31	0,1217	0,64	0,2389	0,97	0,3340	1,30	0,4032
0,32	0,1255	0,65	0,2422	0,98	0,3365	1,31	0,4049

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
1,32	0,4066	1,63	0,4484	1,94	0,4738	2,50	0,4938
1,33	0,4082	1,64	0,4495	1,95	0,4744	2,52	0,4941
1,34	0,4099	1,65	0,4505	1,96	0,4750	2,54	0,4945
1,35	0,4115	1,66	0,4515	1,97	0,4756	2,56	0,4948
1,36	0,4131	1,67	0,4525	1,98	0,4761	2,58	0,4951
1,37	0,4147	1,68	0,4535	1,99	0,4767	2,60	0,4953
1,38	0,4162	1,69	0,4545	2,00	0,4772	2,62	0,4956
1,39	0,4177	1,70	0,4554	2,02	0,4783	2,64	0,4959
1,40	0,4192	1,71	0,4564	2,04	0,4793	2,66	0,4961
1,41	0,4207	1,72	0,4573	2,06	0,4803	2,68	0,4963
1,42	0,4222	1,73	0,4582	2,08	0,4812	2,70	0,4965
1,43	0,4236	1,74	0,4591	2,10	0,4821	2,72	0,4967
1,44	0,4251	1,75	0,4599	2,12	0,4830	2,74	0,4969
1,45	0,4265	1,76	0,4608	2,14	0,4838	2,76	0,4971
1,46	0,4279	1,77	0,4616	2,16	0,4836	2,78	0,4973
1,47	0,4292	1,78	0,4625	2,18	0,4854	2,80	0,4974
1,48	0,4306	1,79	0,4633	2,20	0,4861	2,82	0,4976
1,49	0,4319	1,80	0,4641	2,22	0,4868	2,84	0,4977
1,50	0,4332	1,81	0,4649	2,24	0,4875	2,86	0,4979
1,51	0,4345	1,82	0,4556	2,26	0,4881	2,88	0,4980
1,52	0,4357	1,83	0,4664	2,28	0,4887	2,90	0,4981
1,53	0,4370	1,84	0,4671	2,30	0,4893	2,92	0,4982
1,54	0,4382	1,85	0,4678	2,32	0,4898	2,94	0,4984
1,55	0,4394	1,86	0,4686	2,34	0,4904	2,96	0,4985
1,56	0,4406	1,87	0,4693	2,36	0,4909	2,98	0,4986
1,57	0,4418	1,88	0,4699	2,38	0,4913	3,00	0,49865
1,58	0,4429	1,89	0,4706	2,40	0,4918	3,20	0,49931
1,59	0,4441	1,90	0,4713	2,42	0,4922	3,40	0,49966
1,60	0,4452	1,91	0,4719	2,44	0,4927	3,60	0,49984
1,61	0,4463	1,92	0,4726	2,46	0,4931	3,80	0,499928
1,62	0,4474	1,93	0,4732	2,48	0,4934	4,00	0,499968
						4,50	0,499997
						5,00	0,499997

$t_{\gamma} = t(\gamma, n)$ ning қийматлари жадвали

n	γ			n	γ		
	0,95	0,99	0,999		0,95	0,99	0,999
5	2,78	4,60	8,61	20	2,093	2,861	3,883
6	2,57	4,03	6,86	25	2,064	2,797	3,745
7	2,45	3,71	5,96	30	2,045	2,756	3,659
8	2,37	3,50	5,41	35	2,032	2,720	3,600
9	2,31	2,36	5,04	40	2,023	2,708	3,558
10	2,26	3,25	4,78	45	2,016	2,692	3,527
11	2,23	3,17	4,59	50	2,009	2,679	3,502
12	2,20	3,11	4,44	60	2,001	2,662	3,464
13	2,18	3,06	4,32	70	1,996	2,649	3,439
14	2,16	3,01	4,22	80	1,001	2,640	3,418
15	2,15	2,98	4,14	90	1,987	2,633	3,403
16	2,13	2,95	4,07	100	1,984	2,627	3,392
17	2,12	2,92	4,02	120	1,980	2,617	3,374
18	2,11	2,90	3,97	∞	1,960	2,576	3,291
19	2,10	2,88	3,92				

 $q = q(\gamma, n)$ ning қийматлари жадвали

n	γ			n	γ		
	0,95	0,99	0,999		0,95	0,99	0,999
5	1,37	2,67	5,64	20	0,37	0,58	0,88
6	1,09	2,01	3,88	25	0,32	0,49	0,73
7	0,92	1,62	2,98	30	0,28	0,43	0,63
8	0,80	1,38	2,42	35	0,26	0,38	0,56
9	0,71	1,20	2,06	40	0,24	0,35	0,50
10	0,65	1,08	1,80	45	0,22	0,32	0,46
11	0,59	0,98	1,60	50	0,21	0,30	0,43
12	0,55	0,90	1,45	60	0,188	0,269	0,38
13	0,52	0,83	1,33	70	0,174	0,245	0,34
14	0,48	0,78	1,23	80	0,161	0,226	0,31
15	0,46	0,73	1,15	90	0,151	0,211	0,29
16	0,44	0,70	1,07	100	0,143	0,198	0,27
17	0,42	0,66	1,01	150	0,115	0,160	0,211
18	0,40	0,63	0,96	200	0,099	0,136	0,185
19	0,39	0,60	0,92	250	0,089	0,120	0,162

хи- квадрат тақсимотнинг $\chi_{\alpha, r}$ критик нуқталари жадвали

$n \backslash r$	0,01	0,025	0,05	0,95	0,99
1	6,6	5,0	3,8	0,004	0,001
2	9,2	7,4	6,0	0,103	0,02
3	11,3	9,4	7,8	0,4	0,1
4	13,3	11,1	9,5	0,7	0,3
5	15,1	12,8	11,1	1,2	0,6
6	16,8	14,4	12,6	1,6	0,9
7	18,5	16,0	14,1	2,2	1,2
8	20,1	17,5	15,5	2,7	1,7
9	21,7	19,0	16,9	3,3	2,1
10	23,2	20,5	18,3	3,9	2,6
11	24,7	21,9	19,7	4,6	3,1
12	26,2	23,3	21,0	5,2	3,6
13	27,7	24,7	22,4	5,9	4,1
14	29,1	26,1	23,7	6,6	4,7
15	30,6	27,5	25,0	7,3	5,2
16	32,0	28,8	26,3	8,0	5,8
17	33,4	30,2	27,6	8,7	6,4
18	34,8	31,5	28,9	9,4	7,0
19	36,2	32,9	30,1	10,1	7,6
20	37,6	34,2	31,4	10,9	8,3
21	38,9	35,5	32,7	11,6	8,9
22	40,3	36,8	33,9	12,3	9,5
23	41,6	38,1	35,2	13,1	10,2
24	43,0	39,4	36,4	13,9	10,9
25	44,3	40,6	37,7	14,6	11,5
26	45,6	41,9	38,9	15,4	12,2
27	47,0	43,2	40,1	16,2	12,9
28	48,0	44,5	41,3	17,0	13,6
29	49,6	45,7	42,6	17,7	14,3
30	50,9	47,0	43,8	18,5	15,0

АДАБИЁТ

Асосий адабиёт

1. Я. С. Бугров, С. М. Никольский. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. М., «Наука», 1980.
2. Я. С. Бугров, С. М. Никольский. Дифференциальное и интегральное исчисление. М., «Наука», 1980.
3. Я. С. Бугров, С. М. Никольский. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного, т. I, II, М., «Наука», 1978.
4. Т. А. Азларов, Х. Мансуров. Математик анализ, 1- кисм. Т., «Ўқитувчи», 1994.
5. Т. А. Азларов, Х. Мансуров. Математик анализ, 2- кисм. Т., «Ўқитувчи», 1989.
6. Е. У. Соатов. «Олий математика», 1- жилд, Т., «Ўқитувчи», 1992.
7. Е. У. Соатов. «Олий математика», 2- жилд, Т., «Ўқитувчи», 1994.
8. М. С. Салохибдинов, Г. П. Насритдинов. Одний дифференциал тенгламалар. Т., «Ўзбекистон», 1994.
9. Сборник задач по математике для вузов (Под ред. А. В. Ефимова) ч. I, М., 1986, ч. II, М., 1986, ч. III, М., 1990.
10. Л. А. Кузнецов. Сборник задач по высшей математике (типовые расчеты) М., «Высшая школа», 1983.
11. О. С. Ивашев-Мусатов. Теория вероятностей и математическая статистика, М., «Наука», 1979.
12. В. Е. Гмурман. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М., «Высшая школа», 1975.
13. В. С. Пугачев. Теория вероятностей и математическая статистика. М., «Наука», 1979.
14. С. Х. Сирожиддинов, Н. М. Маматов. Эҳтимолилар назарияси ва математик статистика Т., «Ўқитувчи», 1980.

Қўшимча адабиёт

1. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике в трех частях. (Под общей редакцией доктора физико-математических наук, профессора А. Н. Рябушко), Минск, «Высшая школа», 1990.

2. П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова - Высшая математика в упражнениях и задачах, М., «Высшая школа», 1986.
3. Задачи и упражнения по математическому анализу для вузов. (Под редакцией Б. П. Демидовича), М., Государственное издательство физико-математической литературы, 1963.
4. Г. Н. Берман. Сборник задач по курсу математического анализа, М., «Наука», 1985.
5. А. И. Карасев. Теория вероятностей и математическая статистика, М., «Статистика», 1979.
6. В. Е. Гмурман. Теория вероятностей и математическая статистика, М., «Высшая школа», 1977.
7. Е. С. Вентцель. Теория вероятностей, М., «Наука», 1969.
8. В. П. Чистяков. Курс теории вероятностей, М., «Наука», 1978.
9. Е. Н. Львовский. Статические методы построения эмпирических формул, М., «Высшая школа», 1988.
10. Е. С. Вентцель, Л. А. Овчоров. Теория вероятностей, задачи и упражнения, М., «Наука», 1969.
11. Х. М. Андрухаев. Сборник задач по теории вероятностей, М., «Просвещение», 1985.
12. Б. В. Гнеденко. Курс теории вероятностей, М., «Физматгиз», 1961.

МУНДАРИЖА

Суз боши	3
1-боб. Чизикли алгебра ва аналитик геометрия элементлари	5
1-§. Иккинчи ва учинчи тартибли детерминантлар. Детерминантларни ҳисоблаш. Детерминантларнинг асосий хоссаси. Юкори тартибли детерминантлар	5
2-§. Икки ва уч номаълумли чизикли тенгламалар системаси. Крамер қондаси. Гаусс усули	9
3-§. Матрицалар. Матрицалар устида амаллар. Матрицанинг ранги. Чизикли тенгламалар системасини текшириш	15
1- назорат иши	24
1- намунавий ҳисоб топшириқлари	33
4-§. Векторлар устида чизикли амаллар. Базис. Базис буйича ёйиш. Координаталар орқали берилган векторлар устида чизикли амаллар	45
5-§. Скаляр кўпайтма. Векторнинг узунлиги. Векторлар орасидаги бурчак	50
6-§. Векторларнинг вектор ва аралаш кўпайтмалари	52
2- назорат иши	56
2- намунавий ҳисоб топшириқлари	60
7-§. Текисликнинг тенгламаси. Текисликнинг умумий тенгламасини текшириш. Тўғри чизикнинг тенгламаси	66
8-§. Текисликлар ва тўғри чизикларнинг ўзаро жойлашуви. Текисликлар орасидаги бурчак. Тўғри чизиклар орасидаги бурчак. Нуктадан тўғри чизикка ва текисликкача бўлган масофа	72
3- назорат иши	77
3- намунавий ҳисоб топшириқлари	81
9-§. Эллипс, гипербол ва параболанинг каноник тенгламалари	86
10-§. Иккинчи тартибли сиртларнинг каноник тенгламалари	91
4- назорат иши	93
4- намунавий ҳисоб топшириқлари	96
2-боб. Математик анализга кириш	101
1-§. Элементар функциялар	101
2-§. Элементар функцияларнинг графиклари	104
3-§. Икки функция йиғиндиси, айирмаси, кўпайтмаси ва бўлинмасининг графиклари	106
4-§. Кетма-кетликнинг лимити. Функциянинг лимити	110
5-§. Функциянинг лимитини ҳисоблаш	114
6-§. Биринчи ва иккинчи ажойиб лимитлар	116
7-§. Эквивалент чексиз кичик функциялар ва улар ёрдамида лимитларни ҳисоблаш	118
8-§. Чексиз кичик функцияларни таккослаш	120

1.9	§	Функциянинг узлуксизлиги. Функциянинг узилмиш нукталари ва уларнинг турлари. Функциянинг ноли	121 124
		5- назорат иши	129
		5- намунавий ҳисоб топшириқлари	
3-6	б.	Бир ўзгарувчи функциясининг дифференциал ҳисоби	139
1.1	§	Ҳосила. Ҳосилалар жадвали	139
2	§	Ҳосилани ҳисоблаш	145
3	§	Юкори тартибли ҳосилалар	148
4	§	Функциянинг дифференциали	151
5	§	Радд. Кларнж, КБҲ теоремалари. Лопитал қониси	155
6	§	Тейлор формуласи	158
4-6	б.	Функцияларни ҳосилалар ёрдамида текшириш	162
1.1	§	Биринчи тартибли ҳосила ёрдамида функцияларнинг экстремумларини текшириш	162
2	§	Функциянинг кавариклиги ва боиклиги. Зиглиш нукталари. Асимптоталар	165
3	§	Функцияларнинг графикларини чизиш	168
		6- назорат иши	170
5-6	б.	Ҳақиқий ўзгарувчининг вектор ва комплекс функциялари	173
1	§	Скаляр аргументнинг вектор функциясини дифференциаллаш	173
2	§	Скаляр аргументли вектор функция ҳосиласининг таъбири	176
		6- намунавий ҳисоб топшириқлари	179
		Комплексе сонлар ва улар устида Тейлор формулалари	184
6-6	б.	Бир ўзгарувчи функциясининг интеграл ҳисоби	192
1	§	Аниқмас интеграл ва интеграллашнинг содда усуллари	192
2	§	Аниқмас интегралда ўзгарувчини алмаштириш. Булақлаб интеграллаш	196
3	§	Каср-рационал функцияни энг содда касрларга ёйиш. Рационал функцияларни интеграллаш	201
4	§	$\int R(\sin x, \cos x) dx$ курунишдаги интеграллар	209
5	§	Таркибида тригонометрик функциялар бўлган баъзи интеграллар	213
6	§	Иррационал ифодаларни интеграллаш	219
7	§	Аниқ интеграл. Ньютон — Лейбниц формуласи. Аниқ интегралда ўзгарувчини алмаштириш. Булақлаб интеграллаш	225
8	§	Ясси фигураларнинг юзларини ҳисоблаш	231
9	§	Эгри чизик ёйлари узунликларини ҳисоблаш	236
10	§	Ҳажмларни ҳисоблаш	239
11	§	Ҳосмас интеграллар, яқинлашнинг, ҳосмас интегрални ҳисоблаш	245
		7- назорат иши	252
		7- намунавий ҳисоб топшириқлари	256
7-6	б.	Бир неча ўзгарувчининг функцияси	268
1	§	Бир неча ўзгарувчи функциясининг қусусий ҳосилалари ва тулик дифференциали	268
2	§	Мураккаб функциянинг ҳосилалари. Ошқормас функциянинг ҳосилалари	272
3	§	Ўринма текислик ва сиртга нормал. Юкори тартибли ҳосилалар. Тейлор формуласи	275
4	§	Бир неча ўзгарувчи функциясининг экстремумлари	280
5	§	Шартли экстремум	283
		8- назорат иши	286
8-6	б.	Оддий дифференциал тенгламалар	291
1	§	Ўмумий тушунчалар. Ўзгарувчилари ажраладиган ва бир жинсли биринчи тартибли дифференциал тенгламалар	291
2	§	Чизикли, Бернулли, тулик дифференциалли биринчи тартибли дифференциал тенгламалар	296
3	§	Юкори тартибли дифференциал тенгламалар	303
4	§	Ўзгармас коэффициентли бир жинсли чизикли тенгламалар	306

5-§	Ўзгармас коэффициентли бир жиисли булмаган чизикли дифференциал тенгламалар	309
6-§	Ўзгармас коэффициентли бир жиисли булмаган чизикли дифференциал тенгламаларда ўзгармасларни вариациялаш усули	315
	8- намунавий ҳисоб топшириқлари	317
7-§	Дифференциал тенгламалар системаларини ечиш	328
9- б о б.	Қаторлар, Фурье алаштиришлари	336
1-§	Сонли қаторлар	336
2-§	Мусбат ҳадли қаторларнинг яқинлашниш ва узоклашниш аломатлари	339
3-§	Ўзгарувчи ишорали қаторлар	344
4-§	Функционал қаторлар, уларнинг яқинлашниш соҳаси	346
5-§	Даражали қаторлар	350
6-§	Функцияларни Тейлор ва Маклорен қаторларига ёйиш	355
7-§	Баъзи функцияларнинг Тейлор ва Маклорен қаторлари	359
8-§	Даражали қаторларнинг татбиқи	361
9-§	Фурье қаторлари	365
10-§	Фурье интегралли	371
	9- назорат иши	375
10- б о б.	Каррали интеграллар	382
1-§	Декарт координатларида икки ўлчовли интегралларни ҳисоблаш	382
2-§	Декарт координатларида уч ўлчовли интегралларни ҳисоблаш	388
3-§	Икки ўлчовли интегралда ўзгарувчиларни алаштириш	391
11- б о б.	Эгри чизикли интеграллар ва сирт интеграллари	398
1-§	Биринчи ва иккинчи тур эгри чизикли интеграллар	398
2-§	Биринчи ва иккинчи тур эгри чизикли интегралларнинг татбиқи	405
3-§	Сирт интеграллари	410
	10- назорат иши	415
12- б о б.	Вектор анализи	426
1-§	Скаляр майдони, Сатҳ чизиклари ва сиртлари, Фуналиш буйича ҳосилат, Градиент, Вектор майдон, Вектор чизиклар	426
2-§	Вектор майдон оқими, Остроградский теоремаси, Вектор (майдон) дивергенцияси	430
3-§	Вектор майдондаги чизикли интеграл, Циркуляция, Вектор майдон ротори, Стокс теоремаси, Циркуляцияни ҳисоблаш	433
4-§	Потенциал майдон, Потенциал майдондаги чизикли интеграл, Гамельтон ва Лаплас операторлари	436
	9- намунавий ҳисоб топшириқлари	442
13- б о б.	Математик физиканинг асосий тенгламалари	451
1-§	Тор тебраниш тенгламаси учун Коши масаласини Даламбер усули билан ечиш	451
2-§	Несий чик ўтказиш (гулкни) тенгламаси учун аралиш масалани Фурье усули билан ечиш	457
3-§	Дирихле масаласини доирада Фурье усули билан ечиш	461
14- б о б.	Эҳтимолликлар назарияси ва математик статистика	464
1-§	Эҳтимолликнинг классик ва статистик таърифлари, Геометрик эҳтимоллик	464
2-§	Ҳадисалар алгебраси, Эҳтимолликларни қушиш ва қупайтариш теоремалари, Шартли эҳтимоллик	470
3-§	Боглиқмас синовлар кетма-кетлиги, Бернулли формуласи, Муавр — Лаплас ва Пуассон теоремалари	476
4-§	Дискрет тасодифий миқдорлар, Баъзи тақсимот конуллари	481
5-§	Узлуксиз тасодифий миқдорлар, Айрим тақсимот конуллари	489
6-§	Дискрет ва узлуксиз тасодифий миқдорларнинг математик кутилиши ва дисперсияси	498
	11- назорат иши	506

7- §.	Боғлиқмас тасодифий микдорлар йиғиндисининг таксимоти. Тасодифий аргумент функцияси	518
8- §.	Икки ўлчовли боғлиқмас тасодифий микдорлар. Корреляция моменти ва корреляция коэффициенти	528
9- §.	Вариация катор учун полиган ва гистограмма <i>1- лаборатория машғулоти</i>	539 548
10- §.	Математик кутилиш ва дисперсия учун ишончли ораликлар	550
11- §.	Гипотезаларни Пирсоннинг мувофиқлик критерийси буйича текшириш <i>2- лаборатория машғулоти</i> <i>12- назорат иши</i> <i>10- намунавий ҳисоб топшириғи</i>	555 561 570 580
15- б о б.	Асосий сонли усуллар	605
1- §.	Чизикли тенгламалар системасини ечишнинг Жордано — Гаусс усули ва унинг татбиқи <i>3- лаборатория машғулоти</i>	605 614
2- §.	Тенгламалар ва тенгламалар системаларини ечишнинг итерация усуллари <i>4- лаборатория машғулоти</i>	615 621
3- §.	Оддий дифференциал тенгламаларни ечишнинг сонли усуллари. Эйлер усули ва унинг модификациялари <i>5- лаборатория машғулоти</i> <i>Иловалар</i> <i>Адабиёт</i>	622 626 628 633

Елкин Учқунович Соатов

ОЛИЙ МАТЕМАТИКА

3- жилд

*Олий техника ўқув юртлари талабалари
учун дарслик*

Тошкент «Ўзбекистон» 1996

Мухаррир *Н. Гошпов*
Расмлар мухаррири *Т. Қаноатов*
Техник мухаррир *У. Ким*
Мусахҳиҳа *У. Абдуқодирова*

Теришга берилди 22.08.95. Босишга рухсат этилди 24.01.96. Қоғоз формати 60×90¹/16. Тип таймс гарнитурادا. Офсет босма усулида босилди. Шартли босма листи 40,0. Нашр. л. 40,17 Тиражи 5000. Буюртма 665.

«Ўзбекистон» нашриёти, 700129, Тошкент, Навоий, 30

Ўзбекистон Республикаси Давлат матбуот қўмитасининг ижарадаги
Тошкент матбаа комбинати 700129, Тошкент, Навоий кучаси, 30.

С 73

Соатов Е. У.

Олий математика: Олий техника ўқув юртлари учун
дарслик. 5 жилдлик. 3- жилд.— Т.: Ўзбекистон, 1996.—
640 б.

22.11я73

№ 3- 96

Алишер Навоий номидаги
Ўзбекистон Республикасининг
Давлат кутубхонаси

